Index kewensis plantarum phanerogam...

Théophile Durand, William Turner Thiselton-Dyer, ...

INDEX KEWENSIS

PLANTARUM PHANEROGAMARUM

SUPPLEMENTUM TERTIUM

NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM GENERUM ET SPECIERUM

AB INITIO ANNI MDCCCCI USQUE AD FINEM

ANNI MDCCCCV COMPLECTENS

DUCTU ET CONSILIO D. PRAIN

CONFECERUNT

HERBARII HORTI REGII BOTANICI KEWENSIS CURATORES

OXONII

E PRELO CLARENDONIANO

M DCCCC VIII

LONDINI ET NOVI EBORACI

APUD HENRICUM FROWDE, A.M.

Oxonii: Excudebat Horatius Hart, A.M., Typographus Academicus

MONITUM

INDICIS Kewensis Plantarum Phanerogamarum supplementum 2um usque ad annum 1900 prolatum, ductu et consilio v. cl. W. T. THISELTON-DYER a curatoribus Herbarii Kewensis confectum, eodem modo atque Index ipse impressum anno 1904 e Prelo Clarendoniano in usum publicum editum est.

Supplementum nostrum 3um usque ad anni 1905 finem prolatum priori conforme lectoribus nunc commendamus.

D. PRAIN

Dabamus in Horto Regio Kewensi mense Martio a. 1908.

INDICIS KEWENSIS

SUPPLEMENTUM TERTIUM

NOMINA PLANTARUM PHANEROGAMARUM OMNIA

ANNIS M.DCCCCI—M.DCCCCV EDITA

COMPLECTENS

ABAMA, Adans. = **Narthecium**, Moehr. (Liliac.).
occidentalis, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 47 = N. californicum.

ABBEVILLEA, Berg = **Campomanesia**, Ruiz & Pav. (Myrtac.).
bullata, Barb. Rodr. Myrt. Parag. 17.—Parag.

ABELICEA, Reichb. = **Zelkova**, Spach (Urtic.).
hirta, Schneider, Ill. Handb. Laubholzk. i. (1904) 226 = Z. Keaki.

ABELMOSCHUS, Medic. (Malvac.).
[Hibiscus, Linn. I. K.]
mindanaensis, *Warb. ex Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 111.—Ins. Philipp.
Sharpei, *Copeland, ex Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 29.—Ins. Philipp.

ABEREMOA, Aubl. = **Duguetia**, St. Hil. (Anonac.).
asterotricha, Diels, ex Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 128.—Reg. Amaz.
brevipedunculata, R. E. Fries, in Arkiv Bot. Stockh. iv. no. 19, 8.—Bras.
hadrantha, Diels, ex Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 128.—Reg. Amaz.
Jonasiana, R. E. Fries, in Arkiv Bot. Stockh. iv. no. 19, 10.—Bras.
laevis, R. E. Fries, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1170.—Parag.
stelechantha, Diels, ex Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 129.—Reg. Amaz.
Ulei, Diels, ex Pilg. l. c. 130.—Reg. Amaz.

ABIES, Tourn. (Conif.).
cephalonica, *Loudon, in Gard. Mag.* xiv. (1838) 81; *Arb. Brit.* iv. (1838) 2325.—Graecia.
gracilis, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xx. 203.—As. bor.
Lowii, Annesley, Beaut. Trees & Shrubs, 21 sub tab. = Lowiana.

ABOLBODA, Humb. & Bonpl. (Xyrid.).
macrostachya, *Spruce, ex Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. no. 19, 15.—Venez.

ABRONIA, Juss. (Nyctag.).
aurita, *Abrams, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 537.—Calif.
Bakeri, *Greene, Pl. Baker.* iii. 32.—Am. bor.
cheradophila, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 364.—Am. bor.
fallax, *Heimerl, ex Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 684.—Am. bor.
glabra, *Rydb. l. c.* 685.—Am. bor.
lanceolata, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
Nelsoni, *Heimerl, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, v. 101.—Am. bor.
nudata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 683.—Am. bor.
pedunculata, *Rydb. l. c.* 686.—Am. bor.
pinetorum, *Abrams, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 537.—Calif.
pumila, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 683.—Am. bor.
salsa, *Rydb. l. c.* 684.—Am. bor.

ABRUS, Linn. (Legum.).
Abrus, W. F. Wright, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. 171 = A. precatorius.

ABUTILON, Tourn. (Malvac.).
Abutilon, Shafer, in Ann. Carneg. Mus. i. 32 = A. Avicennae.
austroafricanum, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 25.—Afr. austr.
cornutum, *Dalz. ex T. Cooke, Fl. Bombay*, 98.—Ind. or.
cyclonervosum, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 27.—Boliv.
dentatum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 318.—Mexic.
fragile, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. (1903), 156.—Calif.
Hassleranum, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 90.—Parag.
Holwayi, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 318.—Mexic.
Lauraster, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 24.—Madag.
leucophaeum, *Hochr. l. c.* 15.—Ind. occ.
Lugardii, *Hochr. & Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 825.—Afr. trop.
parvifolium, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 26.—Bras.
Pringlei, *Hochr. l. c.* 14.—Am. bor.
pseudangulatum, *Hochr. l. c.* 13.—Madag.
pseudostriatum, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 24.—Hab.?
pycnodon, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1001.—Afr. trop.
rufivelum, *K. Schum. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 47, nomen.—Bras.
rugosulum, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 288.—Parag.
simulans, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 318.—Mexic.
subpapyraceum, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 23.—Ind. occ.

ACACIA, Tourn. (Legum.).
acuaria, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 7.—Austral.
acutata, *Fitzg. l. c.* 6.—Austral.
aestivalis, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 300.—Austral.
ambigua, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 31 = sericocarpa.
ancistrophylla, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 40.—Austral.
Andrewsii, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 6.—Austral.
Antunesii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 76.—Afr. trop.
Benthami, *Rochbr. Toxic. Afric.* ii. 192.—Afr. austr.
Buchananii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 76.—Afr. trop.
Cambagei, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 661.—Austral.
camptoclada, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 309.—Austral.
camptoclada, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 39.—Austral.
Cliftoniana, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 10.—Austral.

ACACIA:—
collina, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 291.—Austral.
comans, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 6.—Austral.
Cometes, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 39.—Austral.
compacta, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 31.—Am. cent.
crinita, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. (1905) 198.—Mexic.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. 80.—Afr. trop.
dictyoneura, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 303.—Austral.
Dielsii, *Pritz. l. c.* 294.—Austral.
Dorothea, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxvi. 12.—Austral.
dubia, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 9.—Austral.
duriuscula, *Fitzg. l. c.* 15.—Austral.
eremaea, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 40.—Austral.
euphleba, *Fitzg. in Journ. W. Austr. Nat. Hist. Soc.* i. 16.—Austral.
exocarpoides, *Fitzg. l. c.* 7.—Austral.
Fitzgeraldii, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 291.—Austral.
flabellifolia, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 11.—Austral.
Forrestiana, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 298.—Austral.
Hassleri, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 486.—Parag.
hebecladoides, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 195, nomen; *in Engl. Jahrb.* xxxvi. 208.—Afr. trop.
Hova, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 66 (= *Pithecolobium Perrilleanum*).—Madag.
Iguana, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 281.—Mexic.
inamabilis, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 280.—Austral.
insolita, *Pritz. l. c.* 310.—Austral.
Kirkii, *Harms (an Oliv.?), in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 243.—Afr. trop.
lasiocalyx, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 41.—Austral.
leptacantha, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 296.—Austral.
leucosperma, *F. Muell. & Pritz. ex Pritz. l. c.* 302.—Austral.
linophylla, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 16.—Austral.
Lujaei, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 99.—Afr. trop.
macilenta, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 31.—Mexic.
merinthophora, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 307.—Austral.
Merkeri, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 195, nomen; *in Engl. Jahrb.* xxxvi. 208.—Afr. trop.
Moirii, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 312.—Austral.
Mooreana, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 10.—Austral.

ACACIA :—
moroadavensis, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 62.—Madag.
multilineata, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 13.—Austral.
neurophylla, *Fitzg. l. c.*—Austral.
occidentalis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 32.—Mexic.
poliochroa, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 293.—Austral.
porphyrochila, *Pritz. l. c.* 299.—Austral.
prismifolia, *Pritz. l. c.* 293.—Austral.
psammophila, *Pritz. l. c.* 294.—Austral.
purpureapetala, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xv. 780.—Austral.
ramulosa, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 15.—Austral.
Randelliana, *Fitzg. l. c.* 14.—Austral.
resinomarginea, *Fitzg. l. c.* 15.—Austral.
resinostipulea, *Fitzg. l. c.* 12.—Austral.
Ridleyana, *Fitzg. l. c.*—Austral.
Sakalava, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 65.—Madag.
sambesiaca, *Schinz, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxviii. 416.—Afr. trop.
Sassa, *Baill. ex Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 71 (= *Mimosa Sassa*).—Madag.
sericocarpa, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. (1904) 9.—Austral.
sericocarpa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 300 (1905).—Mexic.
songwensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 317.—Afr. trop.
sonorensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 31.—Mexic.
sorophylla, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 296.—Austral.
sphaerostachya, *Pritz. l. c.* 305.—Austral.
tamminensis, *Pritz. l. c.* 290.—Austral.
trachycarpa, *Pritz. l. c.* 308.—Austral.
Tratmaniana, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 8.—Austral.
Trentiniani, *A. Cheval. in Act. Congr. Intern. Bot.* 1900 (1901), 272.—Afr. trop.
trichopetala, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 70 (= *Albizzia trichopetala*).—Madag.
unijuga, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 32.—Mexic.
vernicosa, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 11.—Austral.
verrucifera, Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 17 = Kirkii.
xerophila, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 8.—Austral.
xiphophylla, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 305.—Austral.
Zygia, *Baill. ex Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 71 (= *Inga Zygia*).—Madag.

ACAENA, Linn. (Rosac.).
Alboffii, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 477.—Fuegia.
Hystrix, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 296.—Reg. Argent.
tehuelcha, *Speg, Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 49.—Patag.

ACALYPHA, Linn. (Euphorb.).
Adamsii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 161.—Ins. Galap.
albemarlensis, *Robinson, l. c.* 163.—Ins. Galap.
benensis, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 304.—Bolivia.
Brittoni, *Rusby, l. c.* 303.—Bolivia.
caturoides, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 298.—N. Guin.
chathamensis, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 163.—Ins. Galap.
Engleri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 372.—Afr. trop.
erosa, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 305.—Bolivia.
glandulosa, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 605.—Parag.
grandispicata, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 304.—Bolivia.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 606.—Parag.
inaequalis, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 303.—Bolivia.
Lechleri, *Rusby, l. c.* 304.—Bolivia.

ACALYPHA :—
oreopola, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 82.—Mexic.
paraguariensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 606.—Parag.

ACAMPTOCLADOS, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 139 (1903). *GRAMINEAE.*
sessilispicus, *Nash, l. c.* 140 (= *Eragrostis sessilispica*).—Am. bor.

ACANTHOCLADUS, Klotzsch = **Polygala**, Linn. (Polygal.).
carasaensis, Gluz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. III. 28, nomen.—Bras.

ACANTHOCOCOS, Barb. Rodr. Palm. Hassl. Nov. 1 (1900). *PALMAE.*
Hassleri, *Barb. Rodr. l. c.* 2.—Parag.

ACANTHOPANAX, Miq. (Aral.).
brachypus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxvi. Beibl. lxxxii. 80.—China.
Giraldii, *Harms, l. c.*—China.

ACANTHOPHIPPIUM, Blume (Orchid.).
splendidum, *J. J. Sm. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lviii. (1898) 360 descr.—Celebes.

ACANTHOPHYLLUM, C. A. Mey. (Caryophyll.).
adenophorum, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 867.—As. cent.
spinidens, *Freyn, l. c.* 870.—As. cent.
stenostegium, *Freyn, l. c.* 866.—As. cent.
viscidum, *Freyn, l. c.* 869.—As. cent.

ACANTHOPSIS, Harv. (Acanth.).
Hoffmannseggiana, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 35 (= *Acanthodium Hoffmannseggianum*).—Afr. austr.
trispina, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. austr.

ACANTHOSPERMUM, Schrank (Compos.).
microcarpum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 208.—Ins. Galap.

ACANTHOSYRIS, Griseb. (Santal.).
platensis, *Speg. in Com. Mus. Buenos Aires*, i. 314.—Reg. Argent.

ACANTHURA, Lindau, in Engl. Jahrb. xxx. (1901) 196. *ACANTHACEAE.*
mattogrossensis, *Lindau, l. c.* 197.—Bras.

ACANTHUS, Tourn. (Acanth.).
Perringi, *Siehe, in Gard. Chron.* 1905, t. 2.—As. Min.
Villaeanus, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. (1903) 148.—Afr. trop.

ACER, Tourn. (Sapind.).
diffusum, *Greene, Pittonia*, v. 2.—Am. bor.
erianthum, *Schwerin, in Engl. Pflanzenreich, Acer.* 22.—China.
Fargesi, *Franch. in Sarg. Trees & Shrubs*, 180.—China.
flabellatum, *Rehd. in Sarg. Trees & Shrubs*, 161, t. 81.—China.
Giraldii, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Acer.* 79.—China.
Grosseri, *Pax, l. c.* 80.—China.
Heyhachii, Matsum. ex Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 115 = japonicum.
lanceolatum, *Molliard, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 134.—China.
laxiflorum, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Acer.* 36.—China.
longipes, *Franch. in Sarg. Trees & Shrubs*, 178.—China.
Macounii, *Greene, Pittonia*, v. 2.—Am. bor.
modocense, *Greene, l. c.* 4.—Am. bor.
neo-mexicanum, *Greene, l. c.* 3.—Am. bor.
philippinum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 36.—Ins. Philipp.
pseudo-sieboldianum, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxii. 725.—China.
Regelii, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Acer.* 60.—Turkest.
robustum, *Pax, l. c.* 79.—China.
Schoenermarkiae, *Pax, l. c.* 71.—China.
subserratum, *Greene, Pittonia*, v. 1.—Am. bor.

ACER :—
Torreyi, *Greene, Pittonia*, v. 2.—Am. bor.
triflorum, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 430.—As. or.
turkestanicum, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Acer.* 49.—Turkest.
Wilsoni, *Rehd. in Sarg. Trees & Shrubs*, 157. t. 79.—China.

ACERIPHYLLUM, Engl. (Saxifr.).
Rossii, Ind. Kew. Suppl. i. 4 sphalm. = Rossii.
Rossii, *Engl. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. IIa. 62.—China.

ACHAETOGERON, A. Gray (Compos.).
ascendens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 254.—Mexic.
griseus, *Greenm. l. c.*—Mexic.
purpurascens, *Greenm. l. c.* xxxix. 94.—Mexic.
versicolor, *Greenm. l. c.* xli. 255.—Mexic.

ACHASMA, Griff. = **Amomum**, Linn. (Scitamin.).
coccineum, Valet. in Bull. Inst. Buitenz. xx. 93 = Am. coccineum.
foetens, Valet. l. c. = Am. foetens.
Walang, Valet. l. c. = Am. Walang.

ACHILLEA, Linn. (Compos.).
arenicola, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 61.—Calif.
Briquetiana, *Chenev. in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève*, ix. 126.—Hybr.
laxiflora, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xv. 179.—Am. bor.
subalpina, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 145.—Am. bor.
veronensis, *Rouy, Illustr. Pl. Eur.* t. 434.—Ital.

ACHYRANTHES, Linn. (Amarant.).
angustifolia, *Lopr. in Malpighia*, xiv. 434; *in Engl. Jahrb.* xxx. 107 (= *Gomphrena angustifolia*).—Ind. or.; Afr. trop.
Fauriei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 422.—Japon.
pedicellata, *Lopr. in Malpighia*, xiv. 433.—Afr. trop.
rubrolutea, *Lopr. l. c.* 432.—Afr. trop.
viridis, *Lopr. l. c.*—Afr. trop.

ACHYROCLINE, Less. (Compos.).
Hallii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 594.—Ecuad.
Lehmannii, *Hieron. l. c.* 595.—N. Granat.

ACHYROSPERMUM, Blume (Labiat.).
ciliatum, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 128.—Afr. trop.
Schlechteri, *Guerke, l. c.* 127.—Afr. trop.

ACIANTHUS, R. Br. (Orchid.).
amplexicaulis, *Rolfe, Orchid Rev.* xi. 344 (= *Microstylis amplexicaulis*).—Austral.
Brunonis, F. Muell. Fragm. v. 96 = exsertus, fornicatus.

ACIDANTHERA, Hochst. (Irid.).
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 278.—Afr. trop.

ACIDOTON, Sw. (Euphorb.).
microphyllus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 302.—Ind. occ.

ACINETA, Lindl. (Orchid.).
Colmani, Hort. in Gard. Chron. 1904, i. 173 = Humboldtii.

ACIOA, Aubl. (Rosac.).
Gilletii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. 47.—Afr. trop.
Goetzeana, *Engl. Jahrb.* xxx. 315.—Afr. trop.
Whytei, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 97.—Afr. trop.

ACKAMA, A. Cunn. (Saxifr.).
Nymanii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 272.—N. Guin.

ACMOPYLE, Pilg. in Engl. Pflanzenreich, Taxac. 117 (1903). *TAXACEAE.*
Pancheri, *Pilg. l. c.* (= *Dacrydium Pancheri*).—N. Caled.

ACNISTUS, Schott (Solan.).
geminifolius, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 384.—Ecuador.
insularis, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 198.—Ins. Galap.
Pringlei, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 56.—Mexic.

ACOMIS, F. Muell. (Compos.).
Lesteri, *Barkill, in Kew Bull.* 1901, 140.—Austral.

ACONITUM, Tourn. (Ranuncul.).
albo-violaceum, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 439.—As. or.
atrocyaneum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 150.—Am. bor.
atrox, Goris, in Bull. Sc. Pharm. Par. iii. (1901) 122, et ex Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc. x. 158, partum = deinorrhizum.
Bakeri, *Greene, Pl. Baker.* iii. 5.—Am. bor.
Balfourii, *Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 160.—Reg. Himal.
Bodinieri, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot.* 1902, 45.—China.
Bruhlii, Goris, in Bull. Sc. Pharm. Par. iii. (1901) 122, et ex Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc. x. 158, partim = deinorrhizum.
cannabifolium, *Franch. ex Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 503.—China.
Cavaleriei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agri. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 78.—China.
chasmanthum, *Stapf, ex Holmes, Mus. Report, Pharm. Soc. G. Brit.* 1903, 2; *et in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 142.—Reg. Himal.
contortum, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 506.—China.
deinorrhizum, *Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 155.—Reg. Himal.
dissectum, Watt, in Agric. Ledger, 1902, No. 3, 100, partim = chasmanthum.
divaricatum, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 511.—China.
Elwesii, *Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 174.—Reg. Himal.
Falconeri, *Stapf, l. c.* 163.—Reg. Himal.
Franchetii, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 510.—China.
Fauriei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agri. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 77.—Japon.
glaberrimum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 151.—Am. bor.
heterophylloides, *Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 171.—Reg. Himal.
hians, Watt, in Agric. Ledger, 1902, No. 3, 101 = chasmanthum.
Hookeri, *Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 147.—Reg. Himal.
jaluense, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 439.—As. or.
laciniatum, *Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 165.—Reg. Himal.
leucanthum, *Stapf, l. c.* 173.—Reg. Himal.
moschatum, *Stapf, l. c.* 139.—Reg. Himal.
Nagarum, *Stapf, l. c.* 176.—Assam.
naviculare, *Stapf, l. c.* 154.—Reg. Himal.
pendulum, *Busch, in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 135.—Tibet.
petiolare, Royle, ex Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc. x. 151 = heterophyllum.
porrectum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 150.—Am. bor.
romanicum, *Woloss. Fl. Polon. Exsicc.* no. 905.—Hungar.
rotundifolium, *Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xv. 139.—As. cent.
soongaricum, *Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 141.—As. cent.
Souliei, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 515.—China.
spicatum, *Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 166.—Reg. Himal.
tatsienense, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 510.—China.
tenue, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 140.—Am. bor.
umbrosum, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxii. 250.—China.
violaceum, *Jacquem. ex Stapf, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 144.—Reg. Himal.
vitifolium, Royle, ex Stapf, l. c. 136 = laeve.

ACORELLUS, Palla, ex Kneuck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1903, 68; et in Koch, Syn. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. III. ii. 2557 (1905). *CYPERACEAE.*
distachyus, *Palla, l. c.* 68; *l. c.* 2558 (= *Cyperus distachyus*).—Reg. Medit.
laevigatus, *Palla, l. c.* 2558 (= *Cyperus laevigatus*).—Sicil.

ACORELLUS:—
pannonicus, *Palla, in Koch, Syn. Deutsch. Schweiz. Fl.* ed. III. ii. 2557 (= *Cyperus pannonicus*).—Eur.

ACORIDIUM, Nees & Meyen (Orchid.).
[Ceratostylis, Blume. I. K.]
abbreviatum, *Rolfe, in Orchid Rev.* 1904, 219 (= *Dendrochilum abbreviatum*).—Java.
Arachnites, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum Arachnites*).—Ins. Philipp.
auritum, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum auritum*).—Java.
barbifrons, *Rolfe, l. c.* (= *Platyclinis barbifrons*).—Sumatra.
bistortum, *Rolfe, l. c.* (= *Platyclinis bistorta*).—Malaya.
brachyotum, *Rolfe, l. c.* 220 (= *Dendrochilum brachyotum*).—Java.
bracteosum, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum bracteosum*).—Malaya.
brevilabratum, *Rolfe, l. c.* (= *Platyclinis brevilabrata*).—Sumatra.
Cobbianum, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum Cobbianum*).—Ins. Philipp.
convallariaeforme, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum convallariaeforme*).—Ins. Philipp.
cornutum, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum cornutum*).—Java.
corrugatum, *Rolfe, l. c.* (= *Platyclinis corrugata*).—Borneo.
cucumerinum, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum cucumerinum*).—Ins. Philipp.?
edentulum, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum edentulum*).—Java.
erosum, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum erosum*).—Java.
filiforme, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum filiforme*).—Ins. Philipp.
globigerum, *Rolfe, l. c.* (= *Platyclinis globigera*).—Borneo.
glumaceum, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum glumaceum*).—Ins. Philipp.
gracile, *Rolfe, l. c.* (= *Platyclinis gracilis*).—Penins. Mal.
grandiflorum, *Rolfe, l. c.* (= *Platyclinis grandiflora*).—Borneo.
Kingii, *Rolfe, l. c.* (= *Platyclinis Kingii*).—Malaya.
latifolium, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum latifolium*).—Ins. Philipp.
lineare, *Rolfe, l. c.* (= *Platyclinis linearis*).—Penins. Mal.
linearifolium, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum linearifolium*).—Penins. Mal.
longifolium, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum longifolium*).—Malaya.
magnum, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum magnum*).—Ins. Philipp.
pumilum, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum pumilum*).—Ins. Philipp.
rufum, *Rolfe, l. c.* (= *Platyclinis rufa*).—Hab.?
sarawakense, *Rolfe, l. c.* (= *Platyclinis sarawakensis*).—Borneo.
simile, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum simile*).—Malaya.
sphacelatum, *Ames, Orchid.* i. 1.—Ins. Philipp.
stachyodes, *Rolfe, in Orchid Rev.* 1904, 220 (= *Platyclinis stachyodes*).—Borneo.
uncatum, *Rolfe, l. c.* (= *Dendrochilum uncatum*).—Ins. Philipp.
Whitfordii, *Rolfe, in Ames, Orchid.* i. 73.—Ins. Philipp.

ACRIDOCARPUS, Guill. & Perr. (Malpigh.).
brevipetiolatus, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 252.—Afr. trop.
ferrugineus, *Engl. l. c.* 250.—Afr. trop.
glaucescens, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, ix. 253.—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 27.—Afr. trop.
macrocalyx, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 250.—Afr. trop.
pruricus, Hook. & Jacks. Ind. Kew. i. 33, sphalm. = pruriens.
pruriens, *A. Juss. in Arch. Mus. Par.* iii. (1843) 492.—Afr. austr.
Scheffleri, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 251.—Afr. trop.

ACRISTA, O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901 555. *PALMAE.*
monticola, *O. F. Cook, l. c.* 557.—Ind. occ.

ACRITOCHAETE, Pilg. in Engl. Jahrb. xxxi. (1902) 53. *GRAMINEAE.*
Volkensii, *Pilg. l. c.* 54.—Afr. trop.

ACROCEPHALUS, Benth. (Labiat.).
Debeerstii, *Briq. ex Th. Dur. & Wildem. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 37.—Afr. trop.
Demeusei, *Briq. l. c.* 36.—Afr. trop.
Descampsii, *Briq. l. c.* 38.—Afr. trop.
Stormsii, *Briq. l. c.* 37.—Afr. trop.

ACROCOMIA, Mart. (Palmae).
erisacantha, *Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio* (1902) 55.—Bras.
media, *O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 566.—Ind. occ.

ACROLASIA, Presl = **Mentzelia**, Linn. (Loasac.).
affinis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 278 = M. affinis.
albicaulis, Rydb. l. c. 277 = M. albicaulis.
aurea, Rydb. l. c. 278 (= *Bartonia aurea*).—Am. bor.
compacta, Rydb. l. c. = M. compacta.
congesta, Rydb. l. c. 277 = M. congesta.
ctenophora, Rydb. l. c. = M. ctenophora.
Davidsoniana, Abrams, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 538.—Calif.
gracilenta, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 278 = M. gracilenta.
gracilis, Rydb. l. c. 1904. 566.—Am. bor.
integrifolia, Rydb. l. c. 1903, 278 = M. dispersa.
latifolia, Rydb. l. c. 1904. 567.—Am. bor.
micrantha, Rydb. l. c. 1903, 278 = M. micrantha.
ngaundereensis, Guerke, in Bauer, Deutsch. Niger-Benue Exped. 163, nomen.—Afr. trop.
nitens, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 278 = M. nitens.
pectinata, Rydb. l. c. = M. gracilenta.
pinetorum, Heller, Muhlenbergia, ii. 99 = M. pinetorum.
tenerrima, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 277 = M. tenerrima.
Tweedyi, Rydb. l. c. = M. Tweedyi.
Veatchiana, Rydb. l. c. 278 = M. albicaulis.
viridescens, Heller, Muhlenbergia, ii. 98.—Calif.

ACRONYCHIA, Forst. (Rutac.).
serrata, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 49.—Ins. Amboin.

ACROTOME, Benth. (Labiat.).
amboensis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1095.—Afr. trop.

ACTAEA, Linn. (Ranunc.).
asplenifolia, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 35.—Am. bor.
californica, *Greene, l. c.* 36.—Am. bor.
caudata, *Greene, l. c.* 35.—Am. bor.

ACTINIDIA, Lindl. (Ternstroem.).
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 75.—China.

ACTINOCARPUS, R. Br. = **Damasonium**, Juss. (Alism.).
stellatus, Bub. Fl. Pyren. iv. 3 = D. stellatum.

ACTINODAPHNE, Nees (Laurac.).
lanceolata, *Dalz. & Gibs. Bomb. Fl.* 312.—Ind. or.

ACTINOMERIS, Nutt. (Compos.).
paniculata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1271 (= *Athanasia paniculata*).—Am. bor.

ACTINOPHLOEUS, Becc. = **Drymophloeus**, Zipp. (Palm.).
furcatus, Becc. in Martelli, Webbia, 302.—N. Guin.

ACTINOSTEMMA, Griff. (Cucurb.).
multilobum, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxix. 602.—China.

ACTINOTUS, Labill. (Umbell.).
Forsythii, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxvii. 60.—Austral.
Moorei, *Rodw. Tasman. Fl.* 65.—Austral.
Paddisoni, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxx. 225.—Austral.
suffocata, *Rodw. Tasman. Fl.* 65.—Austral.

ACTOPLANES, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. (1902) 33. *MARANTACEAE.*
canniformis, *K. Schum. l. c.* 34 (= *Thalia cannaeformis*).—Malaya.
Ridleyi, *K. Schum. l. c.* 35.—Ind. or.

ACUAN, Medic. = **Desmanthus**, Willd. (Legum.).
fallax, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 97.—Am. bor.

ADELIA, P. Br. = **Forestiera**, Poir. (Oleac.).
globularis, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 433.—Am. bor.
pinetorum, Small, l. c.—Am. bor.

ADELIA, Linn. (Euphorb.).
membranifolia, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 604 (= *Ricinella membranifolia*).—Parag.; Bras.

ADELOBOTRYS, DC. (Melast.).
macrophylla, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 165.—Peruv.
multiflora, *Pilg. l. c.* 166.—Peruv.
praetexta, *Pilg. l. c.* 167.—Peruv.

ADENANTHOS, Labill. (Proteac.).
argyrea, *Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 138.—Austral.
cygnorum, *Diels, l. c.*—Austral.

ADENIA, Forsk. (Passifl.).
[MODECCA, Linn. I. K.]
acuminata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 54 (= *Modecca acuminata*).—Malaya.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 360.—Afr. trop.
nicobarica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 52 (= *Modecca nicobarica*).—Malaya.
Schlechteri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 150.—Afr. austr.

ADENIUM, Roem. & Schult. (Apocyn.).
coetaneum, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 227.—Afr. trop.
socotranum, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 286.—Socotra.
somalense, *Balf. f. Bot. Socotra*, 162.—Afr. trop.
namaquarium, Henslow, in The Gardener, 1901, 1194 = Hoodia Currori.

ADENOCALYMNA, Mart. (Bignon.).
glomeratum, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 81.—Parag.
macrocarpum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 9.—Am. cent.

ADENODOLICHOS, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 179 (1902); in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 266 (1903). *LEGUMINOSAE.*
adenophorus, *Harms, l. c.* 180; *l. c.* 267 (= *Dolichos adenophorus*).—Afr. trop.
Anchietae, *Harms, l. c.* 179; *l. c.* 266 (= *Dolichos Anchietae*).—Afr. trop.
Baumii, *Harms, l. c.* 180; *l. c.* 267.—Afr. trop.
Bussei, *Harms, l. c.* 180; *l. c.* 267.—Afr. trop.
euryphyllus, *Harms, l. c.* 180; *l. c.* 267.—Afr. trop.
grandifoliolatus, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 203.—Afr. trop.
Harmsianus, *Wildem. l. c.* 202.—Afr. trop.
macrothyrsus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 180; *in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 267 (= *Dolichos macrothyrsus*).—Afr. trop.
punctatus, *Harms, l. c.* 180; *l. c.* 267 (= *Dolichos punctatus*).—Afr. trop.
rhomboideus, *Harms, l. c.* 179; *l. c.* 266 (= *Dolichos rhomboideus*).—Afr. trop.

ADENOPHORA, Fisch. (Campan.).
Alpini, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 194 (= *Campanula Alpini*).—Hungar.
axilliflora, *Borb. l. c.* 191 (= *Campanula axilliflora*).—China.
Bockiana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 605.—China.
Mikoi, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 192 (= *Campanula Mikoi*).—Eur.
palustris, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 426.—As. or.
perpallens, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 193 (= *Campanula perpallens*).—Eur.
rhomboidea, *Borb. l. c.* 192 (= *Campanula rhomboidea*).—Sibir.
Richteri, *Borb. ex Freyn, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1890, 47, *nomen*; *in Magyar Bot. Lap.* i. 253 (= *Campanula Richteri*).—Sibir.

ADENOPUS, Benth. (Cucurb.).
noctiflorus, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 347.—Afr. trop.
reticulatus, *Gilg, l. c.* 348.—Afr. trop.
rufus, *Gilg, l. c.* 346.—Afr. trop.

ADENOSACME, Wall. (Rubiac.).
[MYCETIA, Reinw. DT. & H.]
Scortechinii, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng* lxxii. 197.—Penins. Mal.

ADENOSMA, R. Br. (Scrophul.).
inopinatum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 16.—Penins. Mal.

ADENOSTEGIA, Benth. = **Cordylanthus**, Nutt. (Scrophul.).
filifolia, Abrams, Fl. Los Angeles, 372 = C. filifolius.

ADESMIA, DC. (Legum.).
aphanantha, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 270 (= *Patagonium aphananthum*).—Patag.
glutinosa, *Arech. in Anal. Mus. Montev.* iii. 351.—Urug.
graminidea, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 272 (= *Patagonium graminideum*).—Patag.
karraikensis, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 31.—Patag.
leptopoda, *Speg. l. c.* 32.—Patag.
salicornioides, *Speg. l. c.* 35.—Patag.
tehuelcha, *Speg. l. c.* 36.—Patag.
uruguaya, *Arech. in Anal. Mus. Montev.* iii. 350.—Urug.

ADHATODA, Tourn. (Acanth.).
[JUSTICIA, Linn. DT. & H.]
Andromeda, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 76 (= *Duvernoia Andromeda*).—Afr. austr.
Duvernoia, *C. B. Clarke, l. c.* 77 (= *Duvernoia adhatodioides*).—Afr. austr.

ADICEA, Rafin. = **Pilea**, Lindl. (Urticac.).
herniarioides, Small, Fl. S. E. U. S. 358 = P. muscosa.

ADINANDRA, Jack (Ternstroem.).
luzonica, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 29.—Ins. Philipp.

ADOPOGON, Neck. = **Krigia**, Schreb. (Compos.).
virginicum, Shafer, in Ann. Carneg. Mus. i. 71 = K. amplexicaulis.

ADYSETON, Adans. = **Alyssum**, Linn. (Crucif.).
orbiculare, Bub. Fl. Pyren. iii. 207 = Alyss. minimum.

AECHMEA, Ruiz & Pav. (Bromel.).
aciculosa, *Mez & Sodiro, ex Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 620.—Ecuador.
inermis, *Mez, l. c.*—Peruv.
lavandulacea, *C. H. Wright, in Bot. Mag.* t. 8005.—Ind. occ.
oligosepala, Ind. Kew. Suppl. i. 12, sphalm. = oligosphaera.
Tonduzii, *Mez & Pittier, ex Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 132.—Am. cent.

AEGIPHILA, Jacq. (Verben.).
Candelabrum, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1168.—Parag.
Hassleri, *Briq. l. c.* 1167.—Parag.
nervosa, *Urb. Symb. Antill.* iii. 366.—Ind. occ.
paraguariensis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1166.—Parag.
platyphylla, *Briq. l. c.* 1168.—Parag.
plicata, *Urb. Symb. Antill.* iii. 365.—Ind. occ.
Swartziana, *Urb. l. c.* 364.—Ind. occ.
uniflora, *Urb. l. c.* 363.—Ind. occ.

AEGLE, Correa (Rutac.).
glutinosa, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* vi. 12 (= *Limonia glutinosa*).—Ins. Philipp.

AEGOPODIUM, Knaut (Umbellif.).
tenera, *Yabe, in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xvi. iv. 46 (= *Chamaele tenera*).—Japon.

AELUROPUS, Trin. (Gramin.).
macrostachyus, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 374.—As. trop.

AEOLANTHUS, Mart. (Labiat.).
adenotrichus, *Guerke, ex Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 224.—Afr. trop.
Edlingeri, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 130.—Afr. trop.
glandulosus, *Guerke, l. c.* xxx. 396.—Afr. trop.
paludosus, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 354.—Afr. trop.

AEOLANTHUS.—
rubescens, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 131.—Afr. trop.
tuberosus, Guerke, l. c. xxx. 395 = rubescens.
uliginosus, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 355.—Afr. trop.
usambarensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 129.—Afr. trop.

AERANTHES, Lindl. (Orchid.).
caudata, *Rolfe, in Kew Bull.* 1901, 149.—Madag.
ramosa, *Rolfe, in Orch. Rev.* ix. 852.—Madag.

AERANTHUS, Reichb. f. (Orchid.).
[MYSTACIDIUM, Lindl. I. K.]
[MACROPLECTRUM, Pfitz. D. T. & H.]
Deistelianus, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiii. 75.—Afr. trop.

AERIA, O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 547. *PALMAE.*
attenuata, *O. F. Cook, l. c.* 548.—Ind. occ.

AERVA, Forsk. (Amarant.).
Ruspolii, *Lopr. in Malpighia*, xiv. 431.—Afr. trop.

AESCHYNANTHUS, Jack (Gesner.).
breviflorus, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 534 (= *Trichosporum breviflorum*).—Ins. Philipp.
buxifolius, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 515.—China.
Forbesii, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 534 (= *Trichosporum Forbesii*).—N. Guin.
humilis, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 516.—China.
neo, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 376.—N. Guin.
nummularius, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 534 (= *Trichosporum nummularium*).—N. Guin.

AESCHYNOMENE, Linn. (Legum.).
Baumii, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 261.—Afr. trop.
bella, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 327.—Afr. trop.
Butayei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. 143.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 64.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. l. c.* Sér. V. 143.—Afr. trop.
glandulosa, *Wildem l. c.* 142.—Afr. trop.
glutinosa, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 947, non Taub.—Afr. austr.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 328.—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 188.—Afr. trop.
madrensis, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 255.—Mexic.
nambalensis, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 261.—Afr. trop.
Newtonii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 948.—Afr. trop.
oligantha, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 256.—Mexic.
paludicola, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 329.—Afr. trop.
paucifoliolata, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 256.—Mexic.
pratensis, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 423.—Am. bor.
Pringlei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 312.—Mexic.
Rehmannii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 947.—Afr. austr.

AESCULUS, Linn. (Sapind.).
austrina, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 359.—Am. bor.

AETHIONEMA, R. Br. (Crucif.).
carneum, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 428 (= *Thlaspi carneum*).—Oriens.
latifolium, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 258.—Oriens.

AFRAMOMUM, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib. 201 (1904). *ZINGIBERACEAE.*
albo-violaceum, *K. Schum. l. c.* 207 (= *Amomum albo-violaceum*).—Afr. trop.
alpinum, *K. Schum. l. c.* 220 (= *Amomum alpinum*)—Afr. trop.
angustifolium, *K. Schum. l. c.* 218 (= *Amomum angustifolium*).—Afr. trop.
arundinaceum, *K. Schum. l. c.* 205 (= *Amomum arundinaceum*).—Afr. trop.

AFRAMOMUM:—
Baumannii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 220.—Afr. trop.
biauriculatum, *K. Schum. l. c.* 207.—Afr. trop.
cereum, *K. Schum. l. c.* 210 (=*Amomum cereum*).—Afr. trop.
citratum, *K. Schum. l. c.* 214 (=*Amomum citratum*).—Afr. trop.
colosseum, *K. Schum. l. c.* 206.—Afr. trop.
crassilabium, *K. Schum. l. c.* 220 (=*Amomum crassilabium*).—Afr. trop.
cuspidatum, *K. Schum. l. c.* 209 (=*Amomum cuspidatum*).—Afr. trop.
Daniellii, *K. Schum. l. c.* 218 (=*Amomum Daniellii*).—Afr. trop.
Elliotii, *K. Schum. l. c.* 217 (=*Amomum Elliotii*).—Afr. trop.
erythrostachyum, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 444.—Afr. trop.
giganteum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 212 (=*Amomum giganteum*).—Afr. trop.
glaucophyllum, *K. Schum. l. c.* 216 (=*Amomum glaucophyllum*).—Afr. trop.
Granum-Paradisi, *K. Schum. l. c.* 213 (=*Amomum Granum-Paradisi*).—Afr. trop.
Hanburyi, *K. Schum. l. c.* 217 (=*Amomum Clusii*).—Afr. trop.
Kayserianum, *K. Schum. l. c.* 210 (=*Amomum Kayserianum*).—Afr. trop.
latifolium, *K. Schum. l. c.* 209 (=*Amomum latifolium*).—Afr. trop.
Laurentii, *K. Schum. l. c.* 213 (=*Amomum Laurentii*).—Afr. trop.
leonense, *K. Schum. l. c.* 214.—Afr. trop.
leptolepis, *K. Schum. l. c.* 216 (=*Amomum leptolepis*).—Afr. trop.
limbatum, *K. Schum. l. c.* 215 (=*Amomum limbatum*).—Afr. trop.
longiscapum, *K. Schum. l. c.* 212 (=*Amomum longiscapum*).—Afr. trop.
luteo-album, *K. Schum. l. c.* 216 (=*Amomum luteo-album*).—Afr. trop.
lycobasis, *K. Schum. l. c.* 215.—Afr. trop.
Mala, *K. Schum. l. c.* 218 (=*Amomum Mala*).—Afr. trop.
Mannii, *K. Schum. l. c.* 209 (=*Amomum Mannii*).—Afr. trop.
masuianum, *K. Schum. l. c.* 212 (=*Amomum masuianum*).—Afr. trop.
Melegueta, *K. Schum. l. c.* 204 (=*Amomum Melegueta*).—Afr. trop.
Meleguetella, *K. Schum. l. c.* 205.—Afr. trop.
pilosum, *K. Schum. l. c.* 206 (=*Amomum pilosum*).—Afr. trop.
polyanthum, *K. Schum. l. c.* 207 (=*Amomum polyanthum*).—Afr. trop.
rostratum, *K. Schum. l. c.* 215 (=*Amomum rostratum*).—Afr. trop.
sanguineum, *K. Schum. l. c.* 219 (=*Amomum sanguineum*).—Afr. trop.
sceptrum, *K. Schum. l. c.* 214 (=*Amomum sceptrum*).—Afr. trop.
stipulatum, *K. Schum. l. c.* 220 (=*Amomum stipulatum*).—Afr. trop.
subsericeum, *K. Schum. l. c.* 217 (=*Amomum subsericeum*).—Afr. trop.
sulcatum, *K. Schum. l. c.* 205 (=*Amomum sulcatum*).—Afr. trop.
tectorum, *K. Schum. l. c.* 210.—Afr. trop.
zambesiacum, *K. Schum. l. c.* 206 (=*Amomum zambesiacum*).—Afr. trop.
Zimmermannii, *K. Schum. l. c.* 207.—Afr. trop.

AFRARDISIA, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 183 (1902). *MYRSINACEAE.*
bracteata, *Mez, l. c.* 184 (=*Ardisia bracteata*).—Afr. trop.
brunneo-purpurea, *Mez, l. c.* 186 (=*Ardisia brunneo-purpurea*).—Afr. trop.
Conraui, *Mez, l. c.* 184 (=*Ardisia Conraui*).—Afr. trop.
cymosa, *Mez, l. c.* 186 (=*Ardisia cymosa*).—Afr. trop.
haemantha, *Mez, l. c.* (=*Ardisia haemantha*).—Afr. trop.
polyadenia, *Mez, l. c.* 185 (=*Ardisia polyadenia*).—Afr. trop.
Sadebeckiana, *Mez, l. c.* 187 (=*Ardisia Sadebeckiana*).—Afr. trop.
Schlechteri, *Mez, l. c.* 185 (=*Ardisia Schlechteri*).—Afr. trop.

AFRARDISIA:—
Staudtii, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 185 (=*Ardisia Staudtii*).—Afr. trop.
Zenkeri, *Mez, l. c.* 186 (=*Ardisia Zenkeri*).—Afr. trop.

AFRIDIA, Duthie (Labiat.).
suavis, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. I. 535 (=*Nepeta suavis*).—Afghan.

AFROCALATHEA, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. (1902) 51. *MARANTACEAE.*
rhizantha, *K. Schum. l. c.* (=*Calathea rhizantha*).—Afr. trop.

AFRODAPHNE, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. (1905) 110. *LAURACEAE.*
calabarica, *Stapf, l. c.* 112.—Afr. trop.
caudata, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.
elata, *Stapf, l. c.* 111 (=*Beilschmiedia elata*).—Afr. trop.
euryneura, *Stapf, l. c.* 112.—Afr. trop.
fruticosa, *Stapf, l. c.* 111 (=*Beilschmiedia fruticosa*).—Afr. trop.
gaboonensis, *Stapf, l. c.* 112 (=*Beilschmiedia gaboonensis*).—Afr. trop.
grandifolia, *Stapf, l. c.* 111 (=*Cryptocarya grandifolia*).—Afr. trop.
Mannii, *Stapf, l. c.* (=*Beilschmiedia Mannii*).—Afr. trop.
minutiflora, *Stapf, l. c.* (=*Beilschmiedia minutiflora*).—Afr. trop.
nitida, *Stapf, l. c.* (=*Beilschmiedia nitida*).—Afr. trop.
obscura, *Stapf, l. c.* 112 (=*Beilschmiedia obscura*).—Afr. trop.
Preussii, *Stapf, l. c.* 111 (=*Beilschmiedia Preussii*).—Afr. trop.
sessilifolia, *Stapf, l. c.* (=*Beilschmiedia sessilifolia*).—Afr. trop.
Staudtii, *Stapf, l. c.* (=*Beilschmiedia Staudtii*).—Afr. trop.
Zenkeri, *Stapf, l. c.* (=*Beilschmiedia Zenkeri*).—Afr. trop.

AFZELIA, J. F. Gmel. = **Seymeria**, Pursh (Scrophul.).
texana, Small, Fl. S. E. U. S. 1072.—Am. sept.

AFZELIA, Sm. (Legum.).
africana, *Persoon, Syn. Pl.* i. 455.—Afr. trop.

AGANONERION, Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn. (1894) 206. *APOCYNACEAE.*
dongnaiense, *Pierre, l. c.* nomen.—Cochinch.

AGAPANTHUS, L'Hérit. (Liliac.).
caulescens, *Spreng. in Bull. Soc. Tosc. Ort.* 1902, 42.—Afr. austr.

AGAPETES, G. Don (Vaccin.).
Hosseana, *Diels, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 16.—Siam.
Moorei, *Hemsl. in Bot. Mag.* t. 7926.—Reg. Himal.
parviflora, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 515.—China.
vaccinioides, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 251.—China.
vaccinioides, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 515.—China.

AGASTACHE, Clayt. (Labiat.).
[LOPHANTHUS, Benth. I.K.S.]
Cusickii, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 59 (=*Lophanthus Cusickii*).—Am. bor.
glaucifolia, *A. A. Heller, l. c.* 32.—Calif.
nepetoides, *Schafer, in Ann. Carneg. Mus.* i. 89.—Am. bor.
occidentalis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 4 (=*Vleckia occidentalis*).—Am. bor.
scrophulariaefolia, *Schafer, in Ann. Carneg. Mus.* i. 89.—Am. bor.

AGATHOSMA, Willd. (Rutac.).
stricta, *Dod, in Journ. Bot.* 1901, 398.—Afr. austr.

AGAURIA, Benth. & Hook. f. (Ericac.).
Goetzei, *Engl. Jahrb.* xxx. 369.—Afr. trop.

AGAVE, Linn. (Amaryll.).
Datylio, *Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 224.—Calif.
Langlassei, *André, Rev. Hortic.* 1901, 349.—Mexic.
Simoni, *André, l. c.* 1904, 297.—Hort.
tequilana, *Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 220.—Mexic.
Treleasii, *Toum. in Missouri Bot. Gard. Rep.* xii. 75.—Am. bor.

AGERATELLA, A. Gray (Compos.).
Palmeri, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xli. 272.—Mexic.

AGERATINA, O. Hoffm. (Compos.).
fruticosa, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 426.—Afr. trop.

AGERATUM, Linn. (Compos.).
lucidum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 475.—Mexic.
rhytidophyllum, *Robinson, l. c.* 476.—Mexic.
stachyofolium, *Robinson, l. c.*—Mexic.

AGLAIA, Lour. (Meliac.).
Aherniana, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 32.—Ins. Philipp.
aponoa, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 30.—Ins. Philipp.
Bauerleni, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 175.—N. Guin.
Betchei, *C. DC. l. c.* 179.—Ins. Samoa.
Bordenii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 22.—Ins. Philipp.
Chalmersi, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 173.—N. Guin.
Clarkii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 21.—Ins. Philipp.
Edelfeldti, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 174.—N. Guin.
Forbesiana, *C. DC. l. c.*—N. Guin.
glomerata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 30.—Ins. Philipp.
Harmsiana, *Perkins, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 78.—Ins. Philipp.
Hartmanni, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 173.—N. Guin.
laevigata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 31.—Ins. Philipp.
leucoclada, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 172.—N. Guin.
micrantha, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 22.—Ins. Philipp.
monophylla, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 33.—Ins. Philipp.
myristicifolia, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 176.—N. Guin.
novoguineensis, *C. DC. l. c.* 173 (=*Aglaiopsis glaucescens*).—N. Guin.
oxypetala, *Valet. in Ic. Bogor.* t. 86.—Hort.
parviflora, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 176.—N. Guin.
parvifolia, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 21.—Ins. Philipp.
pauciflora, *Merrill, l. c.* xxxv. 31.—Ins. Philipp.
subminutiflora, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 175.—N. Guin.
Whitmeei, *C. DC. l. c.* 178.—Ins. Samoa.
Ysermanni, *Boerl. & Koord. in Ic. Bogor.* t. 87.—Malaya.

AGLAONEMA, Schott (Arac.).
densinervium, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 134.—Ins. Philipp.
hospitum, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 226.—Siam.
latifolium, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 134.—Ins. Philipp.
siamense, *Engl. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 275.—Siam.
tenuipes, *Engl. l. c.*—Siam.

AGLOSSORRHYNCHA, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, (1905) 133. *ORCHIDACEAE.*
aurea, *Schlechter, l. c.*—Ins. Bismarck.

AGOSERIS, Rafin. = **Troximon**, Nutt. (Compos.).
agrestis, Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 645.—Am. bor.
arachnoidea, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 511.—Am. bor.
attenuata, Rydb. l. c. 1905, 136.—Am. bor.
humilis, Rydb. l. c. 137.—Am. bor.
maculata, Rydb. l. c. 136.—Am. bor.
maritima, Sheldon, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 310.—Am. bor.
maritima, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 501.—Am. bor.
pubescens, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 511.—Am. bor.
roseata, Rydb. l. c. 1905, 136.—Am. bor.
rostrata, Rydb. l. c. 137.—Am. bor.

AGRESTIS, Bub. Fl. Pyren. iv. (1901) 281 = **Agrostis**, Linn. (Gramin.).

AGROPYRON, J. Gaertn. (Gramin.).
arenicolum, *Davy, in Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 76.—Am. bor.
Bakeri, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxviii. 378.—Am. bor.
Coxii, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxxiv. 395.—Ins. Chatham.
flexuosum, *Piper, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xviii. 149 (= *Sitanion flexuosum*).—Am. bor.
fuegianum, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 245 (= *Triticum fuegianum*).—Reg. Magell.
Griffithsi, *Scribn. & Sm. ex Piper, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xviii. 148.—Am. bor.
incrustatum, *Adam. in Denkschr. Akad. Wien, Math. Nat.* lxxiv. 119.—Turcia.
libanoticum, *Hack. ex Kneuck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1904, 21.—As. Min.
sitanioides, *J. G. Sm. ex Piper, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xviii. 149.—Am. bor.
subvillosum, *E. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxviii. 378.—Am. bor.

AGROSTIS, Linn. (Gramin.).
ampla, *Hitchc. in U. S. Dept. Agric. Bull. Pl. Ind.* lxviii. 38.—Am. bor.
bacillata, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 59.—Am. cent.
breviculmis, Hitchc. in U.S. Dept. Agric. Bull. Pl. Ind. lxviii. 36 = nana.
Castriferrei, *Waisb. in Magyar Bot. Lap.* iv. 56, 68.—Eur.
Davyi, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xxx. 3.—Am. bor.
Elmeri, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 7.—Ins. Philipp.
eremophila, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 190.—Patag.
eriantha, *Hack. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich.* xlix. 172.—Afr. austr.
gredensis, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 400.—Hispan.
Hackelii, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1. 175.—Reg. Argent.
Hugoniana, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 389.—China.
Lemmoni, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xxx. 3.—Am. bor.
longiligula, *Hitchc. in U. S. Dept. Agric. Bull. Pl. Ind.* lxviii. 54.—Calif.
melaleuca, *Hitchc. l. c.* 51.—Am. bor.
obtusissima, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 107.—Ins. Mader.
occidentalis, *Scribn. & Merrill, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 466.—Am. bor.
Paulsenii, *Hack. ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 165.—As. cent.
Petriei, *Hack. in Trans. Proc. N. Z. Inst.* xxxv. 379.—N. Zel.
Pittieri, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 60.—Am. cent.
sanctaecruzensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 186.—Patag.
Scribneriana, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 126.—Am. bor.
Sodiroana, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 61.—Ecuador.
tehuelcha, *Speg. in Anal. Mus Buenos Aires*, vii. 186.—Patag.
Thurberiana, *Hitchc. in U. S. Dept. Agric. Bull. Pl. Ind.* lxviii. 23.—Am. bor.
valdiviana, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 58.—Chili.

AGROSTISTACHYS, Dalz. (Euphorb.).
borneensis, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 331.—Borneo.

AGROSTOPHYLLUM, Blume (Orchid.).
amboinense, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* ii. t. 111 B.—Ins. Malay.
atrovirens, *J. J. Sm. l. c.* t. 111 A.—Ins. Malay.
bicuspidatum, *J. J. Sm. l. c.* sub t. 110 A (= *Appendicula callosa*).—Burma; Malaya.
callosum, J. J. Sm. Orchid. Java, 286 = bicuspidatum.
cyathiforme, *J. J. Sm. l. c.* 281.—Java.
dolichophyllum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 127.—N. Guin.

AGROSTOPHYLLUM:—
Drakeanum, *Kraenzl. in Journ. de Bot.* 1903, 422.—N. Caled.
Hasseltii, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* ii. sub t. 110 A (= *Appendicula Hasseltii*).—Burma.
leucocephalum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 128.—N. Guin.
papuanum, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
spicatum, *Schlechter, l. c.* 129.—N. Guin.
uniflorum, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.

AILANTHUS, Desf. (Simarub.).
grandis, *Prain, in Ind. Forester*, xxviii. (1902) 131.—Ind. or.
Kurzii, *Prain, l. c.* 133.—Indo-China.
philippinensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 23.—Ins. Philipp.
Vilmoriniana, *Dode, in Rev. Hortic.* 1904, 444.—China.

AINSLIAEA, DC. (Compos.).
elegans, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2747.—China.
glabra, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. 471.—China.
Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 628.—China.
ovalifolia, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 119.—China.
ramosa, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. 471.—China.
scabrida, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 510.—China.
sparsiflora, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 118.—China.
spicata, *Vaniot, l. c.* 117.—China.
undulata, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 629.—China.

AIOUEA, Aubl. (Laurac.).
farinosa, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 13.—Bras.
Hassleri, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 823, nomen; iii. (1903) 229.—Parag.
marginata, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 13.—Bras.
Schwackeana, *Mez, l. c.* 12.—Bras.

AIRA, Linn. (Gramin.).
scoparia, *Adam. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxiv. 117.—Turcia.
Todari, *Tin. ex Ponzo, in Bull. Bot. Soc. Bot. Ital.* 1903, 201.—Sicil.

AIZOON, Linn. (Ficoid.).
Kochii, *Wagner, in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xix. 80.—Austral.

AJAX, Salisb. = **Narcissus**, Linn. (Amaryll.).
asturiensis, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. 4.—Hispan.
concolor, Jord. l. c. 1.—Gallia.
festinus, Jord. l. c. 2.—Gallia.
Gayi, Henon, in Jord. l. c.—Hab. ?
macrolobus, Jord. l. c. 3.—Gallia.
montinus, Jord. l. c.—Gallia.
parviflorus, Jord. l. c. 4.—Eur.
platylobus, Jord. l. c. 2.—Eur.
porrigens, Jord. l. c. 3.—Gallia.
praelongus, Jord. l. c. 2.—Hab. ?
serotinus, Jord. l. c. 3.—Eur.
tubulosus, Jord. l. c. 4.—Eur.

AJUGA, Linn. (Labiat.).
Labordei, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* Sér. III. xiii. 185.—China.

AKEBIA, Decne. (Berberid.).
Chaffanjoni, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 1.—China.

ALAFIA, Thou. (Apocyn.).
Benthamii, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. 1. 199 (= *Ectinocladus Benthami*).—Afr. trop.
Butayei, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.
clusioides, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 181.—Afr. trop.
grandis, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. 1. 196.—Afr. trop.
parciflora, *Stapf, l. c.* 610.—Afr. trop.
Schumannii, *Stapf, l. c.* 197.—Afr. trop.
Whytei, *Stapf, l. c.* 610.—Afr. trop.

ALANGIUM, Lam. (Cornac.).
costatum, *Boerl. ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 78, nomen.—Hab. ?

ALANGIUM:—
ebenaceum, *Griff. ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 78 (= *Marlea ebenacea*).—Penins. Mal.
Meyeri, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 54.—Ins. Philipp.
nobile, *Harms, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 79 (= *Marlea nobilis*).—Penins. Mal.
Ridleyi, *King, l. c.* 78.—Penins. Mal.
uniloculare, *King, l. c.* 77 (= *Marlea unilocularis*).—Penins. Mal.

ALBIZZIA, Durazz. (Legum.).
Antunesiana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 75.—Afr. trop.
bracteata, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 493.—China.
brevifolia, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér II. ii. 945.—Afr. austr.
euryphylla, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 151.—Afr. trop.
intermedia, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 751.—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 37.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 92.—Afr. trop.
Richardiana, *King & Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* ix. 32.—Madag.
Warneckei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 75.—Afr. trop.

ALBUCA, Linn. (Liliac.).
acuminata, *Baker, in Rec. Albany Mus.* i. 90.—Afr. austr.
affinis, *Baker, l. c.* 93.—Afr. austr.
bifolia, *Baker, l. c.* 89.—Afr. austr.
brevipes, *Baker, l. c.* 92.—Afr. austr.
circinata, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
concordiana, *Baker, l. c.* 93.—Afr. austr.
Dalyae, *Baker, l. c.* 90.—Afr. austr.
Erlangeriana, *Engl. Jahrb.* xxxii. 92.—Afr. trop.
glauca, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 999.—Afr. austr.
granulata, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 12.—Afr. trop.
longifolia, *Baker, in Rec. Albany Mus.* i. 91.—Afr. austr.
longipes, *Baker, l. c.* 93.—Afr. austr.
malangensis, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 786.—Afr. trop.
micrantha, *Baker, in Rec. Albany Mus.* i. 93.—Afr. austr.
Schlechteri, *Baker, l. c.* 92.—Afr. austr.
Schlechteri, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 787.—Afr. austr.
Schoenlandi, *Baker, in Rec. Albany Mus.* i. 90.—Afr. austr.
semipedalis, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
sordida, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 787.—Afr. trop.
zebrina, *Baker, in Rec. Albany Mus.* i. 92.—Afr. austr.
Zenkeri, *Engl. Jahrb.* xxxii. 93.—Afr. trop.

ALCEA, Tourn. = **Althaea**, Tourn. (Malvac.).
karakalensis, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 1066.—Turkestan.

ALCHEMILLA, Linn. (Rosac.).
acuminatidens, *Buser, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 624.—Eur.
alpigena, *Buser, in Bull. Soc. Nat. Ain*, Nov. 1903, 23.—Eur.
chirophylla, *Buser, l. c.* 24.—Eur.
compta, *Buser, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 471.—Eur.
controversa, *Buser, in Bull. Soc. Nat. Ain*, Nov. 1903, 25.—Eur.
flaccida, *Buser, l. c.* 28.—Eur.
flavicoma, *Buser, ex Schroet. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xiv. 120.—Eur.
flavo-virens, *Buser, in Bull. Soc. Nat. Ain*, Nov. 1903, 33.—Eur.
floribunda, *Buser, l. c.* 21.—Eur.
floribunda, *Murb. in Act. Univ. Lund.* xxxvi. *Afd.* II. No. 1. (1903) 31.—Afr. bor.; Graecia.
glacialis, *Buser, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 514.—Helvet.

ALCHEMILLA:—
hirtipes, *Buser, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 473.—Eur.
Juquetiana, *Buser, l. c.* ii. 619.—Eur.
longana, *Buser, l. c.* i. 468.—Eur.
Marcailhouorum, *Buser, in Bull. Ass. Fr. Bot.* v. 124, *fide Hua, in Bot. Centralbl.* xc. 172.—Eur.
nitida, *Buser, in Bull. Soc. Nat. Ain*, Nov. 1903, 33.—Eur.
obscura, *Buser, l. c.* 30.—Eur.
Othmari, *Buser, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 464.—Eur.
petiolulans, *Buser, in Bull. Soc. Nat. Ain.* Nov. 1903, 24.—Eur.
rhododendrophila, *Buser, l. c.* 34.—Eur.
trichocalycina, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* iv. 125.—Serbia.
venosula, *Buser, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 466.—Eur.

ALCHORNEA, Sw. (Euphorb.).
Pearcei, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 305.—Bolivia.
Pittieri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 291.—Am. cent.

ALCOCERIA, Fern. in Proc. Am. Acad. xxxvi. (1901) 493. *EUPHORBIACEAE.*
Pringlei, *Fern. l. c.*—Mexic.

ALECTOROLOPHUS, Moench = **Rhinanthus**, Linn. (Scrophul.).
apterus, Ostenf. in Bot. Notiser, 1904, 83, 97.—Eur.
arcticus, Sterneck, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, i. II. 114.—Am. bor.
arenarius, Borbas, ex Behrend. & Sterneck, in Verh. Bot. Ver. Brand. xlv. 211.—Eur.
arvernensis, Sterneck, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, i. II. 58.—Eur.
Behrendsenii, Sterneck, ex Behrend. & Sterneck, in Verh. Bot. Ver. Brand. xlv. 202.—Eur.
Beyeri, Behrend. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlv. 47.—Eur.
bosniacus, Behrend. ex Behrend. & Sterneck, in Verh. Bot. Ver. Brand. xlv. 210.—Eur.
Burnati, Sterneck, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, i. II. 52.—Eur.
Chaberti, Behrend. ex Behrend. & Sterneck, in Verh. Bot. Ver. Brand. xlv. 204.—Eur.
deminutus, Sterneck, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, i. II. 69.—Eur.
divaricatus, Sterneck, l. c. 64.—Eur.
Drummond-Hayi, Sterneck, l. c. 115.—Eur.
dubius, Poeverl. in Ber. Bayr. Bot. Ges. x. (1905) 22; Fedde Repert. Nov. Sp. i. 144.—Hybr.
elatus, Sterneck, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, i. II. 83.—Eur.
erectus, Sterneck, l. c. 86.—Eur.
Facchinii, Sterneck, l. c. 38 = R. Facchinii.
gracilis, Sterneck, l. c. 93.—Eur.
Heldreichii, Behr. in Allg. Bot. Zeitschr. 1904, 37.—Graecia.
illyricus, Beck & Sterneck, ex Sterneck, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, i. II. 102.—Eur.
Kyrollae, Sterneck, l. c. 119 = R. Kyrollae.
mediterraneus, Sterneck, l. c. 54.—Eur.; As. Min.
modestus, Sterneck, l. c. 33.—Eur.
monticola, Sterneck, l. c. 111.—Eur.
ovifugus, Sterneck, l. c. 61.—Eur.
pacificus, Sterneck, l. c. 120.—Am. bor.
patulus, Sterneck, l. c. 34.—Eur.
pectinatus, Behrend. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlv. 51.—Armen.
personatus, Behrend. ex Behrend. & Sterneck, in Verh. Bot. Ver. Brand. xlv. 213.—Eur.
pindicus, Sterneck, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1902, 177.—Eur.
ponticus, Sterneck, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, i. II. 48.—Eur.
praesignis, Beck & Sterneck, ex Sterneck, l. c. 98.—Eur.
rigidus, Sterneck, l. c. 121 = R. rigidus.
rusticulus, Sterneck, l. c. 106.—Eur.; Iceland.
Semleri, Sterneck, ex Behrend. & Sterneck, in Verh. Bot. Ver. Brand. xlv. 199.—Eur.
simplex, Sterneck, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, i. II. 89.—Eur.

ALECTOROLOPHUS:—
Sintenisii, Sterneck, in Oestr. Bot. Zeitschr. 1902, 179.—Eur.
songaricus, Sterneck, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, i. II. 79.—Oriens.
Songeoni, Sterneck, l. c. 65 = R. Songeoni.
stenophyllus, Sterneck, in Schinz & Heller, Fl. Schweiz, ed. II. 459.—Helvetia.
subalpinus, Sterneck, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, i. II. 86.—Eur.
subulatus, Sterneck, l. c. 80.—Reg. Caucas.
sudeticus, Behrend. in Allg. Bot. Zeitschr. 1904, 35.—Eur.

ALECTRA, Thunb. (Scrophul.).
[MELASMA, Berg. D. T. & H.]
arabica, *Deflers, Voy. Yemen*, 179.—Arab.

ALECTRYON, Gaertn. (Sapind.).
mollis, *Radlk. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 308.—N. Guin.

ALETES, Coult. & Rose (Umbell.).
obovata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 573.—Am. bor.

ALETRIS, Linn. (Haemodor.).
alpestris, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 20.—China.
Biondiana, *Diels, l. c.* 19.—China.
bracteata, *Northrop, in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 27.—Ins. Baham.
obovata, *Nash, in Torreya*, iii. 102.—Am. bor.

ALIBERTIA, A. Rich. (Rubiac.).
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 173.—Parag.

ALICIELLA, Brand, in Helios, xxii. (1905) repr. 11. *POLEMONIACEAE.*
triodon, *Brand, l. c.* repr. 12 (= *Gilia triodon*).—Am. bor.

ALIGERA, Suksd. (Valerian.).
patelliformis, *Suksd. in W. Am. Sci.* xii. 51.—Am. bor.

ALLAEANTHUS, Thw. (Urtic.).
glaber, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 166.—Ins. Philipp.

ALLIARIA, DC. (Crucif.).
[SISYMBRIUM, Linn. I. K.]
auriculata, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 437.—Corea.

ALLIONIA, Loefl. (Nyctag.).
bracteata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 690.—Am. bor.
comata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 407.—Am. bor.
divaricata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 691.—Am. bor.
glandulifera, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 364.—Am. bor.
lanceolata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 691.—Am. bor.
oblongifolia, *Small, Fl. S. E. U. S.* 407.—Am. bor.
pilosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 690 (= *Oxybaphus pilosus*).—Am. bor.
rotundifolia, *Greene, Pl. Baker.* iii. 33.—Am. bor.
scaiifolia, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 611.—Am. bor.
texensis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 406.—Am. bor.

ALLIONIELLA, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, (1902) 687. *NYCTAGINACEAE.*
oxybaphoides, *Rydb. l. c.* 688 (= *Quamoclidion oxybaphoides*).—Am. bor.

ALLIUM, Tourn. (Liliac.).
aflatunense, *B. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 917.—Turkestan.
albopilosum, *C. H. Wright, in Gard. Chron.* 1903, II. 34.—Persia bor.
anguinum, Bub. Fl. Pyren. iv. 87 = Victorialis.
assimile, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 249.—Graecia.
collinum, *Dougl. in Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 640.—Am. bor.

ALLIUM:—
Columnae, Bub. Fl. Pyren. iv. 93 = A. Chamaemoly.
confusum, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 244.—Graecia.
continuum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 263.—Am. bor.
Cuthbertii, *Small, l. c.* 264.—Am. bor.
cyclospathum, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 288.—Oriens.
dictyotum, *Greene, Pl. Baker.* i. 52.—Am. bor.
Ellisii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7875.—Oriens.
fallens, Bub. Fl. Pyren. iv. 91 = fallax.
Helleri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 264.—Am. bor.
Hickmani, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 483.—Calif.
javorjense, *Rohl. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1904, no. 38, 91.—Montenegr.
luteolum, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 256.—Graecia.
macropetalum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 401.—Am. bor.
meteoricum, *Heldr. & Haussk. ex Halacsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 250.—Graecia.
microscordion, *Small, Fl. S. E. U. S.* 263.—Am. bor.
Pikeanum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 402.—Am. bor.
Prattii, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 124.—China.
pskemense, *B. Fedtsch. in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 43.—Turkestan.
scilloides, *Dougl. in Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 640.—Am. bor.
sessile, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 165.—Reg. Argent.
venustum, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 126.—China.
Watsoni, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 642.—Am. bor.
Zimmermannianum, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxv. 23.—China.

ALLOCARYA, Greene (Borag.).
[ERITRICHIUM, Schrad. I. K.]
bracteata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 481.—Am. bor.
cognata, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 235.—Am. bor.
jucunda, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 643.—Am. bor.
orthocarpa, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 235.—Am. bor.
salina, *Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 442.—Am. bor.

ALLONEURON, Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 185. *MELASTOMATACEAE.*
Ulei, *Pilg. l. c.*—Peruv.

ALLOPHYLUS, Linn. (Sapind.).
[ALLOPHYLUS, Linn. et SCHMIDELIA, Linn. I. K.]
appendiculato-serratus, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 348.—Afr. trop.
chaunostachys, *Gilg, l. c.* 349.—Afr. trop.
latefoliolatus, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 137.—Afr. trop.
macrostachys, *Radlk. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 56.—Ins. Philipp.
micrococcus, *Radlk. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 307.—N. Guin.
montanus, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 221.—Siam.
pseudo-paniculatus, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 137.—Afr. trop.
quinatus, *Radlk. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 57.—Ins. Philipp.
setulosus, *Radlk. l. c.* 58.—Ins. Philipp.
subcoriaceus, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 136.—Afr. trop.
Yeru, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 348.—Afr. trop.

ALLOPLECTUS, Mart. (Gesner.).
domingensis, *Urb. Symb. Antill.* ii. 357.—Ind. occ.
macranthus, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 117.—Am. cent.

ALLUANDIA, Drake, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par. cxxxiii. (1901) 240. *SAPINDACEAE.*
[DIDIEREA, Baill. D. T. & H.]

ALNIPHYLLUM, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xv. (1901) 67. *STYRACACEAE.*
macranthum, *Perk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 488.—China.
pterospermum, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 67.—Formosa.

ALNUS, Tourn. (Cupul.).
californica, Hort. ex H. Winkl. in Engl. Pflanzenreich Betul. 115 = rhombifolia.
Fauriei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 423.—Japon.
glabrata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 26.—Mexic.
mollis, *Fernald, in Rhodora*, vi. 162.—Am. bor.
noveboracensis, *Britton, in Torreya*, 1904, 124.—Am. bor.
pendula, *Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xvi. no. 5, 6.—Japon.
Sieboldiana, *Matsum. l. c.* 3.—Japon.
sitchensis, *Sarg. Silva N. Am.* xiv. 61. t. 727.—Am. bor.
sorbifolia, Hort. ex H. Winkl. in Engl. Pflanzenreich Betul. 117 = glutinosa.
Yasha, *Matsum. in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xvi. no. 5, 4.—Japon.

ALOCASIA, Neck. (Arac.).
arifolia, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 670.—Arch. mal.
culionensis, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 135.—Ins. Philipp.
ovalifolia, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 47.—Penins. Mal.
Schlechteri, *Engl. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 62.—N. Guin.

ALOE, Tourn. (Liliac.).
aethiopica, *A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 60.—Afr. trop.
amanensis, *A. Berg. l. c.* 59.—Afr. trop.
asperifolia, *A. Berg. l. c.* 68.—Afr. austr.
Bakeri, Hook. f. ex Baker, in Bot. Mag. sub t. 7834 = oligospila.
bamangwatensis, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 122.—Afr. austr.
Baumii, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene Sambesi Exped.* 191.—Afr. trop.
brunneo-punctata, *Engl. & Gilg, l. c.* 190.—Afr. trop.
Buettneri, *A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 60.—Afr. trop.
Cameroni, *Hemsl. in Bot. Mag.* t. 7915.—Afr. trop.
campylosiphon, *A. Berg. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 151.—Afr. trop.
Chabaudii, *Schoenl. in Gard. Chron.* 1905, tt. 102.—Afr. trop.
cinnabarina, *Diels, ex A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 65.—Afr. austr.
comosa, *Marl. & A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 86.—Afr. austr.
Corderoyi, *A. Berg. in Monatsschr. Kakt.* 1904, 61.—Hybr.
Davyana, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 258.—Afr. austr.
decora, *Schoenl. in Gard. Chron.* 1905, tt. 386.—Afr. austr.
deserti, *A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 61.—Afr. trop.
divaricata, *A. Berg. l. c.* 64.—Madag.
Dyeri, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 289.—Hab. ?
Ellenbeckii, *A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 59.—Afr. trop.
Engleri, *A. Berg. l. c.* 60.—Afr. trop.
Galpini, *Baker, in Kew Bull.* 1901, 135.—Afr. austr.
Grahami, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 39.—Afr. austr.
graminifolia, *A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 84.—Afr. trop.
Greatheadii, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 121.—Afr. austr.
haemanthifolia, *Marl. & A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 85.—Afr. austr.
Lastii, *Baker, in Kew Bull.* 1901, 135.—Afr. trop.
leptosiphon, *A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 66.—Afr. trop.
leucantha, *A. Berg. l. c.* 65.—Afr. trop.
Lugardiana, *Baker, in Kew Bull.* 1901, 135.—Afr. trop.
macrosiphon, Kew Hand-list Tender Monocots. 1897, 173 = Cameroni.
Marlothii, *A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 87.—Afr. austr.
melanacantha, *A. Berg. l. c.* xxxvi. 63.—Afr. austr.
Menyharthi, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 785.—Afr. trop.
metallica, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 191.—Afr. trop.
natalensis, *Wood & Evans, ex Wood, in Natal Colon. Herb. Rep.* 1900 (1901) 9; *et in Journ. Bot.* 1901, 170.—Afr. austr.
oligospila, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7834.—Afr. trop.

ALOE:—
Orpenae, *Schoenl. in Gard. Chron.* 1905, tt. 385.—Afr. austr.
pallidiflora, *A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 58.—Afr. austr.
parviflora, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 785.—Afr. austr.
parvispina, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 263.—Afr. austr.
Peacockii, *A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 60.—Afr. trop.
Pegleræ, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 120.—Afr. austr.
Pirottae, *A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 65.—Afr. trop.
Princeae, *A. Berg. l. c.* 64.—Afr. trop.
Schlechteri, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 45.—Afr. austr.
somaliensis, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1901, 135.—Afr. trop.
trichosantha, *A. Berg. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 62.—Afr. trop.
Trothai, *A. Berg. l. c.* xxxviii. 86.—Afr. trop.

ALOITIS, Rafin. = **Gentiana**, Linn. (Gentian.).
divaricata, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 94.—Am. bor.
foliosa, Greene, l. c.—Am. bor.
mesochora, Greene, l. c.—Am. bor.
occidentalis, Greene, l. c. = G. occidentalis.

ALOPECURUS, Linn. (Gramin.).
Bornmuelleri, *Domin, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 4.—Palest.
mucronatus, *Hack. ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 162.—As. cent.

ALOYSIA, Ort. & Palau = **Lippia**, Linn. (Verben.).
ligustrina, Small, Fl. S. E. U. S. 1013 = L. lycioides.

ALPHONSEA, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
mollis, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 485.—China.
philippinensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 9.—Ins. Philipp.
tonquinensis, *A. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. iv. 1071.—Tonkin.

ALPINIA, Linn. (Scitamin.).
Arundelliana, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 315.—Austral.
bilamellata, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 51.—Japon.
blepharocalyx, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 334.—China.
boninsimensis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 52.—Japon.
borneensis, Valet. ex Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 448 = Nieuwenhuizii.
borraginoides, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 344.—Burma.
caudata, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 446 = Romburghiana.
celebica, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 362.—Celebes.
chrysogynia, *K. Schum. l. c.* 365 (= *Amomum chrysogynium*).—Celebes.
Cumingii, *K. Schum. l. c.* 315.—Ins. Philipp.
densiflora, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. lxxxviii.—Tonkin.
Dyeri, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 349.—Ins. Samoa.
exostylis, *K. Schum. l. c.* 314.—Borneo.
fimbriata, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 447 = Schumanniana.
floribunda, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 439.—N. Guin.
Gagnepainii, *K. Schum. l. c.* 342.—Tonkin.
hainanensis, *K. Schum. l. c.* 335.—China.
Havilandii, *K. Schum. l. c.* 329.—Borneo.
Hellwigii, *K. Schum. l. c.* 320.—N. Guin.
Hemsleyana, *K. Schum. l. c.* 348.—Ins. Fiji.
Henryi, *K. Schum. l. c.* 335.—China.
Hookeriana, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 81.—Borneo.
Horneana, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 349.—Ins. Fiji.
intermedia, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. lxxxiii.—Japon.
Korthalsii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 327.—Borneo.
Kumatake, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 49.—Japon.

ALPINIA:—
laxiflora, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. lxxxviii.—Cochinch.
Leptosolenia, *K. Schum. in Pflanzenreich, Zingib.* 312 (= *Leptosolenia Haenkei*).—Ins. Philipp.
macrocephala, *K. Schum. l. c.* 350.—Ins. Fiji.
macroura, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 268.—Siam.
melanocarpa, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 80 (= *Hellenia melanocarpa*).—Sumatra.
melichroa, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 364 (= *Amomum melichroum*).—Celebes.
modesta, *F. Muell. ex K. Schum. l. c.* 318.—Austral.
moluccana, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. xc.—Ins. Molucc.
Nieuwenhuizii, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 86.—Borneo.
odontonema, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 65.—Ins. Bismarck.
oxymitra, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 268.—Siam.
philippinensis, *Ridley, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 86.—Ins. Philipp.
platychilus, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 334.—China.
platynema, *K. Schum. l. c.* 438.—N. Guin.
pterocalyx, *K. Schum. l. c.* 332.—N. Guin.
pterocarpa, *K. Schum. l. c.* 322.—N. Guin.
pubiflora, *K. Schum. l. c.* 313 (= *Hellenia pubiflora*).—N. Guin.
pulchra, *K. Schum. l. c.* 343 (= *Hellwigia pulchra*).—N. Guin.
purpurata, *K. Schum. l. c.* 323 (= *Guillainia purpurata*).—Polynes. occ.
Rolfei, *K. Schum. l. c.* 368.—Ins. Philipp.
Romburghiana, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 83.—Arch. Mal.
rufescens, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 322 (= *Amomum rufescens*).—Zeylan.
Sanderae, *Hort. Sand. in Gard. Chron.* 1903, i. 245.—N. Guin.
satsumensis, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. (1903) 247.—Japon
Schlechteri, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 438.—N. Guin.
Schumanniana, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 84.—Formosa.
scyphonema, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 438.—N. Guin.
siamensis, *K. Schum. l. c.* 357.—Siam.
Stapfiana, *K. Schum. l. c.* 347.—Ins. Solomon.
tonkinensis, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. lxxxv.—Tonkin.
trachyascus, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 336.—Ins. Philipp.
tricolor, *Hort. Sand. in Gard. Chron.* 1903, i. 245.—Ins. Solomon.

ALSINASTRUM, Schur = **Elatine**, Linn. (Elatin.).
macropodum, Bub. Fl. Pyren. iii. 21 = E. macropoda.
octandrum, Bub. l. c. = E. Hydropiper.

ALSINE, Scop. (Caryophyll.).
[ARENARIA, Linn. I. K.]
axillaris, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 380 (= *Stellaria axillaris*).—Am. austr.
Baldwinii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 422.—Am. bor.
chubutensis, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 386 (= *Stellaria chubutensis*).—Patag.
Clementei, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 451.—Eur.
Curtisii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 274.—Am. bor.
debilis, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 386 (= *Stellaria debilis*).—Patag.; Fuegia.
geniculata, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 140 (= *Arenaria geniculata*).—Alger.
glutinosa, *A. A. Heller, in Bull. S. Calif. Acad.* ii. 67.—Calif.
Jooi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 12.—Japon.
lanceolata, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 387 (= *Stellaria lanceolata*).—Reg. Magell.
longifolia, *Shafer, in Ann. Carneg. Mus.* i. 29.—Am. bor.
longipes, *Shafer, l. c.*—Am. bor.
nemorum, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 387 (= *Stellaria nemorum*).—Eur.; Am. austr.

ALSINE:—
pontica, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 9.—As. Min.
pubera, *Shafer, in Ann. Carneg. Mus.* i. 29.—Am. bor.
rotundifolia, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 387 (=*Stellaria rotundifolia*).—Reg. Magell.
salina, *Groves, in Bab. Man. Brit. Bot.* ed. ix. 68 (=*Lepigonum salinum*).—Eur.
tennesseensis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 422.—Am. bor.
validus, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 69.—Am. bor.

ALSINELLA, Dill. ex Linn. = **Sagina**, Linn. (Caryophyll.).
alpestris, Bub. Fl. Pyren. iii. 55 = S. Linnaei.
filiformis, Bub. l. c. 57 = S. maritima.
maritima, Bub. l. c. 56 = S. maritima.
nodosa, Bub. l. c. 54 = S. nodosa.
procumbens, Bub. l. c. 55 = S. procumbens.
subulata, Bub. l. c. 54 = S. subulata, *Wimm.*

ALSINOPSIS, Small, Fl. S. E. U. S. 491 (1903). *CARYOPHYLLACEAE.*
[Arenaria, Linn. D. T. & H.]
brevifolia, *Small, l. c.* 420 (=*Arenaria brevifolia*).—Am. bor.
caroliniana, *Small, l. c.* 421 (=*Arenaria caroliniana*).—Am. bor.
glabra, *Small, l. c.* 420 (=*Arenaria glabra*).—Am. bor.
groenlandica, *Small, l. c.* (=*Stellaria groenlandica*).—Am. bor.
macrantha, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 407.—Am. bor.
Nuttallii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 420 (=*Stellaria Nuttallii*).—Am. bor.
patula, *Small, l. c.* (=*Arenaria patula*).—Am. bor.
stricta, *Small, l. c.* (=*Arenaria stricta*).—Am. bor.
texana, *Small, l. c.*—Am. bor.
uniflora, *Small, l. c.* (=*Stellaria uniflora*).—Am. bor.

ALSODEIA, Thou. (Violac.).
Bourdaisii, Panch. ex Beauvis. Gen. Montrouz. 81 = Ionidium ilicifolium.
Johnstonei, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 84.—Afr. trop.
prasina, *Stapf, l. c.* 82.—Afr. trop.
ramiziana, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. *Mém.* III. 23, nomen.—Bras.
Whytei, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 83.—Afr. trop.

ALSOMITRA, M. Roem. (Cucurb.).
graciliflora, *Harms, in Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 602.—China.

ALSTONIA, R. Br. (Apocyn.).
Dueckheimiana, *Schlechter, in Tropenpfl.* vii. 528.—N. Caled.
parvifolia, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 59.—Ins. Philipp.

ALSTROEMERIA, Linn. (Amaryll.).
Hassleriana, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1101.—Parag.
nana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 325.—Patag.

ALTAMIRANIA, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. (1903) 106 = **Aspiliopsis**, Greenm. (Compositae).
pachyphylla, Greenm. l. c. = Asp. pachyphylla.

ALTAMIRANOA, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1903) 31. *CRASSULACEAE.*
[Cotyledon, Linn. D. T. & H.]
Batesii, *Rose, l. c.* 32 (=*Cotyledon Batesii*).—Mexic.
calcicola, *Rose, l. c.* (=*Sedum calcicola*).—Mexic.
chihuahuensis, *Rose, l. c.* 33 (=*Sedum chihuahuense*).—Mexic.
elongata, *Rose, l. c.* 31.—Mexic.
fusca, *Rose, l. c.* 33 (=*Sedum fuscum*).—Mexic.
Galeottiana, *Rose, in N. Am. Fl.* xxii. 51 (=*Cotyledon Galeottiana*).—Mexic.
Goldmani, *Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 32.—Mexic.
Hemsleyana, *Rose, in N. Am. Fl.* xxii. 49 (=*Sedum Batesii*).—Mexic.; Am. cent.
Jurgensenii, *Rose, l. c.* 50 (=*Cotyledon Jurgensenii*).—Mexic.
mexicana, *Rose, l. c.* 51 (=*Umbilicus mexicanus*).—Mexic.

ALTAMIRANOA:—
parva, *Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 32 (=*Sedum parvum*).—Mexic.
scopulina, *Rose, l. c.*—Mexic.

ALTENSTEINIA, H. B. & K. (Orchid.).
nervosa, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 8.—Chili.

ALTERNANTHERA, Forsk. (Amarant.).
dolichocephala, *Urb. Symb. Antill.* iv. 221 (=*Telanthera dolichocephala*).—Ind. occ.
floridana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 396 (=*Telanthera floridana*).—Am. bor.
Hassleriana, *Chod. ex Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 355.—Parag.
microphylla, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 154.—Reg. Argent.

ALTHAEA, Tourn. (Malvac.).
angulata, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1065.—Turkestan.

ALYPUM, Fisch. = **Globularia**, Tourn. (Selag.).
flexiramum, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. 14.—Gallia.
glaucescens, Jord. l. c.—Gallia.

ALYSSUM, Tourn. (Crucif.).
bulbotrichum, *Hausskn. & Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 3.—As. Min.
cupreum, *Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 695.—As. cent.
Jouasianum, *Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 426.—Eur.
pannulosum, *Hausskn. & Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 2.—As. Min.
paphlagonicum, Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xx. 7 = Schievereckia Bornmuelleri.
Preissmanni, *Hayek, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 361.—Eur.

ALYXIA, Banks (Apocyn.).
dielliptiocarpa, *E. Heck. in L. Planch. Prod. Apocyn.* (1894) 217.—N. Caled.
elliptica, *Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. Bot. vi. 287.—Ins. Cook.
flavescens, *Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn.* (1894) 261, nomen.—Cochinch.
pisiformis, *Pierre, l. c.* nomen.—Cochinch.

AMALOCALYX, Pierre (Apocyn.).
microlobus, *Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn.* (1894) 325, nomen.—Cochinch.

AMARANTELLUS, Speg. in Com. Mus. Buenos Aires, I. x. 343 (1901). *AMARANTACEAE.*
argentinus, *Speg. l. c.* 344.—Reg. Argent.

AMARANTHUS, Linn. (Amarant.).
cristulatus, *Speg. in Com. Mus. Buenos Aires*, I. x. 345.—Reg. Argent.
vulgatissimus, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 135.—Reg. Argent.

AMARELLA, Gilib. = **Gentiana**, Linn. (Gentian.).
amarelloides, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 53 = G. quinqueflora.
anisosepala, Greene, l. c. = G. anisosepala.
arctophila, Greene, l. c. = G. arctophila.
auriculata, Greene, l. c. = G. auriculata.
californica, Greene, l. c. 54.—Calif.
cobrensis, Greene, l. c. 56.—Am. bor.
conferta, Greene, l. c. 55.—Am. bor.
Copelandi, Greene, l. c. 53 = G. Copelandi.
distegia, Greene, l. c. = G. distegia.
heterosepala, Greene, l. c. = G. heterosepala.
Lembertii, Greene, l. c. 54.—Calif.
Macounii, Greene, l. c.—Am. bor.
microcalyx, Greene, l. c. 53 = G. microcalyx.
occidentalis, Greene, l. c. = G. occidentalis.
plebeia, Greene, l. c. = G. Amarella.
propinqua, Greene, l. c. = G. propinqua.
revoluta, Greene, l. c. 55.—Am. bor.
scopulorum, Greene, l. c.—Am. bor.
strictiflora, Greene, l. c. 53 = G. strictiflora.
tenuis, Greene, l. c. = G. Amarella.
Wislizenii, Greene, l. c. = G. Wislizenii.
Wrightii, Greene, l. c. = G. Wrightii.

AMARYLLIS, Linn. (Amaryll.).
Hassleriana, *Chod. & Lendn. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 422.—Parag.

AMBELANIA, Aubl. (Apocyn.).
grandiflora, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. (1902) 444.—Bras.

AMBERBOA, Pers. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).
[Volutarella, Cass. I. K.]
leucantha, Coss. ex Chevall. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 774.—Alger.
Saharae, Chevall. l. c. v. 442.—Afr. bor.

AMBLYANTHOPSIS, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 1902, 210. *MYRSINACEAE.*
bhotanica, *Mez, l. c.* 211 (=*Ardisia bhotanica*).—Ind. or.
membranacea, *Mez, l. c.* (=*Ardisia membranacea*).—Ind. or.

AMBLYANTHUS, A. DC. (Myrsin.).
multiflorus, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 210.—Ind. or.
praetervisus, *Mez, l. c.*—Ind. or.

AMBLYSTIGMA, Benth. (Asclep.).
pilosum, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 1, 18.—Reg. Argent.

AMBULIA, Lam. = **Limnophila**, R. Br. (Scrophul.).
Baumii, Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 361.—Afr. trop.
dasyantha, Engl. & Gilg, l. c. 362.—Afr. trop.
indica, W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. 181 = L. gratioloides.
trichophylla, Kom. in Act. Hort. Petrop. xviii. 429.—As. or.

AMELANCHIER, Medic. (Rosac.).
Amelanchier, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* iv. 125.—Serbia.
elliptica, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 66.—Am. bor.
gracilis, *Heller, Muhlenbergia*, ii. 59.—Calif.
obovalis, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 434.—Am. bor.
oreophila, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 65.—Am. bor.
subintegra, *Greene, Pittonia*, v. 109.—Calif.

AMELLUS, Linn. (Compos.).
arenarius, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1013.—Afr. austr.

AMMANNIA, Linn. (Lythrac.).
alcalina, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 87.—Am. bor.
Friesii, *Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac.* 50.—Reg. Argent.

AMMOCALLIS, Small, Fl. S. E. U. S. 935 (1903) = **Lochnera**, Reichb. (Apocyn.).
[Lochnera = **Vinca**, Linn. I. K.]
rosea, Small, l. c. 936 = L. rosea.

AMOMUM, Linn. (Scitamin.).
alpinum, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 253; *in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, xv. 170.—Afr. trop.
bicorniculatum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 220.—Borneo.
Bitacoum, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 164.—Afr. trop.
chaunocephalum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 237.—N. Guin.
cuspidatum, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 253; *in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, xv. 171.—Afr. trop.
echinosphaera, *K. Schum. ex Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 257, descr.—Tonkin.
elegans, *Ridley, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 84.—Ins. Philipp.
gracilipes, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 252.—Borneo.
Harmsii, *K. Schum. l. c.* 256.—Sumatra.
hirticalyx, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 269.—Malaya.
Holmesii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 256.—Ind. or.
Loheri, *K. Schum. l. c.* 247.—Ins. Philipp.
longibracteа, *K. Schum. l. c.* 245.—Sumatra.
longipes, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 78.—Java.

AMOMUM:—
Loroglossum, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 258.—Reg. Himal.
macropodum, *Gagnep. l. c.* li. 450.—Hab. ?
platyandrum, *Gagnep. l. c.* 451.—Hab. ?
polycarpum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 226, descr.—Celebes.
procurrens, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 254.—N. Guin.
propinquum, *Ridley, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 84.—Ins. Philipp.
pseudofoetens, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 23; *et in Ic. Bogor.* t. 159.—Java.
robustum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 253.—Penins. Mal.
Schlechteri, *K. Schum. l. c.* 437.—N. Guin.
stipulatum, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 260.—Afr. trop.
tephrodelphys, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 248.—Sumatra.
thyrsoideum, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 256.—Tonkin.
trilobum, *Ridley, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 85.—Ins. Philipp.
trilobum, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 453.—Cochinch.
truncatum, *Gagnep. l. c.* l. 164.—Celebes.
Vespertilio, *Gagnep. l. c.* xlix. 255.—Tonkin.
Walang, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 44.—Java.
Warburgii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 257 (= *Costus Warburgii*).—Ins. Philipp.
xanthoparyphe, *K. Schum. l. c.* 224.—N. Guin.

AMOORA, Roxb. (Meliac.).
Aherniana, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 24.—Ins. Philipp.
Elmeri, *Merrill, l. c.* xxix. 23.—Ins. Philipp.
lepidota, *Merrill, l. c.* xvii. 23.—Ins. Philipp.
macrocarpa, *Merrill, l. c.* 24.—Ins. Philipp.

AMORPHA, Linn. (Legum.).
angustifolia, *Boynton, in Biltm. Bot. Studies,* i. 139.—Am. bor.
montana, *Boynton, l. c.* 138.—Am. bor.
nitens, *Boynton, l. c.* 139.—Am. bor.

AMORPHOPHALLUS, Blume (Arac.).
abyssinicus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 160 (= *Arum abyssinicum*).—Afr. trop.
accrensis, *N. E. Br. l. c.* 157.—Afr. trop.
angolensis, *N. E. Br. l. c.* 156 (= *Hydrosme angolensis*).—Afr. trop.
angustilobum, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 1696.—Austral.
Barteri, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 151 (= *Hydrosme Fontanesii*).—Afr. trop.
Baumannii, *N. E. Br. l. c.* 153 (= *Hydrosme Baumannii*).—Afr. trop.
calabaricus, *N. E. Br. l. c.* 155.—Afr. trop.
carnea, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xli. 47.—Penins. Mal.
dracontioides, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 148 (= *Hydrosme dracontioides*).—Afr. trop.
Fischeri, *N. E. Br. l. c.* 158; *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 777 (= *Hydrosme Fischeri*).—Afr. trop.
flavovirens, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 153.—Afr. trop.
gallaensis, *N. E. Br. l. c.* 155 (= *Hydrosme gallaensis*).—Afr. trop.
Goetzei, *N. E. Br. l. c.* 150 (= *Hydrosme Goetzei*).—Afr. trop.
gratus, *N. E. Br. l. c.* 151 (= *Hansalia grata*).—Afr. trop.
hainanica, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 183.—Hainan.
Henryi, *N. E. Br. l. c.* 181.—Formosa.
hirtus, *N. E. Br. l. c.*—Formosa.
Johnsoni, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 156.—Afr. trop.
laxiflorus, *N. E. Br. l. c.* 152 (= *Hydrosme sparsiflora*).—Afr. trop.
Leopoldianus, *N. E. Br. l. c.* 157 (= *Hydrosme Leopoldiana*).—Afr. trop.
maculatus, *N. E. Br. l. c.* 155.—Afr. trop.
malaccensis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xli. 46.—Penins. Mal.
Mannii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 159.—Afr. trop.
maximus, *N. E. Br. l. c.* 157 (= *Hydrosme maxima*)—Afr. trop.

AMORPHOPHALLUS:—
minor, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xli. 46.—Penins. Mal.
Preussii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 152 (= *Hydrosme Preussii*).—Afr. trop.
Schweinfurthii, *N. E. Br. l. c.* 149 (= *Hydrosme Schweinfurthii*).—Afr. trop.
Staudtii, *N. E. Br. l. c.* 154 (= *Hydrosme Staudtii*).—Afr. trop.
Teusii, *N. E. Br. l. c.* 149 (= *Hydrosme Teusii*).—Afr. trop.
Zenkeri, *N. E. Br. l. c.* 150 (= *Hydrosme Zenkeri*).—Afr. trop.

AMPELOCISSUS, Planch. (Vitac.).
[VITIS, Linn. 1. K.]
brunneo-rubra, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 293.—Afr. trop.
Dekindtiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxii. 132.—Afr. trop.
gracilipes, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 90.—Afr. trop.

AMPELOPSIS, L. C. Rich. (Vitac.).
[VITIS, Linn. 1. K.]
japonica, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo,* xvii. 113 (= *Paullinia japonica*).—Japon.
mexicana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 51.—Mexic.

AMPHIDOXA, DC. (Compos.).
adscendens, *O. Hoffm. ex Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien,* xx. (1905) 56.—Afr. austr.
lasiocephala, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 411.—Afr. trop.

AMPHILOPHIS, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U.S. (1901) 71. *GRAMINEAE.*
[ANDROPOGON, Linn. D. T. & H.]
barbinodis, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 65 (= *Andropogon barbinodis*).—Am. bor.
exaristatus, *Nash, l. c.*—Am. bor.
perforatus, *Nash, l. c.* 66 (= *Andropogon perforatus*).—Am. bor.
Torreyanus, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 71 (= *Andropogon Torreyanus*).—Am. bor.

AMPHILOPHIUM, Kunth (Bignon.).
Aschersonii, *Ule, in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 549.—Peruv.
oxylophium, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 119.—Am. cent.
purpureum, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. (1905) 220.—Mexic.

AMPHIPOGON, R. Br. (Gramin.).
restionaceus, *Pilg. ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 72.—Austral.

AMPHIPTERYGIUM, Schiede ex Schlechtend. in Linnaea, xvii. (1843) 746 = **Juliania**, Schlechtend. (Julianiac.).
amplifolium, Hemsl. & Rose, in Ann. Bot. xvii. 444 = J. amplifolia.
glaucum, Hemsl. & Rose, l. c. 445 = J. glauca.
Huancui, Hemsl. & Rose, l. c. = J. Huancui.
molle, Hemsl. & Rose, l. c. 444 = J. mollis.

AMPHIRRHOX, Spreng. (Violac.).
juruana, *Ule, ex Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 156.—Bras.

AMPHORANTHUS, S. Moore, in Journ. Bot. 1902, 305, 408 = **Phaeoptilum**, Radlk. (Nyctag.).
spinosus, S. Moore, ll. cc. = P. spinosum.

AMSINCKIA,
patagonica, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 39.—Patag.
pseudolycopsioides, *Speg. l. c.* (*errore* pseudolycopsicoides).—Patag.

AMSONIA, Walt. (Apocyn.).
ludoviciana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 935.—Am. bor.
texana, *A. A. Heller, Muhlenbergia,* i. 2.—Am. bor.

AMYGDALUS, Tourn. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).
Aitchisoni, Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. xiv. 94.—Afghan.
bucharica, Korsh. l. c. 92.—As. cent.
Fenzliana, Korsh. l. c. 91 = P. Fenzliana.
kuramica, Korsh. l. c. 93.—Afghan.

AMYGDALUS:—
Petunnikowi, Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb. i. 16.—Turkestan.
tangutica, Korsh. in Bull. Acad. Pétersb. Sér. V. xiv. 94.—China.

AMYLOCARPUS, Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro, iii. (1902) 69. *PALMAE.*
acanthocnemis, *Barb. Rodr. l. c.* 71 (= *Bactris acanthocnemis*).—Bras.
arenarius, *Barb. Rodr. l. c.* 72 (= *Bactris arenaria*).—Bras.
cuspidatus, *Barb. Rodr. l. c.* (*Bactris cuspidata*).—Bras.
ericetinus, *Barb. Rodr. l. c.* 71 (= *Bactris ericetina*).—Bras.
formosus, *Barb. Rodr. l. c.* 72, nomen.—Bras.
geonomoides, *Barb. Rodr. l. c.* (= *Bactris geonomoides*).—Bras.
hirtus, *Barb. Rodr. l. c.* (= *Bactris hirta*).—Bras.
hylophilus, *Barb. Rodr. l. c.* (= *Bactris hylophila*).—Bras.
linearifolius, *Barb. Rodr. l. c.* (= *Bactris linearifolia*).—Bras.
Marayá-y, *Barb. Rodr. l. c.* (= *Bactris Maraja*).—Bras.
microspathus, *Barb. Rodr. l. c.* (= *Bactris microspatha*).—Bras.
mitis, *Barb. Rodr. l. c.* (= *Bactris mitis*).—Bras.
pectinatus, *Barb. Rodr. l. c.* (= *Bactris pectinata*).—Bras.
platispinus, *Barb. Rodr. l. c.* nomen.—Bras.
pulcher, *Barb. Rodr. l. c.* (= *Bactris pulchra*).—Bras.
setipinnatus, *Barb. Rodr. l. c.* (*errore* settipinnatus) (= *Bactris setipinnata*).—Bras.
simplicifrons, *Barb. Rodr. l. c.* 71 (= *Bactris simplicifrons*).—Bras.
syagroides, *Barb. Rodr. l. c.* 72 (= *Bactris syagroides*).—Bras.
tenuissimus, *Barb. Rodr. l. c.* nomen.—Bras.
xanthocarpus, *Barb. Rodr. l. c.* 71 (= *Bactris xanthocarpa*).—Bras.

ANABASIS, Linn. (Chenopod.).
hispanica, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 66.—Hispan.
wathanica, *Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 201.—As. cent.

ANACAMPSEROS, Linn. (Portul.).
Alstonii, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 61.—Afr. austr.
Dinteri, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 873.—Afr. trop.

ANADENDRUM, Schott (Arac.).
angustifolium, *Engl. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 272.—Malaya.

ANAGALLIS, Tourn. (Primul.).
Baumii, *Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 333.—Afr. trop.
Dekindtiana, *Gilg. ex Knuth, l. c.* 333 = pulchella.
filifolia, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 325.—Afr. trop.
Hanningtonii, *Baker, in Kew Bull.* 1901, 127.—Afr. trop.
kilimandscharica, *Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 326.—Afr. trop.
kingaensis, *Engl. Jahrb.* xxx. 371.—Afr. trop.

ANAPHALIS, DC. (Compos.).
alpicola, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo,* xvii. 151.—Japon.
chilensis, *Reiche, Fl. Chile,* iv. 46.—Chili.
occidentalis, *A. A. Heller, Muhlenbergia,* i. 46.—Calif.

ANARTHRIA, R. Br. (Restiac.).
calovaginata, *Gilg. ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 87.—Austral.

ANARTHROPHYLLUM, Benth. (Legum.).
Negeri, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 489.—Reg. argent.
patagonicum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* vii. 261.—Patag.
Prichardi, *Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 331.—Patag.
pungens, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 521.—Reg. Argent.
subandinum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* vii. 259.—Patag.

ANASTRAPHIA, D. Don (Compos.).
bahamensis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 415.—Ind. occ.
oligantha, *Urb. l. c.* 417.—Ind. occ.
Picardae, *Urb. l. c.* 414.—Ind. occ.

ANASTROPHUS, Schlecht. = **Paspalum**, Linn. (Gramin.).
paspaloides, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 75 = P. Waltherianum.

ANCHOMANES, Schott (Arac.).
abbreviatus, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 237.—Afr. trop.

ANCHONIUM, DC. (Crucif.).
persicum, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1265 (= *Matthiola persica*).—Oriens.

ANCHUSA, Linn. (Borag.).
Clavyi, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 232 —Afr. bor.

ANCISTRELLA, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvii. (1903) 155 = **Ancistrocladus**, Wall. (Dipterocarp.).
Barteri, Van Tiegh. l. c. = Ancistrocladus Barteri.

ANCISTROCLADUS, Wall. (Dipterocarp.).
Barteri, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* 1903, 154.—Afr. trop.
Thwaitesi, *Van Tiegh. l. c.*—Zeylan.

ANCOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 544 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.). [OURATEA, Aubl. = **Gomphia**, Schreb. I. K.]
hemiodonta, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 226. = O. semiserrata.
longifolia, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. 544 = O. longifolia.

ANDIRA, Lam. (Legum.).
jamaicensis, *Urb. Symb. Antill.* iv. 298 (= *Geoffraea jamaicensis*).—Ind. occ.

ANDROCYMBIUM, Willd. (Liliac.).
albanense, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 123.—Afr. austr.
hantamense, *Engl. Jahrb.* xxxii. 89.—Afr. austr.

ANDROPOGON, Linn. (Gramin.).
audongensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 454 (= *Cymbopogon audongensis*).—Afr. trop.
androphilus, *Stapf, in Journ. de Bot.* xix. 103.—Afr. trop.
arrectus, *Stapf, l. c.* 101.—Afr. trop.
Calamus-aromaticus, Royle, Essay Antiq. Hindoo Medicine, 33, 83; Illustr. Bot. Himal. t. 97 = pachnodes.
chrysocomus, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 70. —Am. bor.
corymbosus, *Nash, l. c.* 69.—Am. bor.
formosanus, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 371. —China.
glauco-purpureus, *Stapf, in Journ. de Bot.* xix. 102. —Afr. trop.
guyanensis, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 152. —Bras.
gracilior, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 63.—Am. bor.
Hassleri, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 266. —Parag.
himalayensis, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 421.—Ind. or.
ingratus, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 151.—Bras.
littoralis, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 69.—Am. bor.
Matteiuzzianum, *Chiov. in Ann. di Bot. Roma,* ii. 365.—Afr. trop.
palustris, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 137.—Bras.
paucipilus, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 70.—Am. bor.
perangustatus, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 62.—Am. bor.
phoenix, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 454 (= *Cymbopogon phoenix*).—Afr. trop.
Selloanus, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 266. —Parag.
subtenuis, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 63.—Am. bor.
tenuiflorus, *Stapf, in Journ. de Bot.* xix. 103.—Afr. trop.
tremulus, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 765. —Afr. trop.
trepidarius, *Stapf, in Journ. de Bot.* xix. 100.—Afr. trop.
vagans, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 375.—China.
Welwitschii, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 454 (= *Cymbopogon Welwitschii*).—Afr. trop.

ANDROPOGON:—
zizanioides, *Urb. Symb. Antill.* iv. 79 (= *Phalaris zizanioides*).—Ind. occ.

ANDROSACE, Tourn. (Primul.).
akbajtalensis, *Derganc, ex O. Fedtsch. Pl. Pamir,* 50. —As. cent.
apus, *Franch. ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 208.—As. cent.
bryomorpha, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 175. —As. cent.
Duthieana, *Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 193.—Reg. Himal.
Engleri, *Knuth, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 84.—China.
eritrichioides, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 420.—Ind. or.
ferruginea, *Watt, ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 208.—Ind. or.
flaccida, Hook. f. ex Knuth, l. c. 174 = geraniifolia.
fragilis, *Duthie, in Ann. Bot. Gard. Calc.* ix. 48.—Ind. or.
hirsuta, Auct. ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 100 = Chamaejasme.
Laxmanniana, Auct. ex Knuth, l. c. 192 = villosa.
oculata, *Hort. ex Knuth, l. c.* 219.—Quid?
Paxiana, *Knuth, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 84.—China.
pedicellata, Royle, ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 174 = geraniifolia.
Pomeroli, *Knuth, l. c.* 203.—Reg. Himal.
Prattiana, *Knuth, l. c.* 184.—China.
puberulenta, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1903, 260. —Am. bor.
Salasii, *F. Kurtz, in Bol. Acad. Ci. Cordoba,* xv. 513, nomen.—Reg. Argent.
spinulifera, *Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 184.—China.
tibetica, *Knuth, l. c.* 187.—Reg. Himal.; China.
Tschuktschorum, *Knuth, l. c.* 200.—Sibir.
Vegae, *Knuth, l. c.* 201.—Sibir.

ANDROSIPHONIA, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. (1905) 101. *PASSIFLORACEAE.*
adenostegia, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.

ANDROTIUM, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2763 (1903). *ANACARDIACEAE.*
astylum, *Stapf, l. c.*—Borneo.

ANDRYALA, Linn. (Compos.).
canariensis, Lowe, Man. Fl. Madeir. 564 = pinnatifida.
minuta, *Lojac. Fl. Sic.* ii. t. 223.—Sicil.

ANEILEMA, R. Br. (Commel.).
angolense, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 67.—Afr. trop.
angustifolium, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 151.—China.
chrysanthum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 376.—Afr. trop.
formosanum, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 152.—Formosa.
Nicholsoni, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 70.—Afr. trop.
nyasense, *C. B. Clarke, l. c.* 66.—Afr. trop.
paraguayensis, *C. B. Clarke, ex Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 437.—Parag.
paucifolium, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 153.—China.
plagiocapsa, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 184.—Afr. trop.
Rendlei, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 68. —Afr. trop.
rhodospermum, K. Schum. ex C. B. Clarke, l. c. 72 = lanceolatum.
Russegeri, *C. B. Clarke, l. c.* 75 (= *Lamprodithyros Russegeri*).—Afr. trop.
Schlechteri, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 376.—Afr. austr.
Smithii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 70. —Afr. trop.
somaliense, *C. B. Clarke, l. c.* 69.—Afr. trop.
soudanicum, *C. B. Clarke, l. c.* 71.—Afr. trop.
Spekei, *C. B. Clarke, l. c.* 72.—Afr. trop.
Taylori, *C. B. Clarke, l. c.* 73.—Afr. trop.
Whytei, *C. B. Clarke, l. c.* 72.—Afr. trop.

ANEMONE, Linn. (Ranunc.).
amurensis, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxii. 262.—China.

ANEMONE:—
balkana, *Guerke, Pl. Eur.* ii. 460 (= *Pulsatilla balkana*).—Bulgar.
begoniifolia, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot.* Sér. III. xi. (1902) 46.—China.
Boissaei, *Léveillé & Vaniot, l. c.* 47.—China.
bolzanensis, *Guerke, Pl. Eur.* ii. 461 (= *Pulsatilla bolzanensis*).—Hybr.
gelida, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 21.—China.
hirsutissima, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo,* xviii. 69 (= *Pulsatilla hirsutissima*).—Ins. Kurile.
Leveillei, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 5. —China.
lithophila, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1902, 152. —Am. bor.
myriophylla, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* vii. 204.—Patag.
Piperi, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1902, 153.—Am. bor.
Prattii, *Huth, ex Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 4.—China.
Scabiosa, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot.* Sér. III. xi. (1902) 47.—China.
subalbida, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 33.—Gallia.
tuberosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1902, 151.—Am. bor.
Ulbrichiana, *Diels, ex Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 4.—China.
Wilsoni, *Ulbr. l. c.* 2.—China.

ANEMOPAEGMA, Mart. (Bignon.).
grandiflorum, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 434.—Ind. occ.
longipetiolatum, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 82.—Parag.

ANGELICA, Riv. (Umbell.).
crucifolia, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxv. (1905) 170. —Corea.
Dielsii, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 850.—China.
Fargesii, *Boissieu, l. c.*—China.
flaccida, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 431.—As. or.
ibukiensis, *Mak. ex Yabe, in Journ. Coll. Sci. Tokyo,* xvi. iv. 08 (= *Ligusticum ibukiense*).—Japon.
Matsumurae, *Yabe, l. c.* 85.—Japon.
nikoensis, *Yabe, l. c.* 84.—Japon.
pseudo-selinum, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 849.—China.
saxicola, *Mak. ex Yabe, in Journ. Coll. Sci. Tokyo,* xvi. iv. 84.—Japon.
shikokiana, *Mak. ex Yabe, l. c.* 88.—Japon.
Uchiyamae, *Yabe, in Bot. Mag. Tokyo,* xvii. 107.—Corea.
utilis, *Mak. ex Yabe, in Journ. Coll. Sci. Tokyo,* xvi. iv. 79.—Japon.
villosa, *C. P. Smith, in Proc. Indiana Acad. Sci.* 1903 (1904) 135.—Am. bor.

ANGELONIA, Humb. & Bonpl. (Scrophul.).
cubensis, *Robins. in Urb. Symb. Antill.* ii. 458.—Ind. occ.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 404. —Parag.

ANGIANTHUS, Wendl. (Compos.).
connatus, *Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 24.—Austral.

ANGRAECUM, Bory (Orchid.).
affine, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 19, descr.—Afr. trop.
bilaboides, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo,* 144.—Afr. trop.
calanthum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 20, descr.—Afr. trop.
crinale, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo,* 320.—Afr. trop.
curvatum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 22 (= *Mystacidium curvatum*).—Afr. trop.
curvipes, *Schlechter, l. c.* 21, descr.—Afr. trop.
filicornoides, *Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* t. 21.—Afr. trop.
filifolium, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 21, descr.—Afr. trop.
filiforme, *Schlechter, l. c.* 21 (= *Listrostachys filiformis*). —Afr. trop.
filipes, *Schlechter, l. c.* 22, descr.—Afr. trop.

ANGRAECUM:—
Gentilii, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 140.—Afr. trop.
Goetzeanum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxx. 289.—Afr. trop.
ischnopus, *Schlechter, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 170.—Afr. trop.
konduensis, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 321.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. l. c.* 322.—Afr. trop.
Lujaei, *Wildem. l. c.* 142.—Afr. trop.
macrorrhynchium, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 22, descr.—Afr. trop.
micropetalum, *Schlechter, l. c.* 23, descr.—Afr. trop.
Plehnianum, *Schlechter, l. c.* 24, descr.—Afr. trop.
Rothschildianum, *O'Brien, in Gard. Chron.* 1903, ii. 130.—Afr. trop.
scabripes, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 73.—Afr. trop.
scandens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 24, descr.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 21.—Afr. trop.
viridescens, *Wildem. Enum. Pl. Laurent.* 61 (= *Mystacidium Laurentii*).—Afr. trop.
Voeltzkowianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 116.—Ins. Comor.
zigzag, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 143.—Afr. trop.

ANGURIA, Tourn. (Cucurb.).
Keithii, *Northrop, in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 69.—Ind. occ.
ovata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 112.—Am. cent.

ANGURIOPSIS, J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad. xl. (1905) 697. *CUCURBITACEAE.*
margaritensis, *J. R. Johnston, l. c.*—Venez.

ANIBA, Aubl. (Laurac.).
megacarpa, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* tt. 2751-2.—Ins. Trinitatis.

ANIDRUM, Neck. = **Bifora**, Hoffm. (Umbell.).
flosculosum, Calest. in Martelli, Webbia, 273 = B. testiculata.

ANISACANTHUS, Nees (Acanth.).
Gonzalezii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 89.—Mexic.

ANISOMERIS, Presl = **Chomelia**, Jacq. (Rubiac.).
Pohliana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 175 = C. Pohliana.

ANISOPAPPUS, Hook. & Arn. (Compos.).
gracilis, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 416.—Afr. trop.
subdiscoideus, *O. Hoffm. l. c.*—Afr. trop.

ANISOPHYLLEA, R. Br. (Rhizophor.).
fruticulosa, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 313.—Afr. trop.

ANISOPTERA, Korth. (Dipterocarp.).
calophylla, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 22.—Ins. Philipp.
marginatoides, *Heim, in Bot. Tidsskr.* xxv. 44.—Siam.

ANISOPUS, N. E. Br. (Asclep.).
bicoronata, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 416 (= *Marsdenia bicoronata*).—Afr. trop.

ANISUM, Riv. = **Pimpinella**, Linn. (Umbell.).
creticum, Calest. in Martelli, Webbia, 102 = P. cretica, *Poir.*

ANODA, Cav. (Malvac.).
rubra, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 42 (= *Sida rubra*).—Mexic.

ANOGRA, Spach (Onagrac.).
[OENOTHERA, Linn. I. K.]
cinerea, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 570.—Am. bor.
latifolia, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
Nuttallii, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 368 (= *Oenothera Nuttallii*).—Am. bor.
violacea, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 242.—Am. bor.
Vreelandii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 570.—Am. bor.

ANOIGANTHUS, Baker (Amaryll.).
gracilis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 276.—Afr. trop.

ANOMOPANAX, Harms, ex Dalla Torre & Harms, Gen. Siphon. 364 (1903); et in Ann. Jard. Buitenz. xix. (1904) 13. *ARALIACEAE.*
celebicus, *Harms, in Ann. Jard. Buitenz.* xix. (1904) 14.—Celebes.
philippinensis, *Harms, l. c.* 15.—Ins. Philipp.
Schlechteri, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 332.—N. Guin.
Warburgii, *Harms, in Ann. Jard. Buitenz.* xix. (1904) 15.—Celebes.

ANONA, Linn. (Anonac.).
falsifolia, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. *Mém.* III. 14, nomen.—Bras.
glaucophylla, *R. E. Fries, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1172.—Parag.
imbituhana, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. *Mém.* III. 14, nomen.—Bras.
jamaicensis, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 701.—Jamaica.
minensis, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. *Mém.* III. 14, nomen.—Bras.
nutans, *R. E. Fries, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1171.—Parag.
paraguayensis, *R. E. Fries, l. c.*—Parag.
scandens, *Diels, ex Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 134.—Peruv.
sericea, *Dunal, ex Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 700, descr. emend.—Am. austr.
uncinata, *Sprague, l. c.* 701.—Am. cent.

ANOTIS, DC. (Rubiac.).
papuana, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 391.—N. Guin.

ANOTITES, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1905) 97. *CARYOPHYLLACEAE.*
alsinoides, *Greene, l. c.* 99.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, l. c.* 102.—Am. bor.
costata, *Greene, l. c.* 100.—Am. bor.
debilis, *Greene, l. c.* 104.—Am. bor.
diffusa, *Greene, l. c.* 99.—Calif.
discurrens, *Greene, l. c.* 103.—Am. bor.
Dorrii, *Greene, l. c.* 101 (= *Silene Dorrii*).—Am. bor.
elliptica, *Greene, l. c.* 103.—Am. bor.
halophila, *Greene, l. c.* 101.—Am. bor.
Jonesii, *Greene, l. c.* 102.—Am. bor.
latifolia, *Greene, l. c.* 98.—Am. bor.
macilenta, *Greene, l. c.* 100.—Am. bor.
Menziesii, *Greene, l. c.* 98 (= *Silene Menziesii*).—Am. bor.
nodosa, *Greene, l. c.* 100.—Am. bor.
picta, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xix. 165.—Am. bor.
tenerrima, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 104.—Am. bor.
tereticaulis, *Greene, l. c.* 105.—Am. bor.
villosula, *Greene, l. c.* 104.—Am. bor.
viscosa, *Greene, l. c.* 98.—Am. bor.

ANTENNARIA, Gaertn. (Compos.).
acuminata, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xvii. 202.—Am. bor.
austromontana, *E. Nelson, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xxiii. 703.—Am. bor.
borealis, Greene, in Pittonia, iv. 85 = pallida.
callilepis, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xvii. 201.—Am. bor.
chlorantha, *Greene, l. c.* xviii. 38.—Am. bor.
concinna, *E. Nelson, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xxiii. 705.—Am. bor.
formosa, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 145.—Am. bor.
Hendersoni, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 221.—Am. bor.
lanulosa, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xviii. 38.—Am. bor.
latisquama, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 41.—Am. bor.
latisquamea, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. (1905) 145.—Am. bor.
leucophaea, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 221.—Am. bor.
maculata, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xviii. 39.—Am. bor.
mesochora, *Greene, Pittonia*, v. 111.—Am. bor.
microphylla, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 975.—Am. bor.
oxyphylla, *Greene, Pittonia*, iv. 284.—Am. bor.
pallida, *E. Nelson, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xxiii. 700.—Alaska.

ANTENNARIA:—
Piperi, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 21.—Am. bor.
Sansonii, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xviii. 37.—Am. bor.
sedoides, *Greene, l. c.*—Am. bor.
Sierrae-Blancae, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 127.—Am. bor.
speciosa, *E. Nelson, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xxiii. 705.—Calif.
stenolepis, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xvii. 201.—Am. bor.
tomentella, *E. Nelson, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xxiii. 701.—Am. bor.

ANTHEMIS, Mich. (Compos.).
aeolica, *Lojac. Fl. Sic.* ii. I. 84.—Sicil.
brevifolia, *Lojac. l. c.* 81.—Sicil.
Callieri, *Velen. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 43.—Tauria.
carthaginensis, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 70; *et ex Munuera, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 92.—Hispan.
concolor, *Lojac. Fl. Sic.* ii. I. 87.—Sicil.
Cupaniana, *Tod. in Lojac. l. c.* 77.—Sicil.
Georgieviana, *Davidoff, in Magyar Bot. Lap.* iv. 29.—Bulgar.
Ismelia, *Lojac. Fl. Sic.* ii. t. 78.—Sicil.
leucopilodes, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 19.—As. Min.
lonadioides, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii-viii (= *Rhetinolepis lonadioides*).—Alger.
lopadusana, *Lojac. Fl. Sic.* ii. I. 85.—Sicil.
orbelica, *Vel. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* lii. 155.—Eur.
Palumbi, *Lojac. Fl. Sic.* ii. I. 91.—Sicil.
panachaica, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* ii. 57.—Eur.
riloensis, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 28, 6.—Bulgar.
sicula, *Lojac. Fl. Sic.* ii. I. 84.—Sicil.
virescens, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 28, 5.—Bulgar.

ANTHEPHORA, Schreb. (Gramin.).
cristata, *Hack. in Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. 255.—Afr. trop.
elongata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 2.—Afr. trop.

ANTHERICUM, Linn. (Liliac.).
cirrifolium, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 937.—Afr. austr.
Conrathii, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 997.—Afr. austr.
divaricatum, *Baker, ex Schinz, in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, xlix. 174.—Afr. austr.
drepanoides, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 71.—Mexic.
durangense, *Greenm. l. c.* 72.—Mexic.
hereroense, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 857.—Afr. trop.
Junodi, *Baker, ex Schinz, in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, xlix. 175.—Afr. austr.
Laurentii, *Wildem. Enum. Pl. Laurent*, 39.—Afr. trop.
liliagastrum, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 188.—Afr. trop.
lowryense, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 996.—Afr. austr.
macranthum, *Baker, ex Schinz, in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, xlix. 175.—Afr. austr.
Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 72.—Mexic.
oligotrichum, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 996.—Afr. austr.
pallidiflavum, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 187.—Afr. trop.
pretoriense, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 780.—Afr. austr.
Radula, *Baker, l. c.* 781.—Afr. austr.
Rehmanni, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
stenophyllum, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
subulatum, *Baker, l. c.* 782.—Afr. austr.
tortile, *Baker, l. c.* iv. 996.—Afr. austr.
vaginatum, *Baker, l. c.* 997.—Afr. austr.
vestitum, *Baker, ex Schinz, in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, xlix. 174.—Afr. austr.
Warneckei, *Engl. Jahrb.* xxxii. 91.—Afr. trop.
xylorrhizum, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 187.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. Jahrb.* xxxii. 91.—Afr. trop.

ANTHOCLEISTA, Afzel. (Logan.).
Haetsuana, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 829.—Afr. trop.
insulana, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 186.—Afr. trop.
procera, *Lepr. ex Bureau, Thèse Logan.* 77.—Afr. trop.
pulcherrima, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 374.—Afr. trop.

ANTHOLYZA, Linn. (Irid.).
Cabrae, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. 15.—Afr. trop.
Descampsii, *Wildem. l. c.* Sér. IV. 18.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. l. c.* 10.—Afr. trop.
magnifica, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 201.—Afr. trop.
Schlechteri, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1007.—Afr. austr.

ANTHOSPERMUM, Linn. (Rubiac.).
cliffortioides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 416.—Afr. trop.
Holtzii, *K. Schum. l. c.* xxxiv. 340.—Afr. trop.
leuconeuron, *K. Schum. l. c.* xxx. 416.—Afr. trop.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 253.—Afr. trop.
Rosmarinus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 417.—Afr. trop.

ANTHOXANTHUM, Linn. (Gramin.).
Hookeri, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 380 (= *Ataxia Hookeri*).—Ind. or.; China.
laxiflorum, Bub. Fl. Pyren. iv. 264 = Puelii.
pauciflorum, *Adam. in Denkschr. Akad. Wien, Math. Nat.* lxxiv. 116.—Turcia.

ANTHRISCUS, Bernh. (Umbell.).
dissectus, *C. H. Wright, in Johnston, Uganda Prot.* i. 326.—Afr. trop.
glacialis, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 145.—As. cent.

ANTHURIUM, Schott (Arac.).
acrobates, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 276; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 128.—Ecuador.
adenmile, *Sod. Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 219.—Ecuador.
agoyanense, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 203.—Ecuador.
alatum, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 276.—N. Granat.
albidum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 251.—Ecuador.
albispatha, *Sod. l. c.* 261.—Ecuador.
albo-virescens, *Sod. l. c.* 252.—Ecuador.
alegriasense, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 220.—N. Granat.
amazonicum, *Engl. l. c.* 194.—Bras.
anceps, *Sod. Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 215.—Ecuador.
angamarcanum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 200; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 109.—Ecuador.
annulatum, *Sod. l. c.* xv. 308; *l. c.* 14.—Ecuador.
antioquiense, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 174.—N. Granat.
argyrostachyum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 104; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 90.—Ecuador.
aristatum, *Sod. l. c.* xv. 469; *l. c.* 51.—Ecuador.
atroviride, *Sod. l. c.* xvi. 12; *l. c.* 68.—Ecuador.
baezanum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 255.—Ecuador.
barbacoasense, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 156.—N. Granat.
Barclayanum, *Engl. l. c.* 79.—N. Granat.
Blanchetianum, *Engl. l. c.* 168.—Bras.
brachypodum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 192; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 99.—Ecuador.
brevipes, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 195.—Ecuador.
Briosianum, *Sod. Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 222.—Ecuador.
buglossum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvii. 9; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 160.—Ecuador.
Bullianum, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 120.—Hab.?
bullosum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 249.—Ecuador.
cabrerense, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 240.—N. Granat.
cachabianum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 197.—Ecuador.
caiuarachense, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 192.—Peruv.

ANTHURIUM:—
Camposii, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 258.—Ecuador.
canaliculatum, *Sod. l. c.* 245.—Ecuador.
carneospadix, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 194.—Peruv.
caulorrhizum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 211.—Ecuador.
chlorocarpum, *Sod. l. c.* 251.—Ecuador.
chlorostachyum, Sod. Diagn. 11 = malacophyllum.
chocense, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 128.—N. Granat.
citrifolium, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xv. 301; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 11.—Ecuador.
clathratum, *Sod. l. c.* xvi. 100; *l. c.* 86.—Ecuador.
cochliodes, *Sod. l. c.* xvii. 164; *l. c.* 198.—Ecuador.
conterminum, *Sod. Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 67.—Ecuador.
cordulatum, *Sod. l. c.* 223.—Ecuador.
corrpatense, *N. E. Br. ex Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 255.—Bolivia.
corrugatum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 97; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 82.—Ecuador.
crebrinerve, *Sod. l. c.* 91; *l. c.* 76.—Ecuador.
cultrifolium, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 202.—Ecuador.
cupreonitens, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 238.—N. Granat.
curvatum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 198.—Ecuador.
cuspidiferum, *Sod. l. c.* 207.—Ecuador.
cymbispatha, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 106; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 93.—Ecuador.
dendrobates, *Sod. l. c.* xvii. 159; *l. c.* 192.—Ecuador.
dictyophyllum, *Sod. l. c.* xvi. 99; *l. c.* 84.—Ecuador.
discolor, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 262.—Ecuador.
divaricatum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvii. 251; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 207.—Ecuador.
dolichophyllum, *Sod. l. c.* 341; *l. c.* 180.—Ecuador.
dolichostachyum, *Sod. l. c.* xvi. 195; *l. c.* 104 bis.—Ecuador.
elatius, *Sod. l. c.* 8; *l. c.* 62.—Ecuador.
elegantulum, *Sod. l. c.* 419; *l. c.* 136.—Ecuador.
ellipsoideum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* iv. 60.—Ecuador.
Engleri, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 5; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 59.—Ecuador.
Ernesti, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 80.—Peruv.
erythrocarpum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvii. 339; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 169.—Ecuador.
esmeraldense, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 253.—Ecuador.
exstipulatum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 92; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 77 (*errore* extipulatum).—Ecuador.
fasciale, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 204.—Ecuador.
furcatum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvii. 168; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 203.—Ecuador.
fusco-punctatum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 196.—Ecuador.
Gaffurii, *Sod. l. c.* 263.—Ecuador.
Gilgii, *Sod. l. c.* 208.—Ecuador.
glanduligerum, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 97.—N. Granat.
glaucophyllum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 264.—Ecuador.
gracilescens, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xv. 398; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 35.—Ecuador.
grande, *N. E. Br. ex Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 204.—Bolivia.
Greigii, *Hort. ex Engl. l. c.* 281.—Hab.?
guallupense, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 243.—Ecuador.
hastaefolium, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 191; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 97.—Ecuador.
hastiferum, *Hort. in Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 195.—Hybr.
Hrubyi, *Hort. ex Engl. l. c.* 245.—Hybr.
huallagense, *Engl. l. c.* 132.—Peruv.
huamaliesense, *Engl. l. c.* 193.—Peruv.
huanucense, *Engl. l. c.* 165.—Peruv.
hybridum, *Hort. ex Engl. l. c.* 228.—Hybr.
hylaeum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 95; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 79.—Ecuador.
hylophilum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 207.—Ecuador.

ANTHURIUM:—
interruptum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xv. 301; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 13.—Ecuador.
itanhaense, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 166.—Bras.
Jenmanii, *Engl. l. c.* 72.—Guiana.
Johnii, *Engl. l. c.* 119.—Am. cent.
joseanum, *Engl. l. c.* 68.—Am. cent.
julospadix, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 199.—Ecuador.
Kellerianum, *Hort. ex Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 195.—Hybr.
laciniosum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xv. 300; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 10.—Ecuador.
Lancea, *Sod. l. c.* xvi. 273; *l. c.* 123.—Ecuador.
lanceum, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 140.—Hybr.
latecordatum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvii. 6; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 158.—Ecuador.
latemarginatum, *Sod. l. c.* xvi. 194; *l. c.* 100.—Ecuador.
latifolium, *Sod. Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 226; *et in Revista Chil. Hist. Nat.* iv. 75.—Ecuador.
latissimum, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 292.—Peruv.
leonianum, *Sod. Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 21.—Ecuador.
lepturum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xv. 458; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 37.—Ecuador.
leucostachyum, *Sod. Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 221.—Ecuador.
Leveillei, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 260.—Ecuador.
lineolatum, *Sod. l. c.*—Ecuador.
Lingua, *Sod. l. c.* 245.—Ecuador.
linguifolium, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 162.—Ecuador.
litanum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 242.—Ecuador.
livescens, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 337; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 122.—Ecuador.
lividispica, *Sod. l. c.* 432; *l. c.* 139.—Ecuador.
Loefgrenii, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 165.—Bras.
lorifolium, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xv. 304; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 15.—Ecuador.
lucorum, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 194.—N. Granat.
lunatum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvii. 156; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 189.—Ecuador.
luteolum, *Sod. l. c.* xvi. 281; *l. c.* 133.—Ecuador.
lutescens, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 293.—Peruv.
macrolonchium, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 259.—Ecuador.
macrostachyum, *Sod. l. c.* 246.—Ecuador.
macrourum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 438; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 146.—Ecuador.
maculosum, *Sod. l. c.* xv. 388; *l. c.* 30.—Ecuador.
malacophyllum, *Sod. l. c.* xvi. 201; *l. c.* 111.—Ecuador.
margaricarpum, *Sod. l. c.* xv. 292; *l. c.* 2.—Ecuador.
marginellum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 202.—Ecuador.
marmoratum, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 261; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 107.—Ecuador.
masfense, *Sod. l. c.* 439; *l. c.* 148.—Ecuador.
maximum, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 77 = Fontanesii.
membranaceum, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 208.—Ecuador.
micontaefolium, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xvi. 7; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 61.—Ecuador.
micromystrium, *Sod. l. c.* xvii. 163; *l. c.* 196.—Ecuador.
Miquelii, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 126.—Bolivia.
mindense, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xv. 470; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 53.—Ecuador.
miniatum, *Sod. l. c.* xvii. 14; *l. c.* 166.—Ecuador.
monzonense, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 264.—Peruv.
multisulcatum, *Engl. l. c.* 189.—N. Granat.
Myosurus, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 196.—Ecuador.
nanegalense, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xv. 460; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 40.—Ecuador.
nanospadix, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 173.—Bras.
Navasi, *Sod. in Revista Chil. Hist. Nat.* ix. 247.—Ecuador.
nemorale, *Sod. in Anal. Univ. Quito*, xv. 462; *Contrib. Fl. Ecuat. Monog.* ii. 43.—Ecuador.

ANTHURIUM:—
nitens, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 255.—Ecuador.
oblongifolium, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 2; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 56.—Ecuador.
oblongo-cordatum, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 110.—N. Granat.
obtusatum, Engl. l. c. 239.—N. Granat.
ochreatum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xv. 464; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 45.—Ecuador.
oreophilum, Sod. l. c. xvi. 441; l. c. 150.—Ecuador.
orientale, Sod. l. c. 435; l. c. 143.—Ecuador.
ovatum, Sod. l. c. 15; l. c. 72.—Ecuador.
oxyphyllum, Sod. l. c. xv. 381; l. c. 20.—Ecuador.
pachyphyllum, Sod. l. c. xvi. 10; l. c. 65.—Ecuador.
pallidinervium, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 197, 245.—Hybr.
panduraefolium, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 190; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 95.—Ecuador.
pangoanum, Sod. l. c. 6; l. c. 60.—Ecuador.
Parambae, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 217.—Ecuador.
parile, N. E. Br. ex Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 151.—Bolivia.
patulum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 427; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 134.—Ecuador.
pedunculare, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 196.—Ecuador.
pellucido-punctatum, Sod. l. c. 206.—Ecuador.
peltigerum, Sod. l. c. 244.—Ecuador.
peruvianum, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 262.—Peruv.
perversum, Engl. l. c. 195.—Hybr.
Pfitzeri, Engl. l. c. 259.—Ecuador.
philodendroides, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvii. 5; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 155.—Ecuador.
Pirottae, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 261.—Ecuador.
plantagineum, Sod. l. c. 198.—Ecuador.
platyglossum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvii. 252; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 208.—Ecuador.
platylobum, Sod. l. c. 250; l. c. 205.—Ecuador
Pohlianum, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 152.—Reg. Andin.
polyphlebium, Sod. in Anal. Univ. Quito, xv. 388; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 29.—Ecuador.
polystictum, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 248.—Ecuador.
Porteri, Sod. l. c. 210.—Ecuador.
praealtum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvii. 3; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 153.—Ecuador.
Preussii, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 68.—Venez.
procerum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 263; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 113.—Ecuador.
prominens, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 133.—N. Granat.
psilostachyum, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 248.—Ecuador.
psilurum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 433; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 141.—Ecuador.
pucianum, Sod. l. c. xvii. 92; l. c. 185.—Ecuador.
Pululahuae, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 236.—Ecuador.
pulverulentum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 103; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 69, 216.—Ecuador.
quinque-sulcatum, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 194.—Ecuador.
quitense, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 3; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 57.—Ecuador.
radiatum, Sod. l. c. xvii. 13; l. c. 164.—Ecuador.
Regelii, Van Gaert. ex Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 228.—Hybr.
retusum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xv. 461; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 41.—Ecuador.
rhizophorum, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 211.—Ecuador.
rhodostachyum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 9; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 64.—Ecuador.
rigescens, Sod. Diagn. Prev. 16; ex Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 191, 196 = Pichinchae vel rigidifolium.
rigidissimum, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 292.—Peruv.
Rimbachii, Sod. Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 202.—Ecuador.
Riofrioi, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvii. 82; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 178.—Ecuador.
riparum, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 214.—N. Granat.

ANTHURIUM:—
rivulare, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 195; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 101.—Ecuador.
robustum, Hort. ex Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 192.—Hybr.
rotundilobum, Engl. l. c. 275.—N. Granat.
rugulosum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 96; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 81.—Ecuador.
rumicifolium, Sod. l. c. xv. 395; l. c. 17.—Ecuador.
rupestre, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 201.—Ecuador.
rusticum, N. E. Br. ex Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 82.—Bolivia.
Saccardoi, Sod. Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 218.—Ecuador.
sagittale, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 274; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 125.—Ecuador.
sagittellum, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 253.—Ecuador.
scaberulum, Sod. l. c. 219 (errore scaberulum).—Ecuador.
scabrinerve, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvii. 87; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 178.—Ecuador.
sclerophyllum, Sod. l. c. xvi. 436; l. c. 144.—Ecuador.
septuplinervium, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 247.—Ecuador.
smilacifolium, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 93; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 78.—Ecuador.
Soederstroemii, Sod. l. c. 13; l. c. 70.—Ecuador.
spathulatum, Sod. l. c. xv. 391; l. c. 33.—Ecuador.
spathulifolium, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 194.—Ecuador.
Spruceanum, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 169.—Ecuador.
stans, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvii. 94; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 187.—Ecuador.
stenophyllum, Sod. l. c. xv. 392; l. c. 34.—Ecuador.
stipulosum, Sod. l. c. 394; l. c. 36.—Ecuador.
striatipes, Sod. l. c. xvii. 81; l. c. 171.—Ecuador.
striolatum, Sod. l. c. xv. 463; l. c. 44.—Ecuador.
subcarinatum, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 117.—N. Granat.
subellipticum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xv. 472; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 54.—Ecuador.
suborbiculare, Sod. l. c. xvii. 1; l. c. 151.—Ecuador.
subtrigonum, Sod. l. c. 6; l. c. 157.—Ecuador.
tarapotense, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 74.—Peruv.
tenuinerve, Sod. Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 49, 214 = citrifolium.
tenuispadix, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 73.—Bras.
tenuispica, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 199.—Ecuador.
terrestre, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 196.—Peruv.
tremulum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvii. 10; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 161.—Ecuador.
Trianae, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 147.—N. Granat.
tridigitatum, Engl. l. c. 270.—N. Granat.
Trinitatis, Engl. l. c. 73.—Ins. Trinitat.
tripartitum, Engl. l. c. 277.—N. Granat.
trisulcatum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 14; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 71.—Ecuador.
Tungurahuae, Sod. l. c. xvii. 85; l. c. 176.—Ecuador.
Uleanum, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 74.—Bras.
Umbraculum, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 101; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 87.—Ecuador.
Urbani, Sod. Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 224.—Ecuador.
validinervium, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 138.—Bras.
variegatum, Sod. in Anal. Univ. Quito xvi. 279; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 131.—Ecuador.
venustum, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 257.—Ecuador.
verapazense, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 191.—Am. cent.
versicolor, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 270; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 118.—Ecuador.
vestitum, Sod. in Revista Chil. Hist. Nat. ix. 243.—Ecuador.
vexillare, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvii. 12; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 163.—Ecuador.
vittariifolium, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 88.—Bras.
vomeriforme, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 430; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 138.—Ecuador.
vulcanicum, Sod. l. c. xvii. 84; l. c. 174.—Ecuador.
Weberbaueri, Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth. 81.—Peruv.

ANTHURIUM:—
Wolfii, Sod. in Anal. Univ. Quito, xvi. 262; Contrib. Fl. Ecuat. Monog. ii. 106.—Ecuador.
xanthostachyum, Sod. l. c. 204; l. c. 114.—Ecuador.

ANTIARIS, Lesch. (Urtic.).
africana, Engl. Jahrb. xxxiii. 119.—Afr. trop.
usambarensis, Engl. l. c.—Afr. trop.
Welwitschii, Engl. l. c. 118.—Afr. trop.

ANTICLEA, Kunth = **Zygadenus**, Michx. (Liliac.).
chlorantha, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 273 = Z. elegans.
coloradensis, Rydb. l. c. = Z. coloradensis.
elegans, Rydb. l. c. = Z. elegans.
porrifolia, Rydb. l. c. = Z. porrifolius.
virescens, Rydb. l. c. = Z. mexicanus.

ANTIDESMA, Burm. (Euphorb.).
edule, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 26.—Ins. Philipp.
oligonervium, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 294.—N. Guin.
rhynchophyllum, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.
Warburgii, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. l. c. 293.—N. Guin.

ANTIPHYLLA, Haw. = **Saxifraga**, Linn. (Saxifr.).
acrophila, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 29.—Eur.
acutiflora, Jord. l. c. 30.—Eur.
aretioides, Jord. l. c. 28.—Gallia.
coryphaea, Jord. l. c. 29.—Eur.
grandiflora, Jord. l. c. 28.—Gallia.
latiflora, Jord. l. c.—Eur.
laxifolia, Jord. l. c. 30.—Eur.
majuscula, Jord. l. c.—Eur.
parviflora, Jord. l. c. 28.—Gallia.
pulvinata, Small, in N. Am. Fl. xxii. 157 = S. pulvinata.
scopulosa, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 29.—Eur.
squarrosula, Jord. l. c.—Gallia.
vesula, Jord. l. c. 30.—Eur.

ANTIRRHINUM, Tourn. (Scrophul.).
appendiculatum, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 44.—Calif.
emarginatum, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 214.—Calif.
ovatum, Eastw. l. c. 213.—Calif.

ANTONIANA, Bub. Fl. Pyren. iii. (1901) 170 = **Hesperis**, Linn. (Crucif.).
laciniata, Bub. l. c. 171 = H. laciniata.
sylvestris, Bub. l. c. 170 = H. matronalis.

ANUBIAS, Schott (Arac.).
congensis, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 184.—Afr. trop.
Gilletii, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 845.—Afr. trop.
Haullevilleana, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. 13.—Afr. trop.
lanceolata, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 183.—Afr. trop.

ANVILLEA, DC. (Compos.).
australis, L. Chevall. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 771.—Alger.

ANYCHIASTRUM, Small, Fl. S. E. U. S. 400 (1903) = **Paronychia**, Adans. (Illecebr.).
Baldwinii, Small, l. c. 401 = P. Baldwinii.
herniarioides, Small, l. c. = P. herniarioides.
riparium, Small, l. c. = P. riparia.

AONIKENA, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 162 (1902). EUPHORBIACEAE.
patagonica, Speg. l. c.—Patag.

APALATOA, Aubl. = **Crudia**, Schreb. (Legum.).
Blancoi, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 19 = C. Blancoi.

APALOXYLON, Drake, Hist. Pl. Madag. i. t. (1902) 75, 206. LEGUMINOSAE.
madagascariense, Drake, ll. cc.—Madag.

APEIBA, Aubl. (Tiliac.).
Burchellii, Sprague, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 703.—Am. austr.

APERA, Adans. (Gramin.).
intermedia, Hack. ex A. B. Jacks. in Journ. Bot. 1904, 348, nomen.—As. Min.

APHANELYTRUM, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 12. *GRAMINEAE.*
procumbens, *Hack. l. c.* 13.—Ecuador.

APHANIA, Blume (Sapind.).
[SAPINDUS, Linn. I. K.]
philippinensis, *Radlk. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 60.—Ins. Philipp.

APHELANDRA, R. Br. (Acanth.).
cajatambensis, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 368.—Peruv.
Caput-Medusae, *Lindau, l. c.* iv. 325.—Bras.
cirsioides, *Lindau, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 157.—Peruv.
jacobinioides, *Lindau, l. c.* 156.—Peruv.
limbatifolia, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 323.—Peruv.
madrensis, *Lindau, l. c.* 326.—Mexic.
Montis-scalaris, *Lindau, ex Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 188.—Peruv.
paraensis, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 324.—Bras.
phrynioides, *Lindau, l. c.* 326.—Bras.

APHYLLANTHES, Tourn. (Liliac.).
cantabrica, Bub. Fl. Pyren. iv. 111 = monspeliensis.

APHYLLON, Mitch. = **Orobanche**, Linn. (Orobanch.).
violaceum, Eastw. in Zoe, v. (1900) 85.—Calif.

APHYLLORCHIS, Blume (Orchid.).
Gollani, *Duthie, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 42.—Ind. or.

APINELLA, Neck. = **Trinia**, Hoffm. (Umbell.).
dioica, Calest. in Martelli, Webbia, 145 = T. vulgaris.
Hoffmannii, Calest. l. c. = T. hispida.

APINUS, Neck. = **Pinus**, Linn. (Conif.).
albicaulis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 598 = P. albicaulis.
Cembra, Neck. Elem. iii. 270 = P. Cembra.
flexilis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 598 = P. flexilis.
Pinea, Neck. Elem. iii. 270 = P. Pinea.

APIOS, Moench (Legum.).
gracillima, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 488.—China.

APIUM, Tourn. (Umbell.).
ammoides, *Calest. in Martelli, Webbia*, 174 (= *Seseli ammoides*).—Reg. Medit.
angustilobum, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 112 (= *Ligusticum angustilobum*).—Chili.
apioides, *Reiche, l. c.* 110 (= *Ligusticum apioides*).—Chili.
Bicknellii, *Calest. in Martelli, Webbia*, 178 (= *Pimpinella Bicknellii*).—Ins. Balear.
biternatum, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 115 (= *Heliosciadium biternatum*).—Chili.
catalaunicum, *Calest. in Martelli, Webbia*, 177.—Hispan.
chrysanthum, *Calest. l. c.* (= *Pimpinella chrysantha*).—Graecia.
dichotomum, *Calest. l. c.* 179 (= *Pimpinella dichotoma*).—Hispan.; Afr. bor.
elatum, *Calest. l. c.* 178 (= *Helosciadium elatum*).—Hispan.
gracile, *Calest. l. c.* 177 (= *Reutera gracilis*).—Hispan.
Gussonei, *Calest. l. c.* 178 (= *Pimpinella Gussonei*).—Ital.
Heldreichii, *Calest. l. c.* 176 (= *Carum Heldreichii*).—Graecia.
humile, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 111 (= *Ligusticum humile*).—Chili.
laconicum, *Calest. in Martelli, Webbia*, 178 (= *Pimpinella laconica*).—Graecia.
meoides, *Calest. l. c.* 176 (= *Silaus meoides*).—Graecia.
occidentale, *Calest. l. c.* 175.—Eur.
pimpinellifolium, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 110 (= *Ligusticum pimpinellifolium*).—Chili.
Pretenderis, *Calest. in Martelli, Webbia*, 178 (= *Pimpinella Pretenderis*).—Graecia.
procumbens, *Calest. l. c.* 177 (= *Reutera procumbens*).—Hispan.
puberulum, *Calest. l. c.* (= *Reutera puberula*).—Hispan.
pumilum, *Calest. l. c.* 175 (= *Ammi pumilum*).—Lusitan.
rupestre, *Calest. l. c.* 176 (= *Carum rupestre*).—Graecia.

APIUM:—
saxifragum, *Calest. in Martelli, Webbia*, 178 (= *Pimpinella saxifraga*).—Eur.
serbicum, *Calest. l. c.* 177 (= *Pancicia serbica*).—Turcia.
siifolium, *Calest. l. c.* 178 (= *Pimpinella siifolia*).—Hispan.
Sisarum, *Calest. l. c.* 176 (= *Sium Sisarum*).—Eur.; As. bor. et cent.
Thorei, *Calest. l. c.* 174 (= *Ptychotis Thorei*).—Gallia.
villosum, *Calest. l. c.* 179 (= *Pimpinella villosa*).—Hispan.; Afr. bor.

APLECTRUM, Torr. (Orchid.).
Shortii, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 305.—Am. bor.

APLOPAPPUS, Cass. (Compos.).
[HAPLOPAPPUS, Endl. D. T. & H.]
Ameghinoi, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 74.—Patag.
Andersonii, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 100 (= *Stenotus Andersonii*).—Am. bor.
angustifolius, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 286 (= *Pyrrhocoma angustifolia*).—Chili.
bezanillanus, *Reiche, l. c.* 289 (= *Pyrrhocoma bezanillana*).—Chili.
breviradiatus, *Reiche, l. c.* 326.—Chili.
canescens, *Reiche, l. c.* 288 (= *Pyrrhocoma canescens*).—Chili.
Cerberoanus, *Reiche, l. c.* 292 (= *Pyrrhocoma Cerberoana*).—Chili.
chrysocephalus, *Reiche, l. c.* 287 (= *Pyrrhocoma aurea*).—Chili.
corymbosus, *Reiche, l. c.* 330 (= *Steriphe corymbosus*).—Chili.
denticulatus, *Reiche, l. c.* 273 (= *Pyrrhocoma denticulata*).—Chili.
Donianus, *Schultz, Bip. ex Reiche, l. c.* 294.—Chili.
durus, *Reiche, l. c.* 287 (= *Pyrrhocoma rigida*).—Chili.
elatus, *Reiche, l. c.* 293 (= *Haplodiscus elatus*).—Chili.
fallax, *Reiche, l. c.* 296 (= *Haplodiscus fallax*).—Chili.
graveolens, *Reiche, l. c.* 294 (= *Haplodiscus graveolens*).—Chili.
humilis, *Reiche, l. c.* 328 (= *Haplodiscus humilis*).—Chili.
ischnos, *Reiche, l. c.* 292 (= *Haplodiscus ischnos*).—Chili.
Illini, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 75.—Patag.
Kingi, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 291 (= *Haplodiscus Kingi*).—Chili.
latifolius, *Reiche, l. c.* 294 (= *Haplodiscus latifolius*).—Chili.
linifolius, *Reiche, l. c.* 286 (= *Pyrrhocoma linifolia*).—Chili.
longipes, *Reiche, l. c.* 295 (= *Pyrrhocoma longipes*).—Chili.
Macraeanus, *Reiche, l. c.* 296 (*errore* Macreanus) (= *Pyrrhocoma Macraeana*).—Chili.
megacephalus, *Hitchc. in Trans. Kansas Acad.* xvi. 131 (= *Eriocarpum megacephalum*).—Am. bor.
Moyanoi, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 609.—Patag.
multifolius, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, iii. 293 (= *Pyrrhocoma foliosa*).—Chili.
Mustersi, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 77.—Patag.
parvifolius, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 287 (= *Pyrrhocoma parvifolia*).—Chili.
patagonicus, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 528.—Patag.
phyllophorus, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 291 (= *Haplodiscus clausiflorus*).—Chili.
Pinea, *Reiche, l. c.* (= *Pyrrhocoma Pinea*).—Chili.
prostratus, Phil. in Reiche, l. c. 320 = australis.
reticulatus, *Reiche, l. c.* 290 (= *Pyrrhocoma reticulata*).—Chili.
rigidus, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 100 (= *Pyrrhocoma rigida*).—Am. bor.
rosmarinifolius, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 329.—Chili.
saxatilis, *Reiche, l. c.* 289 (= *Pyrrhocoma saxatilis*).—Chili.
serrulatus, *Reiche, l. c.* 312.—Chili.
setigerus, *Meigen, in Engl. Jahrb.* xvii. 281 (= *Pyrrhocoma setigera*).—Chili.

APLOPAPPUS:—
sphacelatus, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 290 (= *Haplodiscus sphacelatus*).—Chili.
stenophyllus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. 604.—Chili.
Struthionum, *Speg. in Rev. Agron. La Plata*, 1897, 529.—Patag.
tehuelches, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 78.—Patag.
tiltilensis, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, iii. 322.—Chili.
taeda, *Reiche, l. c.* 295 (= *Haplodiscus Peteroanus*).—Chili.
vernicosus, *Phil. ex Reiche, l. c.* 312.—Chili.
Zanartui, *Reiche, l. c.* 296 (= *Haplodiscus Zanartui*).—Chili.

APOCYNUM, Tourn. (Apocyn.).
ambigens, *Greene, Pl. Baker.* iii. 17.—Am. bor.
Andrewsii, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 57.—Am. bor.
calophyllum, *Greene, l. c.*—Am. bor.
cardiophyllum, *Greene, l. c.* 79.—Calif.
divergens, *Greene, l. c.* 56.—Am. bor.
laurinum, *Greene, Pittonia*, v. 65.—Am. bor.
lividum, *Greene, Pl. Baker.* iii. 17.—Am. bor.
Milleri, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 739.—Am. bor.
myrianthum, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 59.—Am. bor.
nevadense, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 57.—Am. bor.
oblongum, *Greene, Pittonia*, v. 65.—Calif.
oliganthum, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 58.—Am. bor.
palustre, *Greene, l. c.*—Am. bor.
rhomboideum, *Greene, Pittonia*, v. 66.—Am. bor.
salignum, *Greene, l. c.* 64.—Calif.
Suksdorfii, *Greene, l. c.* 65.—Am. bor.
tomentellum, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 58.—Am. bor.

APONOGETON, Linn. f. (Naiad.).
Dinteri, *Engl. & Krause, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 92.—Afr. trop.
gracilis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 763.—Afr. austr.
hereroensis, *Schinz, l. c.* 764.—Afr. trop.

APOROSELLA, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 488 (1905). *EUPHORBIACEAE.*
Hassleriana, *Chod. l. c.* 489.—Parag.

APOSTASIA, Blume (Orchid.).
papuana, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 72.—N. Guin.

APPENDICULA, Blume (Orchid.).
imbricata, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 110 B.—Java.
Latilabium, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 89.—Ins. Ambon.
longa, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 531.—Java.
papuana, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 125.—N. Guin.
pilosa, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 110 A.—Borneo.

APSANTHEA, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 40 (1903) = **Scilla**, Linn. (Liliac.).
melanocarpa, Jord. l. c. 41.—Alger.
micrantha, Jord. l. c.—Alger.
oligantha, Jord. l. c. 40.—Alger.
propera, Jord. l. c. 41.—Alger.
serotina, Jord. l. c. 40.—Alger.

APTERIA, Nutt. (Burmann.).
aphylla, *Small, Fl. S. E. U. S.* 309 (= *Lobelia aphylla*).—Am. bor.
Ulei, *Schlechter, in Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 102.—Reg. Amaz.

APTOSIMUM, Burch. (Scrophul.).
angustifolium, *E. Web. & Schinz, ex E. Web. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. iii. 896.—Afr. trop.
Dinteri, *E. Web. l. c.* 902.—Afr. austr.
glandulosum, *E. Web. & Schinz, ex E. Web. l. c.* 899.—Afr. trop.
Marlothii, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 127 (= *Peliostomum Marlothii*).—Afr. austr.
neglectum, *E. Web. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 894.—Afr. austr.
Nelsii, *E. Web. l. c.* 900.—Afr. trop.
pubescens, *E. Web. l. c.* 903.—Afr. trop.
Schinzii, *E. Web. l. c.* 901.—Afr. trop.
suberosum, *E. Web. l. c.* 904.—Afr. trop.

AQUILEGIA, Tourn. (Ranunc.).
columbiana, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 145.—Am. bor.

AQUILEGIA :—
desertorum, *Cockerell, ex A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 27.—Am. bor.
Eastwoodiae, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 146.—Am. bor.
Ebneri, *Zimm. in Fünft. Jahres-Ber. Staats-Ober-Realsch. Steyr*, (1875) 21.—Eur.
Fauriei, *Léveillé, in Bull. Acad. Géog. Bot.* 1902, 300.—As. bor.
Henryi, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. (1904) 411 (= *Isopyrum Henryi*).—China.
longisepala, *Zimm. in Fünft. Jahres-Ber. Staats-Ober-Realsch. Steyr*, (1875) 26.—Eur.
mancosana, Cockerell, in Torreya, ii. 75 = Eastwoodiae.
oreophila, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 146.—Am. bor.
Pancicii, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* iv. 118.—Serbia.
pauciflora, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 76.—Calif.
Portae, *Huter, in Oestr. Bot. Zeitschr.* 1903, 495.—Eur.
Shockleyi, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 193.—Am. bor.
sulphurea, Zimm. in Fünft. Jahres-Ber. Staats-Ober-Realsch. Steyr, (1875) 38 = chrysantha.
thalictrifolia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 145.—Am. bor.

AQUILINA, Bub. Fl. Pyren. iii. (1901) 374 = **Aquilegia**, Tourn. (Ranunc.).
pyrenaea, Bub. l. c. = Aquilegia pyrenaica.
vulgaris, Bub. l. c. 375 = Aquilegia vulgaris.

ARABIS, Linn. (Crucif.).
anachoretica, *Porta, ex Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 139.—Eur.
axillaris, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 437.—Corea.
Collinsii, *Fernald, in Rhodora*, vii. 32.—Am. bor.
Ferdinandi-Coburgi, *Kell. & Suenderm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1903, 62.—Maced.
Georgiana, *Harper, in Torreya*, iii. 87.—Am. bor.
gredensis, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 413.—Hispan.
iwatensis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 113.—Japon.
Kochii, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 57.—Am. sept.
Macdonaldiana, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 488.—Calif.
Menziesii, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xviii. 187 (= *Hesperis Menziesii*).—Am. bor.
Merinoi, *Pau, ex Merino, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 512.—Hispan.
oblanceolata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 557.—Am. bor.
pedicellata, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 91.—Am. bor.
pieninica, *Wolosz. Fl. Polon. Exsicc.* no. 803.—Hungar.
rugocarpa, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 357.—Am. bor.
rupicola, *Krylov, in Act. Hort. Petrop.* xxi. 3.—As. cent.
Selbyi, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 557.—Am. bor.
stenoloba, *Greene, Pl. Baker.* iii. 8.—Am. bor.
tanakana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 160.—Japon.
Whitedii, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 39.—Am. bor.

ARACHIS, Linn. (Legum.).
guaranitica, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 886.—Parag.
paraguariensis, *Chod. & Hassl. l. c.*—Parag.

ARACHNANTHE, Blume (Orchid.).
[RENANTHERA, Lour. D.T. & H.]
annamensis, *Rolfe, in Gard. Chron.* 1905, i. 391.—Anam.
Flos-aeris, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 584 (= *Renanthera Flos-aeris*).—Malaya.
Sulingi, *J. J. Sm. l. c.* 586 (= *Aerides Sulingi*).—Java.

ARACHNITES, F. W. Schmidt = **Ophrys**, Linn. (Orchid.).
aranifera, Bub. Fl. Pyren. iv. 48 = O. aranifera.

ARAGALLUS, Neck. = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).
abbreviatus, Greene, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 12.—Am. bor.
aboriginum, Greene, l. c. 13.—Am. bor.

ARAGALLUS :—
Albertinus, Greene, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 15.—Am. bor.
articulatus, Greene, l. c. 18.—Am. bor.
bryophilus, Greene, l. c. 17.—Am. bor.
cervinus, Greene, l. c. 16.—Am. bor.
falcatus, Greene, l. c. 13.—Am. bor.
formosus, Greene, l. c. 14.—Am. bor.
galioides, Greene, l. c. 16.—Am. bor.
hudsonicus, Greene, l. c. 17.—Am. bor.
invenustus, Greene, l. c. 14.—Am. bor.
johannensis, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 556.—Am. bor.
Knowltonii, Greene, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 12.—Am. bor.
luteolus, Greene, l. c. 17.—Am. bor.
Macounii, Greene, l. c. 16.—Am. bor.
majusculus, Greene, l. c. 12.—Am. bor.
melanodontus, Greene, l. c. 15.—Am. bor.
Metcalfei, Greene, l. c. 13.—Am. bor.
rigens, Greene, l. c. 14.—Am. bor.
varians, Rydb. ex Britton & Rydb. in Bull. N. York, Bot. Gard. ii. 176.—Am. bor.
ventosus, Greene, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 15.—Am. bor.
villosus, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 36.—Am. bor.

ARALIA, Tourn. (Aral.).
repens, *Matsum. Enum. Sci. Names* (1895) 27 (= *Panax repens*).—Japon.
reticulata, Hort. ex Hemsl. in Bot. Mag. t. 7927 = Meryta Denhamii.
Searelliana, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 498.—China.

ARCHANGELICA, Hoffm. = **Angelica**, Linn. (Umbell.).
songarica, Lipsky, ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1903, 143 = A. songorica.

ARCHAETOGERON, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. (1904) 94 = **Achaetogeron**, A. Gr. (Compos.).

ARCHIBACCHARIS, Heering, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. xxi. Beiheft III. (1904) 40. *COMPOSITAE.*
hieraciifolia, *Heering, l. c.* (= *Baccharis hieraciifolia*).—Mexic.
hirtella, *Heering, l. c.* 41 (= *Baccharis hirtella*).—Mexic.

ARCHIDENDRON, F. Muell. (Legum.).
solomonense, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2735.—Ins. Solom.

ARCHYTAEA, Mart. (Ternstroem.).
pulcherrima, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 560.—Borneo.

ARCTAGROSTIS, Griseb. (Gramin.).
angustifolia, *Nash, ex Britton & Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 149.—Am. bor.
macrophylla, *Nash, ex Britton & Rydb. l. c.* 151.—Am. bor.
poaeoides, *Nash, ex Britton & Rydb. l. c.* 152.—Am. bor.

ARCTERICA, Coville, in Proc. Wash. Acad. Sci. iii. 573 (1901). *ERICACEAE.*
[CASSIOPE, G. Don. D. T. & H.]
oxycoccoides, *Coville, l. c.* (= *Cassiope oxycoccoides*).—Ins. Bering.

ARCTIUM, Linn. (Compos.).
austriacum, *Teyber, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, lii. (1902) 590.—Eur.

ARCTOPHILA, Rupr. = **Colpodium**, Trin. (Gramin.).
brizoides, Greene, in Ottawa Natural. xvi. 83.—Am. bor.
chrysantha, Greene, l. c. 84.—Am. bor.
gracilis, Greene, l. c. 83.—Am. bor.

ARCTOSTAPHYLOS, Adans. (Ericac.).
auriculata, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 202.—Calif.
bracteata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 417.—Am. bor.
Conzattii, *Fern. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 497.—Mexic.
franciscana, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 201.—Calif.

ARCTOSTAPHYLOS :—
glabrata, *Fern. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 497.—Mexic.
hispidula, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 415.—Am. bor.
intricata, *Howell, l. c.* 416.—Am. bor.
nochistlancensis, *Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. (1903) 220.—Mexic.
oblongifolia, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 416.—Am. bor.
obtusifolia, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 642.—Am. bor.
parvifolia, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 416.—Am. bor.
pulchella, *Howell, l. c.*—Am. bor.
strigosa, *Howell, l. c.* 417.—Am. bor.
vestita, *Eastw. in Sarg. Trees & Shrubs*, 205, t. 97.—Calif.
virgata, *Eastw. l. c.* 203, t. 96.—Calif.

ARCTOTIS, Linn. (Compos.).
Gumbletoni, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7796.—Afr. austr.

ARDISIA, Sw. (Myrsin.).
angustifolia, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 94 (= *Wallenia angustifolia*).—Bras.
Beccariana, *Mez, l. c.* 110.—Borneo.
Brackenridgei, *Mez, l. c.* 127 (= *Myrsine Brackenridgei*).—Ins. Fiji.
brevithyrsa, *Mez, l. c.* 121.—Java.
Brongniartii, *Mez, l. c.* 79.—Hort.
brunneo-purpurea, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 98.—Afr. trop.
Candolleana, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 138 (= *Tinus Candolleanus*).—Ins. Philipp.
carnea, *Mez, l. c.* 120.—Celebes.
castaneifolia, *Mez, l. c.* 138.—Ins. Philipp.
catharinensis, *Mez, l. c.* 96.—Bras.
caudifera, *Mez, l. c.* 116.—Borneo.
chontalensis, *Mez, l. c.* 90.—Am. cent.
Conraui, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 98.—Afr. trop.
cornudentata, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 144.—Formosa.
corymbifera, *Mez, l. c.* 149.—China.
crassifolia, *Mez, l. c.* 130.—Java.
crenipetala, *Mez, l. c.* 91.—Mexic.
dentata, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 393 (= *Icacorea dentata*).—Ind. occ.
Donnell-Smithii, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 236.—Am. cent.
ferruginea, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 103.—Ind. or.
fluminensis, *Mez, l. c.* 95.—Bras.
fortis, *Mez, l. c.* 114.—Borneo.
granatensis, *Mez, l. c.* 86.—N. Granat.
grandidens, *Mez, l. c.* 137.—Ins. Philipp.
guatemalensis, *Mez, l. c.* 92.—Am. cent.
guianensis, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 392 (= *Icacorea guianensis*).—Ind. occ.; Am. austr. trop.
haemantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 99.—Afr. trop.
hainanensis, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 138.—China.
Hanceana, *Mez, l. c.* 149.—China.
Harrisiana, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 401.—Ind. occ.
Hosei, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 244.—Borneo.
Huallagae, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 95.—Peru.
Hulletii, *Mez, l. c.* 131.—Arch. Mal.
insignis, *Mez & Pittier, ex Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 237.—Am. cent.
insularis, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 111.—As. trop.
Jagorii, *Mez, l. c.* 148.—Ins. Philipp.
kachinensis, *Mez, l. c.* 147.—Ind. or.
Karwinskyana, *Mez, l. c.* 85.—Mexic.
Lindenii, *Mez, l. c.* 86.—Mexic.
livida, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 245.—Borneo.
maculosa, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 146.—China.
macrobotrys, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 342.—N. Guin.
mindanaensis, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 107.—Ins. Philipp.
myriosticta, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 342.—N. Guin.
Naegelii, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 114.—Java.
nitidula, *Mez, l. c.* 122.—Java.
obtusa, *Mez, l. c.* 104.—China.
Oldhamii, *Mez, l. c.* 148.—Formosa.

ARDISIA:—
oligantha, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 134. —Java.
ophirensis, Mez, l. c. 113.—Penins. Mal.
pachysandra, Mez, l. c. 97 (= Myrsine pachysandra). —Penins. Mal.
panurensis, Mez, l. c. 95.—Reg. Amaz.
pardalina, Mez, l. c. 148.—Ins. Philipp.
patens, Mez, l. c. 149.—China.
paupera, Mez, l. c. 134.—Sumatra.
pendula, Mez, l. c. 125.—Java.
penduliflora, Mez, l. c. 150.—China.
pergamacea, Mez, l. c. 154 (= Climacandra pergamacea).—Sumatra.
Picardae, Urb. ex Mez, in Urb. Symb. Antill. ii. 395. —Ind. occ.
pirifolia, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 129.—Ins. Philipp.
Pittieri, Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 236.—Am. cent.
polyactis, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 118. —Borneo.
polyadenia, Gilg, in Engl. Jahrb. xxx. 98.—Afr. trop.
polylepis, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 103. —Ind. or.
popayanensis, Mez, l. c. 89.—N. Granat.
proteifolia, Mez, l. c. 148.—Ins. Philipp.
pulverulenta, Mez, l. c. 88.—Am. cent.
Quelchii, N. E. Br. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. vi. 46.—Guian.
racemigera, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 125.—Arch. Mal.
racemosa, R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxvii. 380 (Dec. 1902).—Austral.
racemosa, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. (Mal. 1902) 138 (= Pyrgus racemosa).—Cochinch.
radiana, Hemsl. & Mez, ex Mez, l. c. 146.—China.
Robinsonii, Mez, l. c. 77.—Venez.
robusta, Mez, l. c. 84.—Venez.
Sadebeckiana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxx. 97.—Afr trop.
saligna, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 143.—Ins. Philipp.
Sarasinii, Mez, l. c. 124.—Celebes.
scabra, Thunb. Fl. Ceilan. 4, nomen.—Zeylan.
scabrida, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 118.—Ins. Philipp.
scalaris, Mez, l. c. 142.—Ins. Philipp.?
Schlechteri, Gilg, in Engl. Jahrb. xxx. 97.—Afr. trop.
Schlimii, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 84.—N. Granat.
scoparia, Mez, l. c. 82.—N. Granat.
scopulina, T. S. Brandegee, in Zoe, v. (1905) 215.—Mexic.
sessilifolia, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 125. —Sumatra.
sideromalla, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 348.—N. Guin.
sinuato-crenata, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 146.—Ins. Philipp.
sonchifolia, Mez, l. c. 116.—Ind. or.
squarrosa, Mez, l. c. 110.—N. Guin.
Staudtii, Gilg, in Engl. Jahrb. xxx. 99.—Afr. trop.
sublanceolata, Hochr. in Bull. Inst. Buitenz. xix. 25; Pl. Bogor. Exsicc. 13.—Java?
sulcata, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 112.—Ins. Philipp.
tenera, Mez, l. c. 104.—China.
Thomsonii, Mez, l. c. 133.—Ind. or.
undulata, Mez, l. c. 146.—China.
valida, Mez, l. c. 85.—N. Granat.
verbascifolia, Mez, l. c. 153.—Cochinch.
vernicosa, Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 244.—Borneo.
villosa, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 152 (= Bladhia villosa).—Japon.
Wagneri, Mez, l. c. 79.—Am. cent.
Willisii, Mez, l. c. 140.—Zeylan.
yunnanensis, Mez, l. c. 107.—China.
Zenkeri, Gilg, in Engl. Jahrb. xxx. 100.—Afr. trop.

ARENARIA, Rupp. (Caryophyll.).
breviflora, Bub. Fl. Pyren. iii. 36 = trinervia.
confusa, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 275.—Am. bor.
Eastwoodiae, Rydb. l. c. 1904, 406.—Am. bor.
glaucescens, H. Winkl. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1901) 1902, 58.—As. cent.

ARENARIA:—
gregaria, A. A. Heller, in Bull. S. Calif. Acad. ii. 67. —Calif.
Katoana, Mak. in Bot. Mag. Tokyo, xix. 88.—Japon.
lawsonensis, Britton, ex Britton & Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 169.—Am. bor.
oresbia, Greenm. in Zoe, v. (1904) 184.—Mexic.
Paulseni, H. Winkl. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1901) 1902, 58.—As. cent.
polycaulos, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 406. —Am. bor.
pulvinata, Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1904, 450. —Eur.
Tweedyi, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 406.—Am. bor.

ARENGA, Labill. (Palm.).
mindorensis, Becc. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 48.—Ins. Philipp.

ARETHUSA, Gronov. (Orchid.).
sinensis, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 46.—China.

ARGEMONE, Tourn. (Papav.).
arida, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 26.—Mexic.
pinnatifida, Norton, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, xii. 38.—Am. bor.
rotundata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 160. —Am. bor.
stenopetala, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 27.—Mexic.

ARGITHAMNIA, Sw. (Euphorb.).
Brandegei, Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 220.—Calif.
cochensis, J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad. xl. 688.—Venez.
erubescens, J. R. Johnston, l. c. 689.—Venez.
Palmeri, S. Wats. in Proc. Amer. Acad. xxiv. (1889) 77.—Mexic.
Pringlei, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xli. 239.—Mexic.

ARGOSTEMMA, Wall. (Rubiac.).
acuminatum, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxii. 143.—Penins. Mal.
aequifolium, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxv. 15.—Penins. Mal.
bicolor, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxii. 155.—Penins. Mal.
bryophilum, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee, 393.—N. Guin.
Curtisii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxii. 151.—Penins. Mal.
hirtum, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xxxv. 14.—Penins. Mal.
Hookeri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxii. 155.—Penins. Mal.
membranaceum, King, l. c. 145.—Penins. Mal.
nutans, King, l. c. 146.—Penins. Mal.
oblongum, King, l. c. 153.—Penins. Mal.
perakense, King, l. c. 152.—Penins. Mal.
Ridleyi, King, l. c. 147.—Penins. Mal.
subcrassum, King, l. c. 152.—Penins. Mal.
unifolioloide, King, l. c. 148.—Penins. Mal.
urticifolium, King, l. c. 146.—Penins. Mal.
Wrayi, King, l. c. 154.—Penins. Mal.
Yappii, King, l. c. 145.—Penins. Mal.

ARGYREIA, Lour. (Convolv.).
Burneyi, Gage, in Rec. Bot. Surv. India, iii. 78.—Burma.

ARGYROLOBIUM, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
vaginiferum, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. 323.—Afr. trop.

ARGYROSTACHYS, Lopr. in Engl. Jahrb. xxx. (1901) 108; et in Malpighia, xiv. (1901) 435. AMARANTACEAE.
splendens, Lopr. l. c. 109; l. c. 436.—Afr. trop.

ARIA, Jacq. f. = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).
angustata, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. 10. —Gallia.
austriaca, Beck ex Hedl. in Svenska Vet. Akad. Handl. xxxv. (1901) 65 = P. Aria.
callophylla, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. 11. —Gallia.

ARIA:—
calvescens, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. 8.—Gallia.
cantalica, Jord. l. c. 11.—Gallia.
chlorocarpa, Jord. l. c. 9.—Gallia.
cuspidata, Jord. l. c.—Gallia.
ellipsoidea, Jord. l. c.—Gallia.
globulosa, Jord. l. c. 8.—Gallia.
obovata, Jord. l. c. 9.—Gallia.
parvidens, Jord. l. c. 10.—Gallia.
plicata, Jord. l. c. 9.—Gallia.
rostellata, Jord. l. c. 10.—Gallia.
rotundifolia, Jord. l. c.—Gallia.

ARIOCARPUS, Scheidw. = **Mamillaria**, Haw. (Cact.).
prismaticus, Hort. ex Cobbold, in Journ. Hortic. 1903, I. 332 = M. prismatica.
Rotchubeyanus, Hort. ex Cobbold, l. c. = M. sulcata.

ARISAEMA, Mart. (Arac.).
acuminatum, Small, Fl. S. E. U. S. 226.—Am. bor.
asperatum, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 176. —China.
brevipes, Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 11.—China.
cordatum, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 177. —China.
microspadix, Engl. Jahrb. xxxvii. 142.—Java.
polyphyllum, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxvii. 90 (= Calla polyphylla).—Ins. Philipp.
pusillum, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 229.—Am. bor.
ruwenzoricum, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 143.—Afr. trop.
Sarasinorum, Engl. Jahrb. xxxvii. 143.—Celebes.
Satensoo, Mak. in Bot. Mag. Tokyo, xv. 138 (= Arum Sazensoo).—Japon.
Stewardsonii, Britton, Man. Fl. N. U. S. 1045.—Am. bor.
tosaense, Mak. in Bot. Mag. Tokyo, xv. 130.—Japon.

ARISARUM, Tourn. (Arac.).
latifolium, Bub. Fl. Pyren. iv. 29 = vulgare.

ARISTIDA, Linn. (Gramin.).
abnormis, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. (1903) 48.—Afr. or. trop.
altissima, Arech. in Anal. Mus. Montevid. iv. t. 80.—Urug.
arachnoidea, Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb. i. 21.—Turkestan.
Chapmaniana, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 118.—Am. bor.
cordobensis, Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 91.—Reg. Argent.
culionensis, Pilger, ex Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 145.—Ins. Philipp.
Curtissii, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 94.—Am. bor.
Dinteri, Hack. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 767.—Afr. trop.
fastigiata, Hack. l. c. 768.—Afr. trop.
Hackeli, Arech. in Anal. Mus. Montevid. iv. t. 79.—Urug.
Hassleri, Hack. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 277. —Parag.
intermedia, Arech. in Anal. Mus. Montevid. iv. t. 78. —Urug.
Kerstingii, Pilg. in Engl. Jahrb. xxxiv. 127.—Afr. trop.
micrantha, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 117.—Am. bor.
Pennei, Chiov. in Ann. di Bot. Roma, ii. 366.—Afr. trop.
portoricensis, Pilg. in Urb. Symb. Antill. iv. 100.—Ind. occ.
subinterrupta, Arech. in Anal. Mus. Montevid. iv. t. 77.—Urug.
subuniflora, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 116.—Am. bor.
teretifolia, Arech. in Anal. Mus. Montevid. iv. t. 79.—Urug.
venustula, Arech. l. c. 77.—Urug.
Wrightii, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 116.—Am. bor.

ARISTOLOCHIA, Tourn. (Aristoloch.).
amazonica, Ule, ex Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 122.—Peruv.
asperifolia, Ule, l. c. 121.—Peruv.
bicolor, Ule, l. c. 124.—Peruv.
Burro, Lindm. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 526.—Eur.

ARISTOLOCHIA :—
caulriflora, *Ule, in Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 120.—Peruv.
curviflora, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* i. 545.—Bras.
cuyabensis, *Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvii. no. 5, 14.—Bras.
exigua, *Lindm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 525.—Bras.
gracillima, *Hemsl. in Kew Bull.* 1901, 143.—China.
juruana, *Ule, in Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 118.—Reg. Amaz.
Lagesiana, *Ule, l. c.* 119.—Reg. Amaz.
lingua, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* i. 543.—Reg. Argent.
lingulata, *Ule, in Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 123.—Peruv.
longecaudata, S. Wats. in Proc. Amer. Acad. xxii. 447 = Pringlei.
longecaudata, *Mart. in Mart. Fl. Bras.* iv. ii. 84.—Guiana.
manshuriensis, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxii. 112.—China.
mindanaensis, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 169.—Ins. Philipp.
philippinensis, *Warb. l. c.* 170.—Ins. Philipp.
physodes, *Ule, in Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 119.—Peruv.
Pringlei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 23.—Mexic.
Schlechteri, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 260.—N. Guin.
securidata, *Mosl. in Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 256.—Am. cent.
sessilifolia, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* i. 541.—Bras.
stenophylla, *Urb. Symb. Antill.* iii. 251.—Ind. occ.
tarapotina, *Ule, in Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 123.—Peruv.

ARJONA, Comm. (Santal.).
Ameghinoi, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 159.—Patag.

ARNEBIA, Forsk. (Borag.).
lutea, *Armari, in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 161 (= *Toxostigma luteum*).—Afr. trop.
purpurascens, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 56.—Afr. trop.

ARNICA, Rupp. (Compos.).
aprica, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xv. 280.—Am. bor.
arcana, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 276.—Am. bor.
aspera, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xv. 281.—Am. bor.
aurantiaca, *Greene, in Torreya*, i. 42.—Am. bor.
cana, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xv. 282.—Am. bor.
celsa, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 408.—Am. bor.
chionopappa, *Fernald, in Rhodora*, vii. 148.—Am. bor.
coloradensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 131.—Am. bor.
confinis, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xv. 281.—Am. bor.
gaspensis, *Fernald, in Rhodora*, vii. 148.—Am. bor.
Grayi, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 5.—Am. bor.
laevigata, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xv. 279.—Am. bor.
lanulosa, *Greene, Pl. Baker.* iii. 26.—Am. bor.
parvifolia, *Greene, l. c.* 28.—Am. bor.
platyphylla, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 407.—Am. bor.
rhizomata, *A. Nelson, l. c.* 409.—Am. bor.
silvatica, *Greene, Pl. Baker.* iii. 27.—Am. bor.
Sornborgeri, *Fernald, in Rhodora*, vii. 147.—Am. bor.
stricta, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 407.—Am. bor.
tenuis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 20.—Am. bor.
tomentulosa, *Rydb. l. c.*—Am. bor.

ARNICASTRUM, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. (1903) 115. *COMPOSITAE.*
glandulosum, *Greenm. l. c.*—Mexic.

ARONIA, Pers. = **Amelanchier**, Lindl. (Rosac.).
atropurpurea, Britton, Man. Fl. N. U. S. 517.—Am. bor.

ARRACACIA, Bancr. (Umbell.).
humilis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 336.—Am. cent.

ARTABOTRYS, R. Br. (Anonac.).
aurantiodorus, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* vi. 78 (= *Xylopia aurantiodora*).—Afr. trop.
Jollyanus, *Pierre, in Engl. l. c.* 78.—Afr. trop.
Klainei, *Pierre, in Engl. l. c.* 80.—Afr. trop.
oliganthus, *Engl. & Diels, in Engl. l. c.* 73.—Afr. trop.
Pierreanus, *Engl. & Diels, in Engl. l. c.* 76.—Afr. trop.

ARTEMISIA, Linn. (Compos.).
akbaitalensis, *O. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. (1905) 335.—As. cent.
arachnoidea, *Sheldon, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 310.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, Pl. Baker.* iii. 31.—Am. bor.
Brittonii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 129.—Am. bor.
deversa, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 618.—China.
diversifolia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 20.—Am. bor.
Kennedyi, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xviii. 175.—Am. bor.
lancea, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr.* 1903, 500.—China.
monocephala, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 118.—Am. bor.
Portae, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 474.—Eur. cent.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 50.—Mexic.
pudica, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 130.—Am. bor.
saxicola, *Rydb. l. c.* 128.—Am. bor.
silvicola, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 645.—Am. bor.
sinanensis, *Yabe, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 26.—Japon.
Suksdorfii, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 42.—Am. bor.
togusbulakensis, *Fedtsch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Petersb.* i. 143.—As. cent.
Underwoodii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 129.—Am. bor.
Volfii, *Petitmeng in Monde des Pl.* Sér. II. vi. 46.—Hybr.
Wellbyi, *Hemsl. & H. H. W. Pearson, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 183.—As. cent.

ARTEMISIOPSIS, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. (1902) 331. *COMPOSITAE.*
linearis, *S. Moore, l. c.* 332.—Afr. trop.

ARTHRAXON, Beauv. (Gramin.).
nodosum, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 448.—As. or.

ARTHROSOLEN, C. A. Mey. (Thymel.).
[GNIDIA, Linn. D. T. & H.]
fraternus, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 132.—Afr. austr.

ARTHROSTEMA, Ruiz & Pav. (Melast.).
apodocarpum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 210.—Am. cent.

ARTHROSTYLIDIUM, Rupr. (Gramin.).
angustifolium, *Nash, in Torreya*, iii. 172.—Ind. occ.
Pittieri, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. (1903) 75.—Am. cent.
sarmentosum, *Pilg. in Urb. Symb. Antill.* iv. 108.—Ind. occ.

ARTOCARPUS, Forst. (Urtic.).
antiarifolia, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 630.—Borneo.
foeniformis, *Eeden, Hout. Ned. Oost. Ind.* ed. II. 122, nomen.—Arch. Mal.
humilis, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 629.—Borneo.
longifolia, *Becc. l. c.*—Borneo.
mutabilis, *Becc. l. c.* 627.—Borneo.
refracta, *Becc. l. c.* 630.—Borneo.
reniformis, *Becc. l. c.* 631.—Borneo.
rubrovenia, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 166.—Ins. Philipp.
styracifolia, *Pierre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 492.—Cochinch.
superba, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 625.—Borneo.
Tamaran, *Becc. l. c.* 626.—Borneo.
Tarap, *Becc. l. c.*—Borneo.
xanthocarpa, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 10.—Ins. Philipp.

ARUNCUS, Linn. = **Spiraea**, Tourn. (Rosac.).
Aruncus, Shafer, in Ann. Carneg. Mus. i. 44 = S. Aruncus.

ARUNDINARIA, Michx. (Gramin.).
deflexa, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 75.—Guiana.
densiflora, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 434.—China.
effusa, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. (1903) 72.—Bras.
Faberi, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 435.—China.
falcata, Rivière, in Bull. Soc. Acclim. Sér. III. v. 791 = Falconeri.
Glaziovii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. (1903) 72.—Bras.
goyazensis, *Hack. l. c.* 71.—Bras.
humillima, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 100.—Peruv.
marmorea, *Mak. Descr. Prod. Forest. Japon* (1900) 38, nomen.—Japon.
nana, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo*, xi. (1897) (160).—Japon.
Narihira, *Mak. l. c.* (159) (= *Bambusa Narihira*).—Japon.
nobilis, Mitford, Bamboo Garden, 178 = Falconeri.
ramosissima, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 74.—Bras.
setifera, *Pilg. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 145.—Peruv.
setigera, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 73.—Bras.
Sodiroana, *Hack. l. c.* 70.—Ecuad.
sparsiflora, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 436.—China.
Tootsik, *Mak. Descr. Prod. Forest. Japon* (1900) 38, nomen.—Japon.
Ulei, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. (1903) 75.—Bras.
Wilsoni, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 437.—China.

ARUNDINELLA, Raddi (Gramin.).
hispida, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 527 (= *Andropogon hispidus*).—Formosa.
sinensis, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 342.—China.

ARUNDO, Tourn. (Gramin.).
glauca, Bub. Fl. Pyren. iv. 303 = A. Donax.
roraimensis, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 74.—Guian.

ARYTERA, Blume (Sapind.).
[RATONIA, DC. I. K.]
geminata, *Radlk. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 308 (= *Guioa geminata*).—N. Guin.

ASARCA, Poepp. = **Chloraea**, Lindl. (Orchid.).
appendiculata, Phil. in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. ii. 33.—Chili.
Feuilleana, Kraenzl. l. c. 36.—Chili.
macroptera, Kraenzl. l. c. 38.—Chili.
thermarum, Phil. ex Kraenzl. l. c. 40.—Chili.

ASCLEPIAS, Linn. (Asclep.).
abyssinica, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 333 (= *Gomphocarpus abyssinicus*).—Afr. trop.
affinis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. 184.—Afr. trop.
angustata, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 343 (= *Stathmostelma angustatum*).—Afr. trop.
anisophylla, *Conr. & Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 31.—Afr. austr.
Baumii, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 341.—Afr. trop.
Bicknellii, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 458.—Hybr. ?
Buchwaldii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. 185 (= *Gomphocarpus Buchwaldii*).—Afr. trop.
Cabrae, *Wildem. l. c.*—Afr. trop.
Calceolus, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 312.—Afr. austr.
coccinea, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 340 (= *Stathmostelma incarnatum*).—Afr. trop.
congolensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. 186.—Afr. trop.
cordifolia, *Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 384 (= *Gomphocarpus cordifolius*).—Calif.

ASCLEPIAS:—

crinita, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 352 (= *Gomphocarpus crinitus*).—Afr. trop.

curvipes, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 2[illegible].—Am. bor.

densiflora, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 320. —Afr. trop.

dependens, *N. E. Br. l. c.* 352 (= *Gomphocarpus dependens*).—Afr. trop.

Dewevrei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. v. 186 —Afr. trop.

erecta, *Wildem. l. c.* 187.—Afr. trop.

foliosa, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 349 (= *Gomphocarpus foliosus*).—Afr. trop.

gigantiflora, *N. E. Br. l. c.* 326 (= *Stathmostelma gigantiflorum*).—Afr. trop.

Hassleriana, *Malme, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 63.—Parag.

intermedia, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 459. —Hybr. ?

Kaessneri, *N. E. Br. ex S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 362.—Afr. trop.

kansana, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 457.—Am. bor.

katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. 187.—Afr. trop.

Kotolo, *Eastw. in Zoe*, v. (1900) 86, 98.—Calif.

Laurentiana, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 342 (= *Stathmostelma Laurentiana*).—Afr. trop.

leucotricha, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 342.—Afr. trop.

lisianthoides, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 326 (= *Gomphocarpus lisianthoides*).—Afr. trop.

longissima, *N. E. Br. l. c.* 338 (= *Gomphocarpus longissimus*).—Afr. trop.

macropetala, *N. E. Br. l. c.* 616 (= *Stathmostelma macropetalum*).—Afr. trop.

modesta, *N. E. Br. l. c.* 348.—Afr. trop.

mubindensis, *N. E. Br. l. c.* 344 (= *Stathmostelma bicolor*).—Afr. trop.

nutans, *N. E. Br. l. c.* 352 (= *Gomphocarpus nutans*). —Afr. trop.

odorata, *N. E. Br. l. c.* 324 (= *Stathmostelma odoratum*).—Afr. trop.

pachyclada, *N. E. Br. l. c.* 325 (= *Stathmostelma pachycladum*).—Afr. trop.

pubisеta, *N. E. Br. l. c.* 329 (= *Gomphocarpus purpurascens*).—Afr. trop.

pulchella, *N. E. Br. l. c.* 346 (= *Gomphocarpus pulchellus*).—Afr. trop.

Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 255.—Afr. trop.

rhacodes, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 342 (= *Stathmostelma rhacodes*).—Afr. trop.

robusta, *N. E. Br. l. c.* 324 (= *Gomphocarpus robustus*). —Afr. trop.

Rolfsii, *Britton, in Small, Fl. S.E. U.S.* 943.—Am. bor.

rostrata, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 331.—Afr. trop.

rubella, *N. E. Br. l. c.* 348 (= *Gomphocarpus roseus*). —Afr. trop.

semilunata, *N. E. Br. l. c.* 327 (= *Gomphocarpus semilunatus*).—Afr. trop.

sphacelata, *N. E. Br. l. c.* 339 (= *Gomphocarpus sphacelatus*).—Afr. trop.

Stolzianus, *N. E. Br. l. c.* 617 (= *Gomphocarpus Stolzianus*).—Afr. trop.

ulophylla, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 82.—Afr. austr.

Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. 188 (= *Stathmostelma Verdickii*).—Afr. trop.

ASCOCHILUS, Ridl. (Orchid.).

minutiflora, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 55.—Penins. Mal.

teres, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.

ASCOLEPIS, Nees (Cyperac.).

pinguis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 475.—Afr. trop.

ASCYRUM, Linn. (Hyperic.).

tetrapetalum, *Vail, in Small, Fl. S. E. U. S.* 785 (= *Hypericum tetrapetalum*).—Am. bor.

ASPARAGUS, Tourn. (Liliac.).

altiscandens, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 196.—Afr. trop.

Baumii, *Engl. & Gilg. l. c.*—Afr. trop.

conglomeratus, *Baker, in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 176.—Afr. austr.

ASPARAGUS:—

katangensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 32.—Afr. trop.

Lecardi, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. 17.—Afr. trop.

longipes, *Baker, in Kew Bull.* 1901, 134.—Afr. trop.

Lujae, *Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* t. 34.—Afr. trop.

Schroederi, *Engl. Jahrb.* xxxii. 97.—Afr. trop.

sinicus, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 108 (= *Asparagopsis sinica*).—China.

ASPERULA, Linn. (Rubiac.).

capillacea, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 404.—Eur.

idaea, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 737.—Eur.

occidentalis, *Rouy, Fl. Fr.* viii. 60.—Hybr.

ASPICARPA, Rich. (Malpigh.).

lanata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 49.—Mexic.

ASPIDISTRA, Ker-Gawl. (Liliac.).

minutiflora, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 113.—China.

ASPIDOCARYA, Hook. f. & Thoms. (Menisperm.).

stenothyrsus, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 264.—N. Guin.

ASPIDOPTERYS, A. Juss. (Malpigh.).

indica, *Hochr. in Bull. Inst. Buitenz.* xix. 46 (= *Triopteris indica*).—Ind. or.

ASPIDOSPERMA, Mart. & Zucc. (Apocyn.).

ingratum, *K. Schum. in Urb. in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 30.—Bras.

ASPILIA, Thou. (Compos.).

aggregata, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 102. —Mexic.

apensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 721.—Parag.

Baumii, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 417.—Afr. trop.

callosa, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 720.—Parag.

camporum, *Chod. l. c.*—Parag.

Eenii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 345.—Afr. trop.

Eggersii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 606.—Ecuad.

elata, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 203.—Bras.

Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 391.—Parag.

induta, *Chod. l. c.* iii. 720.—Parag.

Lehmannii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 605.—N. Granat.

Leucanthemum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 391.—Parag.

monocephala, *Baker, in Kew Bull.* 1898, 152.—Afr. trop.

monopetala, Ind. Kew. Suppl. II. 19, sphalm. = monocephala.

purpurea, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 39.—Mexic.

Rosei, *Greenm. l. c.*—Mexic.

stenophylla, *Greenm. l. c.* xxxix. 102.—Mexic.

xylopoda, *Greenm. l. c.* xl. 40.—Mexic.

ASPILIOPSIS, Greenm. in Contrib. Gray Herb. n. s. i. no. 25 (1903); Suppl. leaf. *COMPOSITAE*.

pachyphylla, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 222. —Mexic.

ASTELIA, Banks & Soland. (Liliac.).

hemichrysa, *Brongn. ex Cordem. Fl. Ile Réunion*, 165. —Bourbon.

ASTER, Tourn. (Compos.).

agrostifolius, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1226. —Am. bor.

Andrewsii, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 179.—Am. bor.

arcticus, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 295.—Am. bor.

asperifolius, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1216. —Am. bor.

Boykinii, *Burgess, l. c.* 1211.—Am. bor.

breviscapus, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 495.—China.

Burkei, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 310.—Am. bor.

Candelabrum, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 498.—China.

capillaceus, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1215.—Am. bor.

ASTER:—

castaneus, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1211.—Am. bor.

celtibericus, *Pau, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* Sér. III. xiii. 212.—Hybr.

chlorolepis, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1211. —Am. bor.

claviger, *Burgess, l. c.* 1217.—Am. bor.

conduplicatus, *Burgess, l. c.* 1221.—Am. bor.

Cordineri, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 64.—Am. bor.

corrigiatus, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1216.—Am. bor.

corymbiformis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 655.—Am. bor.

crassulus, *Rydb. l. c.* 1901, 504.—Am. bor.

curvatus, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 499. —China.

defoliatus, *Parish, in Coult. Bot. Gaz.* xxxviii. 461.—Calif.

diabolicus, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 645. —Am. bor.

Durbrowi, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 292.—Am. bor.

Eatoni, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 310.—Am. bor.

Elmeri, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 645.—Am. bor.

excavatus, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1211.—Am. bor.

exiguus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 506; *et in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 964.—Am. bor.

falcidens, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1219.—Am. bor.

flabellum, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 492.—China.

flexilis, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1212.—Am. bor.

fluvialis, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 611.—Am. bor.

Geyeri, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 308.—Am. bor.

Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 103.—China.

glossophyllus, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 646.—Am. bor.

gracilescens, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1218. —Am. bor.

Gravesii, *Burgess, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 961. —Am. bor.

Greatai, *Parish, in Bull. S. Calif. Acad.* i. 15.—Am. bor.

griseolus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 653. —Am. bor.

griseus, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 147.—Am. bor.

incertus, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 269.—Am. bor.

juniperinus, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1225.—Am. bor.

kentuckiensis, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 960.—Am. bor.

laciniatus, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 50 (= *Callistephus laciniatus*).—Hort.

laticorymbus, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 494.—China.

lentus, *Greene, Man. Bot. San Francisco Bay*, 180.—Calif.

leptocaulis, *Burgess, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 950.—Am. bor.

leucopappus, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 339 (= *Noticastrum leucopappum*).—Chili.

limnophilus, *Hemsl. & H. H. W. Pearson, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 86 (= *Erigeron limnophilus*).—Reg. Andin.

linguiformis, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1217.—Am. bor.

lonchophyllus, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 146.—Am. bor.

loriformis, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1217.—Am. bor.

macilentus, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 497.—China.

Meehani, *Jellett, Germantown*, 84.—Am. bor.

meritus, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 268.—Am. bor.

microlonchus, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xv. 278. —Am. bor.

millefolius, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 496.—China.

Moelleri, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 343 (= *Tripolium Moelleri*).—Chili.

ASTER:—

Mohrii, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1217.—Am. bor.

mollis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 22.—Am. bor.

mucronatus, *Sheldon, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 309.—Am. bor.

nigrescens, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 493.—China.

nigromontana, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 501.—China.

orthophyllus, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 146.—Am. bor.

Osterhoutii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 654.—Am. bor.

parviceps, *Mackenzie & Bush, Fl. Jacks. County*, 196.—Am. bor.

philippinensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 138.—Ins. Philipp.

plumarius, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1214.—Am. bor.

poaceus, *Burgess, l. c.* 1215.—Am. bor.

Priceae, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 960.—Am. bor.

Proteus, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1216.—Am. bor.

ricinatus, *Burgess, l. c.* 1212.—Am. bor.

Saundersii, *Burgess, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 954.—Am. bor.

spatelliformis, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1225.—Am. bor.

stilettiformis, *Burgess, l. c.* 1211.—Am. bor.

subcoerulea, *S. Moore, in Gard. Chron.* 1901, ii. 336.—Ind. or.

subsessilis, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1220.—Am. bor.

sylvestris, *Burgess, l. c.* 1216.—Am. bor.

tenuicaulis, *Burgess, l. c.* 1220.—Am. bor.

tenuissimus, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 502.—China.

texanus, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1214.—Am. bor.

triangularis, *Burgess, l. c.* 1217.—Am. bor.

tricapitatus, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 493.—China.

trigonicus, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1214.—Am. bor.

troellius, *Burgess, l. c.* 1216.—Am. bor.

Tweedyi, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 655.—Am. bor.

umbraticus, *Sheldon, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 310.—Am. bor.

Underwoodii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 654.—Am. bor.

ursinus, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1218.—Am. bor.

vaccinus, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, xxix. 648.—Am. bor.

vernalis, *Burgess, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1215.—Am. bor.

Wattii, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 645.—Am. bor.

Wootonii, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 146.—Am. bor.

zosterifolius, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 343 (= *Tripolium tenuifolium*).—Chili.

ASTERANTHE, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. vi. 30. *ANONACEAE.*

Asterias, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Uvaria Asterias*).—Afr. trop.

ASTERISCIUM, Cham. & Schlecht. (Umbell.).

argentinum, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 526.—Reg. Argent.

ASTEROLINON, Hoffmgg. & Link (Primul.).

adoense, *Kunze, in Linnaea*, xvi. (1842) *Liter.* 108.—Afr. trop.

ASTEROMOEA, Blume (Compos.).
[BOLTONIA, L'Hérit. 1. K.]

cantoniensis, *Matsum. Enum. Sci. Names* (1895) 41 (= *Boltonia cantoniensis*).—Japon.

japonica, *Matsum. l. c.* (= *Boltonia japonica*).—Japon.

ASTILBE, Buch.-Ham. (Saxifrag.).

crenatiloba, *Small, in N. Am. Fl.* xxii. 158.—Am. bor.

crenatilobata, Small, Fl. S. E. U. S. 500 = praec.

Davidii, *Henry, in Gard. Chron.* 1902, ii. 95; *Bot. Mag.* t. 7880.—China.

ASTILBE:—

grandis, *Stapf, ex Wilson, in Gard. Chron.* 1905, ii. 426.—China.

myriantha, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 48.—China.

philippinensis, *Henry, in Gard. Chron.* 1903, ii. 155.—Ins. Philipp.

ASTRAGALUS, Tourn. (Legum.).

ackerbergensis, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 562.—As. cent.

aconcaguensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 264.—Chili.

aflatunensis, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 201.—Turkestan.

akbaitalensis, *B. Fedtsch. ex O. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. (1905) 327.—As. cent.

alabugensis, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 234.—Turkestan.

alaicus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 766.—Turkestan.

Albertoregelia, *Winkl. & B. Fedtsch. in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 42.—Turkestan.

Alitschuri, *O. Fedtsch. Fl. Pamir*, 28.—As. cent.

Ameghinoi, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 263.—Patag.

amphidoxus, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 72.—Am. bor.

andaulgensis, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 213.—Turkestan.

angustidens, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 758.—Turkestan.

aridus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1107.—As. cent.

Arnoldi, *Hemsl. & H. H. W. Pearson, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 172.—As. cent.

Arnottianus, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 504 (= *Phaca Arnottiana*).—Am. austr.

Aschuturi, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 233.—Turkestan.

atacamensis, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 134 (= *Tragacantha atacamensis*).—Am. austr.

atricapillus, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 753.—Persia.

Atuelii, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 477.—Reg. Argent.

Beckii, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 755.—Persia.

Beketowi, *B. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 316; *et in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 202.—Turkestan.

bellus, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 135 (= *Tragacantha bella*).—Reg. Andin.

Benthamianus, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 265.—Beluchist.

Biondianus, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 62.—China.

Brauntonii, *Parish, in Bull. S. Calif. Acad. Sci.* ii. 26.—Calif.

breviscapus, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 234.—Turkestan.

Bungeanus, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 265.—As. cent.

Bungei, *C. Winkl. & B. Fedtsch. ex B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 198.—Turkestan.

charguschanus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 764.—As. cent.

chubutensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 266.—Patag.

Crandallii, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. xiv.—Am. bor.

Danieli-Kochii, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 558.—As. cent.

distinens, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 505 (= *Phaca distans*).—Patag.

divergens, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 73.—Am. bor.

dolichopodus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1120.—As. cent.

dschanbulakensis, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 236.—Turkestan.

Edmonstonei, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 148 (= *Phaca Edmonstonei*).—Ins. Galap.

enantiotrichus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 561.—As. cent.

Englerianus, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 60.—China.

ASTRAGALUS:—

erythrostachys, *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 102.—Mexic.

Fetissowi, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 202.—Turkestan.

fissuralis, *Alex. in Act. Hort. Tiflis*, vi. 49.—Reg. Caucas.

fragilidens, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1111.—Reg. Casp.

Fuhsii, *Freyn & Sint. l. c.* 1114.—Reg. Casp.

gaviotus, *Elmer, in Contr. Bot. Gaz.* xxxix. 54.—Calif.

Giraldianus, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 64.—China.

Harmsii, *Ulbr. l. c.* 63.—China.

Hedinii, *Ulbr. l. c.* xxxv. 679.—Tibet.

heterochrous, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xviii. 46; *et in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 757.—Persia.

Hohenackeri, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 265 (*errore* Hohenacheri).—Persia.

hartadensis, *Speg. l. c.*—Chili.

hybridus, *Pau, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1904, 212.—Hybr.

jassiensis, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 236.—Turkestan.

Jesupi, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1048.—Am. bor.

juratzkanus, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 567.—As. cent.

karakalensis, *Freyn & Sint. l. c.* iv. 1110.—Reg. Casp.

kaswinensis, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 758.—Persia.

Kawakamii, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 115.—Ins. Kurile.

kenkolensis, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 201.—Turkestan.

kifonsanicus, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 64.—China.

Kneuckeri, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1113.—As. Min.

Kronenburgii, *B. Fedtsch. ex Kneuck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 171.—Turkestan.

kujukensis, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 225.—Turkestan.

kunigudensis, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 447.—As. cent.

kurilensis, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 115.—Ins. Kurile.

Kuschakewiczi, *B. Fedtsch. ex O. Fedtsch. Fl. Pamir*, 78.—As. cent.

latistylus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1106.—As. cent.

leansanicus, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 62.—China.

Lipskyanus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 755.—As. cent.

longispicatus, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 61.—China.

Lorinserianus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 565.—As. cent.

macrosphaerus, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1116.—Reg. Casp.

mailiensis, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 221.—Turkestan.

Malcolmii, *Hemsl. & H. H. W. Pearson, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 172.—As. cent.

managildensis, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 222.—Turkestan.

maulensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 264.—Chili.

megalocarpus, *Speg. l. c.* 265.—Chili.

mendax, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 770.—Turkestan.

Meyenianus, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 265.—Chili.

Murrii, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 20.—Eur.

nebraskensis, *Bates, in Torreya*, v. (1905) 216.—Am. bor.

Neilreichianus, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 571.—As. cent.

nephtonensis, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 760.—Turkestan.

nertschinskensis, *Freyn, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 21.—As. bor.

nobilis, *Bunge & B. Fedtsch. ex B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 236.—Turkestan.

Nuttallianus, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 265.—Am. bor.

Olufsenii, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 450.—As. cent.

ASTRAGALUS :—
olympicus, J. S. Cotton, in Bull. Torr. Bot Club, 1902, 573.—Am. bor.
oophorus, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 1019. —As. cent.
oreophilus, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 561. —Am. bor.
orophacoides, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 563.—As. cent.
orthanthus, Freyn, l. c. 1018.—As. cent.
Paulsenii, Freyn, l. c. iv. 445.—As. cent.
pauperiformis, B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop. xxiv. 207.—Turkestan.
Petunnikowi, Litw. in Sched. Herb. Fl. Ross. v. 76.—Turkestan.
Philippii, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 265. —Chili.
Rhudolphi, Speg. l. c.—Chili.
piletocladus, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1108.—Reg. Casp.
purpureus, Fomine, in Act. Hort. Tifl. VI. ii. 2.—Caucas.
raswendicus, Hausskn. & Bornm. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 766.—Persia.
Reichei, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 264. —Chili.
rimarum, Bornm. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 756. —Persia.
samarkandinus, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 763.—Turkestan.
santiagensis, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 265.—Chili.
sarbaenensis, B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop. xxiv. 221.—Turkestan.
Sarcocolla, Dymock, in Dymock, Warden & Hooper, Pharmac. Indica, i. (1890) 476.—Persia.
Scheremetewianus, Fedtsch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Petersb. i. 125.—As. cent.
schugnanicus, Fedtsch. l. c. 124.—As. cent.
senilis, Bornm. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 758.—Persia.
seraffchanicus, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 767.—Turkestan.
Shearii, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 562.—Am. bor.
simulans, Cockerell, in Torreya, 1902, 154.—Am. bor.
sinuatus, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 40.—Am. bor.
Skorniakowi, B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop. xxiv. 227.—Turkestan.
stenanthus, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 761.—Reg. Casp.
strictipes, Bornm. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 840. —Persia.
subaedinus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 264.—Chili.
sulphurescens, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 36.—Am. bor.
sulukiensis, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 451.—Turkestan.
supralanatus, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 768.—Turkestan.
sykensis, Freyn, l. c. v. 659.—As. cent.
tarapacanus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 264.—Chili.
Tarletonis, Rydb. ex Britton & Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 175.—Am. bor.
Tecti Mundi, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 456.—As. cent.
tehuelches, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 266.—Patag.
Thlaspi, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xxiii. 90—As. cent.
Titi, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 195.—Calif.
totschalensis, Bornm. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 763.—Persia.
Tulinovii, B. Fedtsch. ex O. Fedtsch. Fl. Pamir, 27.—As. cent.
ufraensis, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 668.—As. cent.
ulacholensis, B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop. xxiv. 205.—Turkestan.
valparadisiensis, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 264.—Chili.
variifolius, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 784.—Turkestan.
varnensis, Davidoff, in Oesterr. Bot. Zeitschr. lii. 493.—Eur.

ASTRAGALUS :—
warackensis, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 263.—Oriens.
Watsonianus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 265.—Am. bor.
Whitedii, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 224.—Am. bor.
Williamsii, Rydb. ex Britton & Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 176.—Am. bor.
Xanthoxiphidium, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 785.—Reg. Casp.
xiphidioides, Freyn & Sint. l. c. 786.—Turkestan.

ASTRANTIA, Tourn. (Umbell.).
rissensis, Gremblich, ex Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 362.—Hybr.

ASTROCARPUS, Neck. (Resed.).
latifolius, Merino, in Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. i. 116.—Eur.

ASTROCARYUM, G. F. W. Mey. (Palm.).
Burity, Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras. ii. 74.—Bras.
giganteum, Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio, 1902, 82.—Bras.
kewense, Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras. ii. 70.—Bras.

ASTROCASIA, Robinson & Millsp. in Engl. Jahrb. xxxvi. (1905) Beibl. lxxx. 19. EUPHORBIACEAE.
phyllanthoides, Robinson & Millsp. l. c. 20.—Am. cent.

ASTROCHLAENA, Hallier f. (Convolv.).
annua, Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. ii. 124.—Afr. trop.
Delamereana, Rendle, in Journ. Bot. 1901, 60.—Afr. trop.
Grantii, Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. ii. 128.—Afr. trop.
involuta, Rendle, in Journ. Bot. 1901, 59.—Afr. trop.
Kaessneri, Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. ii. 123. —Afr. trop.
Phillipsiae, Rendle, l. c. 121.—Afr. trop.
ugandensis, Rendle, l. c. 124.—Afr. trop.
Whytei, Rendle, l. c.—Afr. trop.

ASTRONIA, Noronha (Melast.).
glauca, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 31.—Ins. Philipp.
Meyeri, Merrill, l. c. xxxv. 51.—Ins. Philipp.
Stuhlmannii, Damm. in Engl. Jahrb. xxx. 386.—Afr. trop.

ASYSTASIA, Blume (Acanth.).
excellens, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxiii. 190.—Afr. trop.
glandulosa, Lindau, l. c. 189.—Afr. trop.
natalensis, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 42.—Afr. austr.
riparia, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxiii. 189.—Afr. trop.
stenosiphon, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 42.—Afr. austr.
subbiflora, C. B. Clarke, l. c. 43.—Afr. austr.
trichotogyne, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxiii. 190.—Afr. trop.

ATALANTIA, Correa (Rutac.).
disticha, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxvii. 28.—Ins. Philipp.

ATAMASCO, Rafn. = **Zephyranthes**, Herb. (Amaryll.).
longifolia, Small, Fl. S. E. U. S. 289 = Z. longifolia.

ATELOPHRAGMA, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 660. LEGUMINOSAE.
aboriginum, Rydb. l. c. (= Astragalus aboriginorum). —Am. bor.
Brandegei, Rydb. l. c. (= Astragalus Brandegei).—Am. bor.
elegans, Rydb. l. c. (= Phaca elegans).—Am. bor.
glabriuscula, Rydb. l. c. (= Astragalus glabriusculus). —Am. bor.
Macounii, Rydb. l. c. (= Astragalus Macounii).—Am. bor.
Shearis, Rydb. l. c. (= Astragalus Shearis).—Am. bor.

ATHANASIA, Linn. (Compos.).
montana, Wood & Evans, ex Wood, in Natal Colon. Herb. Rep. 1900 (1901) 10; et in Journ. Bot. 1901, 171.—Afr. austr.

ATHRIXIA, Ker-Gawl. (Compos.).
arachnoidea, Wood & Evans, ex Wood, in Natal Colon. Herb. Rep. 1900 (1901) 9; et in Journ. Bot. 1901, 170.—Afr. austr.
nyassana, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 339.—Afr. trop.

ATHYSANUS, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 14. CRUCIFERAE.
pusillus, Greene, l. c. (= Draba pusilla).—Calif.
unilateralis, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 224 (= Heterodraba unilateralis).—Calif.

ATTITARA, Barrère = **Desmoncus**, Mart. (Palm.)
aerea, Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro, iii. (1902) 75 = D. aereus.
caespitosa, Barb. Rodr. l. c. 76.—Bras.
cuyabaensis, Barb. Rodr. l. c. 75 = D. cuyabaensis.
inermis, Barb. Rodr. l. c. 76 = D. inermis.
leptoclona, Barb. Rodr. l. c. = D. leptoclonos.
lophacantha, Barb. Rodr. l. c. = D. lophacanthos.
macrocarpa, Barb. Rodr. l. c. 1902, 75.—Bras.
macrodon, Barb. Rodr. l. c.—Bras.
nemorosa, Barb. Rodr. l. c.—Bras.
orthacantha, Barb. Rodr. l. c. 76 = D. orthacanthos.
paraensis, Barb. Rodr. l. c. = D. paraensis.
Philipiana, Barb. Rodr. l. c.—Bras.
prostrata, Barb. Rodr. l. c. 75 = D. prostratus.
pycnacantha, Barb. Rodr. l. c. 76 = D. pycnacanthos.
rudenta, Barb. Rodr. l. c. 75 = D. rudentum.

ATRACTYLIS, Linn. (Compos.).
aristata, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlix. 291.—Alger.
Babelii, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, vii–viii. 228.—Alger.
delicatula, Batt. ex L. Chevall. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 773.—Alger.

ATRAGENE, Linn. = **Clematis**, Linn. (Ranunc.).
grosseserrata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 156.—Am. bor.
koreana, Kom. in Act. Hort. Petrop. xxii. 278 = C. koreana.
pseudoalpina, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 157.—Am. bor.
repens, Rydb. l. c. 156.—Am. bor.

ATRIPLEX, Tourn. (Chenopod.).
Ameghinoi, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 143.—Patag.
andina, R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. Ser. IV. i. no. 1, 157.—Reg. Argent.
aptera, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 356.—Am. bor.
argentina, Speg. in Com. Mus. Buenos Aires, I. x. 346. —Reg. Argent.
Cachiyuyu, F. Kurtz, in Bol. Acad. Ci. Cordoba, xv. 518, nomen.—Reg. Argent.
carnosa, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 361.—Am. bor.
crenatifolia, Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 537.—Reg. Argent.
cuneata, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 357.—Am. bor.
flavescens, Speg. in Com. Mus. Buenos Aires, I. x. 347.—Reg. Argent.
frigida, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 142. —Patag.
joaquinana, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington. xvii. 99.—Am. bor.
leptostachys, L. Chevall. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 777.—Alger.
macrostyla, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 144.—Patag.
matamorensis, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 99.—Am. bor.
mendozaensis, Speg. in Com. Mus. Buenos Aires, I. x. 348.—Reg. Argent.
oblanceolata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 403.—Am. bor.
odontoptera, Rydb. l. c. 404.—Am. bor.
pacifica, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 99.—Am. bor.
Philippii, R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. Ser. IV. i. no. 1, 157.—Reg. Argent.
phileotira, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 358. —Am. bor.
quadrivalvata, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 182.—Austral.

ATRIPLEX :—
Serenana, *A. Nelson, ex Abrams, Fl. Los Angeles*, 128: *et in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 99.—Am. bor.
serrulata, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 66.—Hispan.
socotrana, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1903, 481.—Socotra.
spatiosa, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 360.—Am. bor.
tenuissima, *A. Nelson. l. c.* 359.—Am. bor.
Watsoni, *A. Nelson, ex Abrams, Fl. Los Angeles*, 128: *et in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 99.—Am. bor.

ATROPIS, Rupr. (Gramin.).
palustris, *Beck, in Wiss. Mitth. Bosn. Hercegow.* ix. 447 (= *Festuca palustris*).—Austria.
pannonica, *Hack. in Magyar Bot. Lap.* i. 41.—Eur.

ATROXIMA, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. (1905) 85. *POLYGALACEAE.*
Afzeliana, *Stapf, l. c.* 86 (= *Carpolobia Afzeliana*).—Afr. trop.
liberica, *Stapf, l. c.* 85.—Afr. trop.
macrostachya, *Stapf, l. c.* 86 (= *Carpolobia macrostachya*).—Afr. trop.
Zenkeri, *Stapf, l. c.* (= *Carpolobia Zenkeri*).—Afr. trop.

ATTALEA, H. B. & K. (Palm.).
Macoupi, Sagot, ex Drude, in Mart. Fl. Bras. iii. ii. 441 = spectabilis.

ATYLOSIA, Wight & Arn. (Legum.).
[Cantharospermum, Wight & Arn. D. T. & H.]
trichodon, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 491.—China.

AUBRIETIA, Adans. (Crucif.).
Froebeli, *Hort. ex Guenthart, Beitr. Blüthenb.* 22.—Hab.?

AULACODISCUS, Hook. f. (Rubiac.).
[Pleiocarpidia, K. Schum. D. T. & H.]
Maingayi, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 189.—Malaya.

AULOSPERMUM, Coult. & Rose (Umbell.).
angustum, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 358.—Am. bor.
planosum, *Osterh, l. c.* 1903, 236.—Am. bor.

AULOTANDRA, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlviii. (1902) p. lxxix. *ZINGIBERACEAE.*
madagascariensis, *Gagnep. l. c.*—Madag.

AUXOPUS, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxviii. (1905) 3. *ORCHIDACEAE.*
kamerunensis, *Schlechter, l. c.* 4.—Afr. trop.

AVENA, Linn. (Gramin.).
almeriensis, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 448.—Hispan.
Delavayi, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 189.—China.
Hackelii, *Henriq. in Bol. Soc. Broter.* xx. (1905) 57; *et in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 494.—Lusitan.
montevidensis, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 188; *et ex Arech. in Anal. Mus. Montevid*, iv. i. 86.—Urug.

AVENASTRUM, Jess. (Gramin.).
Neumayerianum, *Beck, in Wiss. Mitth. Bosn. Hercegow.* ix. 434 (= *Avena Neumayeriana*).—Austria.

AXYRIS, Linn. (Chenopod.).
pamirica, *B. Fedtsch. ex O. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. (1905) 342.—As. cent.

AYENIA, Loefl. (Stercul.).
compacta, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 321.—Calif.
fruticosa, *K. Schum. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. *Mém.* III. 56, nomen.—Bras.
Nelsoni, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 321.—Mexic.

AZALEA, Linn. = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).
candida, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 360.—Am. bor.
oblongifolia, Small, Fl. S. E. U. S. 883.—Am. bor.
serrulata, Small, l. c.—Am. bor.

AZORELLA, Lam. (Umbell.).
Ameghinoi, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 61.—Patag.
concolor, *Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 368.—Patag.
hydrocotylifolia, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 629 (= *Posoa hydrocotylifolia*).—Chili; Patag.
Morenonis, *Macl. l. c.* (= *Mulinum Morenonis*).—Patag.
patagonica, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 293.—Patag.
plantaginea, *Speg. l. c.* 292.—Patag.

B

BABIANA, Ker-Gawl. (Irid.).
Bakeri, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. vi. (1906) 712.—Afr. austr.
Gawleri, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl. sub* t. 2710.—Afr. trop.
Schlechteri, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér II. i. 865 (1901).—Afr. austr.
Schlechteri, Baker, l. c. iv. 1005 (1904) = Bakeri.
stenophylla, *Baker, l. c.* i. 866.—Afr. austr.

BACCAUREA, Lour. (Euphorb.).
bipindensis, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 368.—Afr. trop.
papuana, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl.* xviii. 3.—N. Guin.

BACCHARIS, Linn. (Compos.).
auriculigera, *Hieron, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 478.—Peruv.
Bakeri, *Heering, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xxi. Beiheft iii, 39.—Bras.
Chilcaura, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 477.—Peruv.
cotinifolia, *Urb. Symb. Antill.* iii. 406 (= *Eupatorium cotinifolium*).—Ind. occ.
cortifolia, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 37.—Bras.
cutervensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 479.—Peruv.
Eggersii, *Hieron. l. c.* xxviii. 588.—Ecuad.
fastigiata, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, iv. 7.—Chili.
glandulosa, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 36.—Mexic.
grandicapitulata, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 481.—Peruv.
huairacajensis, *Hieron. l. c.* xxviii. 589.—Ecuad.
Kraussei, *Heering, ex Reiche, Fl. Chile*, iv. 9.—Chili.
melanopotamica, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 83.—Patag.
Negeri, *Heering, ex Reiche, Fl. Chile*, iv. 28.—Chili.
oaxacana, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 37.—Mexic.
pachycephala, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 480.—Peruv.
pallida, *Heering, ex Reiche, Fl. Chile*, iv. 12.—Chili.
Palmeri, *Greenm in Proc. Amer. Acad.* xli. 259.—Mexic.
palustris, *Heering, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xxi. Beiheft iii. 38.—Bras.
pellucida, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 482.—Peruv.
petraea, *Heering, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xxi. Beiheft iii. 30.—Bras.
petrophila, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 81.—Reg. Argent.
popayanensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 593.—N. Granat.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 259.—Mexic.
procumbens, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 479.—Peruv.
santiagensis, *Heering, ex Reiche, Fl. Chile*, iv. 26.—Chili.
spicata, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 590.—Ecuad.
tandilensis, *Speg. Contrib. Fl. Tandil*, 26.—Reg. Argent.
variifolia, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 591.—Ecuad.
villosa, *Heering, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xxi. Beiheft iii. 25.—Bras.

BACOPA, Aubl. (Scrophul.).
congesta, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 289.—Parag.
dubia, *Chod. & Hassl. l. c.* 290.—Parag.
gratioloides, *Chod. l. c.* 288 (= *Herpestes gratioloides*).—Parag.
Hassleriana, *Chod. l. c.* 289.—Parag.
Salzmanni, *Chod. & Hassl. l. c.* 290 (= *Herpestes Salzmanni*).—Parag.

BACTRIS, Jacq. (Palm.).
caxcaja, *Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras.* ii. 9.—Bras.

BACTRIS :—
falcata, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 683.—Venez.
nigrispina, *Barb. Rodr. Palm. Hassl. Nov.* 15.—Bras.
unaensis, *Barb. Rodr. l. c.* 14.—Bras.

BACULARIA, F. Muell. (Palm.).
angustisecta, *Becc. in Martelli, Webbia*, 294.—N. Guin.

BADULA, Juss. (Myrsin.).
[Ardisia, Sw. I. K.]
Balfouriana, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 281 (= *Tinus Balfouriana*).—Ins. Rodrig.
Candolleana, *Mez, l. c.* 282.—Ins. Borbon.
Commersoniana, *Mez, l. c.* 280.—Ins. Maurit.
maculata, *Mez, l. c.* 281.—Ins. Borbon.
Richeana, *Mez, l. c.* 280.—Ins. Mascar.

BAECKEA, Linn. (Myrtac.).
decipiens, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 20.—Austral.
Elderiana, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 418.—Austral.
grandibracteata, *Pritz. l. c.* 417.—Austral.
grandis, *Pritz. l. c.*—Austral.
latens, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 41.—Austral.
pentagonantha, F. Muell. ex Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. 418 = Elderiana.
platycephala, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 419.—Austral.
staminosa, *Pritz. l. c.* 417.—Austral.

BAERIA, Fisch. & Mey. (Compos.).
aristosa, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 354.—Am. bor.

BAHIA, Lag. (Compos.).
glandulosa, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 116.—Mexic.

BAIKIAEA, Benth. (Legum.).
plurijuga, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 248.—Afr. trop.

BAILLONELLA, Pierre (Sapot.).
obovata, Pierre, ex Engl. Monogr. Afr. Pfl. viii. 62 = Mimusops Pierreana.

BAISSEA, A. DC. (Apocyn.).
axillaris, *Hua, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxxiv. 857 (= *Zygodia axillaris*).—Afr. trop.
calophylla, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 205 (= *Codonura calophylla*).—Afr. trop.
elliptica, *Stapf, l. c.* 215.—Afr. trop.
erythrosticta, *K. Schum. ex Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 206; *et in Engl. Jahrb.* xxxiii. 319.—Afr. trop.
ochrantha, *K. Schum. ex Stapf, l. c.* 206.—Afr. trop.
odorata, *K. Schum. ex Stapf, l. c.* 212.—Afr. trop.
zygodioides, *Stapf, l. c.* 210 (= *Oncinotis zygodioides*).—Afr. trop.

BAKERISIDEROXYLON, Engl. Monogr. Afr. Pfl. viii. 33 (1904). *SAPOTACEAE.*
densiflorum, *Engl. l. c.* 34 (= *Sideroxylon densiflorum*).—Afr. trop.
Passargei, *Engl. l. c.* 35.—Afr. trop.
revolutum, *Engl. l. c.* 34 (= *Sideroxylon revolutum*).—Afr. trop.

BALANOCARPUS, Bedd. (Dipteroc.).
bancanus, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* 111.—Arch. Mal.
Sibogae, *Boerl. l. c.* 112.—Arch. Mal.

BALANOPHORA, Forst. (Balanophor.).
dioica, Ito, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 196, t. 5, fig. 5–6 (non R. Br.) = japonica.
japonica, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. (1902) 212.—Japon.
Kuroiwai, *Mak. l. c.* 213, nomen.—Ins. Liukiu.
micrantha, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 169.—Ins. Philipp.

BALDUINA, Nutt. (Compos.).
[Baldwinia, Torr. & Gray. I. K.]
atropurpurea, *Harper in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 483.—Am. bor.

BALLOTA, Linn. (Labiat.).
glabriflora, *Brand, in Koch, Syn. Deutsch. Fl.* Ed. III. 2145.—Eur.
macedonica, *Vandas, in Magyar Bot. Lap.* iv. 112.—Turcia.

BAMBUSA, Schreb. (Gramin.).
Fauriei, Hack. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 529. —Formosa.
Glaziovii, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. liii. 194.—Bras.
maculosa, Hack. l. c. 196.—Bras.
Narihira, Mak. in Bot. Mag. Tokyo, xi. (1897) (159). —Japon.
oatakensis, Mak. Descr. Prod. Forest. Japon, (1900) 37, nomen.—Japon.
paniculata, Mak. l. c. nomen.—Japon.
papuana, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 58 (= *Arundinaria papuana*). —N. Guin.
purpurascens, Mak. Descr. Prod. Forest. Japon, (1900) 37, nomen.—Japon.
ramosa, Mak. l. c. nomen.—Japon.
spinosissima, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. liii. 197. —Bras.

BANARA, Aubl. (Samyd.).
Vanderbiltii, Urb. Symb. Antill. iii. 320.—Ind. occ.

BANISTERIA, Linn. (Malpigh.).
arborea, Boj. ex Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 459 = Acridocarpus excelsus.
peruviana, Niedenzu, in Ind. Lect. Lyc. Brunsb. 1901 (aest.) 15.—Peruv.
Rusbyana, Niedenzu, l. c. 19.—Boliv.

BAPHIA, Afzel. (Legum.).
acuminata, Wildem. Enum. Pl. Laurent. 104.—Afr. trop.
batangensis, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 166.— Afr. trop.
bipindensis, Harms, l. c. 165.—Afr. trop.
Busseana, Harms, l. c. 166.—Afr. trop.
Conraui, Harms, l. c. 167.—Afr. trop.
cordifolia, Harms. l. c.—Afr. trop.
cornifolia, Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 252.—Afr. trop.
eriocalyx, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 165.—Afr. trop.
Laurentii, Wildem. Enum. Pl. Laurent. 105.—Afr. trop.
Preussii, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 165.—Afr. trop.
Radcliffei, Baker f. in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 147. —Afr. trop.

BAPTISIA, Vent. (Legum.).
albescens, Small, Fl. S. E. U. S. 600.—Am. bor.
Bushii, Small, l. c. 600.—Am. bor.
elliptica, Small, l. c. 599.—Am. bor.
Gibbesii, Small, l. c.—Am. bor.
hirsuta, Small, l. c. 598.—Am. bor.
Nuttalliana, Small, l. c. 599.—Am. bor.

BARBACENIA, Vand. (Amaryll.).
Damaziana, Beauverd, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 1078.—Bras.
Wentzeliana, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. 277.— Afr. trop.

BARJONIA, Decne. (Asclep.).
laxa, Malme, in Arkiv Bot. Stockh. iv. no. 14, 8.—Bras.
platyphylla, K. Schum. in Urb. in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 31.—Bras.

BARKERWEBBIA, Becc. in Martelli, Webbia, 281 (1905). *PALMAE.*
elegans, Becc. l. c. 286.—N. Guin.

BARLERIA, Linn. (Acanth.).
affinis, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 50 (1901).—Afr. austr.
affinis, Wildem. in Ann. Mus. Congo, iv. 140 (1903).— Afr. trop.
bechuanensis, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 48.— Afr. austr.
buddleioides, S. Moore, in Journ. Bot. 1902, 307.— Afr. trop.
cephalophora, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxviii. 70.— Afr. trop.
cinereicaulis, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 53.— Afr. austr.
crossandriformis, C. B. Clarke, l. c. 51.—Afr. austr.
Dewevrei, K. Schum. in Just's Jahresb. xxvii. 1. 514 (sphalm.) = Barteria Dewevrei.
Eylesii, S. Moore, in Journ. Bot. 1905, 50.—Afr. trop.
Galpinii, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 54.—Afr. austr.
heterotricha, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxviii. 69.— Afr. trop.
Hulubei, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 47.—Afr. austr.

BARLERIA:—
jasminiflora, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 50.— Afr. austr.
laceratiflora, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxviii. 68.— Afr. trop.
lukafuensis, Wildem. in Ann. Mus. Congo, iv. 140.— Afr. trop.
media, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 51.—Afr. austr.
oxyphylla, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxviii. 69.—Afr. trop.
pretoriensis, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 54.— Afr. austr.
Rehmanni, C. B. Clarke, l. c. 53.—Afr. austr.
taitensis, S. Moore, in Journ. Bot. 1902, 343.—Afr. trop.
umbrosa, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxiii. 188.—Afr. trop.
Verdickii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, iv. (1903) 139.—Afr. trop.
Virgula, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 48.—Afr. austr.
Whytei, S. Moore, in Journ. Bot. 1903, 138.—Afr. trop.
Wilmsiana, Lindau, in Engl. Jahrb. xxx. 111 (Mart. 1901).—Afr. austr.
Wilmsii, Lindau, ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 54 (Jun. 1901) = praec.
Woodii, C. B. Clarke, in Dyer, l. c. 50.—Afr. austr.

BARNADESIA, Mutis (Compos.).
Jelskii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 511.—Peruv.
laurifolia, Hieron. l. c. xxviii. 651 = Turpinia laurifolia.

BARRINGTONIA, Forst. (Myrtac.).
fusiformis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 140.— Penins. Mal.
musiformis, King, l. c. 139.—Penins. Mal.
pauciflora, King, l. c. 137.—Penins. Mal.
Scortechinii, King, l. c. 138.—Penins. Mal.

BARROËTEA, A. Gray (Compos.).
sessilifolia, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 35.— Mexic.

BARTERIA, Hook. f. (Passifl.).
acuminata, Baker f. in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 155. —Afr. trop.

BARTONIA, Muhl. (Gentian.).
lanceolata, Small, Fl. S. E. U. S. 932.—Am. bor.

BARYXYLUM, Lour. (Legum.).
ferrugineum, F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 19 (= *Peltophorum ferrugineum*).— Siam.

BASELLA, [Rheede] Linn. (Chenopod.).
paniculata, Volkens, in Engl. Jahrb. xxxviii. 81.— Afr. trop.

BASSIA, All. (Chenopod.).
[Chenolea, Thunb. I. K.]
densiflora, Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. i. 31.—Austral.
hostilis, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 185.—Austral.
littoralis, Diels, l. c. 186.—Austral.
longifolia, Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. i. 32.—Austral.
recurvicuspis, Fitzg. l. c.—Austral.

BASSIA, Koenig (Sapot.).
[Illipe, Koenig. D. T. & H.]
crassipes, Pierre, ex Becc. Nelle Foreste di Borneo, 580.—Borneo.
Pierrei, F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 226.—Siam.

BASSOVIA, Aubl. (Solan.).
ciliata, J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad. xl. 694. —Venez.
hispida, K. Schum. in Just's Jahresb. xxvii. 1. 544 = Brachistus hispidus.
stellata, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xli. 246.— Mexic.
strigosa, K. Schum. in Just's Jahresb. xxvii. 1. 544 (sphalm.) = Brachistus strigosus.

BATHIAEA, Drake, Hist. Pl. Madag. i. (1902) 205. *LEGUMINOSAE.*
rubriflora, Drake, l. c.—Madag.

BATODENDRON, Nutt. = **Vaccinium**, Linn. (Vaccin.).
andrachneforme, Small, Fl. S. E. U. S. 893.—Am. bor.

BATRACHIUM, S. F. Gray = **Ranunculus**, Linn. (Ranunc.).
Bakeri, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 95.—Calif.
pedunculare, Greene, l. c.—Calif.

BAUHINIA, Linn. (Legum.).
Aherniana, Perkins, Frag. Fl. Philipp. 8.—Ins. Philipp.
anguliculis, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. Beibl. lxxii. 20.—Bras.
antipolana, Perkins, Frag. Fl. Philipp. 9.—Ins. Philipp.
campestris, Malme, in Arkiv Bot. Stockh. v. no. 5, (1905) 10.—Bras.
chapadensis, Malme, l. c. 13.—Bras.
chlorantha, T. S. Brandegee, in Zoe, v. (1905) 200.— Mexic.
concinna, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 41.—Madag.
crocea, Drake, Hist. Pl. Madag. i. 87.—Madag.
Ellenbeckii, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 158.— Afr. trop.
goyazensis, Harms, l. c. Beibl. lxxii. 21.—Bras.
Grevei, Drake, Hist. Pl. Madag. i. 87.—Madag.
Hagenbeckii, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. Beibl. lxxii. 21.—Bras.
Hassleriana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 690.—Parag.
Hawkesiana, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. xv. 897.—Austral.
hiemalis, Malme, in Arkiv Bot. Stockh. v. no. 5, (1905) 13.—Bras.
lamprophylla, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. Beibl. lxxii. 22.—Bras.
leptantha, Malme, in Arkiv Bot. Stockh. v. no. 5, (1905) 11.—Bras.
leptopus, Perkins, Frag. Fl. Philipp. 10.—Ins. Philipp.
Loeseneriana, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 158.— Afr. trop.
malacotricha, Harms, l. c. Beibl. lxxii. 22.—Bras.
Merrilliana, Perkins, Frag. Fl. Philipp. 10.—Ins. Philipp.
nymphaeifolia, Perkins, l. c. 11.—Ins. Philipp.
Perkinsae, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 21.—Ins. Philipp.
Pinchotiana, Perkins, Frag. Fl. Philipp. 12.—Ins. Philipp.
viscidula, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. Beibl. lxxii. 22.—Bras.
Warburgii, Perkins, Frag. Fl. Philipp. 12.—Ins. Philipp.

BAUMIA, Engl. & Gilg. in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 365 (1903). *SCROPHULARIACEAE.*
angolensis, Engl. & Gilg, l. c. 366.—Afr. trop.

BEADLEA, Small, Fl. S. E. U. S. 319 (1903). *ORCHIDACEAE.*
[Spiranthes, L. C. Rich. D. T. & H.]
Storeri, Small, Fl. S. E. U. S. 319 (= *Spiranthes Storeri*).—Am. bor.

BEAUFORTIA, R. Br. (Myrtac.).
bracteosa, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 431.—Austral.
cymbifolia, Diels, l. c.—Austral.
eriocephala, Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. ii. 23.—Austral.

BEAUMONTIA, Wall. (Apocyn.).
fragrans, Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn. (1894) 325, nomen.—Cochinch.

BEBBIA, Greene (Compos.).
aspera, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 272.— Am. bor.

BEFARIA, Mutis (Ericac.).
Imthurnii, N. E. Br. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. vi. 46.—Guiana.

BEGONIA, Tourn. (Begon.).
Andreana, Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. xxii. 433.—N. Granat.
Balansae, C. DC. in Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 403.—Parag.
Bowringiana, Hort. Sand. in Gard. Chron. 1903, i. 245.—China.
Buchholzii, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 95.—Afr. trop.
capillipes, Gilg, l. c. 96.—Afr. trop.
colorata, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 51.— Ins. Philipp.
Conrauí, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 87.—Afr. trop.
contracta, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 54.— Ins. Philipp.

BEGONIA:—
crispa, Krel. in Wien. Ill. Gart. Zeit. 1904, 146.—Hab.?
cristata, Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. lxiii. 90.—Celebes.
debilis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 60.—Penins. Mal.
Dielsiana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 91.—Afr. trop.
Engleri, Gilg, l. c. 97.—Afr. trop.
Favargeri, Reching. ex Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien, xx. (1905) 33.—Afr. austr.
Forbesii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 58.—Malaya.
gemella, Warb. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. lxiii. 91.—Celebes.
Gilsoni, Hort. in Gartenfl. lii. 430.—Hab.?
Herveyana, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 63.—Penins. Mal.
Huberi, C. DC. ex Huber, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 315.—Bras.
isopteroidea, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 59.—Penins. Mal.
Jagori, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 54.—Ins. Philipp.
Kummeriae, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 87.—Afr. trop.
Kunstleriana, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 63.—Penins. Mal.
Koordersii, Warb. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. lxiii. 91.—Celebes.
Labordei, Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe, 1904, repr. 8.—China.
leucosticta, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 55.—Ins. Philipp.
loloensis, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 94.—Afr. trop.
longicyma, Bellair, in Rev. Hortic. 1905, 581.—Hybr.
longipetiolata, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 92.—Afr. trop.
longiscapa, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 52.—Ins. Philipp.
Lowiana, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 67.—Penins. Mal.
luzonensis, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 52.—Ins. Philipp.
macropoda, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 90.—Afr. trop.
macrura, Gilg, l. c. 92.—Afr. trop.
Martini, Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe, 1904, repr. 8.—China.
Maxwelliana, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 66.—Penins. Mal.
megapteroidea, King, l. c. 65.—Penins. Mal.
Merrillii, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 53.—Ins. Philipp.
mindanaensis, Warb. l. c. 55.—Ins. Philipp.
monantha, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 322.—N. Guin.
montis-Bismarckii, Warb. l. c.—N. Guin.
multidentata, Warb. l. c.—N. Guin.
paupercula, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 64.—Penins. Mal.
perakensis, King, l. c.—Penins. Mal.
peristegia, Stapf, in Kew Bull. 1901, 140.—Bras.
petrophila, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 86.—Afr. trop.
pilderifolia, C. DC. ex Huber, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 315.—Bras.
potamophila, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 89.—Afr. trop.
praeclara, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 66.—Penins. Mal.
Princeae, Gilg, in Engl. Jahrb. xxx. 361.—Afr. trop.
pseudimpatiens, Gilg, l. c. xxxiv. 93.—Afr. trop.
pseudo-lateralis, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 61.—Ins. Philipp.
pseudoviola, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 88.—Afr. trop.
rubro-marginata, Gilg, l. c. 95.—Afr. trop.
Schlechteri, Gilg, l. c. 93.—Afr. trop.
Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 62.—Penins. Mal.
Simii, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 104.—Afr. trop.
Staudtii, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 90.—Afr. trop.
Strachwitzii, Warb. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. lxiii. 90.—Celebes.
subcucullata, C. DC. in Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 404.—Parag.
thaspingensis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 61.—Penins. Mal.
togoensis, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 88.—Afr. trop.

BEGONIA:—
torricellensis, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 321.—N. Guin.
trichochila, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 53.—Ins. Philipp.
unialata, C. DC. ex Huber, in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. i. 316.—Bras.
unifolia, Trelease, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1904, 80.—Mexic.
venusta, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 65.—Penins. Mal.
Verdickii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, iv. (1903) 93.—Afr. trop.
Warburgii, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 94.—Afr. trop.
Whytei, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 103.—Afr. trop.

BEILSCHMIEDIA, Nees (Laurac.).
glomerata, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 15.—Ins. Philipp.
obscura, Engl. ex Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 112 = Afrodaphne obscura.
praecox, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. lxviii. 195.—Java.
sessilifolia, Engl. ex Stapf. in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 112 = Afrodaphne sessilifolia.
ugandensis, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 203.—Afr. trop.

BELANGERA, Cambess. (Saxifr.).
Chaberti, Pampan. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, vii-viii. 328.—Bras.
paraguaiensis, Pampan. in Ann. di Bot. Roma, ii. 53.—Parag.

BELLEVALIA, Montrouz. ex Beauvis. Gen. Montrouz. 80 = **Agation**, Brongn. (Violac.).
artensis, Montrouz. l. c. = A. Pancheri.
serrulata. Montrouz. l. c. 81 = Ionidium ilicifolium.
undulata, Montrouz. l. c. 80 = A. Pancheri.

BELLIOLUM, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xiv. (1900) 330 = **Drimys**, Forst. (Magnol.).
crassifolium, Van Tiegh. l. c. = D. crassifolia.
Pancheri, Van Tiegh. l. c. = D. Pancheri.
rivulare, Van Tiegh. l. c. 331 = D. rivularis.
Vieillardi, Van Tiegh. l. c. = D. Vieillardi.

BELLIUM, Linn. (Compos.).
Sommieri, Parl. in Lojac. Fl. Sic. ii. t. 57.—Sicil.

BELLUCIA, Neck. (Melast.).
acutata, Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 181.—Reg. Amaz.
aequiloba, Pilg. l. c. 182.—Reg. Amaz.

BELMONTIA, E. Mey. (Gentian.).
Baumiana, Gilg. in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 331.—Afr. trop.
chionantha, Gilg, l. c. 332.—Afr. trop.

BELOPERONE, Nees (Acanth.).
adenothyrsa, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 416.—Mexic.
albomarginata, Lindau, l. c. v. 373.—Parag.
chapadensis, S. Moore, in Journ. Bot. 1904, 34.—Bras.
corumbensis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 373.—Bras.
monopleurantha, Lindau, l. c. iv. 415.—Peruv.
Purpusi, T. S. Brandegee, in Zoe, v. (1903) 172.—Calif.
pyrrhostachya, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 417.—Peruv.
thunbergioides, Lindau, l. c. v. 372.—Bras.

BELUTTAKAKA, Adans. = **Chonemorpha**, G. Don (Apocyn.).
Grandieriana, Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn. (1894) 296 = C. Grandieriana.
Harmandiana, Pierre, l. c. = C. Harmandiana.

BENTHAMIELLA, Speg. (Solan.).
azorelloides, Speg. Nov. Add. Fl. Patag. ii. (1902), repr. 53.—Patag.

BERARDIA, Vill. (Compos.).
lanuginosa. Fiori & Paol. Fl. Ital. iii. 316; Ic. Fl. Ital. 440 (= Arctium lanuginosum).—Ital.

BERBERIS, Tourn. (Berber.).
afghanica, Schneider, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 455.—Afghan.
antucoana, Schneider, l. c. 144.—Chili.

BERBERIS:—
australis, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, vii-viii. (1904) 146.—Reg. Medit.
Barbeyana, Schneider, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 816.—Peruv.
Beauverdiana, Schneider, l. c. 817.—Peruv.
Bergeriana, Schneider, l. c. 805.—N. Granat.
Boissieri, Schneider, l. c. 660.—Ins. Balear.
bumeliaefolia, Schneider, l. c. 818.—Bolivia.
Caroli, Schneider, l. c. 459.—China.
ceylanica, Schneider, l. c. 458.—Ind. or.; Zeylan.
chimboensis, Schneider, l. c. 811, nomen.—Hab.?
Dielsiana, Fedde, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 41.—China.
dolichobotrys, Fedde, l. c. 41.—China.
dubia, Schneider, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 663.—China.
elegans, Léveillé, in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 289 (1904).—China.
elegans, Schneider, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 463 (1905).—China.
Engleriana, Schneider, l. c. 807.—Ecuador.
Feddeana, Schneider, l. c. 665.—China.
Forskaliana, Schneider, l. c. 456.—Arabia.
ganpinensis, Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe, 1904, repr. 2.—China.
garhwalensis, Schneider, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 454.—Reg. Himal.
Gilgiana, Fedde, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 43.—China.
Griffithiana, Schneider, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 403.—Reg. Himal.
Henryana, Schneider, l. c. 664.—China.
Hieronymi, Schneider, l. c. 394.—Reg. Argent.
Huegeliana, Schneider, l. c. 451.—Reg. Himal.
ignorata, Schneider, l. c. 661.—Reg. Himal.
Itatiaiae, Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. III. 17, nomen.—Bras.
Jaeschkeana, Schneider, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 399.—Reg. Himal.
japonica, Schneider, l. c. 667.—Japon.
Jelskiana, Schneider, l. c. 808.—Peruv.
Keissleriana, Schneider, l. c. 808.—Bolivia.
Koehneana, Schneider, l. c. 814.—Ind. or.
kumaonensis, Schneider, l. c. 397.—Ind. or.
Lechleriana, Schneider, l. c. 806.—Ecuador!
montevidensis, Schneider, l. c. 148.—Urug.
oblonga, Schneider, l. c. 458.—Turkestan.
orientalis, Schneider, l. c. 666.—Reg. Cauc.; Persia.
Petitiana, Schneider, l. c. 465.—Afr. trop.
Rechingeri, Schneider, l. c. 808.—Bolivia.
Rehderiana, Schneider, l. c. 659.—Japon!
Reicheana, Schneider, l. c. 806.—Ecuador.
salicaria, Fedde, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 42.—China.
Schwerini, Schneider, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 818.—Ecuador.
Sellowiana, Schneider, l. c. 601.—Am. austr.
Souliena, Schneider, l. c. 449.—China.
sphalera, Fedde, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 44.—China.
Thomsoniana, Schneider, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 464.—Reg. Himal.
triacanthophora, Fedde, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 48.—China.
variiflora, Schneider, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 147.—Chili.
Verschaffelti, Schneider, l. c. 821.—Hab.?
Wawrana, Schneider, l. c. 140.—Chili.
Wettsteiniana, Schneider, l. c. 809.—Bolivia.
Wightiana, Schneider, l. c. 452.—Ind. or.
Zabeliana, Schneider, l. c. 667.—Reg. Himal.
Zahlbruckneriana, Schneider, l. c. 145.—Chili.

BERGERETIA, Bub. Fl. Pyren. iii. (1901) 10 = **Illecebrum**, Linn. (Caryophyll.).
uliginosa, Bub. l. c. = I. verticillatum.

BERGIA, Linn. (Elatin.).
erythroleuca, Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 308.—Afr. trop.
pallidirosea, Gilg, l. c. 308.—Afr. trop.
Pentheriana, Keissl. in Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien, xv. 58.—Afr. austr.

BERKHEYA, Ehrh. (Compos.).
bilabiata, N. E. Br. in Kew Bull. 1901, 126.—Afr. austr.
nivea, N. E. Br. l. c.—Afr. austr.
spinulosa, N. E. Br. l. c. 127.—Afr. austr.

BERLANDIERA, DC. (Compos.).
betonicaefolia, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1246 (=*Silphium betonicifolium*).—Am. bor.
dealbata, *Small, l. c.*—Am. bor.
humilis, *Small, l. c.*—Am. bor.

BERLINIA, Soland. (Legum.).
Baumii, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 249.—Afr. trop.
bifoliolata, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 83.—Afr. trop.
micrantha, *Harms, l. c.* xxxiii. 156.—Afr. trop.
Scheffleri, *Harms, l. c.* xxx. 83, descr.—Afr. trop.
tomentosa, *Harms, l. c.* 321.—Afr. trop.

BERMUDIANA, Tourn. = **Sisyrinchium**, Linn. (Irid.).
bella, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 308 = S. angustifolium.
californica, Greene, l. c. = S. californicum.

BERNARDIA, Houst. (Euphorb.).
apaensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 504.—Parag.
guaraoitica, *Chod. & Hassl. l. c.* 505.—Parag.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 397.—Parag.
leptostachys, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 506.—Parag.
paraguariensis, *Chod. & Hassl. l. c.* 503.—Parag.
polymorpha, *Chod. & Hassl. l. c.* 505.—Parag.
simplex, *Chod. & Hassl. l. c.*—Parag.

BERNARDINA, Baudo, in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. II. xx. 348 (1843) = **Lysimachia**, Linn. (Primul.).
capensis, Baudo, l. c. 349 = L. nutans.
clethroides, Baudo, l. c. = L. clethroides.
elegans, Baudo, l. c.; et ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 294 = L. Leschenaultii.
eucalyx, Baudo, l. c. = L. glaucophylla.
lanrina, Baudo, l. c.—Hab. ?
lobelina, Baudo, l. c.; et ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 296 = L. lobelioides.
mauritiensis, Baudo, l. c. = L. mauritiana.
orientalis, Baudo, l. c. = L. orientalis.
parviflora, Baudo, l. c. = L. decurrens.
pentapetala, Baudo, l. c. = L. pentapetala.
pubescens, Baudo, l. c. = L. barystachys.
pumila, Baudo, l. c. = L. pumila.
salicifolia, Baudo, l. c. 348 = L. salicifolia.
sessilis, Baudo, l. c. 349 = L. atropurpurea, *Linn.*
stenia, Baudo, l. c. = L. lineariloba.
tenuis, Baudo, l. c. = L. pyramidalis.

BERSAMA, Fresen. (Sapind.).
ierostegia, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 92.—Afr. trop.

BERTEROA, DC. (Crucif.).
[ALYSSUM, Tourn. I. K.]
Gintlii, *Rohl. in Magyar Bot. Lap.* iii. (1904) 232; *et in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1904, no. 38, 24.—Montenegr.

BERTIERA, Aubl. (Rubiac.).
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 113.—Afr. trop.
laxissima, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 348.—Afr. trop.

BERTYA, Planch. (Euphorb.).
Andrewsii, *Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 31.—Austral.
Brownii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 147.—Austral.

BERZELIA, Brongn. (Bruniac.).
Dregeana, *Colozza, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* x. 296.—Afr. austr.
squarrosa, *Colozza, in Ann. di Bot. Roma*, ii. (1905) 40 (=*Brunia squarrosa*).—Afr. austr.

BESCHORNERIA, Kunth (Amaryll.).
Wrightii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7779.—Mexic. ?

BESLERIA, Plum. (Gesner.).
coriacea, *Urb. Symb. Antill.* ii. 351.—Ind. occ.
elongata, *Urb. l. c.* 353.—Ind. occ.
filipes, *Urb. l. c.* 350.—Ind. occ.
lanceolata, *Urb. l. c.* 351.—Ind. occ.
petiolaris, *Urb. l. c.* 352 (=*Collandra petiolaris*).—Ind. occ.
Sieberiana, *Urb. l. c.* 349.—Ind. occ.
strigillosa, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

BESSEYA, Rydberg, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 279. *SCROPHULARIACEAE.*
[SYNTHYRIS, Benth. I. K.]
alpina, *Rydberg, l. c.* 280 (=*Synthyris alpina*).—Am. bor.
Bullii, *Rydberg, l. c.* (=*Gymnandra Bullii*).—Am. bor.
gymnocarpa, *Rydberg, l. c.* (=*Wulfenia gymnocarpa*).—Am. bor.
plantaginea, *Rydberg, l. c.* (=*S. plantaginea*).—Am. bor.
reflexa, *Rydberg, l. c.* (=*S. reflexa*).—Am. bor.
Ritteriana, *Rydberg, l. c.* (=*S. Ritteriana*).—Am. bor.
rubra, *Rydberg, l. c.* (=*S. rubra*).—Am. bor.
wyomingensis, *Rydberg, l. c.* (=*W. wyomingensis*).—Am. bor.

BETULA, Tourn. (Cupulif.).
alaskana, *Sarg. in Coult. Bot. Gaz.* 1901, 236.—Am. bor.
alleghaniensis, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 166.—Am. bor.
Baeumkeri, *H. Winkl. in Engl. Pflanzenreich, Betul.* 91.—China.
Borggreveana, *Zabel, ex H. Winkl. in Engl. Pflanzenreich, Betul.* 94.—Hybr.
grandifolia, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* ii. 98.—Sibir.
Hallii, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 614.—Am. bor.
luminifera, *H. Winkl. in Engl. Pflanzenreich, Betul.* 91.—China.
Piperi, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 165.—Am. bor.
Plettkei, *Junge, in Verh. Nat. Ver. Hamb.* xiii. (1905) 89.—Hybr.
resinifera, *Britton, in Britton & Rydb. in Bull. N. Y. Bot. Gard.* ii. vi. 165.—Am. bor.
Rosae, *H. Winkl. in Engl. Pflanzenreich, Betul.* 135.—China.
Sandbergi, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 166.—Am. bor.
utahensis, *Britton, l. c.* 165.—Am. bor.
Vulcani, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 423.—Japon.
Zimpelii, *Junge, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1904, 153; *et ex H. Winkl. in Engl. Pflanzenreich, Betul.* 94.—Hybr.

BIAURICULA, Bub. Fl. Pyren. iii. (1901) 217 = **Iberis**, Linn. (Crucif.).
amara, Bub. Fl. Pyren. iii. 225 = I. amara.
Benthamiana, Bub. l. c. 220 = I. Benthamiana.
ciliata, Bub. l. c. 222 = I. ciliata.
Devillei, Bub. l. c. 217 = I. Bubanii.
Dunalii, Bub. l. c. 221.—Eur.
linifolia, Bub. l. c. 223 = I. linifolia.
panduraeformis, Bub. l. c. 224 = I. panduraeformis.
pinnatifida, Bub. l. c. 223 = I. pinnatifida.
resedaefolia, Bub. l. c. = I. resedaefolia.
saxatilis, Bub. l. c. 226 = I. saxatilis.
sempervirens, Bub. l. c. 225 = I. sempervirens.
spathulata, Bub. l. c. 217 = I. spathulata.

BICUCULLA, Borckh. = **Adlumia**, Rafin. (Papav.).
occidentalis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 160.—Am. bor.

BICUSPIDARIA, Rydberg, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 275. *LOASACEAE.*
[MENTZELIA, Linn. D. T. & H.]
hirsutissima, *Rydberg, l. c.* 275 (=*Mentzelia hirsutissima*).—Calif.
involucrata, *Rydberg, l. c.* (=*M. involucrata*).—Calif.
tricuspis, *Rydberg, l. c.* (=*M. tricuspis*).—Calif.

BIDENS, Tourn. (Compos.).
acuta, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1001.—Am. bor.
amplissima, *Greene, in Pittonia*, iv. 268.—Am. bor.
bicolor, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 114.—Mexic.
ciliolata, *Greene, in Pittonia*, iv. 256.—Am. bor.
cognata, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 149.—Am. bor.
Cusickii, *Greene, in Pittonia*, iv. 259.—Am. bor.
Eatoni, *Fernald, in Rhodora*, v. (1903) 92.—Am. bor.
elegans, *Greene, in Pittonia*, iv. 254.—Am. bor.
elliptica, *Gleason, in Ohio Naturalist*, v. 317.—Am. bor.
expansa, *Greene, in Pittonia*, iv. 266.—Am. bor.
flabellata, *O. Hoffm. in Warb. Kunene Sambesi Exped.* 419.—Afr. trop.
formosa, *Greene, in Pittonia*, iv. 264.—Am. bor.
glaucescens, *Greene, l. c.* 258.—Am. bor.

BIDENS:—
gracilenta, *Greene, in Pittonia*, iv. 255.—Am. bor.
hyperborea, *Greene, l. c.* 257.—Am. bor.
Kelloggii, *Greene, l. c.* 267.—Am. bor.
leptomeria, *Greene, l. c.* 264.—Am. bor.
leptopoda, *Greene, l. c.* 260.—Am. bor.
lonchophylla, *Greene, l. c.* 258.—Am. bor.
lugens, *Greene, l. c.* 254.—Am. bor.
Macounii, *Greene, l. c.* 259.—Am. bor.
marginata, *Greene, l. c.* 262.—Am. bor.
oligantha, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 224 (1905).—Mexic.
Parryi, *Greene, in Pittonia*, iv. 265.—Am. bor.
persicaefolia, *Greene, l. c.* 266.—Am. bor.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 263.—Mexic.
prionophylla, *Greene, Pittonia*, iv. 256.—Am. bor.
riparia, *Greene, l. c.* 261.—Am. bor.
robustior, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 349.—Afr. trop.
sarmentosa, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 264.—Mexic.
speciosa, *Parish, in Zoe*, v. 75 (1900).—Calif.
urceolata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 167.—Afr. trop.
ukambensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 350.—Afr. trop.

BIFRENARIA, Lindl. (Orchid.).
Wendlandiana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 489 (=*Stenocoryne Wendlandiana*).—Bras.

BIGAMEA, Koen. = **Ancistrocladus**, Wall. (Dipterocarp.).
hamata, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1903, 155 (=*A. hamatus*).—Zeylan.
Thwaitesi, Van Tiegh. l. c. (=*A. Thwaitesii*).—Zeylan.

BIGELOWIA, DC. (Compos.).
Lehmannii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 582.—Ecuador.
Nelsonii, *Fern. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 505.—Mexic.

BIGNONIA, Tourn. (Bignon.).
acuminata, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 696.—Venez.
californica, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 170 (1903).—Calif.

BIHAI, Adans. = **Heliconia**, Linn. (Musac.).
aurantiaca, Bihai, borinquena, Burchellii, Champneiana, choconiana, Collinsiana, crassa, distans, elongata, episcopalis, humilis, latispatha, librata, lingulata, platystachys, purpurea, rostrata, rutila, spissa, tortuosa, Griggs, in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 445 = homonyma omnia Heliconiae.
longa, Griggs, l. c. 446.—Am. cent.
reticulata, Griggs, l. c.—Am. cent.

BIKKIA, Reinw. (Rubiac.).
fritillarioides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 19 (=*Grisia fritillarioides*).—N. Caled.

BILDERDYKIA, Dum. = **Polygonum**, Tourn. (Polygon.).
cilinodis, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 23 (=*Polygonum cilinode*).—Am. bor.
cristata, Greene, l. c. (=*Polygonum cristatum*).—Am. bor.
pterocarpa, Greene, l. c. (=*Polygonum pterocarpum*).—Ind. or.
scandens, Greene, l. c. (=*Polygonum scandens*).—Am. bor.

BI-LEVEILLEA, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xiii. (1904) 326. *COMPOSITAE.*
LEVEILLEA, Vaniot, non Decne.
[BLUMEA, DC. D. T. & H.]

BILLARDIERA, Sm. (Pittospor.).
gracilis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 213.—Austral.

BILLBERGIA, Thunb. (Bromel.).
boliviensis, *Baker, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 696.—Bolivia.
Forgetiana, *Hort. Sand. in Gard. Chron.* 1903, i. 266, t. 102.—Hab. ?
magnifica, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 133.—Parag.
Meyeri, *Mez, in Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 148.—Bras.
oxysepala, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 621.—Bras.

BILTIA, Small, Fl. S. E. U. S. 884 (1903). *ERICACEAE.*
[Rhododendron, Linn. D. T. & H.]
Vaseyi, *Small, l. c.* (= *Rhododendron Vaseyi*).—Am. bor.

BINOTIA, Rolfe, in Orchid Rev. (1905) 296. *ORCHIDEAE.*
brasiliensis, *Rolfe, l. c.*—Bras.

BIONDIA, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. (1905) 91. *ASCLEPIADACEAE.*
chinensis, *Schlechter, l. c.*—China.

BIPINNULA, Comm. (Orchid.).
Philipporum, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* ii. 21.—Chili.
Volkmanni, *Kraenzl. l. c.* 22.—Chili.

BIRAMELLA, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvii. (1903) 98 = **Ochna**, Linn. (Ochnac.).
Holstii, Van Tiegh. l. c. 97; Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 159; et in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xviii. 40 = Ochna Holstii.

BISCUTELLA, Linn. (Crucif.).
corsica, *Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* i. 132.—Corsica.
montenegrina, *Rohl. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 17, 17.—Montenegr.
Rotgesii, *Fouc. in Bull. Soc. Bot. Roch.* xxii. 28, fide *Index Univ. Bot.* 1204.—Eur.
turolensis, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 282, nomen.—Hispan.

BISETARIA, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 35 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
febrifuga, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xviii. 14 = Ouratea febrifuga.
Lecomtei, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 45 = Ouratea Lecomtei.

BISGOEPPERTIA, O. Kuntze (Gentian.).
[Goeppertia, Griseb. 1. K.]
Prenleloupii, *Urb. Symb. Antill.* iii. 331.—Ind. occ.

BISTORTA, Tourn. = **Polygonum**, Linn. (Polygon.).
affinis, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 21 = P. affine.
amplexicaulis, Greene, l. c. = P. amplexicaule.
bernardina, Greene, l. c. 18 = P. bernardinum.
bulbifera, Greene, l. c. 21 = P. bulbiferum.
calophylla, Greene, l. c. 19.—Am. bor.
cephalophora, Greene, l. c. 18 = P. cephalophorum.
confusa, Greene, l. c. 21 = P. confusum.
glastifolia, Greene, l. c. 18 = P. glastifolium.
jejuna, Greene, l. c. = P. jejunum.
leptophylla, Greene, l. c. 20.—Calif.
lilacina, Greene, l. c. 18.—Am. bor.
linearifolia, Greene, l. c. = P. linearifolium.
littoralis, Greene, l. c. 19.—Am. bor.
Macounii, Greene, l. c. 18 = P. Macounii.
ophioglossa, Greene, l. c. 19.—Am. bor.
oxyphylla, Greene, l. c. 21 = P. oxyphyllum.
perpusilla, Greene, l. c. = P. perpusillum.
plumosa, Greene, l. c. 18 = P. plumosum.
scaberula, Greene, l. c. 77.—Calif.
scopulina, Greene, l. c. 20.—Am. bor.
speciosa, Greene, l. c. 21 = P. speciosum.
sphaerostachya, Greene, l. c. = P. sphaerostachyum.
stenophylla, Greene, l. c. = P. stenophyllum.
vacciniifolia, Greene, l. c. = P. vacciniifolium.
vulcanica, Greene, l. c. 18 = P. vulcanicum.

BLAERIA, Linn. (Ericac.).
affinis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 325.—Afr. austr.
grandis, *N. E. Br. l. c.* 320.—Afr. austr.
kingaensis, *Engl. Jahrb.* xxx. 370.—Afr. trop.
subverticillata, *Engl. l. c.* 371.—Afr. trop.

BLAINVILLEA, Cass. (Compos.).
latifolia, *DC. in Wight, Contrib. Ind. Or.* 17 = rhomboidea.

BLAKEA, P. Br. (Melast.).
monticola, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 693.—Venez.
tuberculata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 111.—Am. cent.

BLANDOWIA, Willd. = **Apinagia**, Tul. (Podost.).
myriophylla, Nash, in N. Am. Fl. xxii. 5 (= *Neolacis myriophylla*).—Am. cent.

BLASTEMANTHUS, Planch. (Ochnac.).
paniculatus, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xix. 68.—Guiana.
Sprucei, *Van Tiegh. l. c.*—Bras.

BLASTOCAULON, Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul. 223 (1903). *ERIOCAULACEAE.*
albidum, *Ruhl. l. c.* 225 (= *Paepalanthus albidus*).—Bras.
prostratum, *Ruhl. l. c.* 224 (= *Paepalanthus prostratus*).—Bras.
rupestre, *Ruhl. l. c.* 223 (= *Paepalanthus rupestris*).—Bras.

BLEPHARIGLOTTIS, Rafin. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).
Blephariglottis, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 296 (= *Habenaria Blephariglottis*).—Am. bor.
Chapmanii, Small, Fl. S. E. U. S. 314.—Am. bor.
ciliaris, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 298 (= *Habenaria ciliaris*).—Am. bor.
conspicua, Small, Fl. S. E. U. S. 313 (= *Habenaria conspicua*).—Am. bor.
grandiflora, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 298 (= *Habenaria grandiflora*).—Am. bor.
lacera, Rydb. l. c. (= *Habenaria lacera*).—Am. bor.
leucophaea, Rydb. l. c. (= *Habenaria leucophaea*).—Am. bor.
peramoena, Rydb. l. c. 297 (= *Habenaria peramoena*).—Am. bor.
psycodes, Rydb. l. c. 298 (= *Habenaria psycodes*).—Am. bor.

BLEPHARIS, Juss. (Acanth.).
carduacea, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 410.—Afr. trop.
cristata, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 194.—Afr. trop.
dilatata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 31.—Afr. austr.
Ecklonii, *C. B. Clarke, l. c.* 27.—Afr. austr.
extenuata, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 301.—Afr. trop.
inaequalis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 33.—Afr. austr.
inermis, *C. B. Clarke, l. c.* 28.—Afr. austr.
innocua, *C. B. Clarke, l. c.* 25.—Afr. austr.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 146.—Afr. trop.
longispica, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 30.—Afr. austr.
marginata, *C. B. Clarke, l. c.* 29 (= *Acanthodium marginatum*).—Afr. austr.
mitrata, *C. B. Clarke, l. c.* 27 (= *Blepharacanthus furcatus*).—Afr. austr.
Scullyi, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 301.—Afr. trop.
sinuata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 33 (= *Acanthodium sinuatum*).—Afr. austr.
Stainbankiae, *C. B. Clarke, l. c.* 26.—Afr. austr.
subvolubilis, *C. B. Clarke, l. c.* 31.—Afr. austr.
uniflora, *C. B. Clarke, l. c.* 27.—Afr. austr.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 147.—Afr. trop.
villosa, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 29.—Afr. austr.

BLEPHARISPERMUM, Wight (Compos.).
minus, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 340.—Afr. trop.
pubescens, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 168.—Afr. trop.

BLEPHARIZONIA, Greene, Man. Bot. San Francisco Bay, 198. *COMPOSITAE.*
laxa, *Greene, l. c.*—Calif.
plumosa, *Greene, l. c.*—Calif.

BLEPHARODON, Decne. (Asclep.).
angustifolius, *Malme, in Bih. Svenska Vet. Akad. Handl.* xxvii. no. 8, 32.—Parag.

BLETIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).
Rodriguesii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 351.—Bras.

BLITUM, Tourn. = **Chenopodium**, Linn. (Chenopod.).
hastatum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 278.—Am. bor.

BLUMEA, DC. (Compos.).
Bodinieri, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 23.—China.
Duclouxii, *Vaniot, l. c.* 25.—China.
globata, *Vaniot, l. c.* 24.—China.
gracilis, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 502.—China.
Henryi, *Dunn, l. c.* 503.—China.
hongkongensis, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 22.—China.
lanuginosa, Law, ex Cooke, Fl. Bombay, ii. 23 = Malcolmii.
Martiniana, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 26.—China.
subracemosa, *C. B. Clarke, in Bot. Tidsskr.* xxiv. 245 (= *Conyza subracemosa*).—Java.

BLUMENBACHIA, Schrad. (Loasac.).
acaulis, *R. Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. 17.—Chili.
mitis, *R. Phil. l. c.*—Chili.
nemorosa, *R. Phil. l. c.* 18.—Chili.

BLYXA, Noronha (Hydrocharid.).
caulescens, *Maxim. in Bot. Mag. Tokyo*, iv. no. 39; *et ex Matsum. Ind. Pl. Jap.* ii. 31.—Japon.
leiocarpa, *Maxim. l. c.* no. 30; *et ex Matsum. l. c.* 32.—Japon.

BOBARTIA, Linn. (Irid.).
gracilis, *Baker, in Kew Bull.* 1901, 134.—Afr. austr.

BOCAGEA, St. Hil. (Anonac.).
mattogrossensis, *R. Fries, in Arkiv Bot. Stockh.* iv. no. 19, 12.—Bras.

BODINIERIA, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. 1902, 48. *RANUNCULACEAE.*
thalictrifolia, *Léveillé & Vaniot, l. c.*—China.

BOEA, Comm. (Gesner.).
bians, *Burkill, in Kew Bull.* 1901, 142.—N. Guin.

BOEBERA, Willd. = **Dysodia**, Cav. (Compos.).
papposa, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 1012 = D. papposa.

BOEHMERIA, Jacq. (Urtic.).
austrina, *Small, Fl. S. E. U. S.* 359.—Am. bor.
decurrens, *Small, l. c.* 358.—Am. bor.
scabra, *Small, l. c.*—Am. bor.
tenuistachys, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 312.—Bolivia.

BOEHMERIOPSIS, Kom. in Act. Hort. Petrop. xviii. 441 (1901). *URTICACEAE.*
pallida, *Kom. l. c.*—As. or.

BOERHAAVIA, Vaill. (Nyctag.).
Heimerlii, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 435.—Socotra.
Simonyi, *Heimerl & Vierh. ex Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 435.—Socotra.

BOERLAGIODENDRON, Harms (Aral.).
monticola, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 330.—N. Guin.

BOGORIA, J. J. Sm. Orchid. Java, 566 (1905). *ORCHIDACEAE.*
Raciborskii, *J. J. Sm. l. c.*—Java.

BOISDUVALIA, Spach (Onagrac.).
[Oenothera, Linn. 1. K.]
campestris, *Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 330.—Am. bor.
imbricata, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 42.—Calif.
macrantha, *A. A. Heller, l. c.* ii. 101.—Calif.
sparsiflora, *A. A. Heller, l. c.* i. 42.—Calif.

BOLBOSCHOENUS, Palla, in Koch, Syn. Deutsch. Fl. ed. iii. 2531 (1904). *CYPERACEAE.*
maritimus, *Palla, l. c.* 2532 (= *Scirpus maritimus*).—Cosmop.

BOLTONIA, L'Hérit. (Compos.).
occidentalis, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 305.—Am. bor.

BOLUSIA, Benth. (Legum.).
amboensis, *Harms. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 260 (= *Phaseolus amboensis*).—Afr. trop.

BOMAREA, Mirb. (Amaryll.).
boliviensis, *Baker, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 700.—Bolivia.

BOMBAX, Linn. (Bombac.).
chastifolium, *K. Schum. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 61, nomen.—Bras.
Kimuenzae, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 740.—Afr. trop.
lukayense, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 741.—Afr. trop.
Martianum, *K. Schum. ex Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 73 (= *Carolinea tomentosa*).—Parag.
pumilum, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 172.—Bras.
tenebrosum, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 486.—China.
Valetonii, *Hochr. in Bull. Inst. Buitenz.* xix. 15, 23; *Pl. Bogor. Exsicc.* 7.—Java.

BOMBYCIDENDRON, Zoll. & Mor. = **Hibiscus**, Linn. (Malvac.).
glabrescens, Warb. ex Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 110.—Ins. Philipp.
parvifolium, Warb. l. c.—Ins. Philipp.

BONAMIA, Thou. (Convolv.).
spinosa, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 287.—Socotra.

BONANIA, A. Rich. (Euphorb.).
microphylla, *Urb. Symb. Antill.* iii. 311.—Ind. occ.

BONANNIA, Guss. (Umbell.).
graeca, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 641 (= *S. graecum*).—Graecia.

BONATEA, Willd. (Orchid.).
[HABENARIA, Willd. I. K.]
antennifera, *Rolfe, in Gard. Chron.* 1905, ii. 450.—Afr. trop.
Pirottae, *Cortesi, in Ann. di Bot. Roma*, ii. 362.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 24.—Afr. trop.

BONNIERELLA, Viguier, in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. (1905) 514. *ARALIACEAE.*
tahitense, *Viguier, l. c.* (= *Panax tahitensis*).—Ins. Societ.

BONYUNIA, Schomb. (Logan.).
minor, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 49.—Guian.

BOOPIS, Juss. (Calycer.).
Ameghinoi, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 69.—Patag.
chubutensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 300.—Patag.
filifolia, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 70.—Patag.
leptophylla, *Speg. l. c.* 71.—Patag.
patagonica, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 301.—Patag.
Prichardi, *S. Moore, in Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 372.—Patag.

BOOTTIA, Wall. (Hydrocharid.).
Aschersoniana, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 173.—Afr. trop.
brachyphylla, *Guerke, in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 539.—Afr. trop.
kunenensis, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 172.—Afr. trop.
parviflora, *Guerke, in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 537.—Afr. trop.
Rautaneni, *Guerke, l. c.* 583.—Afr. trop.

BOPUSIA, Presl = **Graderia**, Benth. (Scrophul.).
subintegra, Hiern, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 390 = G. subintegra.

BORONIA, Sm. (Rutac.).
granitica, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxx. 357.—Austral.
Purdieana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 318.—Austral.
xerophila, *Diels, l. c.* 319.—Austral.

BORRERIA, G. F. W. Mey. (Rubiac.).
[SPERMACOCE, Linn. I. K.]
articularis, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 956 (= *Spermacoce articularis*).—Siam.
cristata, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 101.—Bras.
cyperoides, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 187.—Parag.
guaranitica, *Chod. l. c.* 186.—Parag.
Hassleriana, *Chod. l. c.* 188.—Parag.
malacophylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 373.—Afr. trop.
minutiflora, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
oligantha, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 322, nomen.—Afr. trop.
paraguariensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 186.—Parag.
perangusta, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 100.—Bras.
Princeae, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 341.—Afr. trop.
somalica, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 374.—Afr. trop.
tetradon, *K. Schum. in Schlechter, Westafr. Kautschuk-Exped.* 322, nomen.—Afr. trop.

BORRICHIA, Adans. (Compos.).
glabrata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1263.—Am. bor.

BORYA, Montrouz. ex Beauvis, Gen. Montrouz. 68 (1901) = **Oxera**, Labill. (Verben.).
Latreillei, Montrouz. l. c. = O. oblongifolia.

BOSCIA, Lam. (Capparid.).
filipes, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 221.—Afr. trop.
pachyandra, *Gilg, l. c.* xxx. 310.—Afr. trop.
Pestalozziana, *Gilg. l. c.* xxxiii. 221.—Afr. trop.
prunoides, *Gage, in Rec. Bot. Surv. India*, iii. 23.—Burma.
suaveolens, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 239.—Afr. trop.

BOSLERIA, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. (1905) 175. *SOLANACEAE.*
nevadensis, *A. Nelson, l. c.*—Am. bor.

BOSQUEIOPSIS, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. i. (1901) 839. *URTICACEAE.*
Gilletii, *Wildem. & Th. Dur. l. c.* 840.—Afr. trop.

BOSSIAEA, Vent. (Legum.).
leptacantha, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 263.—Austral.

BOSWELLIA, Roxb. (Burser.).
boranensis, *Engl. Jahrb.* xxxiv. 316.—Afr. trop.
elegans, *Engl. l. c.* 314.—Afr. trop.

BOTHRIOCLINE, Oliv. (Compos.).
linearifolia, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 399.—Afr. trop.
Schinzii, *O. Hoffm. l. c.* 398.—Afr. trop.

BOUCHEA, Cham. (Verben.).
caespitosa, *H. H. W. Pearson, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xv. 178.—Afr. austr.
glandulifera, *H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap.* v. 204.—Afr. austr.
incisa, *H. H. W. Pearson, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xv. 180.—Afr. trop.
integrifolia, *H. H. W. Pearson, l. c.* 179.—Afr. austr.
Krookii, *Guerke, ex Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 45.—Afr. austr.
longipetala, *H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap.* v. 199.—Afr. austr.
namaquana, *Bolus, ex H. H. W. Pearson, l. c.* 204.—Afr. austr.

BOUCHETIA, DC. (Solan.).
anomala, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxviii. 377.—Mexic.

BOUTELOUA, Lag. (Gramin.).
hirticulmis, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xxx. 4.—Am. bor.
Pringlei, *Scribn. l. c.*—Am. bor.

BOUVARDIA, Salisb. (Rubiac.).
Conzattii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 92.—Mexic.

BOWKERIA, Harv. (Scrophul.).
Gerrardiana, *Harv. ex Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 220.—Afr. austr.
velutina, *Harv. l. c.* 219.—Afr. austr.

BOYKINIA, Nutt. (Saxifrag.).
heucheriforme, *Rosend. in Engl. Jahrb.* xxxvii. *Beibl.* lxxxiii. 62 (= *Therofon heucheriforme*).—Am. bor.

BRACEA, Britton, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1905) 448. *APOCYNACEAE.*
bahamensis, *Britton, l. c.*—Ind. occ.

BRACHIARIA, Griseb. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).
digitarioides, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 77 = P. digitarioides.
obtusa, Nash, l. c. = P. obtusum.
platyphylla, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 81 = P. platyphyllum.

BRACHIONIDIUM, Lindl. (Orchid.).
brevicaudatum, *Rolfe, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 50.—Guian.

BRACHISTUS, Miers (Solan.).
lanceolatus, *Greenm. in Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 212.—Am. cent.
physocalycius, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 8.—Am. cent.

BRACHYACTIS, Ledeb. (Compos.).
[ASTER, Linn. D. T. & H.]
hybrida, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 147.—Am. bor.

BRACHYANDRA, Phil. (Compos.).
tenuifolia, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 268 (= *Leto tenuifolia*).—Chili.

BRACHYCHILUM, O. G. Petersen (Scitamin.).
tenellum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 61.—Ins. Molucc.

BRACHYCLADOS, D. Don (Compos.).
caespitosus, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 18 (= *Lavidia caespitosa*).—Patag.
megalanthus, *Speg. l. c.* 19.—Patag.

BRACHYCOME, Cass. (Compos.).
ciliocarpa, *Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 23.—Austral.
oncocarpa, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 606.—Austral.
palustris, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 427.—Afr. trop.

BRACHYCORYTHIS, Lindl. (Orchid.).
oligophylla, *Kraenzl. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 208.—Afr. trop.

BRACHYGYNE, Small, Fl. S. E. U. S. 1073 (1903). *SCROPHULARIACEAE.*
macrophylla, *Small, l. c.* (= *Seymeria macrophylla*).—Am. bor.

BRACHYLAENA, R. Br. (Compos.).
mullensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 149.—Afr. trop.
rotundata, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 131.—Afr. austr.

BRACHYPODIUM, Beauv. (Gramin.).
tenerum, *Vel. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1904, 34.—Bulgar.

BRACHYSTEGIA, Benth. (Legum.).
Bragaei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 82.—Afr. trop.
Busseі, *Harms, l. c.* xxxiii. 155.—Afr. trop.
euryphylla, *Harms, l. c.* 82.—Afr. trop.
Goetzei, *Harms, l. c.* xxx. 318.—Afr. trop.
Holtzii, *Harms, l. c.* xxxiii. 154.—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 204.—Afr. trop.
polyantha, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 319.—Afr. trop.
stipulata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 44.—Afr. trop.
taxifolia, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 155.—Afr. trop.
Woodiana, *Harms, l. c.* xxx. 82.—Afr. trop.

BRACHYSTELMA, R. Br. (Asclep.).
Bingeri, *A. Chevall. in Rev. Cult. Col.* viii. 65.—Afr. trop.
Johnstoni, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl.* t. 2754.—Afr. trop.
nauseosum, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. 191.—Afr. trop.
praelongum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 384.—Afr. austr.
Schinzii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 471 (= *Craterostemma Schinzii*).—Afr. trop.

BRACHYSTELMA:—
simplex, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 40.—Afr. trop.
togoense, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.

BRACHYTOME, Hook. f. (Rubiac.).
Scortechinii, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 198.—Penins. Mal.

BRACKENRIDGEA, A. Gray (Ochnac.).
albo-serrata, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* 1902, 47 (=*Ochna albo-serrata*).—Afr. trop.
Bussei, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 273.—Afr. trop.
corymbosa, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 390—Penins. Mal.
ferruginea, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* 1902, 47 (=*Ochna ferruginea*).—Afr. trop.
Forbesii, *Van Tiegh. l. c.* 46.—N. Guin.
Kingii, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 395.—Penins. Mal.
palustris, *Bartell. in Malpighia*, xv. 165.—Borneo.
perakensis, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 396.—Penins. Mal.
rubescens, *Van Tiegh. l. c.*—Penins. Mal.
serrulata, *Bartell. in Malpighia*, xv. 168.—Borneo.

BRADBURYA, Rafin. = **Centrosema**, Benth. (Legum.).
arenicola, Small, Fl. S. E. U. S. 651.—Am. bor.
floridana, Britton, in Torreya, iv. 142.—Am. bor.
sagittata, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 46 (=*Glycine sagittata*).—Mexic.
Schiedeana, Rose, l. c. (=*Clitoria Schiedeana*).—Mexic.
unifoliata, Rose, l. c. 45.—Mexic.

BRADLEA, Adans. = **Apios**, Tourn. (Legum.).
frutescens, Britton, Man. Fl. N. U. S. 549 (=*Kraunhia frutescens*).—Am. bor.
macrostachys, Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 549 (=*Kraunhia macrostachys*).—Am. br.

BRASSAIOPSIS, Decne. & Planch. (Aral.).
ciliata, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 499.—China.
ficifolia, *Dunn, l. c.* 500.—China.

BRASSAVOLA, R. Br. (Orchid.).
chacoensis, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 7.—Reg. Argent.
Gardneri, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 263.—Bras.

BRASSIA, R. Br. (Orchid.).
Lewisii, *Rolfe, in Orch. Rev.* i. 149.—Hab.?

BRASSICA, Tourn. (Crucif.).
amblyphylla, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 46.—Corsica.
brevicaulis, Bub. Fl. Pyren. iii. 186 = Diplotaxis brevicaulis.
calcarea, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 47.—Corsica.
cernua, *Matsum. Enum. Sci. Names*, (1895) 52 (=*Sinapis cernua*).—Japon.
conferta, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 47.—Corsica.
decumbens, Bub. Fl. Pyren. iii. 185 = Diplotaxis muralis.
erigens, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 45.—Corsica.
flexicaulis, *Jord. l. c.* 48.—Corsica.
hololeuca, *Jord. l. c.* 45.—Corsica.
integrifolia, *O. E. Schulz, in Urb. Symb. Antill.* iii. 509.—Ind. occ.
luteola, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 48.—Corsica.
praeruptorum, *Jord. l. c.* 46.—Corsica.
puberula, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* i. 50.—Hispan.
pubescens, *Druce, in Pharmac. Journ.* Ser. IV. xvii. 799 (=*Sinapis pubescens*).—Eur. austr.
recurva, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 46.—Corsica.
Revelieri, *Jord. l. c.* 48.—Corsica.
rugosa, *Prain, Bengal Pl.* 220 (=*Sinapis rugosa*).—Ind. or.
Urbaniana, *O. E. Schulz, in Urb. Symb. Antill.* iii. 511.—Ind. occ.

BRAUNERIA, Neck. = **Rudbeckia**, Linn. (Compos.).
[ECHINACEA, Moench. I. K.]
angustifolia, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 5 (=*Echinacea angustifolia*).—Am. bor.

BRAUNERIA:—
atrorubens, Boynton & Beadle, in Biltm. Bot. Stud. i. 11 = Rudbeckia atrorubens.
laevigata, Boynton & Beadle, in Small, Fl. S. E. U. S. 1261.—Am. bor.
paradoxa, Norton, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, xii. 40.—Am. bor.

BRAVAISIA, DC. (Acanth.).
grandiflora, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 255.—Am. cent.

BRAYA, Sternb. & Hoppe (Crucif.).
glebaria, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 224.—Patag.
linearis, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 254.—Eur.
lycopodioides, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 12.—Patag.
pamirica, *O. Fedtsch. Pl. Pamir*, 14 (=*Erysimum pamiricum*).—As. cent.
patagonica, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 13.—Patag.
pectinata, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 225.—Patag.
pycnophylloides, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 14.—Patag.
sinensis, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 303.—China.

BRAYODENDRON, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 356. *EBENACEAE.*
[DIOSPYROS, Linn. D. T. & H.]
texanum, *Small, l. c.* (=*Diospyros texana*).—Am. bor.

BRAYULINEA, Small, Fl. S. E. U. S. 394 (1903). *AMARANTACEAE.*
[GUILLEMINEA, H. B. & K. D. T. & H.]
densa, *Small, l. c.* (=*Guilleminea densa*).—Am. bor. et trop.

BRAZZEIA, Baill. (Tiliac.).
[ERYTHROPYXIS, Pierre? D. T. & H. S.]
acuminata, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér IX. i. 359.—Afr. trop.
biseriata, *Van Tiegh. l. c.* 358.—Afr. trop.
Eetveldiana, *Van Tiegh. l. c.* 357 (=*Rhaptopetalum Eetveldianum*).—Afr. trop.
Klainei, *Pierre, ex Van Tiegh. l. c.* 359.—Afr. trop.
pellucida, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.
rosea, *Van Tiegh. l. c.* 358.—Afr. trop.
scandens, *Van Tiegh. l. c.* 356 (=*Erythropyxis scandens*).—Afr. trop.
Soyauxii, *Van Tiegh. l. c.* (=*Rhaptopetalum Soyauxii*).—Afr. trop.
Trillesiana, *Pierre, ex Van Tiegh. l. c.* 359.—Afr. trop.

BRETSCHNEIDERA, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2708 (1901). *SAPINDACEAE.*
sinensis, *Hemsl. l. c.*—China.

BREWERIA, R. Br. (Convolvul.).
[BONAMIA, Thou. D. T. & H.]
capensis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 80 (=*Convolvulus capensis*).—Afr. austr.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 683.—Parag.
trichosanthes, *Small, Fl. S. E. U. S.* 959 (=*Convolvulus trichosanthes*).—Am. bor.

BREYNIA, Forst. (Euphorb.).
accrescens, *Hayata, in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xx. no. 3, 22.—Formosa.

BRICKELLIA, Ell. (Compos.).
amblyolepis, *Robins. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 485.—Mexic.
cardiophylla, *Robins. l. c.*—Mexic.
glomerata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 504.—Mexic.
hebecarpoides, *Robins. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 486.—Mexic.
megalodonta, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 34.—Mexic.
microphylla, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 588 (=*Baccharis microphylla*).—Peruv.
monocephala, *Robins. in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 268.—Mexic.
peninsularis, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. (1903) 160.—Calif.

BRICKELLIA:—
petrophila, *Robins. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 486.—Mexic.
pulcherrima, *Robins. in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 268.—Mexic.
verrucosa, *Robins. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 487.—Mexic.

BRIDELIA, Willd. (Euphorb.).
Balansae, *Tutcher, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 66.—China.

BRILLANTAISIA, Beauv. (Acanth.).
Borellii, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 186.—Afr. trop.

BRIQUETIA, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, vi. (1902) 11. *MALVACEAE.*
ancylocarpa, *Hochr. l. c.*—Parag.

BRITTONASTRUM, Briq. (Labiat.).
betonicoides, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 160 (=*Gardoquia betonicoides*).—Am. bor.
Greenei, *Briq. l. c.* 157.—Am. bor.
lanceolatum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 4.—Am. bor.
neomexicanum, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 158.—Am. bor.
Pringlei, *Briq. l. c.* 161.—Mexic.
rupestre, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 4 (=*Cedronella rupestris*).—Am. bor.

BRIZA, Linn. (Gramin.).
ambigua, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* lii. 308.—Bras.
Calotheca, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 282.—Parag.

BRODIAEA, Sm. (Liliac.).
aurea, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 304 (=*Milla aurea*).—Patag.
bicolor, *Suksd. in West Amer. Sci.* xiv. (1902) 1.—Am. bor.
Luzula, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 305 (=*Luzula patagonica*).—Patag.
Spegazzinii, *Macl. l. c.*—Patag.

BROMELIA, Plum. (Bromel.).
exigua, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 2.—Bras.
Glaziovii, *Mez, l. c.* 1.—Bras.
goyazensis, *Mez, l. c.* 2.—Bras.
mucronata, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 131.—Mexic.
villosa, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 3.—Bras.

BROMUS, Dill. (Gramin.).
brachyphyllus, *Merrill, in Rhodora*, iv. 146.—Am. bor.
Hackelii, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 241.—Patag.
induratus, *Hausskn. & Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 48.—As. Min.
Janczewskii, *Zapal. in Bull. Acad. Cracov.* 1904, 306.—Galicia.
macrantherus, *Hack. ex Henriq. in Bol. Soc. Broter.* xx. (1905) 145.—Lusitan.
magnificus, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvi. 53.—Am. bor.
Paulsenii, *Hack. ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 174.—As. cent.
pubens, *Wolosz. Fl. Polon. Exsicc.* no. 1013.—Galicia.
torgesianus, *Hausskn. & Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 50.—As. Min.

BRONGNIARTIA, H. B. & K. (Legum.).
bilabiata, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 248.—Mexic.
bracteolata, *Micheli, l. c.* 249.—Mexic.
trifoliata, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. (1901) 105.—Calif.

BROSIMUM, Sw. (Urtic.).
heterochitum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 121.—Am. cent.

BROWNLEEA, Harv. (Orchid.).
monophylla, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxi. 307.—Afr. austr.
Pentheriana, *Kraenzl. ex Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 6.—Afr. austr.

BROWNLOWIA, Roxb. (Tiliac.).
suluensis, *Warb. ex Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 102.—Ins. Philipp.

BRUGUIERA, Lam. (Rhizoph.).
Ritchiei, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* vi. 11.—Ins. Philipp.

BRUNELLA, Tourn. (Labiat.).
[PRUNELLA, Linn. I. K.]
gentianaefolia, *Pau, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* Sér. III. xiii. 211.—Hybr.

BRUNFELSIA, Plum. (Solan.).
Fawcettii, *Urb. Symb. Antill.* iii. 371.—Ind. occ.
Harrisii, *Urb. l. c.* 373.—Ind. occ.
maliformis, *Urb. l. c.* 372.—Ind. occ.
paraguayensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 406.—Parag.

BRUNSVIGIA, Heist. (Amaryll.).
Rautanenii, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 667.—Afr. trop.

BUBBIA, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xiv. (1900) 278 = **Drimys**, Forst. (Magnol.).
auriculata, Van Tiegh. l. c. 293 = D. amplexicaulis.
Balansae, Van Tiegh. l. c. = D. Balansae.
Deplanchei, Van Tiegh. l. c. = D. Deplanchei.
heteroneura, Van Tiegh. l. c. 294.—N. Caled.
isoneura, Van Tiegh. l. c. 294.—N. Caled.
Muelleri, Van Tiegh. l. c. 293.—N. Caled.

BUCCAFERREA, Bub. = **Potamogeton**, Tourn. (Naiad.).
amplexicaulis, Bub. Fl. Pyren. iv. 13 = P. perfoliatus.
crispata, Bub. l. c. = P. crispus.
densa, Bub. l. c. 14 = P. densus.
lucida, Bub. l. c. 13 = P. lucens.
natans, Bub. l. c. 11 = P. natans.
pectinata, Bub. l. c. 17 = P. pectinatus.
pusilla, Bub. l. c. 16 = P. pusillus.
rufescens, Bub. l. c. 12 = P. rufescens.
variifolia, Bub. l. c. = P. gramineus.

BUCHANANIA, Spreng. (Anacard.).
Engleriana, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 466.—Ins. Carol.
heterophylla, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 300.—N. Guin.
pseudoflorida, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 24.—Ins. Philipp.

BUCHENROEDERA, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
glabriflora, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 120.—Afr. trop.
griquana, *Schlechter, ex Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 18.—Afr. austr.

BUCHHOLZIA, Engl. (Capparid.).
Engleri, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 221.—Afr. trop.

BUCHNERA, Linn. (Scrophul.).
[BUECHNERA, Linn. D. T. & H.]
affinis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 123.—Afr. trop.
Baumii, *Engl. & Gilg. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 367.—Afr. trop.
brevibractealis, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 392.—Afr. austr.
crassifolia, *Engl. Jahrb.* xxx. 403.—Afr. trop.
kingaensis, *Engl. l. c.* 404.—Afr. trop.
minutiflora, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
prorepens, *Engl. & Gilg. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 368.—Afr. trop.
pulchra, *Skan, ex S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 190.—Afr. trop.
pusilla, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 123.—Afr. trop.
reducta, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 394.—Afr. austr.
rungwensis, *Engl. Jahrb.* xxx. 403.—Afr. trop.
strictissima, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 367.—Afr. trop.

BUDDLEIA, Houst. (Logan.).
albotomentosa, *R. Fries, in Arkiv Bot. Stockh.* i. 411.—Reg. Argent.
aurantiaco-maculata, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 377.—Afr. trop.
Columbae, *André, in Rev. Hortic.* 1901, 37.—Hort.
Hemsleyana, *Koehne, in Gartenfl.* 1903, 169.—China.
Hieronymi, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 117.—Reg. Argent.
nivea, *Duthie, in Gard. Chron.* 1905, ii. 275.—China.
paraguayensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. i. 407.—Parag.

BUETTNERIA, Loefl. (Stercul.).
anatomica, *Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bogor.* (1866) 198, nomen; *Pl. Bogor. Exsicc.* 23.—Am. trop.
celebica, *Hochr. in Bull. Inst. Buitenz.* xix. 45; *Pl. Bogor. Exsicc.* 22.—Celebes.
Hassleri, *K. Schum. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 73.—Parag.
subulifolia, *K. Schum. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 57, nomen.—Bras.

BUFONIA, Sauv. (Caryophyll.).
Sintenisii, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1054.—Turkestan.

BULBINE, Linn. (Liliac.).
Bachmanniana, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 938.—Afr. austr.
Bachmannii, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 664.—Afr. austr.
ensifolia, *Baker, l. c.* i. 780.—Afr. austr.
longifolia, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 939.—Afr. austr.
namaensis, *Schinz, l. c.*—Afr. austr. or.
nigra, *Schinz, l. c.* 940.—Afr. austr.
transvaalensis, *Baker, in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich.* xlix. 173.—Afr. austr.
trichophylla, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 780.—Afr. austr.
xanthobotrys, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 186.—Afr. trop.

BULBINELLA, Kunth (Liliac.).
yedoensis, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 39 (= *Anthericum yedoense*).—Japon.

BULBOPHYLLUM, Thou. (Orchid.).
[BOLBOPHYLLUM, Thou. D. T. & H.]
absconditum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 449.—Java; Sumatra.
acutum, *J. J. Sm. l. c.* 466.—Java.
aemulum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 195.—N. Guin.
alliifolium, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 431.—Java; Sumatra.
antennatum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 196.—N. Guin.
arfakianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 250.—N. Guin.
Bakossorum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 13.—Afr. trop.
bataanense, *Ames, Orchid.* i. 96.—Ins. Philipp.
bidentatum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 612 (= *Didactyle bidentatum*).—Bras.
Binnendijkii, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 442 (= *Cirrhopetalum leopardinum*).—Java.
bisepalum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 196.—N. Guin.
bismarckense, *Schlechter, l. c.* 197.—N. Guin.
Blumei, J. J. Sm. Orchid. Java, 459 = cuspidilingua.
brevipes, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 75.—Penins. Mal.
Brookeanum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 250.—Borneo.
burfordiense, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. sub t. 7787 = grandiflorum.
Ceratostylis, *J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* i. 154.—Sumatra.
chloranthum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 197.—Ins. Bismarck.
chrysoglossum, *Schlechter, l. c.* 198.—N. Guin.
cincinnatum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 76.—Penins. Mal.
Clarkei, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 13 (= *Megaclinium Clarkei*).—Afr. trop.
coiloglossum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 199.—N. Guin.
congolanum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 14.—Afr. trop.
Copelandi, *Ames, Orchid.* i. 97.—Ins. Philipp.
crassifolium, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 429 (= *Oxyricera crassifolia*).—Java.
crassinervium, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 118 A.—Amboina.
crenulatum, *Rolfe, in Bot. Mag.* t. 8000.—Madag.
Crista-galli, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 253.—Sumatra.
cryptanthum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 199.—N. Guin.

BULBOPHYLLUM:—
cryptophoranthoides, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 251.—Borneo.
cuneatum, *Rolfe, in Ames, Orchid.* i. 98.—Ins. Philipp.
Curtisii, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 76.—Penins. Mal.
cylindrobulbum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 200.—N. Guin.
dasypetalum, *Rolfe, in Ames, Orchid.* i. 99.—Ins. Philipp.
decipiens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 14.—Afr. trop.
deistelianum, *Schlechter, l. c.* 17 (= *Megaclinium deistelianum*).—Afr. trop.
ebulbe, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 200.—N. Guin.
elasmatopus, *Schlechter, l. c.* 201.—N. Guin.
elegans, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 83 (= *Cirrhopetalum elegans*).—Ins. Mal.
erioides, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 201.—N. Guin.
erythrostachyum, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1903, 200.—Madag.
fruticicola, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 202.—N. Guin.
gabunense, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 15.—Afr. trop.
Gentilii, *Rolfe, in Gard. Chron.* 1904, ii. 266.—Afr. trop.
globiceps, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 203.—N. Guin.
glutinosum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 597 (= *Didactyle glutinosum*).—Bras.
gracilliscapum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 203.—N. Guin.
grudense, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 458.—Java.
Hahlianum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 204.—Ins. Bismarck.
Humblotianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 71.—Ins. Comor.
hydrophilum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 463.—Java.
hymenobracteum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 204.—N. Guin.
hymenochilum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 252.—Borneo.
Incarum, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 86.—Peruv.
infundibuliforme, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 120 A.—Amboina.
ischnopus, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 205.—N. Guin.
kameruneuse, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 15.—Afr. trop.
kindtianum, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo.* 309; *et in Belgique Coloniale*, x. (1904) 449.—Afr. trop.
laciniatum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 609 (= *Didactyle laciniatum*).—Bras.
lageniforme, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xv. 494.—Austral.
lasioglossum, *Rolfe, in Ames, Orchid.* i. 100.—Ins. Philipp.
laxum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 205.—N. Guin.
lepidum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 471 (= *Ephippium lepidum*).—Java; Borneo.
leptopus, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 206.—N. Guin.
leptorrhachis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 17.—Afr. trop.
leucorhachis, *Schlechter, l. c.* (= *Megaclinium leucorhachis*).—Afr.
longibulbum, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.
macranthoides, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 254.—N. Guin.
macrophyllum, *Kraenzl. l. c.* 249.—Borneo.
macrourum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 207.—N. Guin.
Malachadenia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 596 (= *Malachadenia clavata*).—Bras.
manobulbum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 207.—N. Guin.
masdevalliaceum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 251.—N. Guin.
maxillarioides, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 208.—N. Guin.
melinanthum, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
Michohitzii, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1901, 272.—Malaya.

BULBOPHYLLUM:—
microbulbon, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 209.—Ins. Bismarck.
microcharis, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
Millenii, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 13 (= *Megaclinium Millenii*).—Afr. trop.
mirandum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 255.—Borneo.
nannodes, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 210.—N. Guin.
nanum, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 122.—Afr. trop.
nemorosum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 608 (= *Didactyle nemorosum*).—Bras.
neopommeranicum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 210.—Ins. Bismarck.
Novae-Hiberniae, *Schlechter, l. c.* 211.—Ins. Bismarck.
nuruanum, *Schlechter, l. c.* 212.—N. Guin.
obtusipetalum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 424.—Malaya.
ochraceum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 610 (= *Didactyle ochraceum*).—Bras.
ochranthum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 76.—Penins. Mal.
ochroleucum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 212.—N. Guin.
oxyanthum, *Schlechter, l. c.* 213.—N. Guin.
oxychilum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 18.—Afr. trop.
pachyteloa, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 213.—N. Guin.
papillosum, *Finet, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 303.—Afr. trop.
papillosum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 464.—Java.
penduliscapum, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 119 B.—Sumatra.
perakense, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 76.—Penins. Mal.
perductum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 451.—Java.
platyrhachis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 15 (= *Megaclinium platyrhachis*).—Afr. trop.
plumosum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 614 (= *Didactyle plumosum*).—Bras.
polyblepharon, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 214.—N. Guin.
praestans, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 254.—N. Guin.
psittacoides, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 84 (= *Cirrhopetalum psittacoides*).—Malaya.
pustulatum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 74.—Penins. Mal.
quadricolor, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 611 (= *Didactyle quadricolor*).—Bras.
ramosum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 214.—N. Guin.
recurviflorum, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 118 B.—Amboina.
rhodopetalum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 114.—Afr. trop.
rhodosepalum, *Schlechter, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 171.—Sumatra.
rigidipes, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 215.—N. Guin.
robustum, *Rolfe, in Bot. Mag.* sub t. 8000.—Madag.
roraimense, *Rolfe, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 61.—Guian.
saccatum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 250.—Borneo.
Sangae, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 19.—Afr. trop.
saurocephalum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* 1886, ii. 262.—Ins. Philipp.
scandens, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 253.—Borneo.
Schimperianum, *Kraenzl. l. c.* xxxiii. 71.—Afr. trop.
Schinzianum, *Kraenzl. ex Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 123.—Afr. trop.
schistopetalum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 216.—Ins. Bismarck.
serrulatum, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
sessile, J. J. Sm. Orchid. Java, 448 = clandestinum.
stipulaceum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 217.—N. Guin.
tenerum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 75.—Penins. Mal.
teretifolium, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 18.—Afr. trop.
Teysmannii, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 79.—Amboina.
trachyglossum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 217.—Ins. Bismarck.

BULBOPHYLLUM:—
trigonocarpum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 218.—N. Guin.
triste, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 17 (= *Megaclinium triste*).—Afr. trop.
triurum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 252.—Sumatra.
umbellatum, J. J. Sm. Orchid. Java, 419 = lepidum.
Usambarae, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 56.—Afr. trop.
variabile, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 74.—Penins. Mal.
Warmingianum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 605.—Bras.
Weberbauerianum, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 85.—Peruv.
Whitfordii, *Rolfe, in Ames, Orchid.* i. 100.—Ins. Philipp.
yunnanense, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 14.—China.

BULBOSTYLIS, Kunth (Cyperac.).
argenteobrunnea, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 440.—Afr. trop.
Buchanani, *C. B. Clarke, l. c.* 437.—Afr. trop.
Camporum, K. Schum. ex C. B. Clarke, l. c. 441 = abortiva.
erratica, *C. B. Clarke, l. c.* 434 (= *Schoenus erraticus*).—Afr. trop.
filiformis, *C. B. Clarke, l. c.* 441.—Afr. trop.
Johnstoni, *C. B. Clarke, l. c.* 442.—Afr. trop.
junciformis, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1019 (= *Isolepis junciformis*).—Parag.
Schlechteri, *C. B. Clarke, l. c.* iv. 995.—Afr. austr.
sphaerocephala, *C. B. Clarke, l. c.* iii. 1018 (= *Scirpus sphaerocephalus*).—Parag.
subumbellata, K. Schum. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 436 = Schimperiana.
transiens, *C. B. Clarke, l. c.* 444 (= *Fimbristylis transiens*).—Afr. trop.
Willdenowii, C. B. Clarke, l. c. 431 = barbata.

BUMELIA, Sw. (Sapot.).
bahamensis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 447.—Ind. occ.
egensis, Poepp. ex Pierre, in Urb. Symb. Antill. v. 127 = Micropholis egensis.
Eggersii, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 146.—Ind. occ.
fragrans, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. (1901) 106.—Calif.
Grisebachii, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 141.—Ind. occ.
Krugii, *Pierre, l. c.* 146.—Ind. occ.
loranthifolia, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 447.—Ind. occ.
peninsularis, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. (1901) 107.—Calif.
Picardae, *Urb. Symb. Antill.* v. 148.—Ind. occ.
Purdiaei, *Urb. l. c.* 143.—Ind. occ.
socorrensis, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. (1901) 106.—Calif.

BUNCHOSIA, Rich. (Malpigh.).
apiculata, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 308.—Bras.

BUNIOSERIS, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. (1903) 44. *COMPOSITAE.*
Blanci, *Jord. l. c.*—Eur.
pinnatifida, *Jord. l. c.* 45.—Eur.

BUNIUM, Linn. (Umbell.).
[CARUM, Linn. B. H.]
Chabertii, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 140.—Afr. bor.

BUPLEURUM, Linn. (Umbell.).
ochtiericum, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 15, nomen.—Hispan.
commelynoideum, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 805.—China.
gracilescens, *Reching. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xvii. 393.—Afr. austr.
longeinvolucratum, *Krylov, in Acta Hort. Petrop.* xxi. 17.—As. cent.
Martjanovi, *Krylov, l. c.*—As. cent.

BUPLEURUM:—
parnassicum, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 687.—Eur.
purpureum, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies Bot.* i. 89.—Am. sept.
pusillum, *Krylov, in Acta Hort. Petrop.* xxi. 18.—As. cent.
Rigoi, Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 360 = Sintenisii.
Souliaei, *Calest. in Martelli, Webbia*, 168.—Corsica.

BURBIDGEA, Hook. f. (Zingib.).
schizocheila, *Hort. in Gard. Chron.* 1904, ii. 301.—Hab. ?

BURLINGTONIA, Lindl. = **Rodriguezia**, Ruiz & Pav. (Orchid.).
perpusilla, Kraenzl. in Gard. Chron. 1903, i. 18.—Bras.

BURMANNIA, Linn. (Burmanniac.).
amazonica, *Schlechter, in Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlviii. (1905) 102.—Reg. Amaz.
blanda, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 202.—Afr. trop.
Dalzieli, *Rendle, in Journ. Bot.* 1902, 311.—China.
Damazii, *Beauverd, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 948, 1081.—Bras.
japonica, *Maxim. in Bot. Mag. Tokyo*, iv. no. 39; *et ex Matsum. Ind. Pl. Jap.* ii. 234.—Japon.
Novae-Hiberniae, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 78.—Ins. Bismarck.
oblonga, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 33.—Penins. Mal.
polygaloides, *Schlechter, in Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 103.—Reg. Amaz.

BURSA, Weber = **Capsella**, Medic. (Crucif.).
Bursa-pastoris, Shafer, in Ann. Carneg. Mus. i. 25 = C. Bursa-pastoris.

BURSERA, Jacq. (Burserac.).
Andersonii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 160.—Ins. Galap.
collina, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. (1905) 204.—Mexic.
inaguensis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 443.—Ind. occ.
malacophylla, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 160.—Ins. Galap.

BURTONIA, R. Br. (Legum.).
viscida, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 234.—Austral.

BUSSEA, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 159 (1902). *LEGUMINOSAE.*
massaiensis, *Harms, l. c.* (= *Peltophorum massaiense*).—Afr. trop.

BUTAYEA, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 149. *ACANTHACEAE.*
[PSEUDOBLEPHARIS, Baill. D.T. & H.]
congolana, *Wildem. l. c.* 150.—Afr. trop.

BUTTNERIA, Duham. = **Calycanthus**, Linn. (Calycanth.).
Mohrii, Small, Fl. S. E. U. S. 528.—Am. bor.
nana, Small, l. c. = C. nanus.

BUXUS, Linn. (Euphorb.).
liukiuensis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 179.—Ins. Liukiu.

BYRSONIMA, Rich. (Malpigh.).
arctostaphyloides, *Niedenzu, in Arb. Inst. Braunsb.* i. 40.—Am. trop.
crassa, *Niedenzu, l. c.* 30.—Am. trop.
decipiens, *Niedenzu, l. c.* 35.—Am. trop.
fagifolia, *Niedenzu, l. c.* 20.—Am. trop.
fluminensis, *Niedenzu, l. c.* 43.—Am. trop.
Grisebachiana, *Niedenzu, l. c.* 23.—Am. trop.
laevis, *Niedenzu, l. c.* 34.—Am. trop.
lucidula, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 423.—Bras.
lyoniifolia, *Niedenzu, in Arb. Inst. Braunsb.* i. 38.—Am. trop.
oblanceolata, *Niedenzu, l. c.* 14.—Am. trop.
subcordata, *Niedenzu, l. c.* 40.—Am. trop.
tenuifolia, *Urb. & Niedenzu, l. c.* 19.—Am. trop.
vernicosa, *Niedenzu, l. c.* 33.—Am. trop.

C

CABRALEA, A. Juss. (Meliac.).
brachystachya, *C. DC. in Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 412.—Parag.
fluminensis, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 93, nomen.—Bras.
humilis, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 365. —Bras.
microcalyx, *Harms, in Urb. in Engl. Jahrb.* xxx, *Beibl.* lxvii. 34.—Bras.
Schwackei, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 365.—Bras.

CACALIA, Linn. (Compos.).
[Senecio, Tourn. I. K.]
firma, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 420.—As. or.
Krameri, *Matsum. Enum. Sci. Names* (1895) 57 (= *Senecio Krameri*).—Japon.
palmata, Mak. in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 16 = C. Syneilesis.
sulcata, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 157.—Am. bor.
Syneilesis, *Matsum. Enum. Sci. Names* (1895) 57 (= *Senecio Syneilesis*).—Japon.
tuberosa, *Nutt. Gen. Am. Pl.* ii. 139.—Am. bor.

CACHRYS, Linn. (Umbell.).
ferulacea, *Calest. in Martelli, Webbia*, 15 (= *Prangos ferulacea*).—Eur.; As. occ.

CACTUS, Linn. = **Mamillaria**, Haw. (Cactac.).
hemisphaericus, Small, Fl. S. E. U. S. 811 = M. hemisphaerica.
neo-mexicanus, Small, l. c. 812.—Am. bor.
robustior, Small, l. c.—Am. bor.
similis, Small, l. c. = M. similis.
sulcatus, Small, l. c. = M. sulcata.
texanus, Small, l. c.—Am. bor.

CADABA, Forsk. (Capparid.).
macropoda, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 222.—Afr. trop.

CADIA, Forsk. (Legum.).
Baroni, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 97.—Madag.
Catati, *Drake, l. c.* 96.—Madag.

CAESALPINIA, Linn. (Legum.).
acutifolia, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 686.—Venez.
dictamnoides, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. iv. 829.—Parag.
Erlangeri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 160.—Afr. trop.
modesta, *Arech. in Anal. Mus. Montevideo*, iii. 405.—Urug.
Morsei, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 492.—China.
oligophylla, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 160.—Afr. trop.
rostrata, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl.* t. 2702.—Afr. austr.

CAESAREA, Camb. = **Viviania**, Cav. (Geran.).
Sellowii, *Taub. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mem. III. 78, nomen.—Bras.

CAIOPHORA, Presl (Loasac.).
[Blumenbachia, Schrad. I. K.]
patagonica, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 590 (= *Blumenbachia patagonica*).—Patag.

CAKILE, Linn. (Crucif.).
Harperi, *Small, Fl. S. E. U. S.* 478.—Am. bor.
lanceolata, *O. E. Schulz, in Urb. Symb. Antill.* iii. 504.—Ind. occ.

CALADENIA, R. Br. (Orchid.).
Purdieana, *Andrews, in Journ. Muell. Soc. W. Austral.* i. no. 10, 39.—Austral.

CALADIOPSIS, Engl. Jahrb. xxxvii. (1905) 139. *ARACEAE.*
Lehmannii, *Engl. l. c.* 140.—N. Granat.

CALADIUM, Vent. (Aroid.).
angustilobum, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 136.—N. Granat.
Colocasia, *W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* ix. 206 (= *Arum Colocasia*).—As. trop.
Eggersii, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 136.—Ecuador.
puberulum, *Engl. l. c.*—N. Granat.

CALAMAGROSTIS, Adans. (Gramin.).
albiflora, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* Sér. III. xiii. 181.—China.
Ameghinoi, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 193 (= *Deyeuxia Ameghinoi*).—Patag.
atropurpurea, *Nash, in Britton & Rydb. in Bull. N. Y. Bot. Gard.* ii. 153.—Am. bor.
clipeata, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* Sér. III. xiii. 184.—China.
chilensis, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 176 (= *Deyeuxia chilensis*).—Am. austr.
compacta, *Hack. ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 167 (= *Deyeuxia compacta*).—As. cent.
freticola, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 194 (= *Deyeuxia freticola*).—Patag.
Hieronymi, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* lii. 109.—Argent.
Huttoniae, *Hack. in Rec. Albany Mus.* i. 118, 340.—Afr. austr.
indagata, *Torges & Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 80.—Hybr.
Kotulae, *Zapal. in Bull. Acad. Cracov.* 1904, 162.—Galic.
lucida, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xxx. 8.—Am. bor.
Neumanniana, *Torges, in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xvii. 93.—Hybr.
pappophorea, *Hack. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 315.—Turkestan.
patagonica, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 195 (= *Deyeuxia patagonica*)—Patag.
Petriei, *Hack. in Trans. Proc. N. Z. Inst.* xxxv. 380.—N. Zel.
perplexa, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xxx. 7.—Am. bor.
Pittieri, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* lii. 108.—Am. cent.
polycephala, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* Sér. III. xiii. 183.—China.
Prahliana, *Torges, in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xvii. 88.—Hybr.
radicans, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* Sér. III. xiii. 182.—China.
rosea, *Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 109 (= *Agrostis rosea*).—Reg. Argent.
sclerantha, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* lii. 108.—Reg. Argent.
tenuifolia, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 177 (= *Deyeuxia tenuifolia*).—Am. austr.
yukonensis, *Nash, in Britton & Rydb. in Bull. N. Y. Bot. Gard.* ii. vi. 154.—Am. bor.

CALAMINTHA, Tourn. (Labiat.).
[Satureia, Linn. D. T. & H.]
Chandleri, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. (1905) 195.—Calif.
montenegrina, *Sagorski, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1903, 20.—Eur.

CALAMUS, Linn. (Palm.).
aquatilis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 48.—Penins. Mal.
bacularis, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 609.—Borneo.
Barteri, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 199, nomen.—Afr. trop.
borneensis, *Becc. l. c.* 205.—Borneo.
Bousigonii, *Becc. l. c.* 209.—Cochinch.
brachystachys, *Becc. l. c.* 215.—Borneo.
Burckianus, *Becc. l. c.* 198.—Java.
corrugatus, *Becc. l. c.* 201.—Arch. Mal.
Cumingianus, *Becc. l. c.* 210.—Ins. Philipp.
dilaceratus, *Becc. l. c.* 198.—Ins. Nicobar.
dimorphacanthus, *Becc. l. c.* 214.—Ins. Philipp.
dongnaiensis, *Pierre, ex Becc. l. c.* 198.—Cochinch.
erioacanthus, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 610.—Borneo.
ferrugineus, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 216.—Borneo.
filiformis, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 609.—Borneo.
formosanus, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 211.—Formosa.
gonospermus, *Becc. l. c.* 202.—Arch. Mal.
Harmandi, *Pierre, ex Becc. l. c.* 216.—Cochinch.
Heudelotii, *Becc. l. c.* 199.—Afr. trop.
Henryanus, *Becc. l. c.*—China.
hispidulus, *Becc. l. c.* 209.—Borneo.
kandariensis, *Becc. l. c.* 210.—Celebes.

CALAMUS:—
Laurentii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 97.—Afr. trop.
Leprieurii, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 200.—Afr. trop.
mattanensis, *Becc. l. c.* 216.—Borneo.
maximus, Becc. in Perkins, Fragm. Fl. Philipp. i. 45 = Merrillii.
Merrillii, *Becc. in Martelli, Webbia*, 347.—Ins. Philipp.
microcarpus, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 213.—Ins. Philipp.
microsphaerion, *Becc. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 45.—Ins. Philipp.
Moseleyanus, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 211.—Ins. Philipp.
muricatus, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 609.—Borneo.
mucronatus, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 213.—Borneo.
myriacanthus, *Becc. l. c.* 214.—Borneo.
nematospadix, *Becc. l. c.* 204.—Borneo.
optimus, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 610.—Borneo.
Perrotetii, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 200.—Afr. trop.
pilosellus, *Becc. l. c.* 208.—Borneo.
ramulosus, *Becc. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 46.—Ins. Philipp.
Ridleyanus, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 205.—Penins. Mal.
ruvidus, *Becc. l. c.* 202.—Borneo.
salicifolius, *Becc. l. c.* 206.—Cochinch.
sarawakensis, *Becc. l. c.* 208.—Borneo.
scabridulus, *Becc. l. c.* 203.—Arch. Mal.
siamensis, *Becc. l. c.*—Siam.
spinifolius, *Becc. l. c.* 202.—Ins. Philipp.
subinermis, *Wendl. ex Becc. l. c.* 212.—Borneo.
Vidalianus, *Becc. l. c.* 212.—Ins. Philipp.
trispermus, *Becc. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 46.—Ins. Philipp.
Zollingerii, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 199, nomen.—Celebes.
zonatus, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 609.—Borneo.

CALANDA, K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 386 (1903). *RUBIACEAE.*
cygnorum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 199.—Austral.
primuliflora, *Diels, l. c.* 198.—Austral.
rubricaulis, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 386.—Afr. trop.

CALANDRINIA, H. B. & K. (Portulac.).
chubutensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 243.—Patag.
columbiana, *Howell, in Proc. Amer. Acad.* xxii. 277.—Am. bor.
patagonica, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. 1901), repr. 18.—Patag.
Punae, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 149.—Reg. Argent.

CALANTHE, R. Br. (Orchid.).
aceras, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 140.—N. Guin.
albo-lutea, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 80.—Penins. Mal.
aurantiaca, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
Balansae, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 435.—N. Caled.
chrysantha, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 141.—N. Guin.
Delavayi, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 434.—China.
coiloglossa, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 141.—N. Guin.
Engleriana, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. l. c.* 142.—N. Guin.
Fargesii, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 434.—China.
laxiflora, *Mak. in Matsum. Ind. Pl. Jap.* ii. 237.—Japon.
madagascariensis, *Rolfe, ex Hook. f. in Bot. Mag.* t. 7780.—Madag.
microglossa, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 81.—Sumatra.
mutabilis, *Ridley, l. c.* 79.—Sumatra.
neo-hibernica, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 142.—Ins. Bismarck.
parvilabris, *Schlechter, l. c.* 143.—N. Guin.
pusilla, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 436.—China.
rhodochila, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 143.—N. Guin.

CALANTHE:—
saccata, *Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 3.—Arch. Mal.
torricellensis, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 144.—N. Guin.
tunensis, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 3.—Arch. Mal.
undulata, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 112 B.—Borneo.
yunnanensis, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 27.—China.

CALATHEA, G. F. W. Mey. (Scitam.).
albovaginata, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 99 (= *Phrynium albovaginatum*).—Bras.
brunnescens, *K. Schum. l. c.* (= *Phrynium brunnescens*).—Bras.
Bullii, *K. Schum. l. c.* 114.—Hort.
cardiophylla, *K. Schum. l. c.* 108.—Bras.
cartaractarum, *K. Schum. l. c.* 95.—Venez.
comosa, K. Schum. l. c. 89 = capitata.
cylindrica, *K. Schum. l. c.* 63 (= *Phrynium cylindricum*).—Bras.
dasycarpa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 123.—Am. cent.
divaricata, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 695.—Bolivia.
Donnell-Smithii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 75.—Am. cent.
elliptica, *K. Schum. l. c.*—Guiana.
Gigas, *Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 589.—Hab.?
grandiflora, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 125.—Am. cent.
grandiflora, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 99.—Bras.
lasiostachya, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 124.—Am. cent.
Lehmannii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 78.—Ecuad.
Lindmanii, *K. Schum. l. c.* 175.—Bras.
macrosepala, *K. Schum. l. c.* 84.—Am. cent.
nigricans, *Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 588.—Hab.?
Pittieri, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich*, IV. xlviii. 108.—Am. cent.
polystachya, *K. Schum. l. c.* 176.—Bras.
Raedeliana, K. Schum. l. c. 105 = Koernickeana.
Rodeckiana, *K. Schum. l. c.* 115.—Hort.
sclerobractea, *K. Schum. l. c.* 73.—Am. cent.
sphaerocephala, *K. Schum. l. c.* 101.—Bras.
Trinitatis, *K. Schum. l. c.* 95.—Ind. occ.
truncata, K. Schum. l. c. 104 = orbiculata.
Vera-pax, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 124.—Am. cent.

CALCEOLARIA, Linn. (Scrophul.).
anagalloides, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 84.—Peruv.
brachiata, *Kraenzl. l. c.* 106.—Ecuador.
Cajabambae, *Kraenzl. l. c.* 102.—Peruv.
callunoides, *Kraenzl. l. c.* 103.—Peruv.
Catamarcae, *Kraenzl. l. c.* 98.—Reg. Argent.
cypripediiflora, *Kraenzl. l. c.* 101.—Peruv.
delicatula, *Kraenzl. l. c.* 102.—Peruv.
Engleriana, *Kraenzl. l. c.* 106.—Peruv.
Fiebrigiana, *Kraenzl. l. c.* 84.—Bolivia.
Grisebachii, *Kraenzl. l. c.* 98.—Reg. Argent.
Halliana, *Kraenzl. l. c.* 85.—Peruv.
heterophylloides, *Kraenzl. l. c.* 100.—Peruv.
innudita, *Kraenzl. l. c.* 104.—Peruv.
Incarum, *Kraenzl. l. c.* 108.—Peruv.
Lehmanniana, *Kraenzl. l. c.* 100.—N. Granat.
lepidota, *Kraenzl. l. c.* 83.—Reg. Argent.
lysimachioides, *Kraenzl. l. c.* 84.—Peruv.
macrocalyx, *Kraenzl. l. c.* 99.—Peruv.
Martinezii, *Kraenzl. l. c.* 105.—Ecuador.
myrtilloides, *Kraenzl. l. c.* 99.—Peruv.
polyclada, *Kraenzl. l. c.* 105.—Bolivia.
ramosissima, *Kraenzl. l. c.* 107.—Peruv.
ranunculoides, *Kraenzl. l. c.* 97.—Peruv.
rivularis, *Kraenzl. l. c.* 83.—Bolivia.
sarmentosa, *Kraenzl. l. c.* 97.—Peruv.
Schickendantziana, *Kraenzl. l. c.* 104.—Reg. Argent.
urticina, *Kraenzl. l. c.* 82.—Mexic.
Weberbaueriana, *Kraenzl. l. c.* 101.—Peruv.
Zanatilla, *Kraenzl. l. c.* 107.—Peruv.

CALEA, Linn. (Compos.).
Bakeriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 395.—Parag.
crenata, *Chod. l. c.* iii. 726.—Parag.

CALEA:—
formosa, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 396.—Parag.
Hassleriana, *Chod. l. c.* 727.—Parag.
Jelskii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 496.—Peruv.
nitida, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 396.—Parag.
Pringlei, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 488.—Mexic.
Rojasiana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 728.—Parag.
rupicola, *Chod. l. c.* 726.—Parag.
septuplinervia, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 615.—N. Granat.
Szyszylowiczii, *Hieron. l. c.* xxxvi. 497.—Peruv.
urticifolia, *Millsp. l. c. Beibl.* lxxx. 30 (= *Caleacte urticifolia*).—Am. cent.

CALEPINA, Adans. (Crucif.).
irregularis, Thellung, in Schinz & Keller, Fl. Schweiz, ed. II. 218 = Corvini.
Ruellii, Bub. Fl. Pyren. iii. 248 = Corvini.

CALLIANDRA, Benth. (Legum.).
paniosta, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 686.—Venez.
Pervillei, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 60.—Madag.
rupestris, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. (1905) 199.—Mexic.

CALLICARPA, Linn. (Verben.).
longipetiolata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 47.—Ins. Philipp.

CALLICHILIA, Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 130 (1902). *APOCYNACEAE.*
Barteri, *Stapf, l. c.* 133 (= *Tabernaemontana Barteri*).—Afr. trop.
inaequalis, *Stapf, l. c.* 132 (= *Tabernaemontana inaequalis*).—Afr. trop.
Mannii, *Stapf, l. c.* 131.—Afr. trop.
monopodialis, *Stapf, l. c.* (= *Tabernaemontana monopodialis*).—Afr. trop.
stenosepala, *Stapf, l. c.* 602.—Afr. trop.
subsessilis *Stapf, l. c.* 132 (= *Tabernaemontana subsessilis*).—Afr. trop.

CALLIPHYLLON, Bub. Fl. Pyren. iv. (1901) 56 = **Epipactis**, Adans. (Orchid.).
latifolium, Bub. l. c. = E. latifolia.
palustre, Bub. l. c. 57 = E. palustris.

CALLIPRORA, Lindl. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
anaina, Heller, Muhlenbergia, ii. 14.—Calif.

CALLISIA, Linn. (Commelin.).
scopulorum, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. (1903) 173.—Calif.

CALLISTEMON, R. Br. (Myrtac.).
Polandii, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 2003.—Austral.

CALLISTEPHUS, Cass. (Compos.).
cuneatus, Dalz. ex Cooke, Fl. Bombay, ii. 31 = Inula grantioides.
lacinians, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 50 (= *Aster lacinians*).—Hort.

CALLISTERIS, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1905) 159. *POLEMONIACEAE.*
aggregata, *Greene, l. c.* 159 (= *Cantua aggregata*).—Am. bor.
arizonica, *Greene, l. c.* 160.—Am. bor.
attenuata, *Greene, l. c.*—Am. bor.
Bridgesii, *Greene, l. c.*—Am. bor.
collina, *Greene, l. c.* 159.—Am. bor.
flavida, *Greene, l. c.* 160.—Am. bor.
formosissima, *Greene, l. c.*—Am. bor.
leucantha, *Greene, l. c.* 159.—Am. bor.
pulchella, *Greene, l. c.* 160 (= *Gilia pulchella*).—Am. bor.
texana, *Greene, l. c.*—Am. bor.

CALLISTHENE, Mart. (Vochys.).
mucronata, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. *Mém.* III. 80, nomen.—Bras.
robusta, *Glaz. l. c.*, nomen.—Bras.

CALLITRIS, Vent. (Conifer.).
gracilis, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxvii. 839.—Austral.
Schwarzii, *Marloth, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 206.—Afr. austr.

CALOCARPUM, Pierre = **Lucuma**, A. DC. (Sapot.).
mammosum, Pierre, in Urb. Symb. Antill. v. 98 = L. mammosa.

CALOCEPHALUS, R. Br. (Compos.).
phlegmatocarpus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 614.—Austral.

CALOCHORTUS, Pursh (Liliac.).
amabilis, *Purdy, in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 119.—Am. bor.
concolor, *Purdy, l. c.* 135.—Am. bor.
Dunnii, *Purdy, l. c.* 147.—Am. bor.
Lobbii, *Purdy, l. c.* 122.—Am. bor.
Pringlei, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 472.—Mexico.
shastensis, *Purdy, in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 125.—Am. bor.
striatus, *Parish, in Bull. S. Calif. Acad. Sci.* i. (1902) 112.—Calif.
Vesta, *Gard. Chron.* 1895, ii. 14; *Purdy, in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 139.—Am. bor.

CALODENDRUM, Thunb. (Rutac.).
Eichii, *Engl. Jahrb.* xxxii. 119.—Afr. trop.

CALONYCTION, Choisy (Convolv.).
(IPOMOEA, Linn. [I. K.])
aculeatum, *House, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 590 (= *Convolvulus aculeatus*).—Am. trop.; Ind. occ.
album, *House, l. c.* 591 (= *Ipomoea alba*).—Ind. or. et occ.

CALOPHACA, Fisch. (Legum.).
nigricans, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 178 (= *Cytisus nigricans*).—Ross. austr.; As. cent.

CALOPHYLLUM, Linn. (Guttif.).
Horstii, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* 79 (= *Calysaccion Horstii*).—Borneo.
Sulatri, *Erden. Haut. Ned. Oost. Ind.* Ed. I. 9, nomen.—Celebes.

CALOPOGONIUM, Desv. (Legum.).
sericeum, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 897.—Parag.

CALOSTEMMA, R. Br. (Amaryll.).
Scott-Sellickiana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xv. 629.—Austral.

CALOTIS, R. Br. (Compos.).
inermis, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxvi. 84.—Austral.

CALOTROPIS, R. Br. (Asclep.).
Busseana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 323.—Afr. trop.

CALTHA, Rupp. (Ranuncul.).
elata, *Duthie, in Gard. Chron.* 1905, i. 178.—Ind. or.
obtusa, *Cheesem. in Trans. & Proc. N. Zeal. Inst.* xxxiii. 312.—N. Zel.

CALYCERA, Cav. (Calycer.).
crenata, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 98.—Reg. Argent.
foliosa, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, iii. 207, descr.—Chili.

CALYPSO, Salisb. (Orchid.).
japonica, *Maxim. ex Kom. in Act. Hort. Petrop.* xx. 533.—Japon.

CALYPTOCARPUS, Less. = **Blainvillea**, Cass. (Compos.).
africanus, O. Hoffm. in Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. i. 827.—Afr. trop.
tampicanus, Small, Fl. S. E. U. S. 1274 (= *Oligogyne tampicana*).—Am. bor.

CALYPTRANTHES, Sw. (Myrtac.).
amoena, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 165.—Bras.

CALYPTROCALYX, Blume (Palm.).
Albertisianus, *Becc. in Martelli, Webbia*, 305.—N. Guin.
laxiflorus, *Becc. l. c.* 311.—N. Guin.
leptostachys, *Becc. l. c.* 306.—N. Guin.
pachystachys, *Becc. l. c.* 308.—N. Guin.

CALYPTROTHECA, Gilg (Capparid.).
Stuhlmannii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 230.—Afr. trop.

CALYTHRIX, Labill. (Myrtac.).
[CALYCOTHRIX, Labill. D. T. & H.]
stenophylla, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 18.—Austral.
stipulosa, *Fitzg. l. c.*—Austral.

CAMASSIA, Lindl. (Liliac.).
Suksdorfii, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 307.—Am. bor.

CAMELINA, Crantz (Crucif.).
subappressa, *Haussk. & Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 7.—As. Min.

CAMELLIA, Linn. (Ternstroem.).
[THEA, Linn. D. T. & H.]
Crapnelliana, *Tutch. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 63.—China.

CAMOENSIA, Welw. (Legum.).
Laurentii, *Wildem. Enum. Pl. Laurent*, 103.—Afr. trop.

CAMPANULA, Tourn. (Campanul.).
amabilis, Leichtl. in Bull. Soc. Tosc. Ort. 1904, 339; Kew Bull. 1905, App. iii. 69 = phyctidocalyx.
aurasiaca, *Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis*, 220.—Afr. bor.
axilliflora, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 191 (= *Adenophora axilliflora*).—China.
Baileyi, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 525.—Am. bor.
Beauverdiana, *Fomine, in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, i. 12.—Reg. Caucas.
besenginica, *Fomine, in Act. Hort. Tiflis*, vi. ii. 8.—Reg. Caucas.
californica, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 46 = linnaeifolia.
Choziatowskyi, *Fomine, in Act. Hort. Tiflis*, vi. iii. 38.—Reg. Caucas.
corbariensis, *Rouy, Illustr. Pl. Eur.* t. 494.—Gallia.
cristallocalyx, *Adam. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxiv. 141.—Turcia.
Fergusoni, *Ferguson, in Rev. Hortic.* 1904, 557.—Hybr.
finitima, *Fomine, in Monit. Jard. Bot. Tiflis*, i. 15.—Reg. Caucas.
Fritschii, *Witasek, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien*, i. iii. 90.—Eur.
granatensis, *Witasek, l. c.* 73.—Eur.
gypsicola, *Witasek, l. c.* 70.—Eur.
intercedens, *Witasek, l. c.* 43.—Am. bor.
Kerneri, *Witasek, ex A. Kern. & Fritsch, Sched. Fl. Austr.-Hung.* ix. 38.—Eur.
Kladniana, *Witasek, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien*, i. iii. 39.—Eur.
lancifolia, *Witasek, l. c.* 84.—Eur.
longestyla, *Fomine, in Act. Hort. Tiflis*, vi. iii. 37.—Reg. Caucas.
Loretiana, *Witasek, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien*, i. iii. 88.—Eur.
Macdougalii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 25.—Am. bor.
Marchesettii, *Witasek, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien*, i. iii. 32.—Eur.
mardinensis, *Bornm. & Sint. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 31.—Mesopotam.
Mikoi, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 192 (= *Adenophora Mikoi*).—Eur.
Mrkvickana, *Velen. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 44.—Turcia.
multicaulis, *Witasek, in Meddel. Soc. Faun. Fl. Fenn.* xxix. 209.—Eur.
perpallens, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 193 (= *Adenophora perpallens*).—Eur.
pterocaula, *Haussk. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 34.—As. Min.
pulvinaris, *Haussk. & Bornm. l. c.* 29, descr.—Cappadoc.
racemosa, *Witasek, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien*, i. iii. 34.—Eur.
regina, Alboff, in Nature, liv. (1896) 46; Kew Bull. 1897. App. ii. 47 = mirabilis.
rhomboidea, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 192 (= *Adenophora rhomboidea*).—Sibir.
Richteri, *Borb. l. c.* 193 (= *Adenophora Richteri*).—Sibir.
sardoa, Levier, ex Nym. Consp. Suppl. ii. (1889–90) 209 = macrorhiza.
Scheuchzeri, Marchesetti, Fl. Trieste, 354 = Marchesettii.

CAMPANULA:—
stylocampa, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 525.—Am. bor.
uliginosa, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 885.—Am. bor.
Willkommii, *Witasek, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien*, i. iii. 75.—Eur.

CAMPANULASTRUM, Small, Fl. S. E. U. S. 1141 (1903). *CAMPANULACEAE.*
[CAMPANULA, Linn. D. T. & H.]
americanum, *Small, l. c.* (= *Campanula americana*).—Am. bor.

CAMPANUMOEA, Blume (Campanul.).
Labordei, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 9.—China.

CAMPNOSPERMA, Thw. (Anacard.).
brevipetiolata, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 466.—Ins. Carol.

CAMPOMANESIA, Ruiz & Pav. (Myrtac.).
diversifolia, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 18.—Parag.
Hassleri, *Barb. Rodr. l. c.* 19.—Parag.
resinosa, *Barb. Rodr. l. c.* 20.—Parag.
trichosepala, *Barb. Rodr. l. c.* 19.—Parag.

CAMPTOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 375 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
agrophylla, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 215.—Ind. occ.
alaternifolia, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 192 = O. alternifolia.
castaneifolia, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 375 = O. castaneifolia.
cinerea, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 214.—Ind. occ.
elliptica, Van Tiegh. l. c. (= *Gomphia elliptica*).—Ind. occ.
ilicifolia, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 375 = O. ilicifolia.
Leblondi, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 205.—Guian.
persistens, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 375 (= *Gomphia persistens*).—Bras.
revoluta, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 192 = O. revoluta.
Sagoti, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 211.—Guian.
semiserrata, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 192 = O. semiserrata.
spinulosa, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 214 = O. spinulosa.
striata, Van Tiegh. l. c.—Ind. occ.

CAMPYLOCENTRON, Benth. (Orchid.).
chlororhizum, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 162.—Bras.
filiforme, *Cogn. in Urb. Symb. Antill.* iv. 184 (= *Epidendrum filiforme*).—Ind. occ.; N. Granat.
pygmaeum, *Cogn. l. c.* 183.—Ind. occ.

CAMPYLOCERCUM, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 546 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
Hohenackeri, Van Tiegh. l. c. 1903, 86.—Ind. or.
Metzi, Van Tiegh. l. c.—Ind. or.
neriifolium, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 304 = O. neriifolia.
paucifolium, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 86.—Ind. or.
Zollingeri, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 305.—Java.

CAMPYLOCHNELLA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 378 = **Ochna**, Linn. (Ochnac.).
angustifolia, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 402 = O. angustifolia.
arenaria, Van Tiegh. l. c. = O. arenaria.
katangensis, Van Tiegh. l. c. xviii. 60 = O. katangensis.
roseiflora, Van Tiegh. l. c. = O. roseiflora.
Tholloni, Van Tiegh. l. c. xvi. 401.—Afr. trop.

CAMPYLOPORA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 547 = **Brackenridgea**, A. Gray (Ochnac.).
australiana, Van Tiegh. l. c. = B. australiana.

CAMPYLOSPERMUM, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. (1902) 35 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).

CAMPYLOSPERMUM:—
abbreviatum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xviii. 21.—Malaya.
affine, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 42 = O. affinis.
angulatum, Van Tiegh. l. c. 197 = O. angulata.
angustifolium, Van Tiegh. l. c. = O. angustifolia.
Baroni, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 302.—Madag.
Beccarianum, Van Tiegh. l. c. 301 = O. Beccariana.
Bernieri, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 83.—Madag.
borneense, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 197 = O. borneensis.
Breoni, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 83.—Madag.
breviflorum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 302.—Madag.
calophyllum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 42 = O. calophyllum.
Chapelieri, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 83.—Madag.
Cloiseli, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 302.—Madag.
coriaceum, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 84.—Madag.
Cumingi, Van Tiegh. l. c. 80.—Ins. Philipp.
deltoideum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 301 = O. deltoidea.
densum, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 84.—Madag.
denudatum, Van Tiegh. l. c.—Madag.
Duparquetianum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 43 = O. Duparquetiana.
Dybovskianum, Van Tiegh. l. c. 197.—Afr. trop.
elongatum, Van Tiegh. l. c. 43 = O. elongata.
Hildebrandtii, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 2, 300 = O. Hildebrandtii.
Humbloti, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 197 = O. Humblotii.
Kingi, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 79.—Penins. Mal.
laevigatum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 197 = O. laevigata.
Lastelli, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 83.—Madag.
laxiflorum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 197 = O. laxiflora.
Leschenaultii, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 76.—Zeylan.
malabaricum, Van Tiegh. l. c. 77 (= *Gomphia malabarica*).—Ind. or.
Mannii, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 42 = O. Mannii.
nigricaule, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 84.—Madag.
nigrinerve, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 302.—Madag.
nodosum, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 77.—Zeylan.
obtusifolium, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 197 = O. obtusifolia.
ovale, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 82.—Madag.
perakense, Van Tiegh. l. c. 80.—Penins. Mal.
perseifolium, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 298 = O. perseaefolia.
plicatum, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 78.—Penins. Mal.
retinerve, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xviii. 16.—Ind. or.
revolutum, Van Tiegh. l. c. xvi. 302.—Madag.
Rheedi, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 78.—Ind. or.
rubrum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 302.—Madag.
Rutenbergi, Van Tiegh. l. c.—Madag.
sculptum, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 83.—Madag.
strictum, Van Tiegh. l. c. 79.—Penins. Mal.
sumatranum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 197 = O. sumatrana.
Thouarsi, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 82.—Madag.
Thwaitesi, Van Tiegh. l. c. 77.—Zeylan.
Vahlianum, Van Tiegh. l. c. 76.—Ind. or.
Walkeri, Van Tiegh. l. c.—Zeylan.
Wallichianum, Van Tiegh. l. c.—Ind. or.
zeylanicum, Van Tiegh. l. c. 77 (= *Ochna zeylanica*).—Zeylan.

CAMPYLOSTEMON, Welw. (Celastr.).
Warneckeanum, *Loes. ex Fritsch, in Bot. Centralbl. Beih.* xi. 344.—Afr. trop.

CANARINA, Linn. (Campanul.).
abyssinica, *Engl. Jahrb.* xxxii. 116.—Afr. trop.

CANARIOPSIS, Hochr. Pl. Bogor. Exsicc. (1904) p. ii, sphalm. = **Canarium**, Rumph. (Burser.).

CANARIUM, Rumph. (Burser.).
amboinense, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 55.—Ins. Amboin.
articulatum, *Engl. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 97, nomen.—Celebes.
bersamifolium, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 90.—Ins. Philipp.
calophyllum, *Perkins, l. c.* 91.—Ins. Philipp.
carapifolium, *Perkins, l. c.*—Ins. Philipp.
celebicum, *Engl. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 97, nomen.—Celebes.
connarifolium, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 92.—Ins. Philipp.
emarginatum, *Engl. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 97, nomen.—Celebes.
Englerianum, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 56.—Ins. Amboin.
euryphyllum, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 99.—Ins. Philipp.
Greshoffii, *Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 95.—Celebes.
juglandifolium, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 93.—Ins Philipp.
Koordersianum, *Engl. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 97, nomen.—Celebes.
longissimum, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 58.—Celebes.
lucidum, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 94.—Ins. Philipp.
Minahassae, *Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 96.—Celebes.
pachyphyllum, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 94.—Ins. Philipp.
Perkinsae, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 26.—Ins. Philipp.
polyanthum, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 95.—Ins. Philipp.
polyneurum, *Perkins, l. c.* 96.—Ins. Philipp.
pseudo-commune, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 60.—Hab.?
pseudo-decumanum, *Hochr. l. c.* 61.—Sumatra.
Radlkoferi, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 96.—Ins. Philipp.
Rooseboomii, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 62.—Ins. Kei.
solo, *Engl. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 98, nomen.—Celebes.
stachyanthum, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 97.—Ins. Philipp.
thyrsoideum, *Perkins, l. c.* 98.—Ins. Philipp.
Treubianum, *Engl. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 98, nomen.—Celebes.
Valetonianum, *Engl. ex Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 63.—Celebes.
Vriesеanum, *Engl. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 98, nomen.—Celebes.
Warburgianum, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 99.—Ins. Philipp.

CANAVALIA, DC. (Legum.).
mattogrossensis, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iv. no. 7, 9 (= *Mucuna mattogrossensis*).—Bras.

CANEPHORA, Juss. (Rubiac.).
marojna, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 584.—Madag.

CANHAMO, Perini, Prospectus & Expl. Notice Cult. Canh. Braz. 1 = **Hibiscus**, Linn. (Malvac.).
brasiliensis, Perini, l. c. = H. radiatus, *Cav.*

CANISTRUM, Ed. Morr. (Bromel.).
[AECHMEA, Ruiz & Pav. I. K.]
ingratum, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 3.—Bras.
Schwackeanum, *Mez, l. c.* 4.—Bras.

CANNA, Linn. (Scitam.).
Brittoni, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 695.—Bolivia.
cearensis, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 297.—Bras.

CANSCORA, Lam. (Gentian.).
Kirkii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 558.—Afr. trop.

CANTHIUM, Lam. = **Plectronia**, Linn. (Rubiac.).
abbreviatum, S. Moore, in Journ. Bot. 1903, 398 = P. abbreviata.
bipinnatum, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxvii. 53 (= *Ronabea bipinnata*).—Ins. Philipp.
griseum, King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. 62.—Penins. Mal.
Kaessneri, S. Moore, in Journ. Bot. 1905, 351.—Afr. trop.
majus, Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas, t. 487 B.—Madag.
molle, King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. 60.—Penins. Mal.
pauciflorum, King & Gamble, l. c. 58.—Penins. Mal.
pseudoverticillatum, S. Moore, in Journ. Bot. 1905, 352.—Afr. trop.
pubipes, S. Moore, l. c.—Afr. trop.
transvaalense, S. Moore, l. c. 1903, 398.—Afr. austr.

CAPNITES, Dum. = **Corydalis**, Vent. (Papaver.).
brevidens, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. 7.—Gallia.
brevis, Jord. l. c. 5.—Gallia.
corsica, Jord. l. c. 8.—Corsica.
crenulata, Jord. l. c. 7.—Eur.
erythrocarpa, Jord. l. c. 6.—Gallia.
integriloba, Jord. l. c. 7.—Corsica.
macrostachys, Jord. l. c. 6.—Eur.
peduncularis, Jord. l. c.—Gallia.
pumila, Jord. l. c. 8.—Hab.?
tenuiloba, Jord. l. c. 5.—Eur.

CAPNOREA, Rafin. = **Hesperochiron**, S. Wats. (Hydrophyll.).
californica, Greene, Pittonia, v. 44 (= *Ourisia californica*).—Calif.
campanulata, Greene, l. c. 52.—Calif.
fulcrata, Greene, l. c. 51.—Am. bor.
hirtella, Greene, l. c.—Am. bor.
incana, Greene, l. c. 49.—Am. bor.
lasiantha, Greene, l. c. 47.—Am. bor.
leporina, Greene, l. c. 45.—Calif.
macilenta, Greene, l. c. 48.—Am. bor.
nervosa, Greene, l. c. 51.—Am. bor.
pumila, Greene, l. c. 50.—Am. bor.
strigosa, Greene, l. c. 45.—Calif.
villosula, Greene, l. c. 52.—Am. bor.
Watsoniana, Greene, l. c. 44 = H. californica.

CAPPARIS, Tourn. (Capparid.).
acuminata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. i. V. 87.—Afr. trop.
cerasifera, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 214.—Afr. trop.
collina, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 686.—Venez.
Duchesnei, *Wildem. Enum. Pl. Laurent.* 87.—Afr. trop.
elaeagnoides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 215.—Afr. trop.
lilacina, *Gilg, l. c.* 215.—Afr. trop.
oblongata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 15.—Ins. Philipp.
Oliveriana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 216.—Afr. trop.
sansibarensis, *Gilg, l. c.* 213.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 35.—Afr. trop.
Warneckei, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 216.—Afr. trop.
Welwitschii, *Gilg, l. c.* 214.—Afr. trop.
zizyphoides, *Gilg, l. c.* 216.—Afr. trop.

CAPRIFOLIUM, Tourn. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).
californicum, Howell, Fl. N. W. Am. i. 283 = L. californica.
dimorphum, Kuntze, Rev. Gen. i. 274 = L. etrusca.

CARAIPA, Aubl. (Ternstroem.).
minor, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 434.—Bras.
paraensis, *Huber, l. c.* 432.—Bras.

CARALLUMA, R. Br. (Asclep.).
affinis, *Wildem. in Ic. Hort. Then.* t. 167.—Reg. Medit.
atrosanguinea, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 486 (= *Stapelia atrosanguinea*).—Afr. trop.
caudata, *N. E. Br. l. c.*—Afr. trop.
inversa, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1903, i. 354.—Afr. austr.
lateritia, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 486.—Afr. trop.
Lugardi, *N. E. Br. l. c.* 487.—Afr. trop.
maculata, *N. E. Br. l. c.*—Afr. trop.
Marlothii, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1903, ii. 414.—Afr. austr.
priogonium, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 327.—Afr. trop.

CARALLUMA:—
robusta, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 482.—Afr. trop.
Rosengrenii, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905. 91.—Socotra.
Simonis, *Berger, in Monatsschr. Kakt.* 1904, 6.—Hab.?
tombuctuensis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 622 (= *Boucerosia tombuctuensis*).—Afr. trop.
torta, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 142.—Arabia.
vittata, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 488.—Afr. trop.

CARANDAS, Rumph. = **Carissa**, Linn. (Apocyn.).
Arduina, S. Moore, in Journ. Bot. 1903, 403 = Carissa Arduina.

CARAPA, Aubl. (Meliac.).
borneensis, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 574.—Borneo.

CARDAMINE, Tourn. (Crucif.).
acuminata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 237.—Am. bor.
africana, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1873) 277 = anemonoides.
amphibia, Bub. Fl. Pyren. iii. 147 = Nasturtium amphibium.
anemonoides, *O. E. Schulz, in Engl. Jahrb.* xxxii. 340.—Japon.
angustata, *O. E. Schulz, l. c.* 349 (= *Dentaria heterophylla*).—Am. bor.
Aschersoniana, *O. E. Schulz, l. c.* 410.—Venez.
aspera, Bub. Fl. Pyren. iii. 149 = Nasturtium asperum.
bipinnata, *O. E. Schulz, in Engl. Jahrb.* xxxii. 344 (= *Dentaria bipinnata*).—Reg. Caucas.
Blaisdellii, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 146.—Am. bor.
callitrichoides, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 211.—Patag.
cardiophylla, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 280, *non Greene*.—Am. bor.
crenata, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 156 (1903) (= *Sisymbrium crenatum*).—Calif.
Cymbalaria, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 289.—Reg. Argent.
denudata, *O. E. Schulz, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 46.—China.
digitata, *O. E. Schulz, l. c.* xxxii. 372.—Eur.
Engleriana, *O. E. Schulz, l. c.* 407.—China.
finitima, *O. E. Schulz, l. c.* 537.—Austral.
flagellifera, *O. E. Schulz, l. c.* 405.—Am. bor.
fragariifolia, *O. E. Schulz, l. c.* 448.—China.
heterophylla, *O. E. Schulz, l. c.* 487 (= *Sisymbrium heterophyllum*).—N. Zel.; Oceania.
Holtziana, *Engl. & Schulz, ex O. E. Schulz, l. c.* 416.—Afr. trop.
hyperborea, *O. E. Schulz, l. c.* 550.—Sibir. or.
infausta, *Greene, in Pittonia*, iv. (1901) 307.—Am. bor.
innovans, *O. E. Schulz, in Engl. Jahrb.* xxxii. 417.—Am. cent.
insignis, *O. E. Schulz, l. c.* 439.—China.
laevigata, Bub. Fl. Pyren. iii. 148 = Sisymbrium laevigatum.
leucantha, *O. E. Schulz, in Engl. Jahrb.* xxxii. 403 (= *Dentaria leucantha*).—As. or.
mexicana, *O. E. Schulz, l. c.* 461.—Mexic.
microphylla, *O. E. Schulz, l. c.* 342 (= *Dentaria microphylla*).—Reg. Caucas.
microzyga, *O. E. Schulz, l. c.* 545.—As. cent.; China.
montana, Bub. Fl. Pyren. iii. 147 = Nasturtium pyrenaicum.
multifolia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 238.—Am. bor.
occidentalis, *O. E. Schulz, in Engl. Jahrb.* xxxii. 539.—Am. bor. occ.
palustris, Bub. Fl. Pyren. iii. 147 = Nasturtium palustre.
penduliflora, *O. E. Schulz, in Engl. Jahrb.* xxxii. 538.—Calif.
polyphylla, *O. E. Schulz, l. c.* 366 (= *Dentaria polyphylla*).—Eur.
savensis, *O. E. Schulz, l. c.* 355.—Balkan.
Schinziana, *O. E. Schulz, l. c.* 508.—Japon.
sylvestris, Bub. Fl. Pyren. iii. 148 = Nasturtium sylvestre.
tangutorum, *O. E. Schulz, in Engl. Jahrb.* xxxii. 360.—China.
tasmanica, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 305.—Austral.
tenella, *O. E. Schulz, in Engl. Jahrb.* xxxii. 389.—Am. bor.
thyrsoidea, *O. E. Schulz, l. c.* 591.—Chili.

CARDAMINE :—
Urbaniana, *O. E. Schulz, in Engl. Jahrb.* xxxii. 396.—China.
violifolia, *O. E. Schulz, l. c.* 410.—China.

CARDIANDRA, Sieb. & Zucc. (Saxifrag.).
sinensis, *Hemsl. in Gard. Chron.* 1903, i. 82.—China.

CARDIOSPERMUM, Linn. (Sapind.).
pterocarpum, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 806.—Parag.

CARDUNCELLUS, Adans. (Compos.).
gracilis, *Lojac. Fl. Sic.* ii. i. 172.—Sicil.
multifidus, *Lojac. l. c.* 173 (= *Carthamus multifidus*).—Sicil.

CARDUUS, Tourn. (Compos.).
acaulescens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 508.—Am. bor.
americanus, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
araneosus, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 612.—Am. bor.
austrinus, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1307.—Am. bor.
bipinnatus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 5 (= *Cnicus bipinnatus*).—Am. bor.
Borderi, *Rouy, Fl. Fr.* ix. 92.—Hybr.
calcareus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 5 (= *Cnicus calcareus*).—Am. bor.
callilepis, *Greene, in Proc. Acad. Philad.* 1892, 358.—Calif.
Centaureae, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 507.—Am. bor.
ciliolatus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 5.—Am. bor.
clavatus, *A. A. Heller, l. c.* (= *Cnicus clavatus*).—Am. bor.
coloradensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 132.—Am. bor.
diffusus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 6 (= *Cnicus diffusus*).—Am. bor.
erosus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 507.—Am. bor.
flaccidus, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1307.—Am. bor.
floccosus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 133.—Am. bor.
glaberrimus, *Lojac. Fl. Sic.* ii. i. 167.—Sicil.
griseus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 509.—Am. bor.
Helleri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1307.—Am. bor.
hesperius, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 6 (= *Cnicus hesperius*).—Am. bor.
intermedius, *Lojac. Fl. Sic.* ii. i. 167.—Sicil.
Lesurinus, *Rouy, Fl. Fr.* ix. 90.—Hybr.
lusitanicus, *Rouy, Illustr. Pl. Eur.* sub t. 437.—Lusitan.
Macounii, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 38.—Am. bor.
maritima, *Elmer, in Contr. Bot. Gaz.* xxxix. 45.—Calif.
membranaceus, *Lojac. Fl. Sic.* ii. i. 168.—Sicil.
nidulus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 6 (= *Cnicus nidulus*).—Am. bor.
nutantiformis, *Shuttlew. ex Rouy, Fl. Fr.* ix. 90.—Hybr.
oblanceolatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 510.—Am. bor.
oreophilus, *Rydb. l. c.* 509.—Am. bor.
Osterhoutii, *Rydb. l. c.* 1905, 131.—Am. bor.
perplexans, *Rydb. l. c.* 132.—Am. bor.
personatoformis, *Rouy, Fl. Fr.* ix. 83.—Hybr.
pinetorum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1308.—Am. bor.
pulcherrimus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 510.—Am. bor.
revolutus, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1307.—Am. bor.
ruwenzoriensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 354.—Afr. trop.
rhodopeus, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 28, 7.—Bulgar.
sinensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 143.—China.
spathulatus, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 612.—Am. bor.
Therioti, *Rouy, Fl. Fr.* ix. 72.—Hybr.
Tracyi, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 133.—Am. bor.
Traunsteineri, *Rouy, Illustr. Pl. Eur.* t. 461.—Hybr.
Vaseyi, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 61 = inamoenus.
vittatus, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 439.—Am. bor.

CAREX, Dill. (Cyper.).
accedens, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* clxvi. (1903) 457.—Am. bor.
acrogyna, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* (1901) 201.—Japon.

CAREX :—
aenea, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvii. 480.—Am. bor.
agglomerata, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 269.—China.
albonas, *C. B. Clarke, l. c.* 270.—China.
alliiformis, *C. B. Clarke, l. c.*—China.
aphyllopus, *Kuek. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 53.—Japon.
appendiculata, *Kuek. l. c.* 54.—As. bor. or.
appropinquata, *Schumacher, Enum. Pl. Saell.* i. (1801) 266.—Scand.
arcatica, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 336.—As. cent.
Argyi, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agri. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 78.—China.
argyrostachys, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 27.—Japon.
bakanensis, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 203.—Japon.
basiflora, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 274.—China.
bengalensis, Boeck. ex Kuek. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 52 = pyramidalis.
bonanzensis, *Britton, in Britton & Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 160.—Am. bor.
borneensis, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 14.—Borneo.
bovina, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 702.—Am. bor.
brachypoda, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* clxx. 302.—Am. bor.
Bremuri, *Christ, ex Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 411.—Reg. arctic.
brevicuspis, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 277.—China.
burejana, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 368.—Sibir.
Cajanderi, *Kuek. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xvii. 115, nomen.—Sibir.
campylocarpa, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* clxx. 304.—Am. bor.
Candolleana, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* x. (1901) 273.—Japon.
cardioglochis, *Léveillé & Vaniot, l. c.* xi. (1902) 31.—Japon.
Castriferrei, *Waisb. in Magyar Bot. Lap.* iv. 63, 75.—Hybr.
caulorrhiza, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 179.—Japon.
Cavaleriei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agri. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 79.—China.
cercidascus, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 279.—China.
chalciolepis, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* clxvi. 28.—Am. bor.
Chamissonis, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 301.—Am. bor.
chimaphila, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* clxvi. 33.—Am. bor.
chionophila, *Holm, l. c.* 457; clxvii. 310.—Am. bor.
chloroleuca, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 398.—As. or.
chorgosica, *Meinsh. l. c.* 381.—Turkestan.
chrysoleuca, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* clxvi. 454; clxvii. 302.—Calif.
cinerascens, *Kuek. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1017.—Japon.
Clarkeana, *Kuek. l. c.* iv. 52.—Penins. Mal.
Comari, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 16.—Eur.
consimilis, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* clxvi. 457; clxvii. 310.—Am. bor.
Crawfordii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvii. 469.—Am. bor.
cryptochlaena, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* clxx. 305.—Am. bor.
cyclocarpa, *Holm, l. c.* clxvi. 457; clxvii. 310.—Am. bor.
cyrtosaccus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 524.—Afr. trop.
desertorum, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 19.—Turkestan.
dineuros, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 283.—China.
dispalatha, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 177.—Japon.
dives, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* clxvii. 312; clxviii. 19.—Am. bor.
ducensis, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 367.—Sibir.

CAREX :—
ebenea, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 260.—Am. bor.
ecuadorica, *Kuek. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxviii. 7.—Ecuador.
elachycarpa, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvii. 492.—Am. bor.
Englerana, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1901, 274.—Japon.
eriocarpa, *Hausskn. & Kuek. ex Kuek. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 57.—Armen.
eurycarpa, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* clxx. 303.—Am. bor.
explens, *Kuek. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1017.—Corea.
Fernaldiana, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1901, 276.—Japon.
flabellata, *Léveillé & Vaniot, l. c.* 1902, 111.—Japon.
floribunda, *Meinsk. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 402.—As. or.
foliata, F. Schmidt, ex Meinsh. l. c. 365 = pilosa.
foraminata, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 265.—China.
Forbesii, *C. B. Clarke, l. c.* 286.—China.
formosensis, *Léveillé & Vaniot, in Mém. Soc. Sci. Nat. Math. Cherbourg*, xxxv. (1905) 216.—Formosa.
Franchetiana, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1901, 268.—Japon.
Fritschii, *Waisb. in Magyar Bot. Lap.* iv. 61, 73.—Eur.
fuscotincta, *Merino, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 467.—Hispan.
fuscovaginata, *Kuek. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 50.—Sibir.
gallaecica, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 96; *et ex Merino, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 406.—Hispan.
Gandogeri, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xv. (1905) 184.—Hispan.
gembolensis, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 10.—Java.
ginsiensis, *Waisb. in Magyar Bot. Lap.* iv. 62, 74.—Hybr.
Giraldiana, *Kuek. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 10.—China.
glaberrima, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 369.—Sibir.
glandulifolia, *Kuek. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 57.—China.
glaucaeformis, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 389.—Sibir.
Goodenoughii, *Aschers. & Graebn. Mittel. Europ. Fl.* ii. pt. II. 94 = C. Goodenowii.
grandiligulata, *Kuek. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 9.—China.
Guffroyana, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* x. (1901) 203.—Japon.
gymnoclada, *Holm, in Amer. Journ. Sci.* clxiv. 424.—Am. bor.
haematostachys, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 305.—Corea.
hakodatensis, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 206.—Japon.
Hancei, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 288.—China.
Havilandi, *C. B. Clarke, l. c.* xxxvii. 13.—Borneo.
heleochariformis, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 202.—Japon.
Hendesii, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1903, 12.—Japon.
Herbaudiana, *Léveillé & Vaniot, l. c.* 1901, 275.—Japon.
hirtifructus, *Kuek. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1163.—Japon.
hololasius, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* 1901, 280.—Japon.
Hudsonii, A. Bennett, in London Cat. Pl. ed. ix. 41 = stricta.
hypochlora, *Freyn, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 26.—As. bor.
ichangensis, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 290.—China.
immanis, *C. B. Clarke, l. c.*—China.
jaluensis, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xx. 369.—As. bor.
jizogatakensis, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 203.—Japon.
Karelini, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 380.—As. cent.
katahdinensis, *Fernald, in Rhodora*, iii. 171.—Am. bor.
kattaeana, *Kuek. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1161.—Japon.

CAREX:—

Kinashii, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 204.—Japon.
Kingiana, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* x. (1901) 272.—Japon.
koreana, *Kom.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 446.—Corea.
Korshinskii, *Kom. l. c.* xx. 394.—As. bor.
Kiausipali, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 359.—Sibir.
Kuckenthaliana, *Appel & Brueckn.* in *Ber. Bayer. Bot. Ges.* i. (1891) 75.—Hybr.
lacunarum, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxvi. 458; clxvii. 316.—Calif.
laeviculmis, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 326.—Sibir.
lancifolia, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 298.—China.
latinervia, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* x. (1901) 219.—Japon.
latisquamea, *Kom.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 447.—As. or.
Legendrei, *Léveillé & Vaniot*, in *Rev. Sci. Limousin*, 1904, *ex Mém. Soc. Sci. Nat. Math. Cherbourg*, xxxv. (1905) 216.—Formosa.
lepidopristis, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* x. (1901) 198.—Japon.
leptocladus, *C. B. Clarke*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 519.—Afr. trop.
leptosaccus, *C. B. Clarke*, *l. c.* 516.—Afr. trop.
leucodonta, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxvi. 461.—Am. bor.
limnaea, *Holm*, *l. c.* clxx. 301.—Am. bor.
limnocharis, *Holm*, *l. c.* clxvi. 457; clxvii. 311.—Am. bor.
Litwinovii, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 59.—Turkestan.
Loheri, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 14.—Ins. Philipp.
macrophylla, *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* xxx. 381.—Afr. trop.
macroura, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 404.—Sibir.
madoerensis, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 15.—Java.
Maidenii, *Gandoger*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 392.—Austral.
mainensis, *Porter*, in *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 193.—Am. bor.
malacocarpa, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* x. (1901) 200.—Japon.
Malinvaldi, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 204.—Japon.
mandshurica, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 394.—As. or.
Martini, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 57.—China.
micrantha, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1018.—Corea.
microchaeta, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxvi. 457; clxvii. 305.—Am. bor.
millegrana, *Holm*, *l. c.* 311.—Am. bor.
mira, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1161.—Japon.
mollissima, *Christ, ex Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 413.—Ross.
multipes, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* x. (1901) 271.—Japon.
Navasi, *Merino*, in *Bol. Soc. Arag.* i. 65.—Hispan.
neo-guineensis, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 12.—N. Guin.
nesophila, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxvi. 458; clxvii. 315.—Am. bor.
neurochlaena, *Holm*, *l. c.* 453; *l. c.* 301.—Am. bor.
Nicoloffi, *Pampan.* in *Ann. di Bot. Roma*, i. 135.—Hybr.
nyasensis, *C. B. Clarke*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 519.—Afr. trop.
odontostoma, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1162.—Japon.
Olivieri, *Léveillé*, in *Rev. Sci. Bourb. Centr. Fr.* xvii. (1904) 166.—China.
omskiana, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 340.—Sibir.
ontakensis, *Léveillé*, in *Mém. Soc. Sci. Nat. Math. Cherbourg*, xxxv. (1905) 218.—Japon.
orientalis, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 393.—Turkest.
oronensis, *Fernald*, in *Proc. Amer. Acad.* xxxvii. 471.—Am. bor.

CAREX:—

oxycarpa, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxx. 303.—Am. bor.
pachystoma, *Holm*, *l. c.* 302.—Am. bor.
Peiktusani, *Kom.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 445.—Corea.
peniculacea, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 110.—Japon.
peucophila, *Holm*, in *U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 290.—Mexic.
phaeolepis, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxvi. 464; clxvii. 302.—Am. bor.
physochlaena, *Holm*, *l. c.* 464; *l. c.* 317.—Am. bor.
planiculmis, *Kom.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 448.—As. or.
platycarpos, *Reichb.* in *Moessl. Handb.* ed. II. 1656.—Eur.
pleiorhiza, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 205.—Japon.
plena, Clairv. Man. d'Herbor. 292 = capillaris.
pollens, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 305.—China.
polyschoena, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 9.—Japon.
Pishliana, *Junge*, in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xxii. *Beiheft* 71.—Hybr.
Prainii, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 51 (1903).—Reg. Himal.
Prainii, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 305 (1904).—Ind. or.; China.
prionophylla, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxiv. 423.—Am. bor.
pseudoatrata, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 346.—Ross.
pseudochinensis, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 306.—Corea.
pseudo-diandra, *Waisb.* in *Magyar Bot. Lap.* iv. 60, 72.—Eur.
pseudo-hirta, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 371.—Sibir.
pseudostrigosa, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 109.—Japon.
pseudo-vesicaria, *Léveillé & Vaniot*, *l. c.* 150.—Japon.
pulchella, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* xvi. 457.—Am. bor.
pyramidalis, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 52.—Madag.
radiata, *Small*, *Fl. S. E. U. S.* 218.—Am. bor.
Regelii, *C. B. Clarke*, *ex O. Fedtsch. Pl. Pamir*, 71.—As. cent.
Reichenbachiana, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 60.—China.
remotaeformis, *Kom.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 444.—As. or.
reniformis, *Small*, *Fl. S. E. U. S.* 220.—Am. bor.
rhomboidea, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxvi. 35.—Am. bor.
rhynchachaenium, *C. B. Clarke*, in *Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 5.—Ins. Philipp.
ruffa, Brot. Fl. Lusit. i. (1804) 66 = riparia.
rugulosa, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 58.—Japon.
Sadleri, *E. F. Linton*, in *Journ. Bot.* 1898, 43.—Brit.
saturata, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 12.—Borneo.
scaberrima, *C. B. Clarke*, *l. c.* 10.—Ins. Philipp.
scabrirostris, *Kuek.* in *Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 9.—China.
scaposa, *C. B. Clarke*, in *Bot. Mag.* t. 6940.—China.
Schkuhriana, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 59.—China.
scitaeformis, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1162.—Japon.
scopulorum, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxiv. 422.—Am. bor.
seiskoensis, *Freyn*, in *Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 27.—As. bor.
semiplena, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1018.—Japon.
setosa, *E. C. Howe*, in *Peck, Rep. N. York Mus. Nat. Hist.* xlviii. (1894) 138.—Am. bor.
Shriveri, *Britton*, *Man. Fl. N. U. S.* 208.—Am. bor.
simulans, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 310.—China.
Sodiroi, *Kuek.* in *Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxviii. 7.—Ecuador.
sorachensis, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 205.—Japon.
soyaensis, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 58.—Japon.

CAREX:—

sphacelata, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxvi. 457; clxvii. 309.—Am. bor.
stolonifera, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 27.—Japon.
stupenda, *Léveillé & Vaniot*, *l. c.* x. (1901) 195.—Japon.
subalpina, *Bruegger, ex Appel*, in *Ber. Bayer. Bot. Ges.* i. (1891) 76.—Bavaria.
subantarctica, *Kraenzl. & Speg.* in *Anal. Mus. Buenos Ayres*, vii. 150.—Patag.
subumbellata, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 395.—As. or.
suifunensis, *Kom.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 445.—As. or.
sumatrensis, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 13.—Sumatra.
taldycola, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 339.—Turkest.
tasmanica, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 59.—Tasman.
tegulata, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 306.—Corea.
tenuiformis, *Léveillé & Vaniot*, *l. c.* 104.—Japon.
terniflora, *Maxim. ex Matsum. Ind. Pl. Jap.* ii. 136.—Japon.
Timmiana, *Junge*, in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xxii. *Beiheft*. 70.—Hybr.
Tonnerrei, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 314.—China.
Tourleti, *Gill. ex Tourl.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 313.—Hybr.
truncatigluma, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 315.—China.
tuminensis, *Kom.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 444.—Corea.
turrita, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 13.—Ins. Philipp.
Turuli, *Simk.* in *Magyar Bot. Lap.* iii. 82, 87.—Eur.
udensis, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 366.—Ross.
Underwoodii, *Britton*, in *Torreya*, v. 10.—Ind. occ.
unisexualis, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 316.—China.
ussuriensis, *Kom.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 443.—As. or.
vagans, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxvi. 454; clxvii. 301.—Am. bor.
Vanioti, *Léveillé*, in *Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 108.—Japon.
venustula, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxvi. 457; clxvii. 304.—Am. bor.
verecunda, *Holm*, *l. c.* clxvi. 461.—Am. bor.
vesicata, *Meinsh.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 367.—Sibir.
vespertina, *Howell*, *Fl. N. W. Amer.* i. 705.—Am. bor.
vitrea, *Holm*, in *Amer. Journ. Sci.* clxvi. 454; clxvii. 302.—Calif.
Warburgiana, *Kuek.* in *Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1162.—Formosa.
Wanliana, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Acad. Géog. Bot.* x. (1901) 276.—Japon.
Wilfordii, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 318.—China; Japon.
Williamsii, *Britton*, in *Britton & Rydb.* in *Bull. N. Y. Bot. Gard.* ii. 159.—Am. bor.
Wolteri, *Gross*, in *Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 23.—Hybr.
xiphium, *Kom.* in *Act. Hort. Petrop.* xviii. 446.—As. or.
Yabei, *Léveillé & Vaniot*, in *Bull. Soc. Agri. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 79.—China.
yukonensis, *Britton*, in *Britton & Rydb.* in *Bull. N. Y. Bot. Gard.* ii. 159.—Am. bor.

CARINTA, W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. (1905) 216 = **Geophila**, D. Don (Rubiac.).
herbacea, W. F. Wight, l. c. 216 = G. herbacea.

CARISSA, Linn. (Apocyn.).
tetramera, *Stapf*, in *Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 91 (= *Arduina tetramera*).—Afr. trop.

CARLESIA, Dunn, in Hook. Ic. Pl. t. 2739 (1902). *UMBELLIFERAE*.
sinensis, *Dunn*, *l. c.*—China.

CARLINA, Linn. (Compos.).
brevibracteata, *Asnav.* in *Magyar Bot. Lap.* iii. 4.—Turcia.

CARLOWRIGHTIA, A. Gray (Acanth.).
californica, *T. S. Brandegee*, in *Zoe*, v. (1908) 172.—Calif.

CARLUDOVICA, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).
caribaea, *Cowell, in Torreya*, iii. 103.—Ind. occ.
scandens, *Cowell, l. c.*—Ind. occ.

CAROLINELLA, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2726 (1902). *PRIMULACEAE.*
* cordifolia, *Hemsl. l. c.* t. 2775.—China.
Henryi, *Hemsl. l. c.* t. 2726.—China.
obovata, *Hemsl. l. c.* sub t. 2775.—China.

CAROXYLON, Thunb. = **Salsola**, inn. (Chenopod.).
genistoides, Pan, in Bol. Soc. Arag. ii. 71 = S. genistoides.

CARPHA, Banks & Soland. (Cyperae.).
antarctica, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 40.—Chili.
Emini, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 483 (= *Oreograstis Emini*).—Afr. trop.
graciliceps, *C. B. Clarke, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 81.—Austral.
Schlechteri, *C. B. Clarke, in Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* i. 37, t. 9.—Afr. austr.

CARPHOCHAETE, A. Gray (Compos.).
Schaffneri, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 34.—Mexic.

CARPINUS, Linn. (Cupul.).
grossesrrata, *H. Winkl. in Engl. Pflanzenreich Betul.* 40.—Persia.
hybrida, *H. Winkl. l. c.*—Reg. Caucas.
Londoniana, *H. Winkl. l. c.* 32.—China.
macrocarpa, *H. Winkl. l. c.* 38.—Persia.
oxycarpa, *H. Winkl. l. c.* 31.—As. cent.
Paxii, *H. Winkl. l. c.* 35.—China.
pinfaensis, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 142.—China.
schuschaensis, *H. Winkl. in Engl. Pflanzenreich Betul.* 32.—As. cent.
stipulata, *H. Winkl. l. c.* 35.—China.

CARPODINUS, R. Br. (Apocyn.).
chylorrhiza, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi, Exped.* 336.—Afr. trop.
Eetveldeana, *Wildem. in Wildem. & Gentil, Lianes Caoutch. Congo*, 107.—Afr. trop.
Gentilii, *Wildem. Obs. Apocyn. Latex*, 26.—Afr. trop.
glabra, *Pierre, ex Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 81.—Afr. trop.
globulifera, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 316.—Afr. trop.
Klainei, *Pierre, ex Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 79, descr.—Afr. trop.
lactea, K. Schum. ex Stapf, l. c. 81 = subrepanda.
landolphioides, *Stapf, l. c.* 80 (= *Clitandra landolphioides*).—Afr. trop.
leucantha, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 338.—Afr. trop.
trichanthera, *Pierre, ex Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 62.—Afr. trop.

CARPOLOBIA, G. Don (Polygal.).
Zenkeri, Guerke, ex Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 86 = Atroxima Zenkeri.

CARTHAMUS, Tourn. (Compos.).
baeticus, *Lara, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 37 (= *Kentrophyllum baeticum*).—Hispan.
Davaucii, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 202.—Afr. bor.
Pomelianus, *Batt. l. c.*—Afr. bor.
Reboudianus, *Batt. l. c.*—Afr. bor.

CARTONEMA, R. Br. (Commelin.).
Baileyi, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 1656.—Austral.

CARUELIA, Parl. = **Ornithogalum**, Tourn. (Liliac.).
algeriensis, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 30.—Afr. bor.
hipponensis, Jord. l. c. 31.—Afr. bor.
macrocoma, Jord. l. c. 32.—Afr. bor.
ochroleuca, Jord. l. c. 31.—Afr. bor.
stenopetala, Jord. l. c.—Afr. bor.

CARUM, Rupp. (Umbellif.).
alaicum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 127.—As. cent.
Korshinskii, *Lipsky, l. c.* 128.—As. cent.

CARUM:—
kuriense, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 63.—Socotra.
meoides, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 678 (= *Silaus meoides*).—Graecia.
montanum, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 91.—Am. bor.
platycarpum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 132.—As. cent.
sogdianum, *Lipsky, l. c.* 118.—As. cent.
Tamerlani, *Lipsky, l. c.* 120.—As. cent.
trichocarpum, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 64.—Socotra.
turkestanicum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 113.—As. cent.
Velenovskyi, *Rohl. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 17, 34.—Montenegr.

CARVALHOA, K. Schum. (Apocyn.).
petiolata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 317.—Afr. trop.

CARYOPITYS, Small, Fl. S. E. U. S. 29 (1903). *PINACEAE.*
[Pinus, Linn. D. T. & H.]
edulis, *Small, l. c.* (= *Pinus edulis*).—Am. bor.
monophylla, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 597 (= *Pinus monophyllus*).—Am. bor.

CARYOTA, Linn. (Palm.).
Merrillii, *Becc. in Martelli, Webbia*, 333.—Ins. Philipp.

CASEARIA, Jacq. (Samyd.).
bahamensis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 323.—Ind. occ.
camporum, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 427.—N. Granat.
cauliflora, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 469.—Ins. Carol.
flexicaulis, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 320.—N. Guin.
luzonensis, *Warb. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iii. vi A. 51, fig. 19.—Ins. Philipp.
maculata, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 161.—Reg. Amaz.
solida, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 46.—Ins. Philipp.
spiralis, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 691.—Venez.
tarapotina, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 161.—Peruv.

CASSELIA, Nees & Mart. (Verben.).
Hassleri, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1165.—Parag.
hymenocalyx, *Briq. l. c.*—Parag.

CASSIA, Tourn. (Legum.).
anisopetala, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 209.—Am. cent.
apuensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 827.—Parag.
artensis, *Beauvis. Gen. Montroux.* 19 (= *Macleayia multiflora*).—N. Caled.
Bartoni, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ix. 410.—N. Guin.
Bearesana, *Holmes, in Pharm. Journ.* lxviii. (1902) 42.—Afr. trop.
caribaea, *Northr. in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 39.—Ins. Baham.
Droogmansiana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 47.—Afr. trop.
granitica, *Baker f. in Journ. Bot.* 1905, 45.—Afr. trop.
guaranitica, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. iv. 824.—Parag.
Holwayana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 301.—Mexic.
inaguensis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 443.—Ind. occ.
insignis, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 24.—Guian.
Keilhuileana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 48.—Afr. trop.
leptadenia, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 238.—Texas; Mexic.
longicoma, *Greenm. l. c.* xxxix. 79.—Mexic.
Medsgeri, *Shafer, in Torreya*, iv. 179.—Am. bor.
mirabilis, *Urb. Symb. Antill.* iv. 276 (= *Chamaecrista mirabilis*).—Ind. occ.
morelensis, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 79.—Mexic.

CASSIA:—
piribebuiensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 825.—Parag.
Quiedondilla, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 272.—Mexic.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 49.—Afr. trop.

CASSINIA, R. Br. (Compos.).
phylicaefolia, *Wood, Natal Plants*, t. 355 (= *Rhynea phylicaefolia*).—Afr. austr.

CASSIPOUREA, Aubl. (Rhizophor.).
caesia, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 97.—Afr. trop.
parvifolia, *Stapf, l. c.* (= *Dactylopetalum parvifolium*).—Afr. trop.
schizocalyx, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 122.—Afr. trop.

CASTANEA, Tourn. (Cupulif.).
armata, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1029 (= *Quercus armata*).—Siam.
Bodinieri, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 142.—China.
Fauriei, *Léveillé & Vaniot, l. c.*—Japon.

CASTANOPSIS, Spach (Cupul.).
[Castanea, Adans. D. T. & H.]
Eyrei, *Tutch. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 68 (= *Quercus Eyrei*).—China.

CASTANOSPERMUM, A. Cunn. (Legum.).
Cunninghamii, *J. M. Wood, in Rep. Natal Bot. Gard.* 1903-4, 20, nomen.—Hab.?

CASTILLEJA, Mutis (Scrophul.).
Brooksii, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 288.—Am. bor.
brunnescens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 643.—Am. bor.
californica, *Abrams, in Bull. S. Calif. Acad. Sci.* i. (1902) 68.—Calif.
camporum, *Howell, Fl. N. W. Am.* I. 532.—Am. bor.
Clementis, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 212.—Calif.
cognata, *Greene, Pl. Baker.* iii. 22.—Am. bor.
collina, *Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 231.—Am. bor.
Culbertsonii, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 78.—Calif.
disticha, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 289.—Am. bor.
exilis, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 100.—Am. bor.
glandulosa, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 247.—Mexic.
Gleasoni, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxix. 51.—Calif.
guadalupensis, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 166 (1903).—Calif.
katakyptusa, *Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 286.—Am. cent.
linearis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 25.—Am. bor.
luteovirens, *Rydb. l. c.* 26.—Am. bor.
Martini, *Abrams, in Bull. S. Calif. Acad.* i. 69.—Calif.
nana, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 289.—Am. bor.
obtusiloba, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 644.—Am. bor.
patriotica, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 56.—Mexic.
pilifera, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 246.—Am. bor.
Pringlei, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 56.—Mexic.
puberula, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 644.—Am. bor.
Purpusi, *T. S. Brandegee. in Zoe*, v. 181 (1904).—Mexic.
scabrida, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 523.—Am. bor.
spiralis, *Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 412.—Am. bor.
tapeinoclada, *Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 285.—Am. cent.
trinervis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 26.—Am. bor.
trisecta, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 78.—Calif.
wyomingensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 502.—Am. bor.

CASTILLOA, Cervant. (Urtic.).
australis, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2676.—Peruv.
fallax, O. F. Cook, in Science, n. s. xviii. 438.—Am. cent.
lactiflua, O. F. Cook, l. c.—Mexic.
nicoyensis, O. F. Cook, l. c.—Am. cent.
panamensis, O. F. Cook, l. c.—Am. cent.
Ulei, Warb. in Engl. Jahrb. xxxv. 674.—Reg. Amazon.

CASUARINA, Linn. (Casuarin.).
campestris, Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. 126.—Austral.
grevilleoides, Diels, ex Diels & Pritz. l. c. 130.—Austral.
Prinsepiana, C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. i. 43.—Austral.

CATALPA, Scop. (Bignon.).
vestita, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 577.—China.

CATASETUM, Rich. (Orchid.).
bicallosum, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. v. 427.—Venez.
Crashleyanum, St. Leger, in Cilade de Rio, April 15, 1889.—Bras.
monodon, Kraenzl. in Gard. Chron. 1904, i. 354.—Bras.
Ornithorrhynchus, Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 161.—Bras.
quadridens, Rolfe, in Kew Bull. 1901, 149.—Hab. ?

CATESBAEA, Linn. (Rubiac.).
fasciculata, Northr. in Mem. Torr. Bot. Club, xii. 66.—Ind. occ.

CATIS, O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 557. PALMAE.
[EUTERPE, Mart. D. T. & H.]
Martiana, O. F. Cook, l. c. (= Euterpe oleracea).—Bras.

CATOPSIS, Griseb. (Bromel.).
Bakerii, Mez, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 435.—Am. cent.
brevifolia, Mez & Werckl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1127.—Am. cent.
compacta, Mez, l. c. iii. 140.—Mexic.
juncifolia, Mez & Werckl. l. c. iv. 1121.—Am. cent.
Wangerini, Mez & Werckl. l. c. 1126.—Am. cent.
Werckleana, Mez, l. c. 1125.—Am. cent.

CATTLEYA, Lindl. (Orchid.).
cancaensis, Ballif, in Chron. Orchid. 1901, 329 = chocoensis.
Cogniauxii, Peeters, ex Cogn. Dict. Ic. Orch. Cattl. Hybr. t. 22.—Hybr.
Peetersii, Hort. ex Cogn. l. c. 27.—Hybr.
Pittiana, O'Brien, ex Cogn. l. c. 28.—Hybr.
Saint-Gilles, Peeters, ex Cogn. l. c. 30.—Hybr.
Sapho, Peeters, ex Cogn. l. c. 31.—Hybr.

CAUCANTHUS, Forsk. (Malpigh.).
argenteus, Niedenzu, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1010.—Afr. trop.
cinereus, Niedenzu, l. c. 1011.—Afr. trop.

CAVENDISHIA, Lindl. (Vacciniac.).
guatemalensis, Loesen. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. (1903) 221.—Am. cent.
longiflora, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 420.—Am. cent.

CEANOTHUS, Linn. (Rhamn.).
macrothyrsus, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 68.—Am. bor.
mogollonicus, Greene, l. c. 67.—Am. bor.
myrianthus, Greene, l. c.—Am. bor.
peduncularis, Greene, l. c.—Am. bor.
puberulus, Greene, l. c. 66.—Calif.
pubescens, Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S. 751.—Am. bor.
purpureus, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 258.—Am. bor.
subsericeus, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 564.—Am. bor.

CEBATHA, Forsk. = **Cocculus**, DC. (Menisperm.).
carolina, Small, in Ann. Carneg. Mus. i. 19 = Cocculus carolinus.

CEDRELA, P. Br. (Meliac.).
hirsuta, C. DC. in Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii 413.—Parag.
saxatilis, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 314.—Mexic.
Tonduzii, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 427.—Am. cent.

CEDRONELLA, Riv. (Labiat.).
Wrightii, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xli. 244.—Mexic.

CEIBA, Medic. (Malvac.).
[ERIODENDRON, DC. I. K.]
acuminata, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 320 (= Eriodendron acuminatum).—Mexic.
Glaziovii, K. Schum. ex Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 72, nomen.—Parag.
Glaziovii, O. Kuntze, ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. III. 52, nomen.—Bras.
pallida, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 320.—Mexic.
parvifolia, Rose, l. c. 320.—Mexic.
Sipolisii, K. Schum. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. III. 52, nomen.—Bras.

CELASTRUS, Linn. (Celastr.).
gemmata, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. 470.—China.
grenadensis, Urb. Symb. Antill. v. 51.—Ind. occ.
Hookeri, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. 197.—Reg. Himal.
Listeri, Prain, l. c.—Ind. or.
membranifolia, Prain, l. c.—Ind. or.

CELOSIA, Linn. (Amarant.).
Dewevrei, Schinz, in Th. Dur. & Wildem. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxix. 102.—Afr. trop.
falcata, Lopr. in Malpighia, xiv. 427.—Afr. trop.
Fleckii, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 8.—Afr. trop.
hastata, Lopr. in Malpighia, xiv. 427; in Engl. Jahrb. xxx. 106.—Afr. trop.
Persicaria, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 4.—Peruv.
salicifolia, Lopr. in Malpighia, xiv. 428; et ex Urb. in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 35.—Bras.
Toussaintii, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 8.—Afr. trop.

CELSIA, Linn. (Scrophul.).
brevicaulis, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 276.—Oriens.
pinnatisecta, Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis. 243.—Afr. bor.

CELTIS, Tourn. (Urtic.).
luzonica, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 164.—Ins. Philipp.
Nymanii, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 240.—N. Guin.
Smallii, Beadle, in Small, Fl. S. E. U. S. 365.—Am. bor.

CENCHROPSIS, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 109 (1903). GRAMINEAE.
[CENCHRUS, Linn. D. T. & H.]
myosuroides, Nash, in Small, l. c. (= Cenchrus myosuroides).—Am. bor.

CENIA, Comm. (Compos.).
[COTULA, Linn. D. T. & H.]
albovillosa, S. Moore, in Journ. Bot. 1902, 381.—Afr. austr.

CENTAUREA, Linn. (Compos.).
Aemilii, Briq. Monogr. Centaur. Alp. Marit. 91.—Eur.
aemula, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 147 = Durieui.
albarracinensis, Rouy, Fl. Fr. ix. 169.—Hybr.
argyrolepis, Hayek, in Denkschr. Acad. Wien, lxx. 696.—Eur.
aterrima, Hayek, l. c. 731.—Eur.
atriplicifolia, Matsum. Enum. Sci. Names (1895) 72 (= Rhaponticum atriplicifolium).—Japon.
auricularis, Pau, in Bol. Soc. Arag. ii. 65.—Hispan.
Battandieri, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, vii–viii. 230.—Alger.
Bornmuelleri, Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xx. 21.—Cappadoc.
carduacea, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 161.—Hybr.
Chaixiana, Rouy, Fl. Fr. ix. 168.—Hybr.
corbariensis, Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 435.—Eur.
Damanti, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 145.—Sicil.
deustiformis, Adamov. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat. lxxiv. 145.—Turcia.
Durieui, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 147.—Sicil.
epapposa, Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss. 1903, no. 28, 6.—Bulgar.

CENTAUREA:—
filaginoides, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 144.—Sicil.
Finazzeri, Adamov. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 235.—Turcia.
Fritschii, Hayek, in Denkschr. Acad. Wien, lxx. 623.—Eur.
Gerstlaueri, Erdner, in Mitth. Bayer. Bot. Ges. Erforsch. Fl. xxxiv. (1905) 425, ex Bot. Centralbl. xcviii. 604.—Hybr.
gilanica, Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xx. 23.—Persia.
Goetzeana, O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxx. 441.—Afr. trop.
inermis, Velen. in Oesterr. Bot. Zeitschr. lii. 154.—Eur.
integrans, Naggi, in Malpighia, xix. 79.—Ital.
jaceiformis, Rouy, Fl. Fr. ix. 138.—Hybr.
Jankae, Brandza, in Anal. Acad. Rom. Sér. II. iv 446.—Eur.
Kanitziana, Janka ex Brandza, l. c. 447.—Eur.
lilinica, Velen. in Allg. Bot. Zeitschr. 1904, 34.—Bulgar.
magocsyana, Wagn. in Magyar Bot. Lap. ii. 281.—Hybr.
Mannagettae, Podp. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, lii. 661.—Eur.
Markiana, Wagn. in Magyar Bot. Lap. ii. 284.—Hybr.
Murbeckii, Hayek, in Denkschr. Acad. Wien, lxx. 639.—Eur.
Perrieri, Rouy, Fl. Fr. ix. 135.—Hybr.
Rothrockii, Greenm. in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 221.—Am. bor.; Mexic.
panormitana, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 137.—Sicil.
Pomeliana, Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis. 196.—Afr. bor.
pseudo-Cineraria, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 140.—Gallia.
scariosa, Rouy, Fl. Fr. ix. 114.—Gallia.
scleroblephara, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 271 (= Phaeopappus scleroblepharus).—Armen.
segoviensis, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. 613.—Hispan.
Serresii, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 162.—Hybr.
Simonkaiana, Hayek, in A. Kern. & Fritsch, Sched. Fl. Austr.-Hung. ix. 79.—Eur.
smolinensis, Hayek, in Denkschr. Acad. Wien, lxx. 719.—Eur.
soluntina, Tin. in Lojac. Fl. Sic. ii. t. 135.—Sicil.
Stohlii, Hayek, in Denkschr. Acad. Wien, lxx. 710.—Eur.
ustulata, Halacsy, Consp. Fl. Graec. ii. 131.—Eur.
xerolepida, Pau, in Bol. Soc. Arag. i. 50.—Hispan.

CENTELLA, Linn. (Umbell.).
[HYDROCOTYLE, Linn. I. K.]
repanda, Small, Fl. S. E. U. S. 859 (= H. repanda).—Am. bor.

CENTROGLOSSA, Barb. Rodr. (Orchid.).
[ZYGOSTATES, Lindl. D. T. & H.]
Glaziovii, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. vi. 189.—Bras.
Greeniana, Cogn. l. c. 190 (= Zygostates Greeniana).—Bras.

CENTROLEPIS, Labill. (Centrolepid.).
cephaloformis, Reader, in Vict. Natural. xix. 97.—Austral.
inconspicua, Fitzger. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxviii. 107.—Austral.

CENTROPOGON, Presl (Campan.).
uncinatus, Zahlbr. in Beih. Bot. Centralbl. xiii. 84.—Ecuador.

CENTROSEMA, Benth. (Legum.).
brevilobulatum, Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 162.—Bras.

CENTROSTEGIA, A. Gray (Polygon.).
cryptantha, Goodd. in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 53.—Am. bor.

CENTUNCULUS, Dill. (Primul.).
mexicanus, Schaffn. ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 335 = Anagallis pumila.

CEPHAËLIS, Sw. (Rubiac.)
Peraltai, Gorris, in Bol. Acad. Barcelona, Ser. III. i. 337.—Am. cent.
Ridleyi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. 106.—Penins. Mal.

CEPHALACANTHUS, Lindau, in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. (1905) 158. *ACANTHACEAE.*
maculatus, *Lindau, l. c.*—Peruv.

CEPHALARIA, Schrad. (Dipsac.).
Goetzei, *Engl. Jahrb.* xxx. 416.—Afr. trop.
retrosetosa, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 394.—Afr. trop.

CEPHALOSPHAERA, Warb. in Engl. Jahrb. xxxiii. (1903) 383. *MYRISTICACEAE.*
usambarensis, *Warb. l. c.* (= *Brochoneura usambarensis*).—Afr. trop.

CEPHALOTAXUS, Sieb. & Zucc. (Conif.).
argotaenia, *Pilg. in Engl. Pflanzenreich Taxac.* 104 (= *Podocarpus argotaenia*).—China.

CERAMANTHUS, Malme, in Arkiv Bot. Stockh. iv. (1905) no. 14. 2. *ASCLEPIADACEAE.*
flavus, *Malme, l. c.* 3 (= *Sarcostemma flavum*).—Am. austr.
gracilis, *Malme, l. c.* 4 (= *Sarcostemma gracile*).—Am. austr.

CERASTIUM, Dill. (Caryophyll.).
adsurgens, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 303.—Am. bor.
alsophilum, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 37.—Am. bor.
angustatum, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 300.—Am. bor.
Barberi, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 266.—Mexic.
Beckianum, *Hand.-Mazz. & Stadlm. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 483.—Eur.
campestre, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 301.—Am. bor.
confertum, *Greene, l. c.* 302.—Am. bor.
Earlei, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 249.—Am. bor.
effusum, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 298.—Am. bor.
fastigiatum, *Greene, l. c.* 303.—Am. bor.
graminifolium, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 250.—Am. bor.
Leibergii, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
lithophilum, *Greenm. in Zoe*, v. (1904) 183.—Mexic.
maximum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 60.—Calif.
micropetalum, *Greenm. in Zoe*, v. (1904) 183.—Mexic.
nitidum, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 37.—Am. bor.
occidentale, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 299.—Am. bor.
oreophilum, *Greene, l. c.* 297.—Am. bor.
oxalidiflorum, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 102.—Japon.
patulum, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 302.—Am. bor.
pulchellum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 405.—Am. bor.
Purpusi, *Greenm. in Zoe*, v. (1904) 183.—Mexic.
Rigoi, *Huter & Porta, ex Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 341.—Hybr.
schizopetalum, *H. Winkl. in Vidensk. Medd. Kjøbenh.* (1901) 1902, 51.—As. cent.
scopulorum, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 298.—Am. bor.
Sonnei, *Greene, l. c.* 303.—Am. bor.
Sturmianum, *Hayek, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1903, 366.—Eur.
subulatum, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 36.—Am. bor.
variabile, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 54.—Am. bor.
vestitum, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 301.—Am. bor.

CERASUS, Tourn. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).
arida, Greene, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 57.—Calif.
crenulata, Greene, l. c. 56.—Am. bor.
Herincqaiana, Lav. in Arb. Segrez. 117 = P. pendula, *Maxim.*
Kelloggiana, Greene, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 58.—Calif.
Lannesiana, Carr. in Rev. Hort. 1872, 198; 1873, 351 = Prunus pseudo-Cerasus.
Lyoni, Eastw. in Occas. Papers Calif. Acad. Sci. ix. (1905) 54.—Calif.
obliqua, Greene, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 59.—Calif.
obtusata, Greene, l. c. 60.—Am. bor.
padifolia, Greene, l. c. 59.—Am. bor.
parvifolia, Greene, l. c.—Calif.
prunifolia, Greene, l. c. 57.—Calif.
rhamnoides, Greene, l. c. 58.—Calif.

CERASUS:—
serratifolia, Lindl. ex Carr. in Rev. Hort. 1877, 389 = Prunus pseudo-Cerasus.
trichopetala, Greene, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 60.—Am. bor.

CERATOPHYLLUM, Linn. (Ceratophyll.).
tanaiticum, *Sapjegin, in Trav. Soc. Nat. Kharkow*, xxxvii. 316.—Rossia.

CERATOSANTHES, Burm. (Cucurb.).
Hassleri, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 925.—Parag.

CERATOSTYLIS, Blume (Orchid.).
gracilis, Naves, in Blanco, Fl. Filip. ed. III. Nov. App. 245 = Acoridium tenellum.
grandiflora, *J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* i. 156.—Sumatra.
latuensis, *J. J. Sm. Orch. Ambon.* 37.—Amboina.
philippinensis, *Rolfe, in Ames, Orchid.* i. 79.—Ins. Philipp.
platychila, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 138.—N. Guin.
puncticulata, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 79.—Penins. Mal.
radiata, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 295.—Java.
scirpoides, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 138.—N. Guin.
spathulata, *Schlechter, l. c.* 139.—N. Guin.

CERATOZAMIA, Brongn. (Cycad.).
Fuscata, *Matte, Recherches App. Lib. Lign. Cycad.* 35, nomen.—Hab.?
purpurea, *Matte, l. c.* 125.—Hab.?

CERCANTHEMUM, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 215 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
amplexicaule, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 198 = O. amplexicaulis.
anceps, Van Tiegh. l. c. = O. anceps.
auriculatum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xviii. 30.—Madag.
auriculatum, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 88.—Madag.
Boivini, Van Tiegh. l. c.—Madag.
circinale, Van Tiegh. l. c. 89.—Madag.
dependens, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 198 = O. dependens.
Hoffmanni, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 306.—Madag.
lanceolatum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 198 = O. lanceolata.
reflexum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 306.—Madag.
Sacleuxii, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 198.—Afr. trop.
squamiferum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 307.—Madag.

CERCESTIS, Schott (Arac.).
kamerunianus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 182 (= *Alocasiophyllum kamerunianum*).—Afr. trop.
stigmaticus, *N. E. Br. l. c.* 181.—Afr. trop.

CERCIDIUM, Tul. (Legum.).
Goldmani, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 301.—Mexic.
peninsulare, *Rose, l. c.*—Calif.
plurifoliolatum, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 269.—Mexic.
unijugum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 301.—Mexic.

CERCINIA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 376 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
brevis, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 310.—Cochinch.
Doumeri, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 87.—Ind. or.
Thoreli, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 198.—Cochinch.
Wightii, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 87.—Ind. or.

CERCOCARPUS, H. B. & K. (Rosac.).
mojadensis, *Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. (1905) 530, nomen.—Mexic.
Treleasei, *Schneider, l. c.* nomen.—Mexic.

CERCOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 434 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
acuta, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 277.—Bras.
aemula, Van Tiegh. l. c. 276 (= *Gomphia aemula*).—Bras.
alaternifolia, Van Tiegh. l. c. 277 = O. alaternifolia, *errore* alternifolia.
Barrae, Van Tiegh. l. c. 272.—Bras.
brevipes, Van Tiegh. l. c. 277.—Bras.
cassinifolia, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 434 = O. cassinifolia.
caudata, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 276 = O. caudata.
Chaffanjoni, Van Tiegh. l. c. 272.—Venez.
curvata, Van Tiegh. l. c. 276 (= *Gomphia curvata*).—Bras.
cuspidata, Van Tiegh. l. c. = O. cuspidata.
erythrocalyx, Van Tiegh. l. c. = O. erythrocalyx.
ferruginea, Van Tiegh. l. c. = O. ferruginea.
Fieldingiana, Van Tiegh. l. c. = O. Fieldingiana.
glaucescens, Van Tiegh. l. c. 271 = O. glaucescens.
glomerata, Van Tiegh. l. c. 276 (= *Gomphia glomerata*).—Bras.
Grosourdyi, Van Tiegh. l. c. 278.—Venez.
impressa, Van Tiegh. l. c.—Guian.
laxa, Van Tiegh. l. c. 273.—Venez.
longifolia, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par 1902, 434 = O. longifolia.
lucens, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 271 = O. lucens.
Melinoni, Van Tiegh. l. c. 278.—Guiana.
Magdalenae, Van Tiegh. l. c. 276 = O. Magdalenae.
oliviformis, Van Tiegh. l. c. 271 = O. olivaeformis.
Orbignyana, Van Tiegh. l. c. 277.—Boliv.
repens, Van Tiegh. l. c.—Bras.
rotundifolia, Van Tiegh. l. c. 276 = O. rotundifolia.
Schomburgkii, Van Tiegh. l. c. = O. Schomburgkii.
tenuifolia, Van Tiegh. l. c. 271 = O. tenuifolia.
venulata, Van Tiegh. l. c. 272.—Bras.
verruculosa, Van Tiegh. l. c. 276 = O. verruculosa.

CEREUS, Mill. (Cact.).
acidus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* i. 22 (= *Eulychnia acida*).—Chili.
Aragoni, *Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 456.—Am. cent.
aurivillus, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1903, 67.—Hort.
Biolleyi, *Web. ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* i. 60.—Am. cent.
calcaratus, *A. Web. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 458.—Am. cent.
castaneus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* i. 22 (= *Eulychnia castanea*).—Chili.
Chende, *Gosselin, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* vi. (1905) 506.—Mexic.
Chichipe, *Gosselin, l. c.* 507.—Mexic.
chrysacanthus, *Orcutt, in W. Amer. Sci.* xiii. 63 (= *Pilocereus chrysacanthus*).—Mexic.
conflorus, *Weing. in Monatsschr. Kakt.* 1904, 118.—Ind. occ.
coquimbanus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* i. 23 (= *Eulychnia breviflora*).—Chili.
Dautwitzii, *Orcutt, in W. Amer. Sci.* xiii. 63 (= *Pilocereus Dautwitzii*).—Peruv.
Dayami, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 480.—Reg. Argent.
Dusenii, *Weber, ex Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 56; *et in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 383.—Reg. Argent.
glycimorphus, *Orcutt, Seed Pl. Co., Cat. Cact.* 1903, 5 (= *Echinocereus glycimorphus*).—Hab.?
Gonzalezii, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 460.—Am. cent.
Greggii, *W. Watson, in Gard. Chron.* 1903, ii. 93.—Am. bor.
Grusonianus, *Weing. in Monatsschr. Kakt.* 1905, 54.—Mexic.?
Guelichi, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 482.—Reg. Argent.
huitcholensis, *Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 383.—Mexic.
iquiquensis, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1904, 99.—Chili.
Knippelianus, *Orcutt, in W. Amer. Sci.* xiii. 27 (= *Echinocereus Knippelianus*).—Mexic.

CEREUS:—
Lauterbachii, *K. Schum. ex Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 250.—Parag.
leonensis, *Orcutt, in W. Amer. Sci.* xiii. 27 (= *Echinocereus leonensis*).—Mexic.
longicaudatus, *Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 384.—Mexic.
margaritensis, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 698.—Venez.
miravallensis, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 459.—Am. cent.
Moenninghoffii, *Fischer, in Monatsschr. Kakt.* xv. 143.—Hybr.
nesioticus, *K. Schum. ex Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 179.—Ins. Galap.
pachyrrhizus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* i. 33.—Parag.
paraguayensis, *K. Schum. ex Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. (1903) 249.—Parag.
pensilis, *K. Brandegee, in Zoe,* v. 192 (1904).—Calif.
platygonus, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* xi. 481.—Reg. Argent.
ruber, *Weing. in Monatssch. Kakt.* 1905, 22.—Hab. ?
santiaguensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* xi. 478.—Reg. Argent.
Sargentianus, *Orcutt, Seed Pl. Co. Cat. Cact.* 1903, 9.—Hort.
sciurus, *K. Brandegee, in Zoe,* v. 192 (1904).—Calif.
sclerocarpus, *K. Schum. ex Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 179.—Ins. Galap.
Silvestrii, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* xi. 483.—Reg. Argent.
Sirul, *Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 384.—Mexic.
smaragdiflorus, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* xi. 482.—Reg. Argent.
stenopterus, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 458.—Am. cent.
thelegonoides, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* xi. 480.—Reg. Argent.
Tonduzii, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 459.—Am. cent.
Tunilla, *A. Weber, l. c.* 460.—Am. cent.
Urbanianus, *Guerke & Weing. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iv. 158.—Ind. occ.
vagans, *K. Brandegee, in Zoe,* v. 191 (1904).—Mexic.
viperinus, *Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 385.—Mexic.
Weingartianus, *Hartm. in Monatsschr. Kakt.* xiv. 155.—Ind. occ.
Werckleí, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 460.—Am. cent.
xanthocarpus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* i. 32.—Parag.

CEROPEGIA, Linn. (Asclep.).
angustiloba, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 109.—Afr. trop.
Bonafouxii, *K. Schum. in Engl. Jahrb* xxxiii. 327.—Afr. trop.
botrys, *K. Schum. l. c.* 328.—Afr. trop.
brachyceras, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 45.—Afr. austr.
Butayei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. V. i. 192—Afr. trop.
calcarata, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 453.—Afr. trop.
Conrathii, *Schlechter, in Engl. Jahrb* xxxviii. 45.—Afr. austr.
Dewevrei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. V. i. 192.—Afr. trop.
dichroantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 385.—Afr. trop.
Ellenbeckii, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 327.—Afr. trop.
euryacme, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 46.—Afr. austr.
floribunda, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 460.—Afr. trop.
gemmifera, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 328.—Afr. trop.
Haygarthii, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 46.—Afr. austr.
humilis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 464.—Abyss.
infausta, *N. E. Br. in Dyer, l. c.* 459 (= *Riocreuxia longiflora*).—Afr. trop.

CEROPEGIA:—
Kerstingii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 326.—Afr. trop.
kroboensis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 440.—Afr. trop.
kwebensis, *N. E. Br. l. c.* 456.—Afr. trop.
leptocarpa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 47.—Afr. austr.
perforata, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 141.—N. Guin.
subaphylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 329.—Afr. trop.
tenuissima, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 185.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 109.—Afr. trop.
yorubana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 48.—Afr. trop.
Zeyheri, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.

CERVICINA, Delile = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campan.).
gracilis, J. Britten, Bot. Cook Voy. 56 = W. gracilis.
denudata, S. Moore, in Journ. Bot. 1903, 402 = W. denudata.
depressa, S. Moore, l. c. = W. depressa.

CESPEDESIA, Goudot (Ochnac.).
brasiliana, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xix. 51.—Bras.
repanda, *Van Tiegh. l. c.* 50 (= *Godoya repanda*).—N. Granat.
Sprucei, *Van Tiegh. l. c.* 51.—Peruv.

CESTICHIS, Thou. = **Liparis**, Rich. (Orchid.).
[STICHORCHIS, Thou. D. T. & H.]
araneola, Ames, Orchid. i. 12 = L. araneola.
benguetensis, Ames, l. c. 9.—Ins. Philipp.
compressa, Ames, l. c. 8 = L. compressa.
Cumingii, Ames, l. c. = L. Cumingii.
divergens, Ames, l. c. = L. divergens.
Elmeri, Ames, l. c. 10.—Ins. Philipp.
longipes, Ames, l. c. 75 = L. longipes.
Merrilli, Ames, l. c. 11.—Ins. Philipp.
philippinensis, Ames, l. c. 7.—Ins. Philipp.

CESTRUM, Linn. (Solan.).
brevifolium, *Urb. Symb. Antill.* ii. 457.—Ind. occ.
guaraniticum, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 85.—Parag.
heterophyllum, *Urb. Symb. Antill.* ii. 457.—Ind. occ.
inclusum, *Urb. l. c.* iii. 370.—Ind. occ.
linearifolium, *Urb. l. c.* ii. 458.—Ind. occ.
poasanum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 253.—Am. cent.

CHADSIA, Boj. (Legum.).
Grevei, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 134.—Madag.
majungensis, *Drake, l. c.* 132.—Madag.
racemosa, *Drake, l. c.* 134.—Madag.

CHAENARRHINUM, Lange = **Linaria**, Tourn. (Scrophul.).
[CHAENORRHINUM, Lange, D. T. & H.].
Aschersoni, Simk. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers. 236.—Eur.
viscidum, Simk. l. c. 234 = L. viscida.

CHAENOCEPHALUS, Griseb. (Compos.).
Jelskii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 494.—Peruv.
rupestris, *Urb. Symb. Antill.* iii. 412.—Ind. occ.

CHAENOLOBUS, Small, Fl. S. E. U. S. (1903) 1236 = **Chaenobolus**, Cass. = **Pterocaulon**, Ell. (Compos.).

CHAENOSTOMA, Benth. (Scrophul.).
subnudum, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 128.—Afr. austr.

CHAENOTHECA, Urb. Symb. Antill. iii. 284 (1902) = **Chascotheca**, Urb. (Euphorb.).
domingensis, Urb. l. c. 285 = C. domingensis.
neopeltandra, Urb. l. c. = C. neopeltandra.

CHAEROPHYLLUM, Linn. (Umbell.).
floridanum, *Bush, in Trans. Acad. St. Louis* xii. 62.—Am. bor.
reflexum, *Bush, l. c.*—Am. bor.

CHAETACANTHUS, Nees (Acanth.).
[CALOPHANES, D. Don. I. K.]
hispidus, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 334.—Afr. austr.

CHAETANTHERA, Ruiz & Pav. (Compos.).
collina, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile,* iv. 340.—Chili.
euphrasioides, *Reiche, l. c.* 343 (= *Elachia euphrasioides*).—Chili.
Shortii, *Bush, in Trans. Acad. St. Louis,* xii. 59.—Am. bor.

CHAETOCHLOA, Scribn. = **Setaria**, Beauv. (Gramin.).
occidentalis, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 90.—Am. bor.

CHALAROTHYRSUS, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. (1904) 327. *ACANTHACEAE.*
amplexicaulis, *Lindau, l. c.*—Mexic.

CHALEPOPHYLLUM, Hook. f. (Rubiac.).
speciosum, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 33.—Guian.

CHAMAEANTHUS, Schlechter, in J. J. Sm. Orchid. Java, 552. *ORCHIDACEAE.*
brachystachys, *Schlechter, l. c.*—Java.

CHAMAECRINUM, Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. (1904) 101 = **Hanamania**, Fitzger. (Liliac.).

CHAMAECRISTA, Moench = **Cassia**, Tourn. (Legum.).
bellula, Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington, xv. 19.—Am. bor.
brachiata, Pollard, l. c. 20.—Am. bor.
camporum, Greene, Pittonia, v. 108.—Am. bor.
commixta, Auct. in Proc. Biol. Soc. Washington, xiv. 196 = Cassia nictitans.
littoralis, Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington, xv. 20.—Am. bor.
mirabilis, Pollard, l. c. 19.—Ind. occ.
puberula, Greene, Pittonia, v. 134.—Am. bor.
Tracyi, Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington. xv. 21.—Am. bor.

CHAMAECYPARIS, Spach (Conif.).
[THUYA, Tourn. I. K.]
formosensis, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* xv. 137.—Formosa.

CHAMAEDOREA, Willd. (Palm.).
amabilis, *Wendl. ex Damm. in Gard. Chron.* 1904, ii. 245.—Am. cent.
Lechleriana, *Wendl. l. c.* 246.—Peruv.
Pavoniana, *Wendl. l. c.*—Peruv.
pumila, *Wendl. l. c.*—Am. cent.
rigida, *Wendl. l. c.*—Mexic.
Ruizii, *Wendl. l. c.*—Peruv.

CHAMAELE, Miq. (Umbell.).
decumbens, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo,* xvii. 14 (= *Sium decumbens*).—Japon.
japonica, Mak. ex Yabe, in Journ. Coll. Sci. Tokyo, xvi. iv. 47, in obs. = tenera.

CHAMAELIRIUM, Willd. (Liliac.).
obovale, *Small, in Torreya,* i. 108.—Am. bor.

CHAMAESPHACOS, Schrenk. (Labiat.).
longiflorus, *Bornm. & Sint. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xviii. 51.—Reg. Casp.

CHAMAESYCE, S. F. Gray = **Euphorbia**, Linn. (Euphorb.).
adenoptera, Small, Fl. S. E. U. S. 714 = E. adenoptera.
adicioides, Small, l. c. 710.—Am. bor.
albomarginata, Small, l. c. = E. albomarginata.
ammannioides, Small, l. c. 709 = E. ammannioides.
angusta, Small, l. c. 711 = E. angusta.
Blodgettii, Small, l. c. 712 = E. Blodgettii.
brachypoda, Small, l. c. 709.—Am. bor.
brasiliensis, Small, l. c. 712 = E. brasiliensis.
buxifolia, Small, l. c. 711 = E. buxifolia.
Chiogenes, Small, l. c. 709.—Am. bor.
cinerascens, Small, l. c. 710 = E. melanadenia.
conferta, Small, l. c. 712.—Am. bor.
cordifolia, Small, l. c. 709 = E. cordifolia.
deltoidea, Small, l. c. 710 = E. deltoidea.
Fendleri, Small, l. c. = E. Fendleri.
Garberi, Small, l. c. = E. Garberi.
Geyeri, Small, l. c. 709 = E. Geyeri.

CHAMAESYCE:—
glyptosperma, Small, Fl. S. E. U. S. 712 = Euphorbia glyptosperma.
humistrata, Small, l. c. 713 = E. humistrata.
hyssopifolia, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 429 = E. brasiliensis.
Ingallsii, Small, Fl. S. E. U. S. 706.—Am. bor.
laredana, Small, l. c. 709 = E. laredana.
lata, Small, l. c. 710 = E. lata.
maculata, Small, l. c. 713 = E. maculata.
malaca, Small, l. c.—Am. bor.
Nashii, Small, l. c. 709.—Am. bor.
nutans, Small, l. c. 713 = E. Preslii.
Nuttallii, Small, l. c. 711.—Am. bor.
pergamena, Small, l. c. 713 = E. pergamena.
petaloidea, Small, l. c. 711 = E. petaloidea.
pilulifera, Small, l. c. 714 = E. pilulifera.
pinetorum, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 429.—Am. bor.
polyclada, Small, Fl. S. E. U. S. 711 = E. polyclada.
polygonifolia, Small, l. c. 708 = E. polygonifolia.
Porteriana, Small, l. c. 711.—Am. bor.
prostrata, Small, l. c. 713 = E. prostrata.
revoluta, Small, l. c. 711 = E. revoluta.
serpens, Small, l. c. 709 = E. serpens.
serpyllifolia, Small, l. c. 712 = E. serpyllifolia.
Stanfieldii, Small, l. c.—Am. bor.
stictospora, Small, l. c. 714 = E. stictospora.
Tracyi, Small, l. c. 713.—Am. bor.
villifera, Small, l. c. 712 = E. villifera.

CHAMIRA, Thunb. (Crucif.).
circaeoides, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xviii. 384 (= *Heliophila circaeoides*).—Afr. austr.

CHAMISSONIA, Endl. (Onagrac.).
[OENOTHERA, Linn. I. K.]
tenuifolia, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 614 (= *Sphaerostigma tenuifolium*).—Chili; Patag.

CHAPTALIA, Vent. (Compos.).
alsophila, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 158.—Am. bor.
Arechavaletai, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* Ser. II. i. 14.—Urug.
confinis, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 168.—Am. bor.
Eggersii, *Urb. Symb. Antill.* iii. 418.—Ind. occ.
membranacea, *Urb. l. c.*—Ind. occ.
similis, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 95.—Reg. Argent.

CHASALIA, Comm. (Rubiac.).
Buchwaldii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 338.—Afr. trop.
discolor, *K. Schum. l. c.* 339.—Afr. trop.
subspicata, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 371.—Afr. trop.

CHASCOTHECA, Urb. Symb. Antill. v. 14. (1904). *EUPHORBIACEAE.*
domingensis, *Urb. l. c.*—Ind. occ.
neopeltandra, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

CHEIRANTHUS, Linn. (Crucif.).
ammophilus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 52 (= *Erysimum ammophilum*).—Calif.
argutus, Buch, ex Lowe, Man. Fl. Mader. 28 = mutabilis.
aridus, Greene, Pittonia, iv. 198 = Bakeri.
Bakeri, *Greene, l. c.* 235.—Am. bor.
dentatus, Buch, ex Lowe, Man. Fl. Mader. 28 = mutabilis.
littoreus, Buch, l. c. = Matthiola maderensis.
nevadensis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 52 (= *Erysimum nevadense*).—Calif.
pacificus, *Sheldon, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 308.—Am. bor.
suffrutescens, *Abrams, in Bull. S. Calif. Acad.* ii. 41.—Calif.

CHELONANTHUS, Gilg (Gentian.).
[LISIANTHUS, Linn. I. K. S. I.]
candidus, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 12, 13.—Bras.
frigidus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 334 (= *Lisianthus frigidus*).—Ind. occ.

CHELONE, Linn. (Scrophul.).
Cuthbertii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1058.—Am. bor.

CHELONOPSIS, Miq. (Labiat.).
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 94.—China.

CHENOPODIUM, Tourn. (Chenopod.).
albescens, *Small, Fl. S. E. U. S.* 385.—Am. bor.
Ameghinoi, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 138.—Patag.
aridum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 240.—Am. bor.
atripliciforme, *Murr, in Magyar Bot. Lap.* i. 360.—Sibir. or.; Afghan.
bolivianum, *Murr, l. c.* 359.—Am. bor.; Bolivia.
cycloides, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 363.—Am. bor.
desiccatum, *A. Nelson, l. c.* 362.—Am. bor.
Orphanidis, *Murr, in Magyar Bot. Lap.* iii. 37.—Graecia.
Preissii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 181 (= *Rhagodia Preissii*).—Austral.
pseudopunctulatum, *Murr, in Magyar Bot. Lap.* iii. 38.—Hybr.
querciforme, *Murr, l. c.* 37.—Bolivia.
rafaelense, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 534.—Reg. Argent.
scabricaule, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 139.—Patag.
subglabrum, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 362.—Am. bor.
succosum, *A. Nelson, l. c.* 361.—Am. bor.
Tanakae, *Murr, in Magyar Bot. Lap.* iii. 38.—Japon.
texanum, *Murr, l. c.* ii. 8.—Am. bor.
trilobum, *Issl. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1902, 173.—Eur.
Vollmanni, *Murr, in Magyar Bot. Lap.* ii. 11.—Eur.
Watsoni, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 362.—Am. bor.
Wolfii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 248.—Am. bor.

CHESNEYA, Lindl. = **Calophaca**, Fisch. (Legum.).
elegans, Fomine, in Monit. Jard. Bot. Tiflis, i. 6.—Armenia.

CHILIOTRICHUM, Cass. (Compos.).
diffusum, *P. Dusén, in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 31.—Patag.

CHILOSCHISTA, Lindl. (Orchid.).
[SARCOCHILUS, R. Br. I. K.]
lunifera, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 553 (= *Sarcochilus luniferus*).—Java; Ind. or.

CHIOCOCCA, P. Br. (Rubiac.).
micrantha, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 696.—Venez.

CHIONANTHUS, Gaertn. = **Linociera**, Sw. (Oleac.).
montana, Zoll. ex Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. lix. (1903) 237 = C. nitens.
nitens, Koord. & Valet. l. c.—Java.
oblongifolia, Koord. & Valet. l. c. 244.—Java.
Zollingeriana, Koord. & Valet. l. c. 245.—Java.

CHIONE, DC. (Rubiac.).
coriacea, *Urb. Symb. Antill.* iii. 380.—Ind. occ.

CHIRONIA, Linn. (Gentian.).
Baumiana, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 334; *et ex Schoch, in Bot. Centralbl. Beiheft.* xiv. 252.—Afr. trop.
Ecklonii, *Schoch, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1013.—Afr. austr.
maxima, *Schoch, l. c.* 1014.—Afr. austr.
mediocris, *Schoch, l. c.* 1011.—Afr. austr.
rubro-coerulea, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 379.—Afr. trop.
Schinzii, *Schoch, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1012.—Afr. austr.
Schlechteri, *Schoch, l. c.* 1010.—Afr. austr.

CHIROPETALUM, A. Juss. (Euphorb.).
[ARGITHAMNIA, Sw. I. K.]
tricoccum, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 502 (= *Desfontainea tricocca*).—Parag.

CHISOCHETON, Blume (Meliac.).
amboinensis, *Valet. in Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 67.—Ins. Amboin.
Biroi, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 283.—N. Guin.
Forbesii, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. (1903) 168.—N. Guin.

CHISOCHETON:—
hongkongensis, *Tutch. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 64.—China.
novoguineensis, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 169.—N. Guin.
pentandrus, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxvii. 31 = philippinus.
Weinlandii, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 283.—N. Guin.

CHITONANTHERA, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, (1905) 193. *ORCHIDACEAE.*
angustifolia, *Schlechter, l. c.* 194.—N. Guin.
falcifolia, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
miniata, *Schlechter, l. c.* 195.—N. Guin.

CHITONOCHILUS, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, (1905) 134. *ORCHIDACEAE.*
papuanum, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.

CHLAENOBOLUS, Cass. = **Pterocaulon**, Ell. (Compos.).
undulatus, Small, Fl. S. E. U. S. 1236 = P. pycnostachyum.

CHLAMYSPORUM, Salisb. = **Thysanotus**, R. Br. (Liliac.).
Banksii, J. Britten, Bot. Cook Voy. 94 (= *Thysanotus Banksii*).—Austral.

CHLORAEA, Lindl. (Orchid.).
alboroseа, *Kraenzl. & Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 166.—Patag.
Berteroana, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* ii. 70.—Chili.
bicallosa, *Phil. ex Kraenzl. l. c.* 69.—Chili.
boliviana, *Kraenzl. l. c.* 139 (= *Bieneria boliviana*).—Bolivia.
chica, *Speg. & Kraenzl. in Kraenzl. l. c.* 131.—Patag.
chollilensis, *Speg. & Kraenzl. in Kraenzl. l. c.* 74.—Patag.
collicensis, *Kraenzl. l. c.* 127.—Chili.
ferruginea, *Speg. & Kraenzl. in Kraenzl. l. c.* 76.—Patag.
grandis, *Kraenzl. l. c.* 58.—Chili.
henichloris, *Kraenzl. l. c.* 99.—Chili.
Hookeriana, *Speg. & Kraenzl. in Kraenzl. l. c.* 79.—Am. austr.
hystrix, *Speg. & Kraenzl. in Kraenzl. l. c.* 87.—Chili.
Johowiana, *Kraenzl. l. c.* 127.—Chili.
Kingii, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 322 (= *Asarca Kingii*).—Patag.
Kruegeri, *Phil. in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* ii. 130.—Chili.
Lagunae-Pacis, *Kraenzl. l. c.* 112.—Patag.
leontoglossa, *Kraenzl. l. c.* 83.—Chili.
leucojiflora, *Kraenzl. l. c.* 80.—Chili.
liliacea, *Kraenzl. l. c.* 60.—Chili.
lineata, *Phil. ex Kraenzl. l. c.* 63.—Chili.
modesta, *Phil. ex Kraenzl. l. c.* 114.—Chili.
multilamellata, *Phil. ex Kraenzl. l. c.* 59.—Chili.
nervosa, *Phil. ex Kraenzl. l. c.* 66.—Chili.
odoratissima, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 323 (= *Asarca odoratissima*).—Patag.
panduraeformis, *Phil. ex Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* ii. 54.—Chili.
picta, *Phil. ex Kraenzl. l. c.* 80.—Chili.
pleistodactyla, *Kraenzl. & Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 167.—Patag.
praecincta, *Speg. & Kraenzl. in Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* ii. 118.—Reg. Argent.
pseudo-campestris, *Kraenzl. l. c.* 135.—Chili.
Reicheana, *Kraenzl. l. c.* 81.—Chili.
semitensis, *Phil. ex Kraenzl. l. c.* 106.—Chili.
stenantha, *Kraenzl. l. c.* 98.—Chili.
Spegazziniana, *Kraenzl. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 167.—Patag.
trachysepala, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* ii. 133.—Chili.
Volkmanni, *Phil. ex Kraenzl. l. c.* 121.—Chili.

CHLORANTHUS, Sw. (Chloranth.).
spicatus, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 180 (= *Nigrina spicata*).—Japon.

CHLORIS, Sw. (Gramin.).
anisopoda, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 118.—Ins. Galap.
calvescens, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 279.—Parag.

CHLORIS:—
Cheesemani, *Hack. ex Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 305.—Ins. Cook.
Ridleyi, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 237.—Penins. Mal.

CHLOROCYPERUS, Rikli = **Cyperus**, Mich. (Cyperac.).
aureus, Palla, ex Kneuck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1908, 69 = Cyp. esculentus.
cordobensis, Palla, l. c.—Reg. Argent.
erythrorrhizus, Palla, l. c. = Cyp. erythrorrhizus.
phymatodes, Palla, l. c. = Cyp. esculentus.
rotundus, Palla, l. c.—Hab.?
salaamensis, Palla, l. c. 70.—Afr. trop.

CHLOROPHORA, Gaudich. (Urtic.).
mollis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 52.—Mexic.

CHLOROPHYTUM, Ker-Gawl. (Liliac.).
amaniense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 157.—Afr. trop.
bifolium, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 66.—Afr. trop.
dolichostachys, *Engl. & Gilg. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 188.—Afr. trop.
Fuchsianus, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 102.—Afr. trop.
giniense, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 65.—Afr. trop.
Hasslerianum, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1098.—Parag.
Hoffmannii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 158.—Afr. trop.
Krookianum, *Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xv. 19.—Afr. austr.
nigricans, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 997.—Afr. austr.
psammophilum, *Engl. & Gilg. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 188.—Afr. trop.
Rivae, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, ix. 244.—Afr. trop.
stamineum, *Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xv. 18.—Afr. austr.
strictum, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 782.—Afr. austr.
togoense, *Engl. Jahrb.* xxxii. 92.—Afr. trop.
unyikense, *Engl. l. c.* xxx. 272.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.* xxxii. 92.—Afr. trop.

CHOLISMA, Greene, in Torreya, iv. (1904) 174 = XOLISMA, Rafin. = **Andromeda**, Linn. (Ericac.).

CHOMELIA, Jacq. (Rubiac.).
apiculata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 205.—Afr. trop.
bipindensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 339.—Afr. trop.
fusco-flava, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 206.—Afr. trop.
laxissima, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 340.—Afr. trop.
longifolia, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 206.—Afr. trop.
microloba, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 114.—Am. cent.
neurocarpa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 340.—Afr. trop.

CHONDRADENIA, Maxim. ex Mak. in Bot. Mag. Tokyo xvi. (1902) 8 = **Orchis**, Tourn. (Orchid.).
Yatabei, Maxim. ex Mak. l. c.—O. Chondradenia.

CHONDROPHYLLA, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 245. *GENTIANACEAE.*
[GENTIANA, Tourn. D. T. & II.]
americana, *A. Nelson, l. c.*—Am. bor.
Fremontii, *A. Nelson, l. c.* (= *Gentiana Fremontii*).—Am. bor.

CHONEMORPHA, G. Don (Apocyn.).
Grandieriana, *Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn.* (1894) 296, nomen.—Cochinch.
Harmandiana, *Pierre, l. c.* nomen.—Cochinch.
Yersini, *Vernet, ex Spire, in Bull. Econom. Indo-Chine*, v. (1902) 859, nomen; vii. 1197.—Cochinch.

CHORETRUM, R. Br. (Santal.).
Pritzelii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 177.—Austral.

CHORIZANTHE, R. Br. (Polygon.).
inequalis, *Stokes, in Zoe*, v. 69 (1900).—Calif.
villosa, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 465.—Calif.

CHORIZEMA, Labill. (Legum.).
uncinatum, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 38.—Austral.

CHRESTIENIA, Montrouz. in Beauvis. Gen. Montrouz. (1901) 88 = **Pseuderanthemum**, Radlk. (Acanth.).
elegans, Montrouz. l. c. = P. variabile.
montana, Montrouz. l. c. 89 = P. variabile.

CHRISTISONIA, Gardn. (Orobanch.).
Scortechinii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 205.—Penins. Mal.

CHRYSANTHELLUM, Rich. (Compos.).
mexicanum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 114.—Mexic.

CHRYSANTHEMUM, Tourn. (Compos.).
grande, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7886.—Alger.
grandiflorum, Battand. in Battand. & Trab. Fl. Algér. (1890) 464 = grande.
hypargyreum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 104.—China.
marginatum, Ruffill, in Gard. Chron. 1904, i. 51 = ornatum.
ornatum, *Hemsl. in Bot. Mag.* t. 7965.—Japon.
pamiricum, *O. Hoffm. ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 149.—As. cent.
Rohlenae, *Domin, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 14.—Hybr.
Sabini, Lindl. in Bot. Reg. sub t. 1287 = indicum.

CHRYSITHRIX, Linn. (Cyperac.).
distigmatosa, *C. B. Clarke, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 82.—Austral.

CHRYSOCOMA, Linn. (Compos.).
polygalaefolia, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1014.—Afr. trop.

CHRYSOGLOSSUM, Blume (Orchid.).
nebulosum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 176 (= *Collabium nebulosum*).—Java.
simplex, *J. J. Sm. l. c.* 177 (= *Collabium simplex*).—Java.

CHRYSOMA, Nutt. = **Solidago**, Vaill. (Compos.).
fasciculata, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 215.—Calif.
Merriami, Eastw. l. c.—Calif.

CHRYSOPHYLLUM, Linn. (Sapot.).
Antunesii, *Engl. Jahrb.* xxxii. 137.—Afr. trop.
Buchholzii, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 41.—Afr. trop.
Cainito, Griseb. ex Pierre, in Urb. Symb. Antill. v. 119 = Micropholis Cruegeriana.
Carvalhoi, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 47.—Afr. trop.
discolor, Walp. & Duchass. ex Pierre, in Urb. Symb. Antill. v. 121 = Micropholis discolor.
Eggersii, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 155.—Ind. occ.
Gorungosanum, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 44.—Afr. trop.
Henriquesii, *Engl. l. c.* 45 (*errore* Henriquezii).—Afr. trop.
Kisloii, *Engl. l. c.* 42.—Afr. trop.
Krugii, Pierre, ex Urb. Symb. Antill. v. 160 = pauciflorum.
Millenianum, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 44.—Afr. trop.
mohorense, *Engl. Jahrb.* xxxviii. 100.—Afr. trop.
Picardae, *Urb. Symb. Antill.* v. 158.—Ind. occ.
pruniforme, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 42.—Afr. trop.
Wilmsii, *Engl. l. c.* 46.—Afr. trop.
Zimmermannii, *Engl. l. c.* 44.—Afr. trop.

CHRYSOPOGON, Trin. (Gramin.).
[ANDROPOGON, Linn. D. T. & II.]
sinensis, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 368.—China.

CHRYSOPSIS, Ell. (Compos.).
alpicola, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 649.—Am. bor.
amplifolia, *Rydb. l. c.* 648.—Am. bor.
asprella, *Greene. Leaflets Bot. Obs.* i. 150.—Am. bor.
californica, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxix. 48.—Calif.
camphorata, *Eastw. in Zoe*, v. 81 (1900).—Calif.
caudata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 648.—Am. bor.

CHRYSOPSIS:—
compacta, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 151.—Am. bor.
Cooperi, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 63.—Am. bor.
floridana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1183.—Am. bor.
gigantea, *Small, l. c.*—Am. bor.
horrida, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 648.—Am. bor.
imbricata, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 263.—Am. bor.
latifolia, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1182.—Am. bor.
microcephala, *Small. l. c.*—Am. bor.
resinolens, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 232.—Am. bor.
scabrifolia, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 264.—Am. bor.
Tracyi, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1182.—Am. bor.

CHRYSOSPLENIUM, Tourn. (Saxifr.).
Biondianum, *Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 59.—China.
chamaedryoides, *Engl. l. c.*—China.
Giraldianum, *Engl. l. c.* 49.—China.
iowensis, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 483.—Am. bor.

CHRYSOTHAMNUS, Nutt. = **Bigelowia**, DC. (Compos.).
angustus, Greene, Pittonia, v. 64.—Calif.
appendiculatus, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 6.—Am. bor.
asper, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 80.—Calif.
confinis, Greene, Pittonia, v. 62.—Am. bor.
consimilis, Greene, l. c. 60.—Am. bor.
corymbosus, Elmer, in Coult. Bot. Gaz. xxxix. 50.—Calif.
falcatus, Greene, Pittonia, v. 62.—Am. bor.
filifolius, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 503.—Am. bor.
laetevirens, Greene, Pittonia, v. 61.—Am. bor.
laricinus, Greene, l. c. 110.—Am. bor.
leucocladus, Greene, l. c. 59.—Am. bor.
Macounii, Greene, l. c. 63.—Am. bor.
Moquianus, Greene, l. c. 60.—Am. bor.
nanus, Howell, Fl. N. W. Am. i. 302 (= *Aplopappus nanus*).—Am. bor.
Newberryi, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 652.—Am. bor.
orthophyllus, Greene, Pittonia, v. 62.—Calif.
patens, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 652.—Am. bor.
pinifolius, Greene, Pittonia, v. 60.—Am. bor.
resinosus, Howell, Fl. N. W. Am. i. 303 (= *Ericameria resinosa*).—Am. bor.
scoparius, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 504.—Am. bor.
tortuosus, Greene, Pittonia, v. 63.—Calif.
virens, Greene, l. c. 61.—Am. bor.
vulcanicus, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 80.—Calif.

CHRYSTOLIA, Montrouz. ex Beauvis. Gen. Montrouz. 82 = **Glycine**, Linn. (Legum.).
violacea, Montrouz. l. c. = G. tabacina.

CHRYSURUS, Pers. = **Lamarckia**, Moench (Gramin.).
paradoxus, Sommier, in Bull. Soc. Bot. Ital. 1902, 208.—Eur.

CHUQUIRAGA, Juss. (Compos.).
argentea, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 17 (= *Doniophyton argentinum*).—Patag.
Lehmannii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 648.—Ecuad.
popayanensis, *Hieron. l. c.* 649.—N. Granat.

CHUSQUEA, Kunth (Gramin.).
depauperata, *Pilg. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 149.—Peruv.
discolor, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 155.—Bras.
inamoena, *Pilg. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 150.—Peruv.
linearis, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 76.—Guian.
mexicana, *Hack. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xvii. 256.—Mexic.
Pittieri, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 153.—Am. cent.
picta, *Pilg. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 151.—Peruv.
polyclados, *Pilg. l. c.* 147.—Peruv.
pubispicula, *Pilg. l. c.* 148.—Peruv.
quitensis, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 154.—Ecuad.

CHUSQUEA:—
ramosissima, Pilg. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 149.—Peruv.
simplicissima, Pilg. l. c. 145.—Peruv.
straminea, Pilg. l. c. 147.—Peruv.
tarmensis, Pilg. l. c. 151.—Peruv.
Tonduzii, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. liii. 155.—Am. cent.
urelytra, Hack. l. c. 158.—Bras.
virgata, Hack. l. c. 156.—Am. cent.
Weberbaueri, Pilg. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 146.—Peruv.

CHYTRACULIA, P. Br. = **Calyptranthes**, Sw. (Myrtac.).
pallens, Britton, in Shattuck, Bahama Is. 260 = Cal. pallens.

CHYTRANTHUS, Hook. f. (Sapind.).
Laurentii, Wildem. Énum. Pl. Laurent, 146.—Afr. trop.

CHYTROGLOSSA, Reichb. f. (Orchid.).
paulensis, Edwall, in Revista Centr. Sci. Campinas, ii. 195.—Bras.

CICER, Tourn. (Legum.).
flexuosum, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xxiii. 102.—As. cent.
trifoliolatum, Bornm. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 849.—Persia.

CIENFUEGOSIA, Cav. (Malvac.).
[FUGOSIA, Juss. I. K.]
affinis, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1902, 54 (= Hibiscus affinis).—Am. austr.
Benthamii, Hochr. l. c. 55.—Austral.
cuneiformis, Hochr. l. c. (= Fugosia cuneiformis).—Austral.
cuyabensis, Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 171.—Bras.
Ellenbeckii, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxiii. 381.—Afr. trop.
eucholtzioides, Hochr. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 302.—Parag.
flaviflora, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1902, 56 (= Fugosia flaviflora).—Austral.
Gerrardii, Hochr. l. c. (= Fugosia Gerrardii).—Afr. austr.
gossypioides, Hochr. l. c. (= Sturtia gossypioides).—Austral.
hakeaefolia, Hochr. l. c. (= Hibiscus hakeaefolius).—Austral.
Hassleriana, Hochr. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 302.—Parag.
latifolia, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1902, 57 (= Fugosia latifolia).—Austral.
populifolia, Hochr. l. c. (= Fugosia populifolia).—Austral.
Robinsoni, Hochr. l. c. (= Fugosia Robinsoni).—Austral.
somalensis, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxiii. 380.—Afr. trop.
subprostrata, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1902, 57.—Parag.
thespesioides, Hochr. l. c. 58 (= Fugosia thespesioides).—Austral.
triphylla, Hochr. l. c. 59 (= Fugosia triphylla).—Afr. trop.
Welshii, Guerke, ex Krause, in Engl. Jahrb. xxxv. 724 = C. Welshii, Guerke.

CIMICIFUGA, Linn. (Ranuncul.).
[ACTAEA, Linn. D. T. & H.]
heracleifolia, Kom. in Act. Hort. Petrop. xviii. 438.—Manchuria.

CINERARIA, Linn. (Compos.).
Buchanani, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 352.—Afr. trop.
foliosa, O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxx. 434.—Afr. trop.
Hamiltoni, S. Moore, in Journ. Bot. 1902, 382.—Afr. austr.
longipes, S. Moore, l. c. 1903, 400.—Afr. austr.
pentactina, Hook. f. Bot. Mag. t. 7799.—Afr. austr.?
repanda, Forst. Prod. Fl. Ins. Austr. 56 = Brachyglottis repanda.

CIPADESSA, Blume (Meliac.).
Warburgii, Perkins, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iv. 79.—Ins. Philipp.

CIRRHOPETALUM, Lindl. (Orchid.).
acutiflorum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. 779 (= Bulbophyllum acutiflorum).—Ind. or.
appendiculatum, Rolfe, in Kew Bull. 1901, 148.—Ind. or.
bicolor, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 14 (= Bulbophyllum bicolor).—China.
biflorum, J. J. Sm. in Ic. Bogor. t. 120 B (= Bulbophyllum biflorum).—Java.
breviscapum, Rolfe, in Bot. Mag. t. 8033.—Penins. Mal.
Cogniauxianum, Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 86.—Bras.
Henryi, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 15.—China.
Hookeri, Duthie, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 38.—Ind. or.
Ornithorhynchus, J. J. Sm. in Ic. Bogor. t. 121.—Java.
proliferum, Hort. in Kew Hand-list Orch. 1896, 57 = Collettii.
Thwaitesii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. 777 (= Bulbophyllum Thwaitesii).—Zeylan.
tigridum, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 15 (= Bulbophyllum tigridum).—China.

CIRSIUM, Adans. (Compos.).
[CNICUS, Tourn. I. K.]
accedens, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 61, 117.—Hybr.
Andrewsii, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 506 (= Cnicus Andrewsii).—Calif.
Babingtonii, Rouy, Illustr. Pl. Eur. t. 362.—Eur.
benearnense, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 61, 117.—Hybr.
Breweri, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 507 (= Cnicus Breweri).—Calif.
californicum, Jepson, l. c. 508 (= Cnicus californicus).—Calif.
callilepe, Jepson, l. c. 507 (= Carduus callilepis).—Calif.
Cardo-leonis, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 158.—Sicil.
corbariense, Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlix. 374.—Eur.
Coulteri, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 508 (= Carduus venustus).—Calif.
crassicaule, Jepson, l. c. 504 (= Carduus crassicaulis).—Calif.
dipsacolepis, Matsum. Enum. Sci. Names (1895) 82 (= Cnicus dipsacolepis).—Japon.
dubium, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 155.—Sicil.
Fleischeri, Podp. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, liv. 339.—Hybr.
Fleischmanni, Khek, in Allg. Bot. Zeitschr. 1905, 41.—Hybr.
fontinale, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 505 (= Carduus fontinalis).—Calif.
hydrophilum, Jepson, l. c. 507 (= Carduus hydrophilus).—Calif.
inundatum, Mak. in Bot. Mag. Tokyo, xix. 154.—Japon.
nipponicum, Mak. l. c. 155 (= Cnicus nipponicus).—Japon.
occidentalis, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 509 (= Carduus occidentalis).—Calif.
oligophyllum, Matsum. Enum. Sci. Names (1895) 82 (= Cnicus oligophyllus).—Japon.
pinetorum, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xli. 267.—Mexic.
purpuratum, Matsum. Enum. Sci. Names (1895) 83 (= Cnicus purpuratus).—Japon.
quercetorum, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 507 (= Cnicus quercetorum).—Calif.
remotifolium, Jepson, l. c. 508 (= Cnicus remotifolius).—Am. bor. occ.
Richeleanum, Tourl. in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 310.—Hybr.
Rouyana, Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 426.—Hybr.
Senneni, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 42; Fl. Fr. ix. 31.—Hybr.
spicatum, Matsum. Enum. Sci. Names (1895) 83 (= Cnicus spicatus).—Japon.
Tanakae, Matsum. l. c. (= Cnicus Tanakae).—Japon.
Thureti, Burnat, ex Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 58; Rouy, Fl. Fr. ix. 48.—Hybr.
yezoense, Mak. in Bot. Mag. Tokyo, xix. 155 (= Cnicus yesoensis).—Japon.

CISSAMPELOS, Linn. (Menisperm.).
Glaziovii, Taub. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. III. 16, nomen.—Bras.
Wildemaniana, Bossche, in Pl. Nov. Hort. Then. i. 5.—Afr. trop.

CISSUS, Linn. (Ampelid.).
[VITIS, Tourn. I. K.]
Baueri, Gilg, in Bauer, Deutsch. Niger-Benue Exped. 162, nomen.—Afr. trop.
chlorantha, Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 295.—Afr. trop.
fugosioides, Gilg, l. c. 294.—Afr. trop.
guaranitica, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 545.—Parag.
hypargyrea, Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 293.—Afr. trop.
Kukoma, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 210.—Afr. trop.
lanceolata, Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxvii. no. 11, 16.—Bras.
Laurentii, Wildem. Énum. Pl. Laurent, 148.—Afr. trop.
macilenta, Urb. Symb. Antill. iii. 318.—Ind. occ.
macrothyrsa, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iv. 186.—Afr. trop.
Picardae, Urb. Symb. Antill. iii. 317.—Ind. occ.
polycymosa, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 52.—Afr. trop.
Rivae, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iv. 185.—Afr. trop.
Ruspolii, Gilg, l. c. 186.—Afr. trop.
somaliensis, Gilg, l. c.—Afr. trop.
suberecta, Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl. xxvii. no. 8, 11 (= Vitis inundata).—Bras.
trinervis, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 210.—Afr. trop.
violaceo-glandulosa, Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 294.—Afr. trop.

CISTANCHE, Hoffmgg. & Link (Orobanch.).
lusitanica, Guim. in Broteria, iii. (1904) 190 (= Phelipaea lusitanica).—Lusitan.
Sintenisii, Beck, ex Bornm. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 686.—Oriens.
teretifolia, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1901, 153.—Afr. trop.
violacea, Hook. f. Bot. Mag. t. 7911.—Afr. bor.

CISTUS, Tourn. (Cistac.).
canadensis, Moç. ex Gross. in Engl. Pflanzenreich, Cistac. 46 = Halimium Coulteri.
ciliaris, Moç. ex Gross. l. c. 45 = Halimium chihuahuense.
flexuosus, Herb. Link, ex Gross. l. c. 47 = Halimium glomeratum.
hirtus, Thib. ex Gross. l. c. 89 = Helianthemum asperum.
obcordatus, Moç. ex Gross. l. c. 47 = Halimium glomeratum.
stoechadifolius, Hort. ex Gross. l. c. 69 = Helianthemum leptophyllum.

CITHAREXYLUM, Mill. (Verben.).
bahamense, Millsp. ex Britton, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 450.—Ind. occ.
crassifolium, Greenm. in Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem. vii. 70, nomen.—Am. cent.
Donnell-Smithii, Greenm. l. c. nomen.—Am. cent.
hexangulare, Greenm. l. c. nomen.—Am. cent.
macradenium, Greenm. l. c. nomen.—Am. cent.
Pringlei, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xli. 243.—Mexic.
pterocladum, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxxiii. 255.—Am. cent.
recurvatum, Greenm. in Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem. vii. 70, nomen.—Am. cent.

CITRIOBATUS, A. Cunn. (Pittospor.).
javanicus, Boerl. & Koord. in Ic. Bogor. t. lxxvii.—Malaya.

CITRUS, Linn. (Rutac.).
Garrawayi, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. xv. 491.—Austral.
Oxanthera, Beauvis. Gen. Montrouz. 14 (= Oxanthera fragrans).—N. Caled.
papuana, F. M. Bailey, Contrib. Fl. Brit. N. Guin. (reimpr. ex Rep. Brit. N. Guin. 1901–2) 1.—N. Guin.
Warburgiana, F. M. Bailey, l. c.—N. Guin.

CLADIUM, P. Br. (Cyperac.).
colpodes, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee, 69.—N. Guin.

CLADIUM:—
Gaudichaudii, W. F. Wight. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. 230 (= Baumea mariscoides).—Ins. Philipp. et Mariana.
lucense, Merino, in Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. ii. 65.—Eur.

CLADRASTIS, Rafin. (Legum.).
platycarpa, Mak. in Bot. Mag. Tokyo xv. 62 (= Sophora platycarpa).—Japon.
shikokiana, Mak. l. c. (= Sophora shikokiana).—Japon.

CLAOXYLON, A. Juss. (Euphorb.).
Dewevrei, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. 283.—Afr. trop.
Holstii, Pax, l. c. xxxiv. 372.—Afr. trop.
Menyharthi, Pax, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 877.—Afr. trop.

CLARKIA, Pursh (Onagr.).
parviflora, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 492.—Am. bor.

CLATHROTROPIS, Harms, in Dalla Torre & Harms, Gen. Siphon. 221 (1901). LEGUMINOSAE.
grandiflora, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. Beibl. lxxii. 27 (= Diplotropis grandiflora).—Bras.
nitida, Harms, l. c. (= Diplotropis nitida).—Bras.

CLAUSENA, Burm. f. (Rutac.).
Anisum-olens, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 21 (= Cookia Anisum-olens).—Ins. Philipp.
Bergeyckiana, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 743.—Afr. trop.
Warburgii, Perkins, Frag. Fl. Philipp. 162.—Ins. Philipp.

CLAUSIA, Trotzky (Crucif.).
[HESPERIS, Linn. I. K.]
hispida, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xxiii. 43.—As. cent.
mollissima, Lipsky, l. c. 44.—As. cent.
Olgae, Lipsky, l. c.—As cent.
sarawschanica, Lipsky, l. c. 45.—As. cent.
turkestanica, Lipsky, l. c. 41.—Turkestan.

CLAVIJA, Ruiz & Pav. (Myrsin.).
boliviensis, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Theophrast. 26.—Bolivia.
Eggersiana, Mez, l. c. 18.—Ecuador.
elliptica, Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II, v. 537.—Bras.
Engelsii, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Theophrast. 19.—N. Granat.
Hassleri, Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 235.—Parag.
Kalbreyeri, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Theophrast. 17 (= Theophrasta Kalbreyeri).—N. Granat.
Lehmannii, Mez, l. c. 18.—N. Granat.
longifolia, Mez, in Urb. Symb. Antill. ii. 438 (= Theophrasta longifolia).—Ind. occ.
membranacea, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Theophrast. 28.—Ecuador.
nobilis, Mez, l. c. 17 (= Theophrasta nobilis).—Ecuador.
parviflora, Mez, l. c. 27.—Peruv.
parvula, Mez, l. c. 23.—Ecuador.
Poeppigii, Mez, l. c. 25.—Peruv.
Radlkoferi, Mez, l. c. 21.—Hab.?
Ruiziana, Mez, l. c. 23 (= Theophrasta Ruiziana).—Peruv.
Schwackeana, Mez, l. c. 22.—Bras.
serrata, Mez, l. c. 23 (= Theophrasta serrata).—Peruv.
serratifolia, Mez, l. c.—N. Granat.
spinosa, Mez, l. c. 22 (= Horta spinosa).—Bras.
tarapotana, Mez, l. c. 24.—Peruv.
tenera, Mez, l. c. 22.—Bras.

CLAYTONIA, Gronov. (Portul.).
rosea, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 404.—Am. bor.

CLEIDION, Blume (Euphorb.).
papuanum, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 296.—N. Guin.

CLEISTANTHUS, Hook. f. (Euphorb.).
bipindensis, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. 282.—Afr. trop.
dasyphyllus, F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 31.—Penins. Mal.
libericus, N. E. Brown, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 113.—Afr. trop.

CLEISTANTHUS:—
orgyalis, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxvii. 75 (= Gluta orgyalis).—Ins. Philipp.
polyphyllus, F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 31.—Penins. Mal.

CLEISTOCACTUS, Lem. = **Cereus**, Mill. (Cact.).
aureus, A. Web. in Roland-Goss. Cleistoc. 11 = Cereus aureus.
Celsianus, A. Web. l. c. 16 (= Pilocereus Celsianus).—Bolivia.
chotaensis, A. Web. l. c. 19.—Ecuador.
Humboldtii, A. Web. l. c. 5 = Cereus Humboldtii.
hyalacanthus, Roland-Goss. Cleistoc. 5 = Cereus hyalacanthus.
icosagonus, A. Web. in Roland-Goss. Cleistoc. 6 = Cereus icosagonus.
Kerberi, Roland-Goss. Cleistoc. 5 = Cereus Kerberi.
lanatus, A. Web. in Roland-Goss. Cleistoc. 9 = Cereus lanatus.
laniceps, Roland-Goss. Cleistoc. 4 = Cereus laniceps.
monvilleanus, A. Web. in Roland-Goss. Cleistoc. 17 = Cereus monvilleanus.
parviflorus, Roland-Goss. Cleistoc. 4 = Cereus parviflorus.
parvisetus, A. Web. in Roland-Goss. Cleistoc. 18 = Cereus parvisetus.
sepium, A. Web. l. c. 8 = Cereus sepium.
serpens, A. Web. l. c. 11 = Cereus serpens.

CLEISTOPHOLIS, Pierre (Anonac.).
albida, Engl. & Diels, Monogr. Afr. Pfl. vi. 34 (= Anona albida).—Afr. trop.
glauca, Pierre, ex Engl. & Diels, l. c. 35.—Afr. trop.
gracilipes, Engl. & Diels, l. c. 34 (= Oxymitra gracilipes).—Afr. trop.
grandiflora, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 39.—Afr. trop.
Klaineana, Pierre, ex Engl. & Diels, Monogr. Afr. Pfl. vi. 35.—Afr. trop.
patens, Engl. & Diels, l. c. 35 (= Oxymitra patens).—Afr. trop.
platypetala, Engl. & Diels, l. c. 34 (= Oxymitra platypetala).—Afr. trop.
Staudtii, Engl. & Diels, l. c. 35 (= Oxymitra Staudtii).—Afr. trop.

CLEMATIS, Dill. (Ranunc.).
Antunesii, Engl. Jahrb. xxxii. 130.—Afr. trop.
biflora, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 193.—Calif.
coreana, Léveillé, in Bull. Acad. Géog. Bot. 1902, 298.—As. bor.
Clarkeana, Léveillé & Vaniot, l. c. 170.—China.
dictyota, Greene, Pittonia, v. 133.—Am. bor.
Drakeana, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot. 1902, 168.—China.
eriophora, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, xxix. 154.—Am. bor.
Finetiana, Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 219.—China.
flaccida, Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 421.—Am. bor.
funebris, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot. 1902, 168.—China.
Gagnepainiana, Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 219.—China.
hastata, Finet & Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 527.—China.
Jonesii, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, xxix. 153.—Am. bor.
koreana, Kom. in Act. Hort. Petrop. xviii. 438.—Corea.
Kuntziana, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot. 1902, 171.—China.
missouriensis, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 421.—Am. bor.
otophora, Franch. ex Finet & Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 548.—China.
Philippiana, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot. 1902, 169.—China.
pseudopogonandra, Finet & Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 549.—China.
pterantha, Dunn, in Hook. Ic. Pl. t. 2713.—China.
repens, Finet & Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 548.—China.
splendens, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot. 1902, 171.—China.

CLEMATIS:—
trullifera, Finet & Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 547.—China.
versicolor, Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 421.—Am. bor.

CLEMENTSIA, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1903) 3. CRASSULACEAE. [SEDUM, Linn. D. T. & H.]
rhodantha, Rose, ex Britton & Rose, l. c. (= Sedum rhodanthum).—Am. bor.

CLEOME, Linn. (Capparid.).
Gilletii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 36.—Afr. trop.
glabra, Taub. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. III. 19, nomen.—Bras.
Marsellei, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 181.—Afr. trop.
niamniamensis, Schweinf. & Gilg, ex Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 203.—Afr. trop.
Paxiana, Gilg, l. c.—Afr. trop.
polyanthera, Schweinf. & Gilg, ex Gilg, l. c. 202.—Afr. trop.
sinaloensis, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 198 (1905).—Mexic.
stenophylla, Klotzsch, ex Urb. Symb. Antill. iv. 251, descr.—Ind. occ.
titubans, Speg. in Bol. Agric. Buenos Aires, i. 236.—Argent.

CLEOMELLA, DC. (Capparid.).
alata, Eastw. in Zoe, v. 87 (1900).—Calif.
cornuta, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 249.—Am. bor.
Hillmani, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 171.—Am. bor.
nana, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 490.—Am. bor.
taurocranos, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 172.—Calif.

CLERODENDRON, Linn. (Verben.).
assurgens, K. Schum. in Just's Jahresb. xxviii. i. 496 (= Siphonanthus assurgens).—Afr. trop.
Baumii, Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 351.—Afr. trop.
botryoides, K. Schum. in Just's Jahresb. xxviii. i. 496 (= Siphonanthus botryoides).—Afr. trop.
costulatum, K. Schum. l. c. (= Siphonanthus costulata).—Afr. trop.
Curtisii, N. E. Br. in Kew Bull. 1901, 142.—Malaya.
dependens, Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 581.—Madag.
discolor, Becc. Nelle Foreste di Borneo, 203.—Borneo.
dumale, K. Schum. in Just's Jahresb. xxviii. i. 496 (= Siphonanthus dumalis).—Afr. trop.
Friesii, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 372.—N. Guin.
hastato-oblongum, C. B. Clarke, in Schmidt, in Bot. Tidsskr. xxvi. 174.—Siam.
hirsutum, H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap. v. 221 (= Cyclonema hirsutum).—Afr. austr.
japonicum, Mak. in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 91 (= Volkameria japonica).—Japon.
Kanichi, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 119.—Afr. trop.
katangensis, Wildem. l. c. 120.—Afr. trop.
Lindawianum, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 372.—N. Guin.
Picardae, Urb. Symb. Antill. iii. 367.—Ind. occ.
pilosum, H. H. W. Pearson, in Trans. S. Afr. Phil. Soc. xv. 181.—Afr. austr.
pusillum, Guerke, in Engl. Jahrb. xxx. 390.—Afr. trop.
quadriloculare, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 63 (= Ligustrum quadriloculare).—Ins. Philipp.
reflexum, H. H. W. Pearson, in Trans. S. Afr. Phil. Soc. xv. 182.—Afr. trop.
rhytidophyllum, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 371.—N. Guin.
sanguineum, K. Schum. in Just's Jahresb. xxviii. i. 496 (= Siphonanthus sanguinea).—Afr. trop.
Schmidtii, C. B. Clarke, in Schmidt, in Bot. Tidsskr. xxvi. 173.—Siam.
simile, H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap. v. 224 (1901).—Afr. austr.

CLERODENDRON :—
simile, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. (1905) 64.—Ins. Philipp.
triphyllum, *H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap.* v. 220 (= *Cyclonema triphyllum*).—Afr. austr.

CLETHRA, Gronov. (Ericac.).
Alcoceri, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 240.—Mexic.
luzonica, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 38.—Ins. Philipp.

CLIBADIUM, Linn. (Compos.).
anceps, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 97.—Mexic.
Eggersii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 598.—Ecuad.
glomeratum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 98.—Mexic.
Pittieri, *Greenm. l. c.*—Mexic.

CLIDEMIA, D. Don (Melastom.).
costaricensis, *Cogn. in Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem.* vii. 13, nomen.—Am. cent.
crotonifolia, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 179.—Peruv.
radicans, *Pilg. l. c.*—Reg. Amaz.
Ulei, *Pilg. l. c.* 180.—Peruv.
urticoides, *Pilg. l. c.*—Peruv.

CLIFFORTIA, Linn. (Rosac.).
alata, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 121.—Afr. austr.
Galpini, *N. E. Br. l. c.* 122.—Afr. austr.
subsetacea, *Diels, ex Bolus & Wolley-Dod, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xiv. 260.—Afr. austr.
tabularis, *Diels, ex Bolus & Wolley-Dod, l. c.* 259.—Afr. austr.

CLIMACORACHIS, Hemsl. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. (1903) 43. *LEGUMINOSAE.*
fruticosa, *Hemsl. & Rose, l. c.* 44.—Mexic.
mexicana, *Hemsl. & Rose, l. c.* 43.—Mexic.

CLINOGYNE, Salisb. (Scitamin.).
arillata, *K. Schum. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 232 (= *Donax arillata*).—Afr. trop.
Baumannii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 63.—Afr. trop.
chrysantha, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 166.—Afr. trop.
cordifolia, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 62.—Afr. trop.
flexuosa, *K. Schum. l. c.* 63 (= *Phrynium flexuosum*).—Afr. trop.
Hensii, *K. Schum. l. c.* 62 (= *Phrynium Hensii*).—Afr. trop.
holostachya, *K. Schum. l. c.* 65 (= *Phrynium holostachyum*).—Afr. trop.
inaequilatera, *K. Schum. l. c.* (= *Phrynium inaequilaterum*).—Afr. trop.
lasiocolea, *K. Schum. l. c.* 66.—Afr. trop.
leucantha, *K. Schum. l. c.* (= *Donax leucantha*).—Afr. trop.
monophylla, *K. Schum. l. c.* 64 (= *Phrynium monophyllum*).—Afr. trop.
oligantha, *K. Schum. l. c.* 66 (= *Donax oligantha*).—Afr. trop.
ramosissima, *K. Schum. l. c.* 64 (= *Phrynium ramosissimum*).—Afr. trop.
Schweinfurthiana, *K. Schum. l. c.* 62 (= *Donax Schweinfurthiana*).—Afr. trop.
similis, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 587.—Hab. ?
sulphurea, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 65 (= *Phrynium sulphureum*).—Afr. trop.
trichomyle, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

CLINOPODIUM, Linn. = **Calamintha**, Tourn. (Labiat.).
Clinopodium, Degen, in Magyar Bot. Lap. iv. 131 = Calamintha Clinopodium.
graecum, Brand, in Koch, Syn. Deutsch. Fl. ed. III. 2122 (= *Satureia graeca*).—Eur.
macrocalyx, Small, Fl. S. E. U. S. 1043.—Am. bor.

CLINTONIA, Rafin. (Liliac.).
umbellulata, *Shafer, in Ann. Carneg. Mus.* i. 100.—Am. bor.

CLISTOYUCCA, Trel. in Miss. Bot. Gard. Rep. 1902, 41. *LILIACEAE.*
arborescens, *Trel. l. c.* (= *Yucca arborescens*).—Am. bor.

CLITANDRA, Benth. (Apocyn.).
alba, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 64.—Afr. trop.
Arnoldiana, *Wildem. in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxxvi. (1903) 400.—Afr. trop.
Gentilii, *Wildem. Notes Apocyn. Laticif. Fl. Congo*, 25.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. Obs. Apocyn. Latex*, 37.—Afr. trop.
Lacourtiana, *Wildem. in Wildem. & Gentil, Lianes Caoutch. Congo*, 110.—Afr. trop.
membranacea, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 597.—Afr. trop.
nitida, *Stapf, l. c.* 595.—Afr. trop.
Nzunde, *Wildem. Notes Apocyn. Laticif. Fl. Congo*, 22.—Afr. trop.
oocarpa, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 598.—Afr. trop.
parvifolia, *Stapf, l. c.* 63 (= *Cylindropsis parvifolia*).—Afr. trop.
sclerophylla, *K. Schum. ex Stapf, l. c.* 67 = viscifiua.
Simoni, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 169.—Afr. trop.
Staudtii, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 67.—Afr. trop.
togolana, *Stapf, l. c.* 64 (= *Cylindropsis togolana*).—Afr. trop.

CLITORIA, Linn. (Legum.).
cearensis, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 305.—Bras.

CLIVIA, Lindl. (Liliac.).
cyrtanthiflora, *Wittm. Gartenfl.* 1904, 225 (= *Imantophyllum cyrtanthiflorum*).—Hybr.

CLUSIA, Linn. (Guttif.).
Salvinii, *Donn. Sm. in Bot. Gaz.* xxxv. (1903) 1.—Am. cent.

CLUYTIA, Boerh. (Euphorb.).
angustifolia, *Knauf, in Engl. Jahrb.* xxx. 340.—Afr. trop.
glabrescens, *Knauf, l. c.*—Afr. trop.
glauca, *Pax, in Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xv. 50.—Afr. austr.
Krookii, *Pax, l. c.* 49.—Afr. austr.
Paxii, *Knauf, in Engl. Jahrb.* xxx. 341.—Afr. trop.
Schlechteri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 373.—Afr. austr.

CLUYTIANDRA, Muell. Arg. (Euphorb.).
Engleri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 368.—Afr. trop.
fruticans, *Pax, l. c.* xxxiii. 276.—Afr. trop.
somalensis, *Pax, l. c.* 277.—Afr. trop.

CNEMIDOPHACOS, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 663. *LEGUMINOSAE.*
flavus, *Rydb. l. c.* 664 (= *Astragalus flavus*).—Am. bor.

CNESTIS, Juss. (Connarac.).
grandifoliolata, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 746.—Afr. trop.

CNICUS, Linn. (Compos.).
Bodinieri, *Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot.* 1903, 121.—China.
Cerberus, *Vaniot, l. c.* 120.—China.
monocephalus, *Vaniot, l. c.* 122.—China.
Norrisii, *Bickn. Fl. Bordighera*, 156.—Hybr.

CNIDIUM, Cusson = **Selinum**, Linn. (Umbell.).
formosanum, Yabe, in Journ. Coll. Sci. Tokyo, xvi. iv. 63.—Formosa.
longiradiatum, Yabe, l. c. 60 (= *Selinum longiradiatum*).—Japon.

CNIDOSCOLUS, Pohl = **Jatropha**, Linn. (Euphorb.).
texanus, Small, Fl. S. E. U. S. 706 (= *Jatropha texana*).—Am. bor.

COCCINIA, Wight & Arn. (Cucurb.).
calantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 358.—Afr. trop.
djurensis, *Schweinf. & Gilg, ex Gilg, l. c.* 357.—Afr. trop.
Engleri, *Gilg, l. c.* 354.—Afr. trop.
microphylla, *Gilg, l. c.* 357.—Afr. trop.
Petersii, *Gilg, l. c.* 356.—Afr. trop.
polyantha, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
Princeae, *Gilg, l. c.* 358.—Afr. trop.

COCCOCYPSELUM, P. Br. (Rubiac.).
Hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 169.—Parag.

COCCOGLOCHIDION, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, (1905) 292. *EUPHORBIACEAE.*
erythrococcus, *K. Schum. l. c.* 293.—N. Guin.

COCCOLOBA, Linn. (Polygon.).
Ernstii, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 685.—Venez.
Lehmannii, *Lindau, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 156.—N. Granat.
Meissneriana, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxviii. i. 451 (= *Uvifera Meissneriana*).—Boliv.
Tuerckheimii, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 213.—Am. cent.

COCCOTHRINAX, Sargent (Palm.).
acuminata, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 469 (= *Thrinax acuminata*).—Ind. occ.
argentea, *K. Schum. l. c.* (= *Thrinax argentea*).—Am. cent.
radiata, *K. Schum. l. c.* (= *Thrinax radiata*).—Ins. Trinit.

COCHLEARIA, Tourn. (Crucif.).
heterophylla, *Hausskn. & Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 5.—As. Min.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. iii. 195 = officinalis.

COCHLIODA, Lindl. (Orchid.).
brasiliensis, *Rolfe, in Gard. Chron.* 1904, ii. 141.—Bras.
vulcanica, *Benth. & Hook. f. ex Veitch, Man. Orchid.* ix. 189 (= *Mesospinidium vulcanicum*).—Ecuador.

COCOPS, O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 568. *PALMAE.*
rivalis, *O. F. Cook, l. c.*—Ind. occ.

COCOS, Linn. (Palm.).
amadelpha, *Barb. Rodr. Palm. Hassl. Nov.* 7.—Parag.
apaensis, *Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras.* i. 100.—Parag.
Arechavaletana, *Barb. Rodr. in Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, i. 43.—Urug.
arenicola, *Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras.* i. 100.—Parag.
Barbosii, *Barb. Rodr. l. c.* 86.—Bras.
campicola, *Barb. Rodr. Palm. Hassl. Nov.* 6.—Parag.
campylospatha, *Barb. Rodr. l. c.* 9.—Parag.
catechucarpa, *Barb. Rodr. in Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, i. 41.—Urug.
Cogniauxiana, *Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras.* i. 102.—Parag.
Dyerana, *Barb. Rodr. l. c.* i. 95.—Parag.
Glaziovana, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxi. *Beibl.* lxx. 21.—Bras.
Hassleriana, *Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras.* i. 101.—Parag.
lilliputiana, *Barb. Rodr. Palm. Hassl. Nov.* 5.—Parag.
quinquefaria, *Barb. Rodr. l. c.* 13.—Hort.
Romanzoffiano-pulposa, *Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras.* i. 116.—Urug.
stolonifera, *Barb. Rodr. in Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, i. 40.—Urug.
Urbaniana, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxi. *Beibl.* lxx. 22.—Bras.
Wildemaniana, *Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras.* i. 101.—Parag.

CODIA, Forst. (Saxifr.).
albicans, *Vieill. ex Pampan. in Ann. di Bot. Roma*, ii. 104.—N. Caled.
incrassata, *Pampan. l. c.* 105.—N. Caled.
microcephala, *Pampan. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 490.—N. Caled.

CODONANTHE, Hanst. (Gesner.).
caribaea, *Urb. Symb. Antill.* ii. 365.—Ind. occ.
Eggersii, *Urb. l. c.* 366.—Ind. occ.
formicarum, *Fritsch, in Karst. & Schenck, Vegetationsbilder*, iii. (1905) sub tt. 3–4.—Reg. Amaz.
Uleana, *Fritsch, l. c.*—Reg. Amaz.

CODONOPSIS, Wall. (Campanul.).
silvestris, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 425.—As. or.

COELACHNE, R. Br. (Gramin.).
Hackelii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 8.—Ins. Philipp.

COELOCARYON, Warb. (Myristic.).
cuneatum, *Warb. in Rev. Cult. Colon.* xii. (1903) 132; *et in Engl. Jahrb.* xxxiii. 385.—Afr. trop.
multiflorum, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 386.—Afr. trop.

COELOCOCCUS, H. Wendl. = **Metroxylon**, Rottb. (Palm.).
amicarum, W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. 244 (= *Sagus amicarum*).—Ins. Pacif.
carolinensis, Dingl. in Bot. Centralbl. xxxii. (1887) 349.—Ins. Pacif.
Warburgi, Heim, in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 572; et in Bull. Agric. Colon. Par. i. 11.—Ins. N. Hebrid.

COELOGLOSSUM, Hartm. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).
diphyllum, Fiori & Paol. Ic. Fl. Ital. 98.—Ital.

COELOGYNE, Lindl. (Orchid.).
cinnamomea, *Lindl. in Gard. Chron.* 1858, 37.—Hab.?
densiflora, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 81.—Penins. Mal.
grandiflora, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 23.—China.
Lawrenceana, *Rolfe, in Gard. Chron.* 1905, i. 227.—Anam.
modesta, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 141.—Java.
pallens, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 81.—Penins. Mal.
pholidotoidea, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 106 B.—Borneo.
rhizomatosa, *J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* i. 146.—Celebes.
septemcostata, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 106 A.—Malaya.
tumida, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 141.—Java.
yunnanensis, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 23.—China.

COELOSPERMUM, Blume (Rubiac.).
truncatum, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 51.—Penins. Mal.

COELOSTYLIS, Torr. & Gray = **Spigelia**, Linn. (Logan.).
Lindheimeri, Small, Fl. S. E. U. S. 922 = S. Lindheimeri.

COFFEA, Linn. (Rubiac.).
affinis, *Wildem. in Agric. Prat. Pays Chauds*, iv. 113.—Afr. trop.
Bonnieri, *Dubard, in Agric. Prat. Pays Chauds*, v. 96.—Madag.
excelsa, *Cheval. in Rev. Cult. Colon.* xii. 258; *et in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxl. 517.—Afr. trop.
Gallienii, *Dubard, in Agric. Prat. Pays Chauds*, v. 93.—Madag.
ligustrifolia, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 109.—Afr. trop.
Maclaudi, *Cheval. in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxl. 1474.—Afr. trop.
Mogeneti, *Dubard, in Agric. Prat. Pays Chauds*, v. 99.—Madag.
nudiflora, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 108.—Afr. trop.
Schmidtii, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 338.—Malaya.
silvatica, *Cheval. in Rev. Cult. Colon.* xii. 258.—Afr. trop.

COLA, Schott & Endl. (Stercul.).
Giletii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 58.—Afr. trop.
Millenii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 313.—Afr. trop.
rostrata, *K. Schum. l. c.* 314.—Afr. trop.
Scheffleri, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

COLCHICUM, Linn. (Liliac.).
bulgaricum, *Vel. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 32.—Eur.
glossophyllum, *Heldr. ex Halacsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 274.—Graecia.
Psaridis, *Heldr. ex Halacsy, l. c.*—Graecia.
velutinum, *Bornm. & Kneuck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1903, 63.—Sinai.
Zahnii, *Heldr. ex Halacsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 273.—Graecia.

COLEA, Boj. (Bignon.).
hirsuta, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 583.—Madag.
membranacea, *Aug. DC. l. c.*—Madag.

COLEOSANTHUS, Cass. = **Brickellia**, Ell. (Compos.).
albicaulis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 646.—Am. bor.
axillaris, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 149.—Am. bor.
congestus, Nelson, in Coult. Bot. Gaz. 1901, 401.—Am. bor.
gracilipes, Greene, Pittonia, iv. 237.—Calif.
melissaefolius, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 150.—Am. bor.
modestus, Greene, Pittonia, iv. 236.—Am. bor.
nepetaefolius, Greene, l. c. 237.—Am. bor.
populifolius, Greene, l. c. 238.—Am. bor.
reniformis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 646 (= *Brickellia reniformis*).—Am. bor.
umbellatus, Greene, Pittonia, iv. 238.—Am. bor.
venulosus, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 262.—Am. bor.

COLEOTRYPE, C. B. Clarke (Commelin.).
Laurentii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 377.—Afr. trop.

COLEUS, Lour. (Labiat.).
Baumii, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 357.—Afr. trop.
Copplai, *Heck. in Rev. Cult. Colon.* viii. 166; *et in Ann. Inst. Col. Marseilles*, viii. ii. (1901) 6.—Afr. trop.
Dazo, *Cheval. in Agric. Prat. Pays Chauds*, iv. 104.—Afr. trop.
heterotrichus, *Briq. in Th. Dur. & Wildem. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 40.—Afr. trop.
Menyharthi, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1074.—Afr. trop.
Pentheri, *Guerke, ex Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 48.—Afr. austr.
Rehmannii, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1075.—Afr. austr.
somalensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 265.—Afr. trop.

COLLINSIA, Nutt. (Scrophul.).
brachysiphon, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 214.—Calif.
breviflora, *Snksd. in W. Am. Sci.* xii. 54.—Am. bor.
glandulosa, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 505.—Am. bor.
multiflora, *Howell, l. c.*—Am. bor.
pusilla, *Howell, l. c.*—Am. bor.

COLOGANIA, Kunth (Legum.).
capitata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 41.—Mexic.
confusa, *Rose, l. c.* 37.—Am. bor.
congesta, *Rose, l. c.* 312.—Mexic.
Deamii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 492.—Mexic.
glabrior, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 38.—Am. cent.
grandiflora, *Rose, l. c.* 41.—Mexic.
Houghii, *Rose, l. c.* 39.—Mexic.
humilis, *Rose, l. c.* 40.—Mexic.
Nelsoni, *Rose, l. c.*—Mexic.
pallida, *Rose, l. c.* 38.—N. Mexic.
racemosa, *Rose, l. c.* 40.—Mexic.
rufescens, *Rose, l. c.* 38.—Am. cent.
scandens, *Rose, l. c.*—Mexic.

COLONA, Cav. = **Columbia**, Pers. (Tiliac.).
Blancoi, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. vi. 17 (= *Columbia Blancoi*).—Ins. Philipp.
longipetiolata, Merrill, l. c. 16.—Ins. Philipp.

COLQUHOUNIA, Wall. (Labiat.).
Seguini, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 165.—China.

COLUBRINA, Rich. (Rhamn.).
Colubrina, *Small, Fl. S. E. U. S.* 752 (= *Rhamnus Colubrina*).—Am. bor.
megacarpa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 50.—Mexic.

COLUMBIA, Pers. (Tiliac.).
hastata, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 105.—Ins. Philipp.
hirsuta, *Warb. in Perkins, l. c.* 106.—Ins. Philipp.
inaequidentata, *Warb. in Perkins, l. c.* 105, nomen.—Celebes.

COLUMBIA:—
Jagori, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 106.—Ins. Philipp.
lanceolata, *Warb. in Perkins, l. c.* 107.—Ins. Philipp.
mindanaensis, *Warb. in Perkins, l. c.*—Ins. Philipp.
mollis, *Warb. in Perkins, l. c.* 108.—Ins. Philipp.
scabra, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 368.—Tonkin.
subobovata, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 25.—Amboina.

COLUMNEA, Plum. (Gesner.).
calcarata, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 254.—Am. cent.
calotricha, *Donn. Sm. l. c.* xl. 9.—Am. cent.
cubensis, *Britton, in Torreya*, v. (1905) 215.—Cuba.
jamaicensis, *Urb. Symb. Antill.* ii. 359.—Ind. occ.
sulfurea, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 117.—Am. cent.

COLURIA, R. Br. (Rosac.).
longifolia, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. 486; *Mél. Biol.* xi. 215.—China.

COLUTEA, Tourn. (Legum.).
gracilis, *Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 46.—Turkestan.
Paulsenii, *Freyn, l. c.* 47.—As. cent.

COMANDRA, Nutt. (Santal.).
Richardsiana, *Fernald, in Rhodora*, 1905, 48.—Am. bor.

COMBRETUM, Linn. (Combret.).
angustifolium, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 213.—Afr. trop.
arbuscula, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 314.—Afr. trop.
arenarium, *Engl. & Gilg, l. c.* 318.—Afr. trop.
argyrochryseum, *Engl. & Gilg, l. c.* 320.—Afr. trop.
argyrophyllum, K. Schum. in Just's Jahresb. xxvii. i. 482 (sphalm.) = Terminalia argyrophylla.
aureonitens, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 315.—Afr. trop.
Baumii, *Engl. & Gilg, l. c.* 320.—Afr. trop.
Bosoi, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 195.—Afr. trop.
Butayei, *Wildem. l. c.* 196.—Afr. trop.
buvumense, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 152.—Afr. trop.
Cabrae, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 100.—Afr. trop.
Dekindtiana, *Engl. Jahrb.* xxxii. 136.—Afr. trop.
Dinteri, *Schinz, in Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 877.—Afr. trop.
Engleri, *Schinz, l. c.* 878.—Afr. trop.
Gentilii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 65.—Afr. trop.
gnidioides, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 319.—Afr. trop.
Grandidieri, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 42.—Madag.
Hasslerianum, *Chod. ex Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 345.—Parag.
Haullevilleanum, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 213.—Afr. trop.
Kamatutu, *Wildem. l. c.* 215.—Afr. trop.
lacteviride, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 316.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 197.—Afr. trop.
Leutweni, *Schinz, in Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* i. 878.—Afr. trop.
lukafuensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 214.—Afr. trop.
monticola, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 317.—Afr. trop.
pachycarpum, *Engl. & Gilg, l. c.* 316.—Afr. trop.
quirirense, *Engl. & Gilg, l. c.* 318.—Afr. trop.
sinuatipetalum, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 215.—Afr. trop.

COMINSIA, Hemsl. (Scitamin.).
gigantea, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 58 (= *Phrynium giganteum*).—Australas.

COMMELINA, Plum. (Commelin.).
Buchanani, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 47.—Afr. trop.
Carsoni, *C. B. Clarke, l. c.* 52.—Afr. trop.
Cecilae, *C. B. Clarke, l. c.* 51.—Afr. trop.

COMMELINA:—
Clarkeana, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. III. i. 245.—Afr. trop.
cuneata, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 51.—Afr. trop.
Dekindtiana, Fritsch, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 1105.—Afr. trop.
demissa, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 52.—Afr. trop.
elegantula, K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 182.—Afr. trop.
filifolia, K. Schum. l. c. 183.—Afr. trop.
grossa, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 60.—Afr. trop.
guaranitica, C. B. Clarke, ex Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 245.—Parag.
Holubii, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 61.—Afr. trop.
lagosensis, C. B. Clarke, l. c. 57.—Afr. trop.
Merkeri, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxvi. 207.—Afr. trop.
Nashii, Small, Fl. S. E. U. S. 242.—Am. bor.
neurophylla, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 53.—Afr. trop.
nyasensis, C. B. Clarke, l. c. 40.—Afr. trop.
opulens, C. B. Clarke, l. c. 58.—Afr. trop.
rufociliata, C. B. Clarke, l. c. 54.—Afr. trop.
saxicola, Small, Fl. S. E. U. S. 242.—Am. bor.
sphaerosperma, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 56.—Afr. trop.
subcucullata, C. B. Clarke, l. c. 53.—Afr. trop.
venusta, C. B. Clarke, l. c. 58.—Afr. trop.
villosa, C. B. Clarke, ex Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 435.—Parag.
violacea, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 39.—Afr. trop.
Zenkeri, C. B. Clarke, l. c. 59.—Afr. trop.

COMMIPHORA, Jacq. (Burser.).
albiflora, Engl. in Engl. Jahrb. xxxiv. 310.—Afr. trop.
arussensis, Engl. l. c. 305.—Afr. trop.
baluensis, Engl. l. c. 313.—Afr. trop.
huraensis, Engl. l. c. 309.—Afr. trop.
Dekindtiana, Engl. l. c. 312.—Afr. trop.
Ellenbeckii, Engl. l. c. 303.—Afr. trop.
Erlangeriana, Engl. l. c. 311.—Afr. trop.
flaviflora, Engl. l. c. 304.—Afr. trop.
foliolosa, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 480 (= Balsamea foliolosa).—Afr. trop.
fraxinoides, K. Schum. l. c. (= Balsamea fraxinoides).—Afr. trop.
heterophylla, Engl. in Engl. Jahrb. xxxiv. 306.—Afr. trop.
holosericea, Engl. l. c. 313.—Afr. trop.
Holtziana, Engl. l. c 310.—Afr. trop.
lindensis, Engl. l. c. 303.—Afr. trop.
montana, Engl. l. c. 312.—Afr. trop.
Muleiame, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 479 (= Balsamea Muleiame).—Afr. trop.
multijuga, K. Schum. l. c. 480 (= Balsamea multijuga).—Afr. trop.
Neumannii, Engl. in Engl. Jahrb. xxxiv. 306.—Afr. trop.
Nkolola, Engl l. c. 308.—Afr. trop.
pilosissima, Engl l. c.—Afr. trop.
rubriflora, Engl. l. c. xxx. 336.—Afr. trop.
rugosa, Engl. l. c. xxxiv. 307.—Afr. trop.
subsessilifolia, Engl. l. c. 303.—Afr. trop.
tomentosa, Engl. l. c. 308.—Afr. trop.
truncata, Engl. l. c. 309.—Afr. trop.
ugogensis, Engl. l. c. 314.—Afr. trop.

COMOMYRSINE, Hook. f. (Myrsin.).
Sodiroana, Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 535.—Ecuador.

COMONEURA, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1897) 1293 = **Octoknema**, Pierre (Olacac.).
Klaineana, Pierre, l. c. = O. Klaineana.

COMPSONEURA, Warb. (Myristic.).
costaricensis, Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 71.—Am. cent.
Ulei, Warb. ex Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 136.—Reg. Amaz.

CONANDRIUM, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. (1902) 156. MYRSINACEAE.
gymnopus, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 344.—N. Guin.

CONANDRIUM:—
polyanthum, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 157 (= Amblyanthus polyantha).—N. Guin.
rhynchocarpum, Mez, l. c. (= Ardisia rhynchocarpa).—Arch. Mal.

CONCEVEIBA, Aubl. (Euphorb.).
pubescens, Britton, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 306.—Bolivia.

CONCHOPHYLLUM, Blume = **Dischidia**, R. Br. (Asclep.).
papuanum, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 355.—Ins. Bismarck.

CONDGIEA, H. Baill. ex Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. IX. i. (1905) 300 = **Klainedoxa**, Pierre (Simarub.).
lanceolata, H. Baill. l. c. = K. lanceolata.
ovalifolia, H. Baill. l. c. = K. cuprea.

CONIMITELLA, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 96 (1905). SAXIFRAGACEAE.
Williamsii, Rydb. l. c. 97 (= Heuchera Williamsii).—Am. bor.

CONIOSELINUM, Fisch. = **Ligusticum**, Linn. (Umbell.).
Schugnanicum, B. Fedtsch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb. i. 135.—As. cent.

CONNARUS, Linn. (Connar.).
Gilgianus, Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 154.—Bras.
libericus, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 93.—Afr. trop.
Reynoldsii, Stapf, l. c. 94.—Afr. trop.

CONNELLIA, N. E. Br. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. vi. (1901) 66. BROMELIACEAE.
Augustae, N. E. Br. l. c. (= Encholirium Augustae).—Guiana.
Quelchii, N. E. Br. l. c. 67.—Guiana.

CONOCEPHALUS, Blume (Urtic.).
canescens, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 167.—Ins. Philipp.
cordifolius, Burg. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. ix. (1902) 220.—Borneo.
dubius, Burg. l. c. 225.—Borneo.
grandifolius, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 167.—Ins. Philipp.
intermedius, Burg. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. ix. (1902) 218.—Borneo.
oblongifolius, Burg. l. c. 222.—Borneo.
microstachys, Burg. l. c. 223.—Borneo.
papuanus, Burg. l. c. 228.—N. Guin.
scabrinervius, Burg. l. c. 223.—Borneo.
sengalensis, Burg. l. c. 226.—Sumatra.
violaceus, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxvii. 80 (= Procris violacea).—Ins. Philipp.

CONOCLINIUM, DC. = **Eupatorium**, Tourn. (Compos.).
flaccidum, Greene, Pittonia, iv. 274.—Am. bor.
Greggii, Small, Fl. S. E. U. S. 1169 (= Eupatorium Greggii).—Am. bor.
integrifolium, Small, l. c. 1170.—Am. bor.
nepetaefolium, Greene, Pittonia, iv. 274.—Am. bor.
venulosum, Greene, l. c. 273.—Am. bor.

CONOMORPHA, A. DC. (Myrsin.).
ampla, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 257.—Bras.
Candolleana, Mez, l. c. 256.—Guian.
caracasana, Mez, l. c. 260.—Venez.
citrifolia, Mez, l. c. 256.—Am. trop.
crotonoides, Mez, l. c. 262 (= Cybianthus crotonoides).—Guian.
dentata, Mez, l. c. 252.—Ecuador.
Dussii, Mez, in Urb. Symb. Antill. ii. 421.—Ind. occ.
fulvo-pulverulenta, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 258.—Guian.
glabra, Mez, l. c. 254.—Venez.
glaucorubens, Mez, l. c. 260.—Am. trop.
grandiflora, Mez, l. c. 258.—Am. trop.
iteoides, Mez, l. c. 254 (= Badula iteoides).—N. Granat.
Jelskii, Mez, l. c. 251.—Peruv.
laeta, Mez, l. c. 257.—Peruv.
latifolia, Mez, l. c. 255.—Guian.
laurifolia, Mez, l. c. 259.—Venez.

CONOMORPHA:—
magnoliifolia, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 258.—Guian.
meridensis, Mez, l. c. 255.—Venez.
nevadensis, Mez, l. c.—Venez.
obovata, Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 535.—Bras.
pastensis, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 252.—N. Granat.
perseoides, Mez, l. c.—N. Granat.
pseudo-icacorea, Mez, l. c. 261 (= Ardisia pseudo-icacorea).—Am. trop.
punctata, Mez, l. c. 260.—Guian.
quercifolia, Mez, l. c. 253.—Peruv.
Sodiroana, Mez, l. c. 254.—Ecuador.
spicata, Mez, l. c. 259 (= Myrsine spicata).—Venez.
Stapfii, Mez, l. c. 257.—N. Granat.
verticillata, Mez, l. c. 252 (= Myrsine verticillata).—Peruv.

CONOPHARYNGIA, G. Don (Apocyn.).
[PLUMERIA, Tourn. I. K.]
angolensis, Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 146 (= Tabernaemontana angolensis).—Afr. trop.
brachyantha, Stapf, l. c. 148 (= Tabernaemontana brachyantha).—Afr. trop.
contorta, Stapf, l. c. 142 (= Tabernaemontana contorta).—Afr. trop.
crassa, Stapf, l. c. 144 (= Tabernaemontana crassa).—Afr. trop.
Cumminsii, Stapf, l. c. 145.—Afr. trop.
durissima, Stapf, l. c. 143 (= Tabernaemontana durissima).—Afr. trop.
elegans, Stapf, l. c. 149 (= Tabernaemontana elegans).—Afr. trop.
Holstii, Stapf, l. c. 146 (= Tabernaemontana Holstii).—Afr. trop.
Johnstonii, Stapf, l. c. 147.—Afr. trop.
Jollyana, Stapf, l. c. 144.—Afr. trop.
longiflora, Stapf, l. c. 142 (= Tabernaemontana longiflora).—Afr. trop.
pachysiphon, Stapf, l. c. 146 (= Tabernaemontana pachysiphon).—Afr. trop.
penduliflora, Stapf, l. c. 149 (= Tabernaemontana penduliflora).—Afr. trop.
Smithii, Stapf, l. c. 142 (= Tabernaemontana Smithii).—Afr. trop.
Stapfiana, Stapf, l. c. 147 (= Tabernaemontana Stapfiana).—Afr. trop.
stenosiphon, Stapf, l. c. (= Tabernaemontana stenosiphon).—Afr. trop.
Thonneri, Stapf, l. c. 143 (= Tabernaemontana Thonneri).—Afr. trop.
usambarensis, Stapf, l. c. 148 (= Tabernaemontana usambarensis).—Afr. trop.

CONOPODIUM, Koch (Umbell.).
arvense, Calest. in Martelli, Webbia, 279 (= Heterotaenia arvensis).—Hispan.
bunioides, Calest. in Martelli, l. c. (= Bulinia bunioides).—Hispan.
majus, Le Grand, in Rev. Gén. de Bot. ix. 167, in obs. cum cit. falsa = denudatum, Koch.
thalictrifolium, Calest. in Martelli, Webbia, 279 (= Heterotaenia thalictrifolia).—Hispan.

CONOSPERMUM, Sm. (Proteac.).
Croniniae, Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. 143.—Austral.
Eatoniae, Pritz. ex Diels & Pritz. l. c. 141.—Austral.

CONOSTEGIA, D. Don (Melast.).
minutiflora, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 327.—Mexic.

CONOSTYLIS, R. Br. (Haemodor.).
Dielsii, Fitzger. in Journ. Muell. Soc. W. Austral. i. no. 11, 82.—Austral.
Harperiana, Fitzger. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. xxviii. 106.—Austral.
phathyrantha, Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. 111.—Austral.
psammophila, Diels, ex Diels & Pritz. l. c. 109 = Dielsii.
robusta, Diels, ex Diels & Pritz. l. c.—Austral.

CONOTHAMNUS, Lindl. (Myrtac.).
neglectus, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 430.—Austral.

CONRINGIA, Heist. (Crucif.).
australis, Bub. Fl. Pyren. iii. 181 = Erysimum australe.
polymorpha, Bub. l. c. 180 = Erysimum lanceolatum.
stricta, Bub. l. c. 179 = Erysimum strictum.
turritoides, Bub. l. c. = Erysimum cheiranthoides.

CONVOLVULUS, Tourn. (Convolv.).
ambigens, *House, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 139. —Am. bor.
Berryi, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 287. —Am. bor.
Bullerianus, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 63.—Afr. austr.
fraterniflorus, *Mackenzie & Bush, in Rep. Miss. Bot. Gard*, 1905, 104.—Am. bor.
Galpinii, *C. H. Wright, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 75.—Afr. austr.
Hilsenbergianus, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 61.—Madag.
huillensis, *Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 97 (= *Ipomoea huillensis*).—Afr. trop.
interior, *House, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 140.—Am. bor.
liniformis, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 61.—Afr. austr.
Randii, *Rendle, l. c.* 1902, 189.—Afr. trop.
rhynchophyllus, *Baker, ex Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. I. vi. 534, descr.—Afr. austr.
saxicola, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 495. —Calif.

CONYZA, Linn. (Compos.).
filaginoides, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 568 (= *Laennecia filaginoides*).—N. Granat.
Gallianii, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 169.—Afr. trop.
limosa, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 408.—Afr. trop.
pinnatifida, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 502.—China.
straminea, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 383. —Parag.

COPAIFERA, Linn. (Legum.).
Baumiana, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 246.—Afr. trop.
Chodatiana, *Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1047.—Parag.

COPROSMA, Forst. (Rubiac.).
chathamica, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxiv. 317.—Ins. Chatham.
laevigata, *Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 283.—Ins. Cook.
Moorei, *Rodw. Tasman. Fl.* 60.—Austral.

CORALLOCARPUS, Welw. (Cucurb.).
brevipedunculatus, *Gilg. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 366.—Afr. trop.
Bussei, *Gilg, l. c.* 363.—Afr. trop.
dissectus, *Cogn. in Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 881.—Afr. austr.
elegans, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 364.—Afr. trop.
Hildebrandtii, *Gilg, l. c.* 362.—Afr. trop.
leiocarpus, *Gilg, l. c.* 365.—Afr. trop.
longiracemosus, *Gilg, l. c.* 364.—Afr. trop.
pseudogijef, *Gilg, l. c.* 365.—Afr. trop.
tavetensis, *Gilg, l. c.* 362.—Afr. trop.

CORALLORHIZA, Hall. (Orchid.).
Grabhami, *Cockerell, in Torreya*, iii. 140.—N. Mexic.
ochroleuca, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 402.—Am. bor.
Vreelandii, *Rydb. l. c.* 1901, 271.—Am. bor.

CORCHOROPSIS, Sieb. & Zucc. (Tiliac.).
psilocarpa, *Harms & Loes. ex Gilg & Loes. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxv. 51.—China.
tomentosa, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 11 (= *Corchorus tomentosus*).—Japon.

CORCHORUS, Tourn. (Tiliac.).
lobatus, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 54. —Afr. trop.

CORDIA, Linn. (Borag.).
areolata, *Urb. Symb. Antill.* iii. 362.—Ind. occ.
calcicola, *Urb. l. c.* 359.—Ind. occ.
chiapensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 52.—Mexic.
exarata, *Urb. Symb. Antill.* iii. 358.—Ind. occ.

CORDIA :—
Gilletii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 71. —Afr. trop.
guaranitica, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 305.—Parag.
haitiensis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 357.—Ind. occ.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 815. —Parag.
heccaidecandra, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 25.—Am. cent.
Johnsoni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 13.—Afr. trop.
Mannii, *C. H. Wright, l. c.* 15 (= *Ehretia acutifolia*). —Afr. trop.
paraguariensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 305.—Parag.
Picardae, *Urb. Symb. Antill.* iii. 360.—Ind. occ.
propinqua, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 60.—Ins. Philipp.
pulchra, *Millsp. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 24. —Am. cent.
Rickseckeri, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot.* i. 522.—Ind. occ.
Seleriana, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 498.—Mexic.
stellata, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 86.—Mexic.
Uruguaya, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iv. i. (1902) 16.—Urug.
Warneckei, *Guerke, ex Baker & C. H. Wright in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 13.—Afr. trop.

CORDYLINE, Royen (Liliac.).
angustissima, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 63.—N. Guin.
hyacinthoides, *W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* ix. 249 (= *Aloe hyacinthoides*). —Zeylan.
kewensis, Hort. Sand. in Gard. Chron. 1903, i. 266 = Dracaena kewensis.

COREOPSIS, Linn. (Compos.).
angustata, *Greene, Pittonia*, iv. 239.—Am. bor.
arenicola, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 170.—Afr. trop.
Baumii, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 419.—Afr. trop.
crataegifolia, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 431.—Afr. trop.
cuneifolia, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 43.—Mexic.
Elliotii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 346.—Afr. trop.
falcata, *Boynton, in Biltm. Bot. Studies*, i. 141.—Am. bor.
Jacksoni, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 347.—Afr. trop.
lineariloba, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 430.—Afr. trop.
lupulina, *O. Hoffm. l. c.* 432.—Afr. trop.
ochracea, *O. Hoffm. l. c.* 431.—Afr. trop.
pinnatipartita, *O. Hoffm. l. c.* 432.—Afr. trop.
pulchra, *Boynton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1277.—Am. bor.
ruwenzoriensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 345.—Afr. trop.
similis, *Boynton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1278.—Am. bor.
stenophylla, *Boynton, in Biltm. Bot. Studies*, i. 141.—Am. bor.
ugandensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 347. —Afr. trop.
Whytei, *S. Moore, l. c.* 348.—Afr. trop.

CORISPERMUM, B. Juss. (Chenopod.).
emarginatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 404.—Am. bor.
marginale, *Rydb. l. c.* 1903, 247.—Am. bor.

CORMIGONUS, Rafin. = **Bikkia**, Reinw. (Rubiac.).
mariannensis, W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. 249 = B. mariannensis.

CORMUS, Spach = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).
foliolosa, Franch. in Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat. i. 103 = P. foliolosa.

CORNIDIA, Ruiz & Pav. = **Hydrangea**, Linn. (Saxifr.).
peruviana, Small, in N. Am. Fl. xxii. 161 = H. peruviana.

CORNULACA, Delile (Chenopod.).
Korshinskyi, *Litw. in Sched. Herb. Fl. Ross.* 1901, 78. —As. cent.

CORNUS, Tourn. (Cornac.).
Arnoldiana, *Rehder, in Sargent, Trees & Shrubs*, 79. —Hybr.
gracilis, *Koehne, in Mitth. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1903, 36.—Hab. ?
lanceolata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 55.—Mexic.
Nelsoni, *Rose, l. c.* 54.—Mexic.
Priceae, *Small, in Torreya*, i. 54.—Am. bor.
pumila, *Koehne, in Mitth. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1903, 46.—Hab. ?
Urbiniana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 54.—Mexic.

CORNUTIA, Plum. (Verben.).
cymosa, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 10.—Am. cent.

CORONOPUS, Rupp. = **Senebiera**, DC. (Crucif.).
australis, Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. viii. 426 = S. australis.
rhytidocarpus, Macl. l. c. = S. rhytidocarpa.

CORSIA, Becc. (Burmann.).
torricellensis, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 74.—N. Guin.
unguiculata, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.

CORTADERIA, Stapf = **Moorea**, Lemaire (Gramin.).
dioica, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 194 = M. argentea.
Sodiroana, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 238. —Ecuador.

CORYDALIS, Vent. (Papav.).
Alexeenkoana, *Busch, in Act. Hort. Tiflis*, ix. *Suppl.* 56.—Reg. Caucas.
Cavaleriei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 5.—China.
chelidoniifolia, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot.* 1902, 174.—China.
daucifolia, *Léveillé & Vaniot, l. c.* 172.—China.
Duclouxii, *Léveillé & Vaniot, l. c.* 174.—China.
Fumaria, *Léveillé & Vaniot, l. c.* 172.—China.
japonica, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 61.—Japon.
macrocalyx, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 30.—Turkestan.
Martini, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot.* 1902, 173.—China.
Pacroskii, *Busch, in Act. Hort. Tiflis*, ix. *Suppl.* 55.—Reg. Caucas.
pallidiflora, *Busch, l. c.* 52.—Reg. Caucas.
Schanginii, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 372 (= *Fumaria Schanginii*).—Turkestan.
tomentosa, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1903, ii. 123.—China.
Wetherillii, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 524. —Am. bor.
Wilsoni, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1903, ii. 123.—China.

CORYLOPSIS, Sieb. & Zucc. (Hamamel.).
Gotoana, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 114.—Japon.

CORYNANTHE, Welw. (Rubiac.).
brachythyrsus, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berl.* iii. 95.—Afr. trop.
Johimbe, *K. Schum. l. c.* 94.—Afr. trop.
pachyceras, *K. Schum. l. c.* 96.—Afr. trop.

CORYNEPHORUS, Beauv. (Gramin.).
incanescens, Bub. Fl. Pyren. iv. 31 = canescens.

CORYNEPHYLLUM, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 28 (1905). *CRASSULACEAE.*
viride, *Rose, l. c.* 29.—Mexic.

CORYNOCARPUS, Forst. (Anacard.).
dissimilis, *Hemsl. in Ann. Bot.* xvii. 754.—N. Caled.
similis, *Hemsl. l. c.* 753.—Ins. N. Hebrides.

CORYPHA, Linn. (Palm.).
macrophylla, *Koster, in Bull. Soc. Tosc. Ort.* xxix. (1904) 81 (= *Livistona macrophylla*).—Hort.

CORYSANTHES, R. Br. (Orchid.).
Merrilli, *Ames, Orchid.* i. 65.—Ins. Philipp.
minuta, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 82 (=*Liparis minuta*).—Polynes.

COSMIZA, Rafin. = **Polypompholyx**, Lehm. (Lentib.).
longecilinta, Small, Fl. S. E. U. S. 1090 = P. laciniata.

COSMONEURON, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1897) 1293 = **Ootoknema**, Pierre (Olacac.).
Klaineanum, Pierre, l. c. = O. Klaineana.

COSMOS, Cav. (Compos.).
ocellatus, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 265.—Mexic.

COSTUS, Linn. (Scitamin.).
anomocalyx, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 396.—Afr. trop.
araneosus, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 95.—Afr. trop.
Bakeri, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 387.—Am. cent.
brasiliensis, *K. Schum. l. c.* 403.—Bras.
chrysocephalus, *K. Schum. l. c.* 410.—Ins. Sunda?
congestiflorus, *Rich. ex Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 97.—Guiana.
Deistelii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 393.—Afr. trop.
dendrophilus, *K. Schum. l. c.* 416.—Afr. trop.
Dinklagei, *K. Schum. l. c.* 408.—Afr. trop.
dubius, *K. Schum. l. c.* 409 (=*Zingiber dubium*).—Afr. trop.
Dussii, *K. Schum. l. c.* 402.—Ind. occ.
erythrocoryne, *K. Schum. l. c.* 410.—Peruv.
fissiligulatus, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 93.—Afr. trop.
Gagnepainii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 420.—Bras.
geothyrsus, *K. Schum. l. c.* 410.—Ecuador.
guanaiensis, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 694.—Bolivia.
juruanus, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 389.—Bras.
lacerus, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 261.—Ind. or.
latifolius, *Gagnep. l. c.* xlix. 101.—Bras.
Lima, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 388.—Am. cent.
littoralis, *K. Schum. l. c.* 395.—Afr. trop.
macranthus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 279.—Afr. trop.
macrostrobilus, *K. Schum. in Urb. Symb. Antill.* iv. 159.—Ind. occ.
maximus, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 405.—Am. cent.
megalobractea, *K. Schum. l. c.* 407.—Afr. trop.
micranthus, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 556.—Ind. occ.
microcephalus, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 412.—Borneo.
nemotrichus, *K. Schum. l. c.* 414.—Afr. trop.
nutans, *K. Schum. l. c.* 407.—Am. cent.
oblitteratus, *K. Schum. l. c.* 393.—Afr. trop.
oligophyllus, *K. Schum. l. c.* 408.—Penins. Mal.
pauciflorus, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 100.—Bras.
phlociflorus, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 694.—Bras.
Pilgeri, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 404.—Bras.
pilosissimus, *K. Schum. l. c.* 420.—Bras.
pterometra, *K. Schum. l. c.* 394.—Afr. trop.
radicans, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 262.—Afr. trop.
Registrator, *Boerlage, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 1903, 437; *Ic. Bogor.* tt. 164-165.—Hab.?
Ridleyi, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 411.—Penins. Mal.
rosulifer, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 101.—Bras.
sanguineus, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 122.—Am. cent.
scaberulus, *Rich. ex Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 99.—Guiana.
splendens, *Donn. Sm. & Tuerckh. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 260.—Am. cent.

COSTUS:—
subbiflorus, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 394.—Afr. trop.
sulfureus, *K. Schum. l. c.* 412.—Celebes.
tonkinensis, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 248.—Tonkin.
ubangiensis, *Gagnep. l. c.* 97.—Afr. trop.
uluguruensis, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 396.—Afr. trop.
Zechii, *K. Schum. l. c.* 409.—Afr. trop.

COTONEASTER, Rupp. (Rosac.).
adpressa, *Bois, in Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 116.—China.
bullata, *Bois, in Vilm. & Bois, l. c.* 119.—Tibet.
Cotoneaster, Degen, in Magyar Bot. Lap. iv. 125 = integerrima.
Franchetii, *Bois, in Rev. Hortic.* 1902, 379.—China.

COTTENDORFIA, Schult. f. (Bromel.).
Rusbyi, *Baker, ex Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 697.—Bolivia.

COTULA, Tourn. (Compos.).
goughensis, *Rud. Brown, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 242.—Ins. Gough.

COTYLEDON, Tourn. (Crassul.).
Alstoni, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 93.—Afr. austr.
Beckeri, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 12.—Afr. austr.
chlorantha, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 578 (=*Umbilicus chloranthus*).—Eur. or.; As. Min.
Dinteri, *Baker f. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 818.—Afr. austr.
elegans, *N. E. Brown, in Bot. Mag.* t. 7993.—Mexico.
Flanagani, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 22.—Afr. austr.
Galpini, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 16.—Afr. austr.
glutinosa, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 119.—Afr. austr.
insignis, *N. E. Br. in Bot. Mag.* t. 8036.—Afr. trop.
intermedia, *Bornm. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 427.—Mader.
Iwarenge, *Mak. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 142.—Japon.
minuta, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 436.—As. or.
nudicaule, *Abrams, in Bull. S. Calif. Acad.* ii. 42.—Calif.
Plattiana, *Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 267.—Am. bor.
pulvinata, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7918.—Mexic.
tuberosa, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 577 (=*Umbilicus pendulinus*).—Graecia.
virescens, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 14.—Afr. austr.
Whitei, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 19.—Afr. austr.
Woodii, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 21.—Afr. austr.

COUEPIA, Aubl. (Rosac.).
Ulei, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 149.—Reg. Amaz.

COULTEROPHYTUM, Robins. (Umbell.).
Holwayi, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 336.—Mexic.

COUROUPITA, Aubl. (Myrtac.).
subsessilis, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 163.—Reg. Amaz.

COURSETIA, DC. (Legum.).
guaranitica, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 880.—Parag.
Hassleri, *Chod. l. c.*—Parag.
madrensis, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 258.—Mexic.
planipetiolata, *Micheli, l. c.*—Mexic.

COUSSAPOA, Aubl. (Urtic.).
oligocephala, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 11.—Am. cent.

COUSSAREA, Aubl. (Rubiac.).
impetiolaris, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 418.—Am. cent.
paraguariensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 180.—Parag.

COUTAREA, Aubl. (Rubiac.).
acamptoclada, *Robinson & Millsp. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 28.—Am. cent.

COWANIA, D. Don (Rosac.).
alba, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 55.—Am. bor.

CRABBEA, Harv. (Acanth.).
Galpinii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 40.—Afr. austr.
pedunculata, *N. E. Br. in Dyer, l. c.*—Afr. austr.
robusta, *N. E. Br. l. c.* 39.—Afr. austr.

CRACCA, Linn. = **Tephrosia**, Pers. (Legum.).
Chapmanii, Small, Fl. S. E. U. S. 612.—Am. bor.
holosericea, Small, l. c. 610 = T. holosericea.
latidens, Small, l. c. 609.—Am. bor.
macrantha, Rose, in Coult. Bot. Gaz. xl. 143 = T. macrantha.
Pringlei, Rose, l. c.—Mexic.
submontana, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 46.—Mexic.
talpa, Rose, in Coult. Bot. Gaz. xl. 143 = T. talpa.

CRANICHIS, Sw. (Orchid.).
cylindrica, *Ames, in Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem.* vii. 49, nomen.—Am. cent.
microphylla, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 158.—Bras.

CRANIOSPERMUM, Lehm. (Borag.).
subfloccosum, *Krylov, in Act. Hort. Petrop.* xxi. 10.—As. cent.

CRASPEDORHACHIS, Benth. (Gramin.).
Menyharthii, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 770.—Afr. trop.

CRASSOCEPHALUM, Moench = **Gynura**, Cass. (Compos.).
auriforme, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 171.—Afr. trop.
latifolium, S. Moore, in Journ. Bot. 1905, 141.—Ins. Philipp.
notonioides, S. Moore, l. c. 1902, 341.—Afr. trop.
ruwenzoriense, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 352.—Afr. trop.

CRASSOPETALUM, Northrop, in Mem. Torr. Bot. Club, xii. 48 sphalm. = CROSSOPETALUM, P. Br. = **Myginda**, Linn. (Celastr.).

CRASSULA, Dill. (Crassul.).
albanensis, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 55.—Afr. austr.
argyrophylla, *Diels, ex Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 290.—Afr. austr.
Bolusii, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 59.—Afr. austr.
brevistyla, *Baker f. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 813.—Afr. austr.
congesta, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1902, tr. 171.—Afr. austr.
conjuncta, *N. E. Br. l. c.* t. 106.—Afr. austr.
cornuta, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 285.—Afr. austr.
deceptor, *Schoenl. & Baker f. l. c.*—Afr. austr.
decipiens, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1903, i. 3.—Afr. austr.
Dielsii, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 117.—Afr. austr.
elegans, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 286.—Afr. austr.
enantiophylla, *Baker f. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 816.—Afr. austr.
Ernesti, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 288.—Afr. austr.
Kuhnii, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 114.—Afr. austr.
Leipoldtii, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 288.—Afr. austr.
limosa, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 58.—Afr. austr.
loriformis, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 289.—Afr. austr.
magellanica, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 456 (=*Tillaea magellanica*).—Reg. Magell.
Marlothii, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 59.—Afr. austr.
mesembrianthoides, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 284.—Afr. austr.
minutiflora, *Schoenl. & Baker f. l. c.* 288.—Afr. austr.
mucronata, *Keissl. in Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xv. 38.—Afr. austr.
nitida, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 54.—Afr. austr.
nodulosa, *Schoenl. l. c.* 56.—Afr. austr.

CRASSULA:—
pachyphylla, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 58.—Afr. austr.
paludosa, *P. Dusen, in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 22.—Patag.
quadrangularis, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 57.—Afr. austr.
Rattrayi, *Diels, ex Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 290.—Afr. austr.
Rehmanni, *Baker f. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 817.—Afr. austr.
remota, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 118.—Afr. austr.
rudis, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 288.—Afr. austr.
sedifolia, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1902, 429.—Afr. austr.
sessilifolia, *Baker f. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 815.—Afr. austr.
similis, *Baker f. l. c.* 814.—Afr. austr.
tenuipedicellata, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 288.—Afr. austr.
tenuis, *Dod. in Journ. Bot.* 1901, 399.—Afr. austr.
Tillaea, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 456 (= *Tillaea minima*).—Calif.; Am. austr.
Tysoni, *Schoenl. & Baker f. in Journ. Bot.* 1902, 289.—Afr. austr.
variabilis, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 122.—Afr. austr.

CRATAEGUS, Tourn. (Rosac.).
abdita, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 75.—Am. bor.
abjecta, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 636.—Am. bor.
aboriginum, *Sargent, in Rhodora*, v. 163.—Am. bor.
abstrusa, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 66.—Am. bor.
acutifolia, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* 1901, 217.—Am. bor.
acutiloba, *Sargent, in Rhodora*, iii. 23.—Am. bor.
adunca, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 87.—Am. bor.
adusta, *Beadle, l. c.* 110.—Am. bor.
aemula, *Beadle, l. c.* 53.—Am. bor.
agrestina, *Beadle, l. c.* 72.—Am. bor.
alacris, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 601.—Am. bor.
albemarlensis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. II. 10.—Am. bor.
albicans, *Ashe, l. c.* 20.—Am. bor.
albicera, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 132.—Am. bor.
algens, *Beadle, l. c.* 135.—Am. bor.
alma, *Beadle, l. c.* 64.—Am. bor.
alnorum, *Sargent, in Rhodora*, v. 153.—Am. bor.
altrix, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 282.—Am. bor.
amara, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. I. 22.—Am. bor.
amica, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 97.—Am. bor.
amicta, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. I. 26.—Am. bor.
amnicola, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 55.—Am. bor.
ampla, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. 615 (Sept. 1905).—Am. bor.
ampla, *Sargent, in Rhodora*, vii. 208 (Nov. 1905) = praec.!
ancisa, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 63.—Am. bor.
anisophylla, *Beadle, l. c.* 99.—Am. bor.
annosa, *Beadle, l. c.* 83.—Am. bor.
anomala, *Sargent, in Rhodora*, iii. 74.—Am. bor.
apiomorpha, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 386.—Am. bor.
apposita, *Sargent, l. c.* 103.—Am. bor.
aquilonaris, *Sargent, in Rhodora*, v. 185.—Am. bor.
arborea, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 137.—Am. bor.
arcana, *Beadle, l. c.* 122.—Am. bor.
arcuata, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. (1902) 387.—Am. bor.
Arduennae, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 377.—Am. bor.
arguta, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 102.—Am. bor.
arkansana, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 223.—Am. bor.
armata, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 136.—Am. bor.
armentalis, *Beadle, l. c.* 117.—Am. bor.

CRATAEGUS:—
Arnoldiana, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 221.—Am. bor.
arrogans, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 81.—Am. bor.
aria, *Beadle, l. c.* 130.—Am. bor.
ascendens, *Sargent, in Rhodora*, v. 141.—Am. bor.
asperifolia, *Sargent, l. c.* iii. 31.—Am. bor.
assimilis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 68.—Am. bor.
assurgens, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 383.—Am. bor.
atropurpurea, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. II. 12.—Am. bor.
attrita, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 98.—Am. bor.
audens, *Beadle, l. c.* 114.—Am. bor.
augusta, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 597.—Am. bor.
austera, *Sargent, l. c.* 586.—Am. bor.
austrina, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 59.—Am. bor.
baccata, *Sargent, in Rhodora*, vii. 176.—Am. bor.
Bartoniana, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 637.—Am. bor.
Bartramiana, *Sargent, l. c.* 582.—Am. bor.
basilica, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 125.—Am. bor.
Beadlei, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 113.—Am. bor.
bellula, *Sargent, Trees & Shrubs*, 111.—Am. bor.
Berlandieri, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* 1901, 230.—Am. bor.
bicolor, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. II. 12.—Am. bor.
Bissellii, *Sargent, in Rhodora*, v. 65.—Am. bor.
bisulcata, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 112.—Am. bor.
Blanchardi, *Sargent, in Rhodora*, vii. 218.—Am. bor.
blanda, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 121.—Am. bor.
blandita, *Sargent, in Rhodora*, v. 147.—Am. bor.
bona, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 587.—Am. bor.
borealis, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 111.—Am. bor.
Brainerdi, *Sargent, in Rhodora*, iii. 27.—Am. bor.
Brazoria, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 233.—Am. bor.
bristolensis, *Sargent, in Rhodora*, vii. 175.—Am. bor.
Brownii, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 519.—Am. bor.
brumalis, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 393.—Am. bor.
Brunetiana, *Sargent, in Rhodora*, v. 164.—Am. bor.
Buckleyi, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 25.—Am. bor.
Bushii, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 109.—Am. bor.
caesa, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. I. 24.—Am. bor.
calciglabra, *Schuette, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvi. 96.—Am. bor.
callida, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 123.—Am. bor.
callosa, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 595.—Am. bor.
calva, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 83.—Am. bor.
canadensis, *Sargent, in Rhodora*, iii. 73.—Am. bor.
Canbyi, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 3.—Am. bor.
carnosa, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. II. 14.—Am. bor.
cernua, *Ashe, l. c.* I. 25.—Am. bor.
Cerronis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 370.—Am. bor.
centrica, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 596.—Am. bor.
Chadsfordiana, *Sargent, l. c.* 660.—Am. bor.
champlainensis, *Sargent, in Rhodora*, iii. 20.—Am. bor.
chrysocarpa, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 110.—Am. bor.
ciliaria, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 120.—Am. bor.
cibilis, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii 232.—Am. bor.
cicur, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 307.—Am. bor.
cirrata, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 101.—Am. bor.
clara, *Beadle, l. c.* 95.—Am. bor.
cognata, *Sargent, in Rhodora*, v. 58.—Am. bor.
Coleae, *Sargent, Trees & Shrubs*, 7.—Am. bor.
Collinsiana, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 611.—Am. bor.

CRATAEGUS:—
colonica, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 104.—Am. bor.
coloradensis, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 175.—Am. bor.
Colorado, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 110.—Am. bor.
columbiana, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 229.—Am. bor.
comata, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 592.—Am. bor.
communis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 58.—Am. bor.
compitalis, *Beadle, l. c.* 93.—Am. bor.
concinna, *Beadle, l. c.* 70.—Am. bor.
condensa, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 617.—Am. bor.
condigna, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 35.—Am. bor.
conjuncta, *Sargent, in Rhodora*, v. 57.—Am. bor.
consanguinea, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 34.—Am. bor.
constans, *Beadle, l. c.* 88.—Am. bor.
contigua, *Sargent, in Rhodora*, v. 115.—Am. bor.
contrita, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 61.—Am. bor.
corporea, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 403.—Am. bor.
corusca, *Sargent, l. c.* xxxiii. 117.—Am. bor.
crassa, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. II. 13.—Am. bor.
Craytoni, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 121.—Am. bor.
cristata, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 392.—Am. bor.
crocata, *Ashe, l. c.* 389.—Am. bor.
crocea, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 113.—Am. bor.
crocina, *Beadle, l. c.* 132.—Am. bor.
crudelis, *Sargent, in Rhodora*, v. 143.—Am. bor.
cruenta, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. II. 16.—Am. bor.
crux, *Ashe, l. c.* xviii. I. 17.—Am. bor.
culta, *Sargent, in Rhodora*, vii. 199.—Am. bor.
cuprea, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 105.—Am. bor.
Curtisi, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 109.—Am. bor.
curva, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 109.—Am. bor.
cyanophylla, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 387.—Am. bor.
cyclophylla, *Sargent, in Rhodora*, vii. 210.—Am. bor.
Cydonia, *Gruber, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 390.—Am. bor.
Dallasiana, *Sargent, Trees & Shrubs*, 59.—Am. bor.
Damei, *Sargent, in Rhodora*, vii. 200.—Am. bor.
dapsilis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 89.—Am. bor.
darlingtoniana, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 653.—Am. bor.
decora, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. I. 17.—Am. bor.
deducta, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 602.—Am. bor.
definita, *Sargent, l. c.* 647.—Am. bor.
delawarensis, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 102.—Am. bor.
delecta, *Sargent, Man. Trees N. Amer.* 451.—Am. bor.
delicata, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 606.—Am. bor.
deltoides, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. II. 19.—Am. bor.
delucida, *Sargent, in Rhodora*, v. 139.—Am. bor.
demissa, *Sargent, l. c.*—Am. bor.
denaria, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 131.—Am. bor.
densiflora, *Sargent, in Rhodora*, iii. 75.—Am. bor.
depilis, *Sargent, Man. Trees N. Amer.* 419.—Am. bor.
depressa, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. II. 8.—Am. bor.
digna, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 628.—Am. bor.
dilatata, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 9.—Am. bor.
disjuncta, *Sargent, Trees & Shrubs*, 109.—Am. bor.
dispar, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 28.—Am. bor.
dissimilis, *Sargent, in Rhodora*, v. 149.—Am. bor.
dissona, *Sargent, l. c.* 60.—Am. bor.
divida, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 401.—Am. bor.
dolosa, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 90.—Am. bor.
dumicola, *Sargent, in Rhodora*, v. 183.—Am. bor.

CRATAEGUS:—
durobrivensis, *Sargent, Trees & Shrubs*, 8.—Am. bor.
Eamesi, *Sargent, Man. Trees N. Amer.* 454.—Am. bor.
Earlei, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 112.—Am. bor.
ebracteata, *Ashe, l. c.* 109.—Am. bor.
eburnea, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 395.—Am. bor.
edita, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 110.—Am. bor.
Edsoni, *Sargent, in Rhodora*, vii. 205.—Am. bor.
edura, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 128.—Am. bor.
egens, *Beadle, l. c.* 85.—Am. bor.
Egglestoni, *Sargent, in Rhodora*, iii. 30.—Am. bor.
egregia, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 82.—Am. bor.
Ellwangeriana, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 118.—Am. bor.
elongata, *Sargent, l. c.* xxxv. 380.—Am. bor.
Emersoniana, *Sargent, in Rhodora*, vii. 181.—Am. bor.
Engelmanni, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 2.—Am. bor.
erecta, *Sargent, l. c.* 218.—Am. bor.
erythrocarpa, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 109.—Am. bor.
erythropoda, *Ashe, l. c.* 118.—Am. bor.
Evansiana, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 633.—Am. bor.
exclusa, *Sargent, in Rhodora*, v. 108.—Am. bor.
exigua, *Sargent, l. c.* 52.—Am. bor.
exilis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 76.—Am. bor.
eximia, *Beadle, l. c.* 62.—Am. bor.
extraria, *Beadle, l. c.* 73.—Am. bor.
fastosa, *Sargent, Trees & Shrubs*, 61.—Am. bor.
Faxoni, *Sargent, in Rhodora*, v. 181.—Am. bor.
fecunda, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 111.—Am. bor.
felix, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 589.—Am. bor.
fera, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 128.—Am. bor.
Ferrissi, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. ii. 11.—Am. bor.
Fernaldi, *Sargent, in Rhodora*, v. 166.—Am. bor.
fertilis, *Sargent, l. c.* 182.—Am. bor.
festiva, *Sargent, l. c.* 54.—Am. bor.
firma, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 612.—Am. bor.
florea, *Sargent, in Rhodora*, v. 145.—Am. bor.
florens, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 94.—Am. bor.
floridana, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 124.—Am. bor.
fluviatilis, *Sargent, in Rhodora*, v. 117.—Am. bor.
foetida, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 389.—Am. bor.
Forbesae, *Sargent, in Rhodora*, v. 151.—Am. bor.
fortis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 92.—Am. bor.
fretalis, *Sargent, in Rhodora*, v. 112.—Am. bor.
Fretzii, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 604.—Am. bor.
frugalis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 100.—Am. bor.
frugiferens, *Beadle, l. c.* 30.—Am. bor.
fruticosa, *Sargent, Trees & Shrubs*, 13.—Am. bor.
fucosa, *Sargent, in Rhodora*, v. 187.—Am. bor.
fulgens, *Sargent, l. c.* vii. 182.—Am. bor.
fulva, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 649.—Am. bor.
furtiva, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 81.—Am. bor.
fusca, *Sargent, in Rhodora*, vii. 193.—Am. bor.
galbana, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 74.—Am. bor.
Gaultii, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 397.—Am. bor.
Gaylussacia, *A. A. Heller, in Bull. S. Calif. Acad.* ii. 69.—Calif.
gemmosa, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 119.—Am. bor.
genialis, *Sargent, in Rhodora*, v. 148.—Am. bor.
Georgiana, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 113.—Am. bor.
gilva, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 60.—Am. bor.
glabriuscula, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 235.—Am. bor.
glareosa, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. i. 21.—Am. bor.
glaucophylla, *Sargent, in Rhodora*, v. 140.—Am. bor.
grandis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. ii. 9.—Am. bor.

CRATAEGUS:—
Gravesii, *Sargent, in Rhodora*, v. 159.—Am. bor.
gravida, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 119.—Am. bor.
gravis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 49.—Am. bor.
gregalis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 118.—Am. bor.
grossiserrata, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 112.—Am. bor.
Gruberi, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 358.—Am. bor.
habilis, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 436.—Am. bor.
Handyae, *Sargent, in Rhodora*, vii. 177.—Am. bor.
Hargeri, *Sargent, l. c.* v. 66.—Am. bor.
Helenae, *Sargent, l. c.* vii. 162.—Am. bor.
Henryi, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 494.—China.
Hillii, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 384.—Am. bor.
hudsonica, *Sargent, Man. Trees N. Amer.* 457.—Am. bor.
hystricina, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 433.—Am. bor.
Ideae, *Sargent, in Rhodora*, vii. 211.—Am. bor.
ignava, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 81.—Am. bor.
illudens, *Beadle, l. c.* 111.—Am. bor.
illustris, *Beadle, l. c.* 68.—Am. bor.
impar, *Beadle, l. c.* 72.—Am. bor.
inanis, *Beadle, l. c.* 62.—Am. bor.
incana, *Beadle, l. c.* 113.—Am. bor.
incilis, *Beadle, l. c.* 41.—Am. bor.
incisa, *Sargent, in Rhodora*, vii. 193.—Am. bor.
induta, *Sargent, Trees & Shrubs*, 115.—Am. bor.
infera, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 651.—Am. bor.
ingens, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 56.—Am. bor.
ingrata, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 54.—Am. bor.
inopina, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 107.—Am. bor.
inops, *Beadle, l. c.* 98.—Am. bor.
insidiosa, *Beadle, l. c.* 94.—Am. bor.
insignis, *Sargent, Trees & Shrubs*, 107.—Am. bor.
insolens, *Sargent, in Rhodora*, vii. 217.—Am. bor.
insolita, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 622.—Am. bor.
insueta, *Sargent, l. c.* 599.—Am. bor.
integra, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 87.—Am. bor.
integriloba, *Sargent, in Rhodora*, iii. 78.—Am. bor.
interior, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 52.—Am. bor.
invicta, *Beadle, l. c.* 87.—Am. bor.
iracunda, *Beadle, l. c.* 124.—Am. bor.
irrasa, *Sargent, in Rhodora*, v. 116.—Am. bor.
Jackii, *Sargent, l. c.* 162.—Am. bor.
jejuna, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 593.—Am. bor.
Jesupi, *Sargent, in Rhodora*, v. 61.—Am. bor.
Jonesae, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 14.—Am. bor.
Keepii, *Sargent, in Rhodora*, v. 165.—Am. bor.
Kellogii, *Sargent, Trees & Shrubs*, 117.—Am. bor.
lacera, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 123.—Am. bor.
lacrimata, *Small, in Torreya*, i. 97.—Am. bor.
lanata, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 86.—Am. bor.
Laneyi, *Sargent, Trees & Shrubs*, 5.—Am. bor.
lanuginosa, *Sargent, Trees & Shrubs*, 113.—Am. bor.
lassa, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 29.—Am. bor.
lata, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 610.—Am. bor.
latisepala, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 109.—Am. bor.
lauta, *Sargent, in Rhodora*, vii. 206.—Am. bor.
Laurentiana, *Sargent, l. c.* iii. 77.—Am. bor.
laxa, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 103.—Am. bor.
laxiflora, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 400.—Am. bor.
lemingtonensis, *Sargent, in Rhodora*, vii. 216.—Am. bor.
lenis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 67.—Am. bor.
lenta, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. i. 18.—Am. bor.
lepida, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 38.—Am. bor.
Lettermani, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* 1901, 220.—Am. bor.
levis, *Sargent, in Rhodora*, vii. 198.—Am. bor.
limata, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 77.—Am. bor.
littoralis, *Sargent, in Rhodora*, v. 59.—Am. bor.
lobulata, *Sargent, l. c.* iii. 22.—Am. bor.
longipetiolata, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 621.—Am. bor.

CRATAEGUS:—
longispina, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 398.—Am. bor.
lucorum, *Sargent, l. c.* xxxi. 227.—Am. bor.
luculenta, *Sargent, Trees & Shrubs*, 11.—Am. bor.
macilenta, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 64.—Am. bor.
Mackenzii, *Sargent, in Mackenzie, Fl. Jackson County*, 108.—Am. bor.
macra, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 134.—Am. bor.
magniflora, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 383.—Am. bor.
maloides, *Sargent, Trees & Shrubs*, 9.—Am. bor.
marcida, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 53.—Am. bor.
matura, *Sargent, in Rhodora*, iii. 24.—Am. bor.
Megeene, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. i. 20.—Am. bor.
media, *Sargent, in Rhodora*, v. 150.—Am. bor.
membranacea, *Sargent, l. c.* 186.—Am. bor.
mendosa, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 65.—Am. bor.
meridiana, *Beadle, l. c.* 115.—Am. bor.
michiganensis, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 111.—Am. bor.
micracantha, *Sargent, Trees & Shrubs*, 69.—Am. bor.
micrantha, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 658.—Am. bor.
miniata, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 51.—Am. bor.
mira, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 78.—Am. bor.
missouriensis, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 110.—Am. bor.
mitis, *Sargent, Man. Trees N. Amer.* 407.—Am. bor.
modesta, *Sargent, in Rhodora*, iii. 28.—Am. bor.
modica, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 624.—Am. bor.
monstrata, *Sargent, in Rhodora*, v. 146.—Am. bor.
moselemensis, *Gruber, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905. 391.—Am. bor.
Moyeriana, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 818.—Am. bor.
multifida, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 52.—Am. bor.
multipes, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 111.—Am. bor.
munda, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 38.—Am. bor.
Napaea, *Sargent, in Rhodora*, vii. 203.—Am. bor.
nemoralis, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 104.—Am. bor.
neo-canbyi, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 638.—Am. bor.
neo-londinensis, *Sargent, Man. Trees N. Amer.* 443.—Am. bor.
nitida, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 231.—Am. bor.
nubicola, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 126.—Am. bor.
obesa, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 47.—Am. bor.
obtecta, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 233.—Am. bor.
olida, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 56.—Am. bor.
opima, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 40.—Am. bor.
otiosa, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 48.—Am. bor.
ovata, *Sargent, Man. Trees N. Amer.* 402.—Am. bor.
Paddockeae, *Sargent, in Rhodora*, vii. 202.—Am. bor.
Palmeriana, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 647.—Am. bor.
pallens, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 27.—Am. bor.
paludosa, *Sargent, Trees & Shrubs*, 15.—Am. bor.
Palmeri, *Sargent, l. c.* 57.—Am. bor.
panda, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 89.—Am. bor.
pascens, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. i. 23.—Am. bor.
pastorum, *Sargent, in Rhodora*, iii. 24.—Am. bor.
pauciispina, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 391.—Am. bor.
pausiaca, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 390.—Am. bor.
Peckietta, *Sargent, in Rhodora*, vii. 174.—Am. bor.
Peckii, *Sargent, l. c.* v. 63.—Am. bor.
pedicellata, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 226.—Am. bor.
pellucidula, *Sargent, in Rhodora*, vii. 179.—Am. bor.
penita, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 57.—Am. bor.
Pennypackeri, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 100.—Am. bor.
pennsylvanica, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 394.—Am. bor.

CRATAEGUS:—
pentandra, *Sargent, in Rhodora*, iii. 25.—Am. bor.
pentasperma, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 436.—Am. bor.
peoriensis, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 5.—Am. bor.
Pequotorum, *Sargent, in Rhodora*, v. 55.—Am. bor.
perlevis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 48.—Am. bor.
pexa, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 116.—Am. bor.
philadelphica, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 588.—Am. bor.
pilosa, *Sargent, in Rhodora*, v. 56.—Am. bor.
Piperi, *Britton, in Torreya*, i. 55.—Am. bor.
pisifera, *Sargent, in Rhodora*, vii. 163.—Am. bor.
polita, *Sargent, l. c.* v. 112.—Am. bor.
populnea, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 395.—Am. bor.
porracea, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. ii. 19.—Am. bor.
porrecta, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 391.—Am. bor.
praecox, *Sargent, in Rhodora*, iii. 25.—Am. bor.
praetermissa, *Sargent, l. c.* vii. 213.—Am. bor.
pratensis, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 6.—Am. bor.
premora, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 391.—Am. bor.
Pringlei, *Sargent, in Rhodora*, iii. 21.—Am. bor.
prismatica, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. ii. 15.—Am. bor.
propinqua, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 53.—Am. bor.
propria, *Sargent, in Rhodora*, vii. 214.—Am. bor.
pubifolia, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 114.—Am. bor.
pubipes, *Ashe, l. c.*—Am. bor.
pulla, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 96.—Am. bor.
pumila, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 612.—Am. bor.
pygmaea, *Sargent, l. c.* 650.—Am. bor.
pyracanthoides, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 186.—Am. bor.
quaesita, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies* i. 33.—Am. bor.
quinebaugensis, *Sargent, in Rhodora*, vii. 194.—Am. bor.
radiosa, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 657.—Am. bor.
raleighensis, *Ashe, in N. Carolina, Coll. Bull.* clxxv. 112.—Am. bor.
Randiana, *Sargent, in Rhodora*, v. 142.—Am. bor.
rava, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 91.—Am. bor.
Ravenelii, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 122.—Am. bor.
ravida, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. ii. 6.—Am. bor.
recurva, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 106.—Am. bor.
regalis, *Beadle, l. c.* 134.—Am. bor.
reses, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 55.—Am. bor.
resima, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 110.—Am. bor.
retrusa, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 49.—Am. bor.
Reverchoni, *Sargent, Trees & Shrubs*, 55.—Am. bor.
Rhodella, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. i. 19.—Am. bor.
rhombifolia, *Sargent, in Rhodora*, v. 183.—Am. bor.
rigens, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 54.—Am. bor.
rimosa, *Beadle, l. c.* 107.—Am. bor.
rivalis, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 580.—Am. bor.
roxnensis, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 114.—Am. bor.
Robbinsiana, *Sargent, in Rhodora*, vii. 197.—Am. bor.
Robesoniana, *Sargent, l. c.* v. 110.—Am. bor.
Robinsoni, *Sargent, l. c.* 184.—Am. bor.
robur, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 69.—Am. bor.
rubescens, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 111.—Am. bor.
rufipes, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 51.—Am. bor.
rustica, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 122.—Am. bor.
Ruthiana, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 591.—Am. bor.
rutila, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 399.—Am. bor.

CRATAEGUS:—
saturata, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 619.—Am. bor.
saxatilis, *Sargent, l. c.* 640.—Am. bor.
scabrida, *Sargent, in Rhodora*, iii. 29.—Am. bor.
scabriuscula, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 605.—Am. bor.
Schuettei, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. ii. 7.—Am. bor.
Schweinitziana, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 652.—Am. bor.
Searsi, *Sargent, in Rhodora*, vii. 188.—Am. bor.
Seelyana, *Sargent, l. c.* 209.—Am. bor.
segnis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 32.—Am. bor.
sequax, *Ashe, in Journ. E. Mitchell, Sci. Soc.* xx. 50.—Am. bor.
sera, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 115.—Am. bor.
serena, *Sargent, in Rhodora*, vii. 201.—Am. bor.
sertata, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 381.—Am. bor.
sextilis, *Sargent, l. c.* 390.—Am. bor.
Shaferi, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 397.—Am. bor.
Shallotte, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 113.—Am. bor.
Sheridani, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 370.—Am. bor.
signata, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 42.—Am. bor.
sinistra, *Beadle, l. c.* 44.—Am. bor.
sitiens, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 54.—Am. bor.
Smithii, *Sargent, Trees & Shrubs*, 67.—Am. bor.
sodalis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 50.—Am. bor.
sordida, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 114.—Am. bor.
spatiosa, *Sargent, in Rhodora*, vii. 180.—Am. bor.
speciosa, *Sargent, Trees & Shrubs*, 65.—Am. bor.
stolonifera, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 109.—Am. bor.
Stonei, *Sargent, in Rhodora*, v. 62.—Am. bor.
stratfordensis, *Sargent, l. c.* vii. 178.—Am. bor.
submollis, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 7.—Am. bor.
subrotundifolia, *Sargent, l. c.* xxxv. 394.—Am. bor.
subviridis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 51.—Am. bor.
sylvestris, *Auct. in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvi. 184.—Am. bor.
tarda, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 392.—Am. bor.
Tatnalliana, *Sargent, l. c.* 106.—Am. bor.
tecta, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 26.—Am. bor.
tenax, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. i. 21.—Am. bor.
tenella, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 388.—Am. bor.
tenera, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 52.—Am. bor.
tenuifolia, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 435.—Corea.
teres, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 43.—Am. bor.
tersa, *Beadle, l. c.* 129.—Am. bor.
tetrica, *Beadle, l. c.* 46.—Am. bor.
Thayeri, *Sargent, in Rhodora*, v. 113.—Am. bor.
tinctoria, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. i. 27.—Am. bor.
tortilis, *Ashe, l. c.* 19.—Am. bor.
torva, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 130.—Am. bor.
trachyphylla, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 388.—Am. bor.
Treleasei, *Sargent, Trees and Shrubs*, 63.—Am. bor.
Triosteum, *Gruber, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 392.—Am. bor.
trisperma, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xvii. ii. 17.—Am. bor.
tristis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 84.—Am. bor.
uber, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xx. 47.—Am. bor.
umbratilis, *Sargent, in Rhodora*, vii. 192.—Am. bor.
uplandia, *Sargent, in Proc. Acad. Philad.* lvii. (1905) 594.—Am. bor.
valida, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 77.—Am. bor.
vegeta, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 396.—Am. bor.
verruculosa, *Sargent, Man. Trees N. Amer.* 394.—Am. bor.
versuta, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 112—Am. bor.
viaria, *Beadle, l. c.* 101.—Am. bor.
viatica, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 398.—Am. bor.

CRATAEGUS:—
vicana, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 104.—Am. bor.
vicinalis, *Beadle, l. c.* 124.—Am. bor.
villaris, *Beadle, l. c.* 108.—Am. bor.
viminea, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. i. 23.—Am. bor.
virella, *Ashe, in Ann. Carneg. Mus.* i. 396.—Am. bor.
viridimontana, *Sargent, in Rhodora*, vii. 204.—Am. bor.
visenda, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 79.—Am. bor.
vitellina, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xviii. i. 267.—Am. bor.
vittata, *Ashe, l. c.* xx. 50.—Am. bor.
vulsa, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 39.—Am. bor.
Websteri, *Sargent, in Rhodora*, vii. 215.—Am. bor.
Wheeleri, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 369.—Am. bor.
Wilkinsoni, *Ashe, l. c.* xxxv. 435.—Am. bor.

CRATAEVA, Linn. (Capparid.).
speciosa, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 463.—Ins. Carol.

CRATERISPERMUM, Benth. (Rubiac.).
gramileoides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxii. 145.—Afr. trop.
reticulatum, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 158.—Afr. trop.

CRATYSTYLIS, S. Moore, in Journ. Bot. 1905, 138. *COMPOSITAE.*
conocephala, *S. Moore, l. c.* (= *Olearia conocephala*).—Austral.
microphylla, *S. Moore, l. c.* 139.—Austral.
subspinescens, *S. Moore, l. c.*—Austral.

CRAWFURDIA, Wall. (Gentian.).
trinervis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 171 (= *Convolvulus trinervis*).—Japon.
Tripterospermum, *Makino, l. c.* 172 (= *Tripterospermum trinerve*).—Java.

CREMANTHODIUM, Benth. (Compos.).
calotum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 105.—China.
Dezsyi, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 184.—As. cent.
Fletcheri, *Hemsl. l. c.* 185.—As. cent.
goringense, *Hemsl. l. c.*—As. cent.

CREMASTRA, Lindl. (Orchid.).
appendiculata, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 24 = Wallichiana.

CREMASTUS, Miers (Bignon.).
[BIGNONIA, Linn. 1. K.]
Sanctae-Annae, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 106.—Bras.

CREMNOPHILA, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 56 (1905). *CRASSULACEAE.*
nutans, *Rose, l. c.* (= *Sedum nutans*).—Mexic.

CREOCHITON, Blume (Melast.).
rosea, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 32.—Ins. Philipp.

CREPIS, Vaill. (Compos.).
alpicola, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 65.—Am. bor.
angustata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 135.—Am. bor.
Barberi, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 52.—Mexic.
Bockiana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 633.—China.
Cusickii, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 502.—Am. bor.
denticulata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 135.—Am. bor.
glaucella, *Rydb. l. c.* 1901, 512.—Am. bor.
Henryi, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 633.—China.
klikitatensis, *Suksd. ex Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 43.—Am. bor.
perplexans, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 134.—Am. bor.
petiolata, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
Phoenix, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 511.—China.
rapunculoides, *Dunn, l. c.* 512.—China.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 632.—China.
tomentulosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 134.—Am. bor.
tubaeformis, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* ii. 230.—Eur.

CREPIS:—
Vandasii, *Rohl. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1904, no. 38, 66.—Montenegr.
Velenovskyi, *Domin, in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1904, no. 18, 37.—Austria.

CRESCENTIA, Linn. (Bignon.).
Donnell-Smithii, *Sprague, ex Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem.* vii. 25, nomen.—Am. cent.

CRESSA, Linn. (Convolv.).
depressa, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 58.—Am. bor.

CRINUM, Linn. (Amaryll.).
amboense, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 666.—Afr. trop.
Baumii, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 199.—Afr. trop.
Boehmii, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 666.—Afr. trop.
Johnstoni, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7812.—Afr. trop.
Lugardae, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1903, II. 49.—Afr. trop.
Menyharthi, *Baker, in Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 859.—Afr. austr.
nerinoides, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 666.—Afr. trop.
ondongense, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
polyphyllum, *Baker, l. c.* 667.—Afr. trop.
Rattrayii, *Hort. in Gard. Chron.* 1905, II. 11.—Afr. trop.
Samuelii, *Worsley, in Gard. Chron.* 1902, II. 304.—Afr. trop.
Wimbushi, *Worsley, l. c.* 303.—Afr. trop.

CRIOSANTHES, Rafin. = **Cypripedium**, Linn. (Orchid.).
arietina, House, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 374 = Cypripedium arietinum.

CRISTARIA, Heist. (Malvac.).
Kuntzei, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 245.—Patag.
linoides, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 20 (= *Malvastrum linoides*); *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 576.—Patag.

CROCODILOIDES, Adans. = **Berkheya**, Ehrh. (Compos.).
Chamaepeuce, S. Moore, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1024.—Afr. trop.

CROCUS, Tourn. (Irid.).
sylvester, Bub. Fl. Pyren. iv. 151 = vernus.

CROFTIA, Small, Fl. S. E. U. S. 1068 (1903). *ACANTHACEAE*.
parvifolia, *Small, l. c.* (= *Schaueria parvifolia*).—Am. bor.

CROOKEA, Small, Fl. S. E. U. S. 786 (1903). *HYPERICACEAE*.
microsepala, *Small, l. c.* (= *Ascyrum microsepalum*).—Am. bor.

CROOMIA, Torr. (Roxburgh.).
kiusiana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 156.—Japon.

CROSSANDRA, Salisb. (Acanth.).
fruticulosa, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 112.—Afr. trop.
Jashi, *Lindau, l. c.* xxxviii. 70.—Afr. trop.

CROSSOPETALUM, P. Br. = **Myginda**, Linn. (Celastr.).
austrinum, J. R. Gardn. in Small, Fl. S. E. U. S. 736.—Am. bor.
coriaceum, Northrop, in Mem. Torr. Bot. Club, xii. 48.—Ind. occ.
floridanum, J. R. Gardn. in Small, Fl. S. E. U. S. 736.—Am. bor.

CROTALARIA, Dill. (Legum.).
abdal-kuriensis, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 32.—Socotra.
aculeata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 185.—Afr. trop.
angulicaulis, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 253.—Afr. trop.

CROTALARIA:—
Baumii, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 253.—Afr. trop.
Benthamiana, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 267.—Austral.
Catati, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 201.—Madag.
Dinteri, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 875.—Afr. trop.
Dinteri, *Schinz, l. c.* iii. 819.—Afr. trop.
dubia, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 185.—Afr. trop.
erecta, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 159.—Bras.
gracilenta, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 313.—Mexic.
Grevei, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 201.—Madag.
hirsutissima, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 819.—Afr. trop.
hispida, *Schinz, l. c.* 820.—Afr. trop.
lachnoclada, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 254.—Afr. trop.
leptocarpa, *Balf. f. Bot. Socotra*, 66.—Ins. Socotra.
leptoclada, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 255.—Afr. trop.
Lindenii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 819.—Afr. trop.
longifoliolata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 187.—Afr. trop.
lukafuensis, *Wildem. l. c.* 184.—Afr. trop.
minor, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1901, 121.—Afr. trop.
mutabilis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 820.—Afr. trop.
psammophila, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 255.—Afr. trop.
Seemeniana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 322.—Afr. trop.
sericifolia, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 255.—Afr. trop.
siamica, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 20.—Siam.
subcapitata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 186.—Afr. trop.
subsessilis, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 256.—Afr. trop.
tenuissima, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 46.—Mexic.
ukingensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 323.—Afr. trop.
viminalis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 47.—Mexic.

CROTON, Linn. (Euphorb.).
angustatus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 296.—Ind. occ.
arenicola, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 428.—Am. bor.
aureo-marginatus, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 496.—Parag.
brachytrichus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 298.—Ind. occ.
brevipes, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 290.—Am. cent.
chortstadenia, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 295.—N. Guin.
cuyabensis, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 166.—Bras.
dispar, *N. E. Brown, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 113.—Afr. trop.
Elliottianus, *Engl. & Pax, ex Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 289.—Afr. trop.
Engelmanni, Ferg. in Missouri Bot. Gard. Rep. xii. 54 = Lindheimeri.
enantiophyllus, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 296.—Ins. Bismarck.
flavescens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 81.—Mexic.
floridanus, *Ferg. in Missouri Bot. Gard. Rep.* xii. 50.—Am. bor.
glomeratus, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 566.—Madag.
Gonzalesii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 81.—Mexic.
Grosseri, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 290.—Am. cent.
guaraniticus, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 496.—Parag.
Hasslerianus, *Chod. l. c.* i. 396.—Parag.
heteranthus, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 566.—Madag.
jucundus, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 205 (1905).—Mexic.
lepidotus, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 565.—Madag.
litoralis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 294.—Ind. occ.

CROTON:—
macrostigma, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 396.—Parag.
maracayuensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 492.—Parag.
margaritensis, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 689.—Venez.
martinicensis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 295.—Ind. occ.
megaladenus, *Urb. l. c.* 278.—Ind. occ.
Milleri, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 690.—Venez.
miquelensis, Ferg. in Missouri Bot. Gard. Rep. xii. 49 = chamaedrifolius.
microtiglium, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 4.—Ins. Tonga.
Mocquerysi, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 565.—Madag.
paraguayensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 396.—Parag.
Picardae, *Urb. Symb. Antill.* iii. 297.—Ind. occ.
Poitaei, *Urb. l. c.* 300.—Ind. occ.
polytomus, *Urb. l. c.* 293.—Ind. occ.
Prionianus, *Urb. l. c.* 295.—Ind. occ.
pseudopulchellus, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 371.—Afr. trop.
pyramidalis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 7.—Am. cent.
rivinoides, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 395.—Parag.
rumicifolius, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 496.—Parag.
subglaber, *Urb. Symb. Antill.* iii. 301.—Ind. occ.
waltherioides, *Urb. l. c.* 292.—Ind. occ.
yerbalium, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 493.—Parag.

CROTONOGYNE, Muell. Arg. (Euphorb.).
argentea, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 283.—Afr. trop.
caterviflora, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 114.—Afr. trop.

CRUCIANELLA, Linn. (Rubiac.).
Sintenisii, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xviii. 49.—Reg. Casp.

CRUCKSHANKSIA, Hook. & Arn. (Rubiac.).
patagonica, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 740 (= *Oreopolus patagonicus*).—Patag.

CRUDIA, Schreb. (Legum.).
Havilandi, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 199.—Borneo.
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 97.—Afr. trop.
Mansoni, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 199.—Burma.
monophylla, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 80.—Afr. trop.

CRYPTANDRA, Sm. (Rhamn.).
myriantha, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 357.—Austral.
polyclada, *Diels, l. c.* 358.—Austral.

CRYPTANTHE, Benth. & Hook. f. = **Krynitzkia**, Fisch. & Mey. (Borag.).
depressa, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 29.—Am. bor.
dicarpa, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvi. 30.—Am. bor.
fallax, Greene, Pittonia, v. 54.—Calif.
gracilis, Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 236.—Am. bor.
grisea, Greene, Pittonia, v. 53.—Calif.
horridula, Greene, l. c. 55.—Calif.
Howellii, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 30 (= *C. multicaulis*, Howell).—Am. bor.
incana, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 79.—Calif.
minima, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 31.—Am. bor.
monosperma, Greene, Pittonia, v. 53.—Am. bor.
multicaulis, Howell, Fl. N. W. Am. i. 487 (*non* A. Nelson).—Am. bor.
simulans, Greene, Pittonia, v. 54.—Calif.
trifurca, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 203.—Calif.
vitrea, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. ii. 292.—Am. bor.

CRYPTOCARYA, R. Br. (Laurac.).
foetida, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxx. (1905) 517.—Austral.
grandifolia, Engl. ex Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 111 = Afrodaphne grandifolia.

CRYPTOCARYA:—
Gregsoni, *Maiden, in Journ. Linn. Soc. N. S. Wales,* xxvii. 347.—Austral.
minutiflora, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 11.—Bras.
nitens, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lxviii. 220.—Java.
Weinlandii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 270.—N. Guin.

CRYPTOCHILUS, Wall. (Orchid.).
bicolor, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 112 A (= *Mediocalcar bicolor*).—Ins. Malay.

CRYPTOCORYNE, Fisch. (Arac.).
purpurea, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xli. 44.—Penins. Mal.

CRYPTOLEPIS, R. Br. (Asclep.).
Baumii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. t. 247 (1902).—Afr. trop.
Baumii, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 340 (1903).—Afr. trop.
Debeerstii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. V. i. 180.—Afr. trop.
decidua, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. t. 243 (= *Curroria decidua*).—Afr. trop.
delagoensis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 26.—Afr. austr.
Hentii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. t. 246.—Afr. trop.
nigritana, *N. E. Br. in Dyer, l. c.* 251 (= *Ectadiopsis nigritana*).—Afr. trop.
producta, *N. E. Br. in Dyer, l. c.* 247.—Afr. trop.
suffruticosa, *N. E. Br. in Dyer, l. c.* 251 (= *Ectadiopsis suffruticosa*).—Afr. trop.

CRYPTOPHORANTHUS, Rodr. (Orchid.).
Lehmanni, *Rolfe, in Orch. Rev.* xi. 303.—N. Granat.
Moorei, *Rolfe, l. c.* 304.—Hab. ?

CRYPTOSEPALUM, Benth. (Legum.).
Boehmii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 156.—Afr. trop.
Busseanum, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
dasycladum, *Harms, l. c.* xxx. 319.—Afr. trop.
Debeerstii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 40.—Afr. trop.
exfoliatum, *Wildem. l. c.* 41.—Afr. trop.
pulchellum, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 321.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 39.—Afr. trop.

CRYPTOSPORA, Kar. & Kir. (Crucif.).
dentata, *Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 693.—As. cent.

CRYPTOSTYLIS, R. Br. (Orchid.).
papuana, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee,* 82.—N. Guin.

CRYPTOTAENIOPSIS, Dunn, in Hook. Ic. Pl. t. 2737 (1902). *UMBELLIFERAE.*
asplenioides, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 807.—China.
botrychioides, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 494.—China.
cardiocarpa, *Dunn, l. c.* 495 (= *Carum cardiocarpum*).—China.
Delavayi, *Dunn, l. c.* (= *Carum Delavayi*).—China.
filicina, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 806 (= *Carum filicinum*).—China.
leptophylla, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 495.—China.
mollis, *Dunn, l. c.* 496 (= *Carum molle*).—China.
Tanakae, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 806 (= *Carum Tanakae*).—China.
trichomanifolia, *Boissieu, l. c.* (= *Carum trichomanifolium*).—China.
vulgaris, *Dunn, in Hook. Ic. Pl.* t. 2737.—As. or.

CTENANTHE, Eichl. (Scitamin.).
dasycarpa, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 153 (= *Calathea dasycarpa*).—Am. cent.
Oppenheimiana, *K. Schum. l. c.* (= *Calathea Oppenheimiana*).—Bras.

CTENOPHRYNIUM, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. 68 (1902). *SCITAMINEAE.*
unilaterale, *K. Schum. l. c.* 69 (= *Phrynium unilaterale*).—Madag.

CTENOPHYLLUM, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 663. *LEGUMINOSAE.*
pectinatum, *Rydb. l. c.* (= *Phaca pectinata*).—Am. bor.

CUCUMIS, Tourn. (Cucurb.).
asper, *Cogn. in Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 882.—Afr. trop.
Dinteri, *Cogn. l. c.*—Afr. trop.

CULCASIA, Beauv. (Arac.).
barombensis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 177.—Afr. trop.
gracilis, *N. E. Br. l. c.*—Afr. trop.
insulana, *N. E. Br. l. c.* 175.—Afr. trop.
lancifolia, *N. E. Br. l. c.*—Afr. trop.
liberica, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 115.—Afr. trop.
longevaginata, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 297.—Afr. trop.
parviflora, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 176.—Afr. trop.
tubulifera, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 301.—Afr. trop.

CULCITIUM, Humb. & Bonpl. (Compos.).
Gilliesi, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 3.—Patag.
Panissae, *Duse, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. xii. 285.—N. Granat.

CUMBIA, Buch.-Ham. (Myrtac.).
australis, Britten, in Journ. Bot. 1901, 66 = Barringtonia Careya.

CUPANIA, Plum. (Sapind.).
largifolia, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 327.—Am. cent.

CUPANIOPSIS, Radlk. (Sapind.).
stenopetala, *Radlk. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 309.—N. Guin.

CUPHEA, P. Br. (Lythrac.).
axilliflora, *Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac.* 170.—Am. cent.
Bilimekii, *Koehne, l. c.* 155.—Mexic.
Bombonasae, *Sprague, in Ann. Bot.* xvii. 161.—Am. trop.
brachyantha, *Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac.* 132.—Bras.
Burchellii, *Koehne, l. c.* 131.—Bras.
Chodatiana, *Koehne, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii 254, 843.—Parag.
decipiens, *Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac.* 130.—Bras.
delicatula, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 213 (1905).—Mexic.
Hassleri, *Koehne, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 401.—Parag.
Humayana, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 214 (1905).—Mexic.
impexa, *Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac.* 143.—Bras.
ovalifolia, *Koehne, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 401.—Parag.
pauciflora, *Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac.* 132.—Venez.
tampotensis, *Sprague, in Ann. Bot.* xvii. 160.—Peruv.
urens, *Koehne, in Urb. Symb. Antill.* iii. 329.—Ind. occ.

CUPRESSUS, Tourn. (Conif.).
pygmaea, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 239.—Am. bor.

CURATELLA, Linn. (Dillen.).
Glazioviana, *Gilg, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 9, nomen.—Bras.

CURCULIGO, Gaertn. (Amaryll.).
megacarpa, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits,* xli. 33.—Penins. Mal.

CURCUMA, Linn. (Scitamin.).
alismatifolia, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. (1903) 259.—Cochinch.
coerulea, *K. Schum, in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 106.—Burma.
gracillima, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 161.—Cochinch.
parvula, *Gage, in Rec. Bot. Surv. India,* iii. 106.—Burma.
Ranadei, *Prain, in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* xi. 463 (1898).—Ind. or.

CURCUMA:—
sessilis, *Gage, in Rec. Bot. Surv. India,* iii. 106.—Burma.
sparganifolia, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. (1903) 260.—Cambodia.
stenochila, *Gagnep. l. c.* lii. 548.—Cochinch.

CURIMA, O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 561. *PALMAE.*
colophylla, *O. F. Cook, l. c.*—Ind. occ.
corallina, *O. F. Cook, l. c.* 563 (= *Martinezia corallina*).—Ind. occ.

CUSCUTA, Tourn. (Convolv.).
Anthemi, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 277.—Am. bor.
epitribulum, *Schinz. in Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 880.—Afr. trop.
Gerrardii, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 84.—Afr. austr.
glandulosa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 969.—Am. bor.
gracilis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 501.—Am. bor.
Hygrophilae, *H. H. W. Pearson, in Hook. Ic. Pl.* t. 2704.—Ind. or.
laxiflora, *Aznav. in Magyar Bot. Lap.* iv. 137.—Turcia.
Medicaginis, *C. H. Wright, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 86.—Afr. austr.
megalocarpa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 501.—Am. bor.
natalensis, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 85.—Afr. austr.

CUSPARIA, Humb. (Rutac.).
acuminata, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 154.—Reg. Amaz.

CUTHBERTIA, Small, Fl. S. E. U. S. 237 (1903). *COMMELINACEAE.*
graminea, *Small, l. c.*—Am. bor.
rosea, *Small, l. c.* (= *Tradescantia rosea*).—Am. bor.

CUVIERA, DC. (Rubiac.).
aspera, *Simk. in Magyar Bot. Lap.* iii. 86.—Eur.
macroura, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 352.—Afr. trop.
plagiophylla, *K. Schum. l. c.* 353.—Afr. trop.

CYANASTRUM, Oliver (Haemodor.).
Bussei, *Engl. Jahrb.* xxxviii. 88.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 5.—Afr. trop.

CYANELLA, Linn. (Haemodor.).
amboensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 943.—Afr. austr. or.
Pentheri, *Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien,* xv. 26.—Afr. austr.

CYANOSTEGIA, Turcz. (Verben.).
microphylla, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 100.—Austral.

CYANOTIS, D. Don (Commelin.).
flexuosa, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 84.—Afr. trop.

CYATHOCALYX, Cham. (Anonac.).
globosus, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 17.—Ins. Philipp.

CYATHOCHAETA, Nees (Cyperac.).
teretifolia, *Fitzger. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,* xxviii. 109.—Austral.

CYATHOGYNE, Muell. Arg. (Euphorb.).
Bussei, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 280.—Afr. trop.
spathulifolia, *Pax, l. c.* 281.—Afr. trop.

CYATHULA, Lour. (Amarant.).
albida, *Lopr. in Malpighia,* xiv. (1901) 446.—Afr. trop.
Merkeri, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl.* iii. 196, nomen; *Engl. Jahrb.* xxxvi. 207.—Afr. trop.
spathulifolia, *Lopr. in Malpighia,* xiv. (1901) 444.—Afr. austr.

CYBIANTHUS, Mart. (Myrsin.).
alpestris, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 224.—Bras.
comatus, *Mez, l. c.* 219.—Guiana.
Cruegeri, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 424.—Ind. occ.
cuyabensis, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 221.—Bras.

CYBIANTHUS:—
cyclopetalus, Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 538.—Bras.
egensis, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 222.—Reg. Amaz.
Fendleri, Mez, l. c. 218.—Venez.
Froelichii, Mez, l. c. 225.—Bras.
Glaziovii, Mez, l. c. 227.—Bras.
goyazensis, Mez, l. c. 222.—Bras.
gracillimus, Mez, l. c. 224.—Bras.
indecorus, Mez, l. c. 226.—Bras.
Klotzschii, Mez, l. c. 218.—Venez.
lagoensis, Mez, l. c. 223.—Bras.
Poeppigii, Mez, l. c. 218.—Peruv.
Regnellii, Mez, l. c. 222.—Bras.
resinosus, Mez, l. c. 219.—Peruv.
Schwackeanus, Mez, l. c. 224.—Bras.
Sellowianus, Mez, l. c.—Bras.
venezuelensis, Mez, l. c. 221.—Venez.

CYCAS, Linn. (Cycad.).
Micholitzii, Dyer, in Gard. Chron. 1905, ii. 142.—Cochinch.

CYCLADENIA, Benth. (Apocyn.).
venusta, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 77.—Am. bor.

CYCLAMEN, Tourn. (Primul.).
aedirhizum, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. 21.—Hab.?
albidum, Jord. l. c. 23.—Hab.?
albiflorum, Jord. l. c. 20.—Hab.?
algeriense, Jord. l. c. 22.—Alger.
angulare, Jord. l. c. 19.—Reg. Caucas.?
apiculatum, Jord. l. c. 15.—Hab.?
breviflorum, Jord. l. c. 18.—Hab.?
brevifrons, Jord. l. c. 15.—Hab.?
cyclophyllum, Jord. l. c. 18.—Ital.
eucardium, Jord. l. c. 16.—Hab.?
hiemale, Hildebr. in Gartenfl. 1904, 70.—As. Min.
holochlorum, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. 19.—Gallia.
ilicetorum, Jord. l. c. 17.—Gallia.
insulare, Jord. l. c. 20.—Corsica.
lilacinum, Jord. l. c. 19.—Ital.
lobospilum, Jord. l. c. 17.—Corsica.
pachybolbum, Jord. l. c. 22.—Alger.
pseud-ibericum, Hildebr. in Beih. Bot. Centralbl. x. 532.—Eur.
rarinaevum, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. 17.—Gallia.
repandum, Auct. ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 251 = balearicum.
sabaudum, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. 20.—Gallia.
spectabile, Jord. l. c. 16.—Hab.?
stenopetalum, Jord. l. c.—Graecia?
subrotundum, Jord. l. c. 21.—Afr. bor.
tunetanum, Jord. l. c. 23.—Tunis.
umbratile, Jord. l. c. 18.—Ital.
velutinum, Jord. l. c. 22.—Hab.?
venustum, Jord. l. c. 21.—Alger.
zonale, Jord. l. c. 15.—Hab.?

CYCLAMINOS, Heldr. = **Cyclamen**, Tourn. (Primul.).
Miliarakesii, Heldr. ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 254 = C. graecum.

CYCLEA, Arn. (Menisperm.).
polypetala, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 485.—China.

CYCLODISCUS, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. (1901) 490, sphalm. = **Cylicodiscus**, Harms (Legum.).

CYCLOSPATHE, O. F. Cook, in Mem. Torr. Bot. Club, xii. 25 (1902). *PALMAE.*
Northropi, O. F. Cook, l. c.—Ind. occ.

CYCLOSTEMON, Blume (Euphorb.).
bipindensis, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. 279.—Afr. trop.
Bordenii, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 26.—Ins. Philipp.
Gilgianus, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. 278.—Afr. trop.
laciniatus, Pax, l. c. 278.—Afr. trop.
leonensis, Pax, l. c. 280.—Afr. trop.
major, Pax, l. c. xxxiv. 369.—Afr. trop.

CYCLOSTEMON:—
microphyllus, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 27.—Ins. Philipp.
ugandensis, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 211.—Afr. trop.
usambaricus, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. 279.—Afr. trop.

CYCNIOPSIS, Engl. in Engl. Jahrb. xxxvi. (1905) 233. *SCROPHULARIACEAE.*
humifusa, Engl. l. c. (= Browallia humifusa).—Afr. trop.
minima, Engl. l. c.—Afr. trop.

CYCNIUM, E. Mey. (Scrophul.).
Albersii, Engl. Jahrb. xxxvi. 231.—Afr. trop.
asperrimum, Engl. l. c.—Afr. trop.
Ellenbeckii, Engl. l. c.—Afr. trop.
fruticans, Engl. l. c. 230 = erectum.
hamatum, Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 368.—Afr. trop.
Huttoniae, Hiern, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 397.—Afr. austr.
Questieauxianum, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 124.—Afr. trop.
rubriflorum, Engl. Jahrb. xxx. 405.—Afr. trop.
spicatum, Engl. l. c. xxxvi. 232.—Afr. trop.
Verdickii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 125.—Afr. trop.

CYDONIA, Tourn. (Rosac.).
chinensis, Lindl. Bot. Reg. xi. (1825) t. 905 = sinensis.
Sargentii, Hort. Lemoine ex K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 508.—Japon.
sinensis, Thouin, in Ann. Mus. Hist. Nat. Par. xix. (1812) 144.—China.

CYLICODISCUS, Harms, in Engl. & Prantl, Pflanzenf. Nachtr. i. (1897) 192. *LEGUMINOSAE.*
gabunensis, Harms, l. c. (= Erythrophloeum gabunense).—Afr. trop.

CYLICOMORPHA, Urb. in Engl. Jahrb. xxx. 115 (1901). *PASSIFLORACEAE.*
parviflora, Urb. l. c. 116.—Afr. trop.
Solmsii, Urb. l. c. 115 (= Jacaratia Solmsii).—Afr. trop.

CYLISTA, Ait. (Legum.).
Balfourii, Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1904, 34.—Socotra.
Schweinfurthii, Wagn. & Vierh. ex Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1904, 33.—Socotra.

CYMBALARIELLA, Nappi, in Bull. Ort. Bot. Napoli, i. (1903) 390. *SAXIFRAGACEAE.*
arachnoidea, Nappi, l. c. (= Saxifraga arachnoidea).—Helvet.
baborensis, Nappi, l. c. (= Saxifraga baborensis).—Algeria.
hederacea, Nappi, l. c. (= Saxifraga hederacea).—Eur. austr.; As. Min.
hederaefolia, Nappi, l. c. (= Saxifraga hederaefolia).—Abyss.
Huetiana, Nappi, l. c. (= Saxifraga Huetiana).—Kurdistan.
mollis, Nappi, l. c. (= Saxifraga mollis).—Oriens.
paradoxa, Nappi, l. c. (= Saxifraga paradoxa).—Carinth.
parviflora, Nappi, l. c. (= Saxifraga parviflora).—Sicil.
pumila, Nappi, l. c. (= Saxifraga pumila).—Qaid?
reticulata, Nappi, l. c. (= Saxifraga reticulata).—Sibir.
scothophila, Nappi, l. c. (= Saxifraga scothophila).—Oriens.
sibirica, Nappi, l. c. (= Saxifraga sibirica).—As. bor.
Sibthorpii, Nappi, l. c. (= Saxifraga Sibthorpii).—Graecia.

CYMBIDIUM, Sw. (Orchid.).
alborubens, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 11.—Japon.
atropurpureum, Rolfe, in Orch. Rev. 1903, 190.—Java.
erythrostylum, Rolfe, in Gard. Chron. 1905, ii. 427.—Anam.
Hoosai, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 27.—Japon.
insigne, Rolfe, in Gard. Chron. 1904, i. 387.—Anam.
Kanran, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 10.—Japon.
Mackinnoni, Duthie, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 40.—Ind. or.
pulcherrimum, Hort. Sand. in Gard. Chron. 1891, ii. 712 = Dayanum.

CYMBIDIUM:—
roseum, J. J. Sm. Orchid. Java, 476.—Java.
Sanderae, Hort. Sand. ex Rolfe, in Orch. Rev. 1904, 163 = Parishii.
Sanderi, Hort. Sand. in Gard. Chron. 1905, i. 115 = insigne.
scabroserrulatum, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 154.—Japon.
Schroederi, Rolfe, in Gard. Chron. 1905, i. 243.—Anam.
Zaleskianum, L. Linden, Lindenia, t. dcclxxviii.—Ind. or.

CYMBOPETALUM, Benth. (Anonac.).
longipes, Diels, in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 132.—Peruv.

CYMBOPOGON, Spreng. (Gramin.).
[ANDROPOGON, Linn. I. K. DT. & H.]
stypticus, Fritsch, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 1099 (= Andropogon stypticus).—Afr. trop.

CYMODOCEA, Kon. (Naiad.).
australis, Trimen, Cat. Ceyl. Pl. 99.—Zeylan.; Siam.

CYNANCHUM, Linn. (Asclep.).
congolense, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 190.—Afr. trop.
ecuadorense, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxiv. Beibl. lxxviii. 15.—Ecuador.
Giraldii, Schlechter, l. c. xxxvi. Beibl. lxxxii. 92.—China.
inamoenum, Loes. ex Gilg & Loes. in Engl. Jahrb. xxxiv. Beibl. lxxv. 60 (= Vincetoxicum inamoenum).—China.
Loheri, Schlecht. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 120.—Ins. Philipp.
Mannii, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 394 (= Vincetoxicum Mannii).—Afr. trop.
physocarpum, Schlecht. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 121.—Ins. Philipp.
praecox, Schlechter, ex S. Moore, in Journ. Bot. 1902, 256.—Afr. trop.
Schlechterianum, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 121.—Ins. Philipp.
somaliense, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 398 (= Schizostephanus somaliensis).—Afr. trop.
validum, N. E. Br. l. c. (= Schizostephanus alatus).—Afr. trop.

CYNOGLOSSUM, Tourn. (Borag.).
Austinae, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 203.—Calif.
boreale, Fernald, in Rhodora, 1905, 250.—Am. bor.
geometricum, Baker & C. H. Wright, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. ii. 52.—Afr. trop.
Mannii, Baker & C. H. Wright, l. c.—Afr. trop.
Pringlei, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 30.—Mexic.

CYNOMETRA, Linn. (Legum.).
Alexandri, C. H. Wright, in Johnston, Uganda Prot. i. 325.—Afr. trop.
Cloiselii, Drake, Hist. Pl. Madag. i. 75.—Madag.
congensis, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 127.—Afr. trop.
djumaensis, Wildem. l. c. 128.—Afr. trop.
Engleri, Harms, in Engl. Jahrb. xxxviii. 77.—Afr. trop.
Gilletii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 128.—Afr. trop.
Laurentii, Wildem. Enum. Pl. Laurent. 96.—Afr. trop.
Schlechteri, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. 77.—Afr. trop.
Schumanniana, Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 186.—N. Guin.
simplicifolia, Harms, l. c. 187.—Ins. Philipp.
Warburgii, Harms, l. c.—Ins. Philipp.

CYNORCHIS, Thou. (Orchid.).
uncata, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiii. 53.—Afr. trop.
villosa, Rolfe, ex Hook. f. in Bot. Mag. t. 7845.—Madag.

CYPELLA, Herb. (Irid.).
coriifolia, Baker, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 1108.—Parag.

CYPERUS, Mich. (Cyperac.).
Ajax, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 343.—Afr. trop.
aureobrunneus, C. B. Clarke, l. c. 346.—Afr. trop.
Bushii, Britton, Man. Fl. N. U. S. 1044.—Am. bor.
congensis, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 364.—Afr. trop.

CYPERUS:—
erectus, Roxb. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 205 = Pycreus globosus.
floridanus, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 170.—Am. bor.
grandibulbosus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 363.—Afr. trop.
Heudelotii, *C. B. Clarke, l. c.* 364.—Afr. trop.
incompressus, *C. B. Clarke, l. c.* 348.—Afr. trop.
japonicus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1904, 53.—Japon.
Kirkii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 318.—Afr. trop.
Korshinskii, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 235.—As. cent.
latispicatus, Boeckl. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 202 = angulatus.
lentiginosus, *Millsp. & Chase, in Field Columb. Mus. Bot.* iii. 74.—Am. cent.
leptophyes, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb. Beibl.* lxviii. 14.—Chili.
Litwinowi, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 233.—Turkestan.
longispicatus, *Norton, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xii. 37.—Am. bor.
microbolbos, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 354.—Afr. trop.
Nashii, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1321.—Am. bor.
nubicus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 360.—Afr. trop.
Plankii, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 172.—Am. bor.
poecilus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 328.—Afr. trop.
Pollardi, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1321.—Am. bor.
pterygorrachis, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 202.—Japon.
rubromarginatus, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 236.—As. cent.
Schlechteri, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 663.—Afr. austr.
spiculosus, F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 224 = monocephalus, *Baker*.
subuniflorus, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 173.—Am. bor.
Volkensii, K. Schum. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 366 = longus.

CYPHIA, Berg (Campan.).
Antunesii, *Engl. Jahrb.* xxxii. 147.—Afr. trop.
erecta, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 162.—Afr. trop.
scandens, *Wildem. l. c.* 163.—Afr. trop.
ubenensis, *Engl. Jahrb.* xxx. 419.—Afr. trop.

CYPHOCARPA, Lopr. (Amarant.).
Petersii, *Lopr. in Malpighia*, xiv. (1901) 439.—Afr. trop.
resedoides, *Lopr. l. c.* 437.—Afr. austr.
Wilmsii, *Lopr. l. c.* 438.—Afr. austr.

CYPHOCHLAENA, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1901, 465. *GRAMINEAE*.
madagascariensis, *Hack. l. c.*—Madag.

CYPHOLOPHUS, Wedd. (Urtic.).
Warburgianus, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 256.—N. Guin.

CYPHOSTIGMA, Benth. (Scitam.).
Curtisii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 272 (= *Elettariopsis Curtisii*).—Penins. Mal.
diphyllum, *K. Schum. l. c.* 272.—Borneo.
latiflorum, *K. Schum. l. c.* 274 (= *Elettariopsis latiflora*).—Penins. Mal.
longitubum, *K. Schum. l. c.* (= *Elettariopsis longituba*).—Penins. Mal.
pedicellatum, *K. Schum. l. c.* 271.—Zeylan.
pubescens, *K. Schum. l. c.* 274 (= *Elettariopsis pubescens*).—Penins. Mal.
Schmidtii, *K. Schum. l. c.* (= *Elettariopsis Schmidtii*).—Siam.
serpentinum, *K. Schum. l. c.* 272 (= *Elettariopsis serpentina*).—Penins. Mal.

CYPRIPEDIUM, Linn. (Orchid.).
Boccardianum, *Cogn. in Chron. Orchid.* i. 401.—Hybr.
glaucophyllum, *Mast. in Gard. Chron.* 1903, ii. 405 (= *Paphiopedilum glaucophyllum*).—Java.

CYPRIPEDIUM:—
Gratrixianum, *Hort. ex Mast. in Gard. Chron.* 1905, i. 76.—Cochinch.
Haywoodianum, *Hort. l. c.* 1905, i. 195.—Hybr.
Memoria-Fournieri, *Cogn. Dict. Ic. Orch. Cypr. Hybr.* t. 60.—Hybr.
veganum, *Cockerell & Barker, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiv. 178.—Am. bor.

CYRILLA, Garden (Cyrill.).
brevifolia, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 22.—Guiana.

CYRTANDRA, Forst. (Gesner.).
axillantha, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 380.—N. Guin.
Brownii, *K. Schum. l. c.* 376.—N. Guin.
ceratocalyx, *K. Schum. l. c.* 383.—N. Guin.
chrysalabastrum, *K. Schum. l. c.* 384.—N. Guin.
exserta, *K. Schum. l. c.* 382.—N. Guin.
floribunda, *K. Schum. l. c.* 377.—N. Guin.
fusco-vellea, *K. Schum. l. c.* 379.—N. Guin.
lasiantha, *K. Schum. l. c.*—N. Guin.
monticola, *K. Schum. l. c.* 381.—N. Guin.
oreogiton, *K. Schum. l. c.*—N. Guin.
pilostila, *K. Schum. l. c.* 378.—N. Guin.
polycarpa, *K. Schum. l. c.* 377.—N. Guin.
rarotongensis, *Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. *Bot.* vi. 290.—Ins. Cook.
sphaerocalyx, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 383.—N. Guin.
trachycaulis, *K. Schum. l. c.* 380.—N. Guin.

CYRTANTHUS, Ait. (Amaryll.).
inaequalis, *O'Brien, in Gard. Chron.* 1905, i. 261.—Afr. austr.

CYRTOPERA, Lindl. = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).
Stolziana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiii. 69.—Afr. trop.

CYRTOPODIUM, R. Br. (Orchid.).
lineatum, *Barb. Rodr. in Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, i. 52.—Bras.

CYRTORHYNCHA, Nutt. = **Ranunculus**, Tourn. (Ranunc.).
rupestris, Greene, Pl. Baker. iii. 3.—Am. bor.

CYRTOSTACHYS, Blume (Palm.).
Loriae, *Becc. in Martelli, Webbia*, 303.—N. Guin.

CYSTIUM, Stev. = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).
diphysum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 659 = A. diphysus.
ineptum, Rydb. l. c. = A. lentiginosus.

CYSTOPUS, Blume = **Odontochilus**, Blume (Orchid.).
muricatus, J. J. Sm. Orch. Ambon. 13.—Ins. Ambon.

CYTHEREA, Salisb. = **Calypso**, Salisb. (Orchid.).
bulbosa, House, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 382 = Calypso borealis.

CYTISUS, Linn. (Legum.).
Beanii, *Nichols. in Kew Hand-List Trees & Shrubs*, ed. II. 173.—Hybr.
Georgievi, *Davidoff, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 493.—Eur.
kewensis, *Bean, in Kew Hand-List Trees & Shrubs*, ed. II. 177.—Hybr.
Kovacevi, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 28, 3.—Bulgar.
Nejceffii, *Urum. ex Velen. l. c.* no. 28, 2.—Bulgar.
pseudopygmaeus, *Davidoff, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 491.—Eur.

D

DACRYDIUM, Soland. (Conif.).
biforme, *Pilg. in Engl. Pflanzenreich, Taxac.* 45 (= *Podocarpus biformis*).—N. Zel.
falciforme, *Pilg. l. c.* (= *Podocarpus falciformis*).—Borneo.

DACTYLIS, Linn. (Gramin.).
lobata, *Ostenfeld, in Bot. Tidsskr.* xxiv. 394.—Eur.

DACTYLOCTENIUM, Willd. = **Eleusine**, Gaertn. (Gramin.).
Hackelii, Wagn. & Vierh. ex Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1903, 434.—Socotra.

DAEDALACANTHUS, T. Anders. (Acanth.).
parvus, C. B. Clarke, in Kew Hand-List Dicot. 225 = Wattii.
Wattii, *Beddome, in Gard. Mag.* 1901, 644.—Ind. or.

DAEMIA, R. Br. (Asclep.).
caudata, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 90.—Socotra.

DAEMONOROPS, Blume (Palm.).
acantholobus, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 226.—Borneo.
annulatus, *Becc. l. c.* 227.—Borneo.
collariferus, *Becc. l. c.*—Borneo.
cristatus, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 608.—Borneo.
dissitophyllus, *Becc. l. c.*—Borneo.
diversispinus, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 229.—Borneo.
Draconcellus, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 608.—Borneo.
erinaceus, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 225.—Borneo.
Forbesii, *Becc. l. c.* 227.—Sumatra.
formicarius, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 608.—Borneo.
imbellis, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 220.—Penins. Mal.
intumescens, *Becc. l. c.* 222.—Penins. Mal.
lamprolepis, *Becc. l. c.* 223.—Celebes.
longispathus, *Becc. l. c.* 230.—Borneo.
mattanensis, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 609.—Borneo.
microstachys, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 225.—Borneo.
microthamnus, *Becc. l. c.* 231.—Penins. Mal.
Motleyi, *Becc. l. c.* 224.—Borneo.
ochrolepis, *Becc. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 47.—Ins. Philipp.
oxycarpus, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 607.—Borneo.
Pierreanus, *Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind.* ii. 220.—Cochinch.
pseudomirabilis, *Becc. l. c.* 226.—Sumatra.
ruptilis, *Becc. l. c.* 230.—Borneo.
scapigerus, *Becc. l. c.* 228.—Borneo.
singalanus, *Becc. l. c.* 219.—Sumatra.
sparsiflorus, *Becc. l. c.* 224.—Borneo.
stenophyllus, *Becc. l. c.* 220.—Sumatra.
ursinus, *Becc. l. c.* 222.—Borneo.
virescens, *Becc. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 47.—Ins. Philipp.

DAHLIA, Cav. (Compos.).
Chisholmi, *Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xxix. (1905) 439.—Mexic.

DAHLSTEDTIA, Malme, in Arkiv Bot. Stockh. iv. no. 9 (1905) 1. *LEGUMINOSAE*.
pinnata, *Malme, l. c.* 4 (= *Camptosema pinnatum*).—Bras.

DALBERGIA, Linn. f. (Legum.).
aestivalis, *Pierre, ex Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 107.—Cochinch.
Albertisii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 62.—N. Guin.
anomala, Pierre, ex Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc. x. 87 = paniculata.
Balansae, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 54.—As. or. austr.
bariensis, *Pierre, ex Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 96.—Cochinch.
Beccarii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 64.—Borneo.
boinensis, *Jumelle, in Comp. Rend. Acad. Sci. Par.* cxl. 462.—Madag.
Bojeri, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 177.—Madag.
borneensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 44.—Borneo.
cambodiana, *Pierre, ex Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 79.—Cochinch.
Campenoni, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 181.—Madag.
candenatensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 49 (= *Cassia candenatensis*).—As. or.; Australas.
Cloiselii, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 177.—Madag.
coromandeliana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 60.—Ind. or.

DALBERGIA:—
Curtisii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 58.—Malaya.
dongnaiensis, *Pierre, ex Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 97.—Cochinch.
Duperreana, *Pierre, ex Prain, l. c.*—Cochinch.
Dyeriana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 44.—China.
entadioides, *Pierre, ex Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 54, 107.—Cochinch.
eurybothrya, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 180.—Madag.
falcata, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 65.—Borneo.
florifera, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 146.—Afr. trop.
Forbesii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 61.—Malaya.
fusca, *Pierre, ex Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 56.—As. or. austr.
Gentilii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 147.—Afr. trop.
glaucescens, *Wildem. l. c.*—Afr. trop.
Godefroyi, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 63.—Siam.
Harmsiana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 194.—Afr. trop.
Havilandi, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 45.—Borneo.
Henryana, *Prain, l. c.* 46.—China.
Heudelotii, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 95.—Afr. trop.
Hoseana, *Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 67.—Borneo.
isangiensis, *Wildem. Énum. Pl. Laurent.* 116.—Afr. trop.
Jaherii, *Burck, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 47.—Ins. Mal.
kisantuensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 748.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent.* 116.—Afr. trop.
malabarica, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 48.—Ind. or.
mammosa, *Pierre, ex Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 96.—Cochinch.
medicinalis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 194.—Afr. trop.
megalocarpa, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 171.—Afr. trop.
Micheliana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 148.—Afr. trop.
Mimosella, *Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 42. (= *Amerimnon Mimosella*).—Ins. Philipp.
obtusifolia, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 42.—Burma; China.
parciflora, Benth. Pl. Jungh. i. 255 = parviflora.
Pierreana, *Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 72.—Cochinch.
Perrieri, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 186 (1902).—Madag.
Perrieri, *Jumelle, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxl. (1905) 453.—Madag.
pinnata, *Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 48 (= *Derris pinnata*).—Cochinch.
polyadelpha, *Prain, l. c.* 84.—China.
Poolii, *Baker, ex Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 177.—Madag.
sacerdotum, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 42.—China.
saigonensis, *Pierre, ex Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 88, 108.—Cochinch.
sambesiaca, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 998.—Afr. trop.
stenophylla, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 56.—China.
stercoracea, *Maing. ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 58.—Malaya.
szemaoensis, *Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* x. 91.—China.
tonkinensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 42.—As. or. austr.
tricolor, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 184.—Madag.
ugandensis, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 147.—Afr. trop.

DALEA, Linn. (Legum.).
arizonica, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 493 (= *Parosela arizonica*).—Am. bor.
erythrorhiza, *Greenm. in Zoe*, v. 185 (1904).—Mexic.
glandulosa, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxvii. 87.—Ins. Philipp.

DALEA:—
Hofstenii, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 132.—Reg. Argent.
minor, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 201 (1905) (= *Parosela minor*).—Mexic.
Saundersii, *Parish, in Bull. S. Calif. Acad.* ii. 83.—Calif.

DALECHAMPIA, Plum. (Euphorb.).
guaranitica, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 608.—Parag.
Hassleriana, *Chod. l. c.* 609.—Parag.
Passiflora, *Chod. & Hassl. l. c.*—Parag.
ulmifolia, *Chod. & Hassl. l. c.* 608.—Parag.

DALUCUM, Adans. = **Melica**, Linn. (Gramin.).
Bauhini, Bub. Fl. Pyren. iv. 351 = M. Bauhini.
ciliatum, Bub. l. c. 350 = M. ciliata.
Lobelianum, Bub. l. c. 353 = M. uniflora.
majus, Bub. l. c. 352 = M. minuta.
nutans, Bub. l. c. = M. nutans.
ramosum, Bub. l. c. 351 = M. minuta.

DAMPIERA, R. Br. (Gooden.).
Dielsii, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 581.—Austral.
dura, *E. Pritz. l. c.* 579.—Austral.
humilis, *E. Pritz. l. c.* 582.—Austral.
Mooreana, *E. Pritz. l. c.* 579.—Austral.
plumosa, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1908, 99.—Austral.
restiacea, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 580.—Austral.
stenostachya, *E. Pritz. l. c.* 577.—Austral.
tenuicaulis, *E. Pritz. l. c.* 580.—Austral.

DANAIS, Comm. (Rubiac.).
Chapelieri, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas*, t. 451 A.—Madag.

DANTHONIA, DC. (Gramin.).
americana, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xxx. 5.—Am. bor.
breviseta, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 192.—Bras.
epilis, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xxx. 7.—Am. bor.
macrophylla, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 192.—Bras.
planifolia, *Petrie, in Trans. & Proc. N. Zeal. Inst.* xxxiii. 328.—N. Zel.
thermalis, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xxx. 5.—Am. bor.

DAPHNANDRA, Benth. (Monimiac.).
tenuipes, *Perkins, in Engl. Pflanzenreich, Monim.* 75.—Austral.

DAPHNE, Tourn. (Thymel.).
Dauphini, *Hort. ex Rambault, in Le Jardin*, xvii. 73.—Hybr.

DAPHNOPSIS, Mart. & Zucc. (Thymel.).
Helleriana, *Urb. Symb. Antill.* ii. 453.—Ind. occ.

DARWINIA, Rudge (Myrtac.).
acerosa, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 17.—Austral.

DASISTOMA, Rafin. = **Gerardia**, Linn. (Scrophul.).
brachycarpa, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 452.—Am. bor.
calycosa, Mackenzie & Bush, in Rep. Miss. Bot. Gard. 1905, 105.—Am. bor.
dispersa, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 452.—Am. bor.
serrata, Small, l. c. 451; et in Britton, Man. Fl. N. U. S. 836 = G. serrata.
virginica, Britton, in Mem. Torr. Bot. Club, v. (1894) 295 = G. quercifolia, *Benth.*

DASOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 545 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
Balansae, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 240 (1902) = O. Hassleriana.
Hassleriana, Van Tiegh. l. c. 241 = O. Hassleriana.

DASYCOLEUM, Turcz. (Meliac.).
Sayeri, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 170.—N. Guin.

DASYSTACHYS, Baker (Liliac.).
senegalensis, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 782.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 10.—Afr. trop.

DASYSTEPHANA, Adans. = **Gentiana**, Tourn. (Gentian.).
Andrewsii, Small, Fl. S. E. U. S. 930 = G. Andrewsii.
decora, Small, l. c. = G. decora.
latifolia, Small, l. c.—Am. bor.
parvifolia, Small, l. c.—Am. bor.
Porphyrio, Small, l. c. 931 = G. Porphyrio.
puberula, Small, l. c. 930 = G. puberula.
Saponaria, Small, l. c. = G. Saponaria.
villosa, Small, l. c. 931 = G. villosa.

DAUCUS, Tourn. (Umbell.).
breviaculeatus, *Calest. in Martelli, Webbia*, 261.—Ital.
Martellii, *Gand. ex Calest. l. c.* 263.—Ital.

DAVIESIA, Sm. (Legum.).
Dielsii, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 249.—Austral.

DAVILLA, Vand. (Dillen.).
cearensis, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 312.—Bras.
goyazensis, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 9, nomen.—Bras.
pseudo-rugosa, *Glaz. l. c.* 8, nomen.—Bras.
suaveolens, *Glaz. l. c.*—Bras.

DECASPERMUM, Forst. (Myrtac.).
nitidum, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 325.—N. Guin.

DEGUELIA, Aubl. = **Derris**, Lour. (Legum.).
Grevei, Drake, Hist. Pl. Madag. i. 189.—Madag.
microphylla, Valet. in Ic. Bogor. t. 129 = D. dalbergioides.

DEHAASIA, Blume (Laurac.).
acuminata, *Koord. & Valet. in Meded. 'S. Lands Plantent.* lxvii. 207.—Java.
pugerensis, *Koord. & Valet. l. c.* 204.—Java.

DEHERAINIA, Decne. (Myrsin.).
cubensis, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 437 (= *Theophrasta cubensis*).—Ind. occ.

DEIANIRA, Cham. & Schlecht. (Gentian.).
cordifolia, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 12, 15.—Bras.

DEINANDRA, Greene = **Hemizonia**, DC. (Compos.).
simplex, Elmer, in Coult. Bot. Gaz. xxxix. 48.—Calif.

DEINBOLLIA, Schum. & Thonn. (Sapind.).
fulvo-tomentella, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 137.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent.* 145.—Afr. trop.
polypus, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 91.—Afr. trop.

DEKINDTIA, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxii. 139 (1902). *OLEACEAE*.
africana, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

DELPHINIUM, Tourn. (Ranunc.).
batangense, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 478.—China.
Blaisdellii, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 142.—Am. bor.
Brownii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 148.—Am. bor.
Cavaleriense, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot.* xi. (1902) 49.—China.
Cerefolium, *Léveillé & Vaniot, l. c.* 49.—China.
Chilliwacense, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 36.—Am. bor.
chrysotrichum, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 488 (*errore* chrysotricum).—China.
commutatum, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 36.—Eur.
Cuyamacae, *Abrams, in Bull. Torr. Bot Club*, 1905, 538.—Calif.
diversicolor, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 149.—Am. bor.
dumetorum, *Greene, Pl. Baker.* 4.—Am. bor.
elongatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 148.—Am. bor.
floribundum, *Freyn & Sint. ex Freyn in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 561.—As. cent.
Gilgianum, *Pilg. ex Gilg & Loes. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxv. 33.—China.
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 39.—China.

DELPHINIUM :—

Goetzeanum, *Engl. Jahrb.* xxx. 308.—Afr. trop.
Greenei, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 674.—Am. bor.
luporum, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 76.—Calif.
luteum, *A. A. Heller, in Bull. S. Calif. Acad.* ii. 68.—Calif.
Mariae, *Busch, in Trav. Soc. Nat. Pétersb. Bot.* xxxiii. (1903) (*Fl. Cauc. Crit.* iii. iii. 230).—Reg. Caucas.
micropetalum, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 479.—China.
multiflorum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 147.—Am. bor.
Nortonianum, *Mackenzie & Bush, in Trans. Acad. St. Louis*, xii. 82.—Am. bor.
pallidiflorum, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér.* II. i. 254.—Oriens.
pellucidum, *Busch, in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 134.—Tibet.
polycladon, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 669.—Am. bor.
pratense, *Eastw. l. c.*—Am. bor.
Quercetorum, *Greene, Pl. Baker.* 4.—Am. bor.
ramosum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 276.—Am. bor.
Robertianum, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot.* xi. (1902) 49.—China.
robustum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 276.—Am. bor.
roseum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 35.—Calif.
subnudum, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 670.—Am. bor.
thibeticum, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 489.—China.
trifoliolatum, *Finet & Gagnep. l. c.* 481.—China.

DELPINOELLA, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. (1902) 227 = **Delpinophytum**, Speg. (Crucif.).
patagonica, Speg. l. c. = Delpinophytum patagonicum.

DELPINOPHYTUM, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, ix. (1903) 9. *CRUCIFERAE.*
patagonicum, *Speg. l. c.*—Patag.

DENDRIUM, Desv. = **Leiophyllum**, Hedw. f. (Ericac.).
Hugeri, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 360.—Am. bor.
prostratum, Small, Fl. S. E. U. S. 882 = L. buxifolium.

DENDROBIUM, Sw. (Orchid.).
acuminatum, *Rolfe, in Ames, Orchid.* i. 66.—Ins. Philipp.
aemulans, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 176.—N. Guin.
Andersonianum, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ix. 412.—N. Guin.
angraecifolium, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 169.—N. Guin.
angustipetalum, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 59.—Ins. Ambon.
Annae, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 354.—Sumatra; Java?
arcuatum, *J. J. Sm. l. c.* 357.—Java.
Atavus, *J. J. Sm. l. c.* 353.—Java.
atrorubens, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 150.—N. Guin.
bellatulum, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 10.—China.
bifidum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 73.—Penins. Mal.
biloculare, *J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* i. 146.—N. Guin.
bismarckiense, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 167.—N. Guin.
borneense, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 373.—Borneo.
brevicolle, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 115 B.—Hab.?
Calicopis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 72.—Penins. Mal.
capituliflorum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1901, 146.—N. Guin.
chamaephytum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 156.—N. Guin.
chionanthum, *Schlechter, l. c.* 157.—N. Guin.
chrysocephalum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1892, ii. 122.—Hab.?
chrysotropis, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 159.—N. Guin.
concavum, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 50.—Ins. Ambon.

DENDROBIUM :—

cyanocentrum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 160.—N. Guin.
cyrtosepalum, *Schlechter, l. c.* 169.—Ins. Bismarck.
dactyliferum, *Reichb. f. in Gard. Chron.* 1884, i. 638.—Hab.?
Dendrocolla, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 114. B.—Ins. Malay.
dilatatocolle, *J. J. Sm. l. c.* 116 A.—Hab.?
durum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 320.—Java.
ecolle, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 116 A.—Ins. Malay.
elephantinum, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 373.—Borneo.
eriopexis, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 170.—Ins. Bismarck.
euryanthum, *Schlechter, l. c.* 162.—N. Guin.
eximium, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
Fargesii, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 374.—China.
fasciculatum, *F. M. Bailey, in The Garden*, 1905, 201, nomen.—N. Guin.
filiforme, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 113 D.—Hab.?
fractiflexum, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 377.—N. Caled.
frutex, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 175.—N. Guin.
glomeriflorum, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1895, ii. 206.—Hab.?
glossorrhynchoides, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 172.—N. Guin.
gracilentum, *Schlechter, l. c.* 158.—N. Guin.
Hancockii, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 11.—China.
herpetophytum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 172.—N. Guin.
inaequale, *Rolfe, in Kew Bull.* 1901, 147.—N. Guin.
inaequale, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 375 (1903).—N. Caled.
integrilabium, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 117 B.—Java.
ischnopetalum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 153.—Ins. Bismarck.
Jofftii, Ind. Kew. Suppl. i. 130, sphalm. = Tofftii.
Junesii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 197.—Austral.
karoense, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*. 157.—Ins. Bismarck.
Koordersii, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 67.—Ins. Ambon.
lageniforme, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 116 B.—N. Guin.
lamprocaulon, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 166.—Ins. Bismarck.
lobulatum, *Rolfe & J. J. Sm. in J. J. Sm. Orchid. Java*, 336.—Java.
Mabelae, *Gammie f. in Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.* xvi. 567.—Ind. or.
macrum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 174.—N. Guin.
Madonnae, *Rolfe, in Hook. f. Bot. Mag.* t. 7900.—N. Guin.
margaritaceum, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 379.—Anam.
mekynosepalum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 154.—N. Guin.
melanostictum, *Schlechter, l. c.* 167.—N. Guin.
mellitum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 32.—Penins. Mal.
Micholitzii, *Rolfe, ex Ames, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 119.—N. Guin.
monodon, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 178, nomen.—N. Guin.
montanum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 363.—Java.
montedeakinense, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl.* xviii. 4.—N. Guin.
muricatum, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 377.—N. Caled.
neuroglossum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 170.—N. Guin.
obtusum, *Schlechter, l. c.* 177.—N. Guin.
ochranthum, *Schlechter, l. c.* 171.—Ins. Bismarck.
odiosum, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 373.—China.
oreogenum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 177.—N. Guin.
orientale, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 70.—Ins. Ambon.
paludicola, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 173.—N. Guin.
papilioniferum, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 42.—Ins. Ambon.
parietiforme, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 117 C.—Celebes.

DENDROBIUM :—

paucilaciniatum, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 117 A.—Ins. Philipp.
pectinatum, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 379.—N. Caled.
pentanema, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*. 155.—Ins. Bismarck.
pentapterum, *Schlechter, l. c.* 161.—N. Guin.
phalangium, *Schlechter, l. c.* 154.—N. Guin.
piestocaulon, *Schlechter, l. c.* 173.—Ins. Bismarck.
planum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 352.—Java.
polysema, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 163.—N. Guin.
pseudo-mohlianum, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 178.—N. Guin.
punamense, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 168.—Ins. Bismarck.
puniceum, *Rolfe, in Kew Bull.* 1901, 146.—N. Guin.
quinarium, *Rolfe, l. c.* 147.—N. Guin.
ramificans, *J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* i. 147.—Celebes.
regium, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 80.—Ind. or.
rhipidolobum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 151.—N. Guin.
roseo-nervatum, *Schlechter, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 131.—Sumatra.
rotundatum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. 712 (= *Bulbophyllum rotundatum*).—Reg. Himal.
sagittatum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 338.—Java; Sumatra.
salmoneum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 178.—N. Guin.
Sarcochilus, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 376.—N. Caled.
simile, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 175.—N. Guin.
spurium, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 343 (= *Sarcochilus spurius*).—Malaya.
stenocentrum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 158.—N. Guin.
striatum, *Hort. ex Gard. Chron.* 1905, ii. 382; *Orch. Rev.* 1905, 366.—Ins. Philipp.
Taylori, *Fitzger. Austral. Orch.* ii. (= *Bulbophyllum Taylori*).—Austral.
tentaculatum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 155.—N. Guin.
tenuicaule, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 73.—Penins. Mal.
thysanochilum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 152.—Ins. Bismarck.
Tofftii, *F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. 71.—Austral.
torricellense, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 164.—N. Guin.
trachychilum, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 179.—N. Guin.
Treubii, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 65.—Ins. Ambon.
trigonocarpum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 159.—N. Guin.
Urvillei, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 372.—Ins. Timor.
utile, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 114 A.—Ins. Molucc.
validum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 165.—Ins. Bismarck.
vandaefolium, *Finet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 375.—N. Caled.
viridicatum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 72.—Penins. Mal.
xanthomeson, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 168.—N. Guin.
zebrinum, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 113 C.—Borneo.
Zippelii, *J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* i. 150.—N. Guin.
zonatum, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 13.—China.

DENDROCALAMUS, Nees (Gramin.).
affinis, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 447.—China.

DENDROCHILUM, Blume (Orchid.).
acuminatum, *J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* i. 61.—Sumatra.
angustifolium, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 77.—Penins. Mal.

DENDROCHILUM:—
Beccarii, *J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* i. 62.—Sumatra.
bistortum, *J. J. Sm. l. c.* 64 (=*Platyclinis bistorta*).—Arch. Mal.
corrugatum, *J. J. Sm. l. c.* 65 (=*Platyclinis corrugata*).—Borneo.
ellipticum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 77.—Penins. Mal.
exalatum, *J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* i. 77.—Sumatra.
globigerum, *J. J. Sm. l. c.* 64 (=*Platyclinis globigera*).—Borneo.
gracile, *J. J. Sm. l. c.* 69 (=*Platyclinis gracilis*).—Java.
grandiflorum, *J. J. Sm. l. c.* 66 (=*Platyclinis grandiflora*).—Borneo.
Kingii, *J. J. Sm. l. c.* 76 (=*Platyclinis Kingii*).—Penins. Mal.
odoratum, *J. J. Sm. l. c.* 80 (=*Platyclinis odorata*).—Penins. Mal.
rufum, *J. J. Sm. l. c.* 76 (=*Platyclinis rufa*).—As. trop.
sarawakense, *J. J. Sm. l. c.* 66 (=*Platyclinis sarawakensis*).—Borneo.
stachyodes, *J. J. Sm. l. c.* 77 (=*Platyclinis stachyodes*).—Borneo.
sumatranum, *J. J. Sm. l. c.* 69.—Sumatra.
vaginatum, *J. J. Sm. l. c.* 61.—Java.

DENDROMECON, Benth. (Papav.).
agnina, *Greene, Pittonia*, v. 299.—Calif.
arborea, *Greene, l. c.* 305.—Calif.
caesia, *Greene, l. c.* 303.—Calif.
caudata, *Greene, l. c.* 298.—Calif.
densifolia, *Greene, l. c.* 304.—Calif.
elliptica, *Greene, l. c.* 300.—Calif.
fastigiata, *Greene, l. c.* 298.—Calif.
herbacea, *Greene, l. c.* 303.—Calif.
leiophylla, *Greene, l. c.* 302.—Calif.
pallida, *Greene, l. c.* 301.—Calif.
pumila, *Greene, l. c.* 302.—Calif.
quercetorum, *Greene, l. c.* 301.—Calif.
rhamnoides, *Greene, l. c.* 305.—Calif.
saligna, *Greene, l. c.* 300.—Calif.

DENTARIA, Tourn. = **Cardamine**, Linn. (Crucif.).
anomala, Eames, in Rhodora, v. 217.—Am. bor.
furcata, Small, Fl. S. E. U. S. 480.—Am. bor.
incisa, Eames, in Rhodora, v. 216; Small, Fl. S. E. U. S. 480.—Am. bor.

DEPPEA, Cham. & Schlecht. (Rubiac.).
microphylla, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 249.—Mexic.

DERINGA, Adans. = **Cryptotaenia**, DC. (Umbell.).
canadensis, Shafer, in Ann. Carneg. Mus. i. 64 = C. canadensis.

DERRIS, Lour. (Legum.).
alborubra, *Hemsl. in Bot. Mag.* t. 8008.—China.
congolensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 149.—Afr. trop.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 330.—Afr. trop.
Hancei, *Hemsl. in Bot. Mag.* sub t. 8008.—China.
involuta, *Sprague, in Gard. Chron.* 1905, ii. 3.—Austral.
micans, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 82.—Ins. Philipp.
mindorensis, *Perkins, l. c.*—Ins. Philipp.
polyantha, *Perkins, l. c.* 83.—Ins. Philipp.
pulchra, *Gage, in Rec. Bot. Surv. India*, iii. 49.—Burma.
violacea, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 174 (=*Lonchocarpus violaceus*, Oliver).—Afr. trop.

DESBORDESIA, Pierre, ex Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. IX. i. (1905) 289. *SIMARUBACEAE.*
glaucescens, *Van Tiegh. l. c.* 290 (=*Irvingia glaucescens*).—Afr. trop.
insignis, *Pierre, ex Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.
pallida, *Van Tiegh. l. c.* 291.—Afr. trop.
Pierreana, *Van Tiegh. l. c.* 290.—Afr. trop.
Soyauxi, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.
Sparei, *Van Tiegh. l. c.* 291.—Afr. trop.

DESCHAMPSIA, P. Beauv. (Gramin.).
alpicola, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 601.—Am. bor.
arctica, *Merrill, in Rhodora*, iv. 143 (=*Aira arctica*).—Am. bor.

DESCURAINIA, Webb & Berth. = **Sisymbrium**, Linn. (Crucif.).
deserticola, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 220 = S. deserticola.
glabrescens, Speg. l. c. 223 = S. glabrescens.
heterotricha, Speg. l. c. 221.—Patag.
myriophylla, R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. Ser. IV. i. no. 1, 148 = S. myriophyllum.

DESMANTHODIUM, Benth. (Compos.).
fruticosum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 37.—Mexic.

DESMANTHUS, Willd. (Legum.).
Scottianus, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 56.—Madag.
tenuifolius, *Drake, l. c.* 54 (=*Dichrostachys tenuifolia*).—Madag.

DESMODIUM, Desv. (Legum.).
amethystinum, *Dunn, in Gard. Chron.* 1902, ii. 210.—China.
Campenoni, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 172.—Madag.
chartaceum, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 202 (1905).—Mexic.
galapagense, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 150.—Ins. Galap.
huillensis, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 494 (=*Meibomia huillensis*).—Afr. trop.
indigotinum, *Harms & K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 276.—N. Guin.
madrense, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 258.—Mexic.
polygaloides, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 889.—Parag.
pseudo-amplifolium, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 259.—Mexic.
quinquepetalum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 20 (=*Cytisus quinquepetalus*).—Ins. Philipp.
ramosissimum, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 362.—Urug.
remotum, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 171 (=*Aeschynomene remota*).—Madag.
Seatoni, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 80.—Mexic.
tastense, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 157 (1903).—Calif.
xylopodium, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 80.—Mexic.

DESMONCUS, Mart. (Palm.).
inermis, *Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, i. 17.—Bras.
paraensis, *Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras.* ii. 57 (=*Atitara paraensis*).—Bras.

DESMONEMA, Miers (Menisperm.).
pallido-aurantiaca, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 237.—Afr. trop.

DETARIUM, Juss. (Legum.).
macrocarpum, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 78.—Afr. trop.

DETRIS, Adans. = **Felicia**, Cass. (Compos.).
abyssinica, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. 166 = F. abyssinica.
Dinteri, S. Moore, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1013.—Afr. trop.
Richardi, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. 166 = F. Richardi.

DEUTZIA, Thunb. (Saxifrag.).
glaberrima, *Koehne, in Gilg & Loes. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxv. 38.—China.
glabrata, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxii. 433.—China.
hamata, *Koehne, in Gilg & Loes. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxv. 37.—China.
Lemoinei, *Hort. ex Desjardin, in Le Jardin*, 1904, 329.—Hybr.
micrantha, *Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 51.—China.
myriantha, *Hort. ex Desjardin, in Le Jardin*, 1904, 329.—Hybr.
Pringlei, *Schneider, in Mitth. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1904, 186.—Mexic.
taiwanensis, *Schneider, l. c.* 177.—Formosa.
Vilmorinae, *Lemoine & Bois, ex Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 125.—China.

DEVERRA, DC. = **Pituranthos**, Viv. (Umbell.).
intermedia, L. Chevall. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 770.—Alger.

DEWILDEMANIA, O. Hoffm. ex Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. p. a. (1903). *COMPOSITAE.*
filifolia, *O. Hoffm. l. c.*—Afr. trop.

DEWINDTIA, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 42 (1902). *LEGUMINOSAE.*
katangensis, *Wildem. l. c.* 43.—Afr. trop.

DEYEUXIA, Clar. (Gramin.).
Ameghinoi, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 190.—Patag.
effusiflora, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 392.—China.
Henryi, *Rendle, l. c.* 393.—China.
Hugoniana, *Rendle, l. c.*—China.
hupehensis, *Rendle, l. c.* 394.—China.
javanica, *Boerl. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxii. 238 (=*Calamagrostis javanica*).—Java.
patagonica, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 191.—Patag.
sachalinensis, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 395 (=*Calamagrostis sachalinensis*).—As. bor.

DIALIUM, Linn. (Legum.).
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent.* 100.—Afr. trop.
madagascariense, *Baill. ex Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 96.—Madag.
travancoricum, *Bourd. in Ind. Forester*, xxx. 243.—Ind. or.
Zenkeri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 86.—Afr. trop.

DIAMORPHA, Nutt. (Crassul.).
Smallii, *Britton, in N. Am. Fl.* xxii. 56.—Am. bor.

DIANTHERA, Gronov. (Acanth.).
angusta, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1068.—Am. bor.
guianensis, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 57.—Guian.
lanceolata, *Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 855.—Am. bor.
sulfurea, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 6.—Am. cent.
sylvatica, Burchell. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 80 = Isoglossa sylvatica.

DIANTHUS, Linn. (Caryophyll.).
albacetanus, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 339.—Eur.
callichrous, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 30.—Gallia.
carneus, *Jord. l. c.* 25.—Eur.
chlorostomus, *Jord. l. c.* 31.—Gallia.
egregius, *Jord. l. c.* 23.—Gallia.
flabellatus, *Jord. l. c.* 29.—Gallia.
flexicaulis, *Jord. l. c.* 26.—Gallia.
Gyspergerae, *Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* i. 132.—Corsica.
hazaricus, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 892.—Ind. or.
hypoleucus, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 31.—Eur.
impunctatus, *Jord. l. c.* 29.—Gallia.
juratensis, *Jord. l. c.* 32.—Gallia.
kladovanus, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* iv. 132.—Servia.
laciniatus, Hort. ex Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 60 = chinensis.
Laucheanus, *Bolle, in Gartenfl.* 1904, 393.—Hybr.
longifolius, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 32.—Eur.
macrophyllus, *Jord. l. c.* 30.—Gallia.
maritimus, *Jord. l. c.* 25.—Gallia.
massiliensis, *Jord. l. c.*—Gallia.
minutiflorus, *Jord. l. c.* 26.—Gallia.
nicaeensis, *Jord. l. c.* 30.—Gallia.
nipponicus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 58.—Japon.
paradoxus, *Keller, ex Schroet. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xiv. 117.—Hybr.
parciflorus, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 28.—Gallia.
Portae, *Kerner, ex Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 339.—Eur.
puberulus, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 31.—Gallia.
ramiger, *Jord. l. c.* 23.—Gallia.
rigidulus, *Jord. l. c.* 27.—Gallia.
rubicundus, *Jord. l. c.* 24.—Gallia.

DIANTHUS:—

shinanensis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* xvii. 58.—Japon.

singuliflorus, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 26.—Gallia.

subalbidus, *Jord. l. c.* 24.—Gallia.

Suskalovicii, *Adam. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 179.—Turcia.

tenuidens, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 23.—Gallia.

variegatus, *Jord. l. c.* 27.—Gallia.

vesulanus, *Jord. l. c.*—Eur.

DIAPEDIUM, Koen. = **Dicliptera**, Juss. (Acanth.).

albicaule, S. Moore, in Journ. Bot. 1903, 156.—Afr. trop.

attenuatum, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 5.—Am. bor.

DIAPHYCARPUS, Calest. in Martelli, Webbia, 277 (1905). *UMBELLIFERAE.*

incrassatus, *Calest. l. c.* (= *Carum incrassatum*).—Reg. Medit.

DIASCIA, Link & Otto (Scrophul.).

Alicıae, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 155.—Afr. austr.

Bergiana, *Ecklon. ex Hiern, l. c.* 147 = elongata.

cardiosepala, *Hiern, l. c.* 149.—Afr. austr.

Dielsiana, *Schlechter, ex Hiern, l. c.* 155.—Afr. austr.

dissecta, *Hiern, l. c.* 153.—Afr. austr.

elegans, *Hiern, l. c.* 159 (= *Hemimeris elegans*).—Afr. austr.

expolita, *Hiern, l. c.* 156.—Afr. austr.

Flanagani, *Hiern, l. c.* 161.—Afr. austr.

Macowani, *Hiern, l. c.* 162.—Afr. austr.

minutiflora, *Hiern, l. c.* 143.—Afr. austr.

moltenensis, *Hiern, l. c.* 158.—Afr. austr.

monasca, *Hiern, l. c.* 142.—Afr. austr.

namaquensis, *Hiern, l. c.* 144.—Afr. austr.

rotundifolia, *Hiern, l. c.* 152.—Afr. austr.

Rudolphi, *Hiern, l. c.* 150.—Afr. austr.

Scullyi, *Hiern, l. c.* 144.—Afr. austr.

stachyoides, *Schlechter, ex Hiern, l. c.* 160.—Afr. austr.

Tysoni, *Hiern, l. c.* 148.—Afr. austr.

DIATEINACANTHUS, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. (1905) 369. *ACANTHACEAE.*

hondurensis, *Lindau, l. c.*—Am. cent.

DICERANDRA, Benth. = **Ceranthera**, Ell. (Labiat.).

odoratissima, Harper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 479.—Am. bor.

DICERATELLA, Boiss. (Crucif.).

Erlangeriana, *Engl. Jahrb.* xxxii. 99.—Afr. trop.

Ruspoliana, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma,* ix. 248.—Afr. trop.

umbrosa, *Engl. Jahrb.* xxxii. 98.—Afr. trop.

DICHAEA, Lindl. (Orchid.).

pendula, *Cogn. in Urb. Symb. Antill.* iv. 182 (= *Limodorum pendulum*).—Ind. occ.

DICHAELIA, Harv. (Asclep.).

[Brachystelma, R. Br. I. K.]

brachylepis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 42.—Afr. austr.

cinerea, *Schlechter, l. c.*—Afr. austr.

macra, *Schlechter, l. c.* 43.—Afr. austr.

microphylla, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 312.—Afr. austr.

Zeyheri, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 43.—Afr. austr.

DICHAETANTHERA, Endl. (Melast.).

heterostemona, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 573.—Madag.

DICHAPETALUM, Thou. (Chaillet.).

[Chailletia, DC. I. K.]

altescandens, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 80.—Afr. trop.

angustisquamulosum, *Engl. & Ruhl. l. c.* 86.—Afr. trop.

argenteum, *Engl. l. c.* 82.—Afr. trop.

batanganum, *Engl. & Ruhl. l. c.* 79.—Afr. trop.

buvumense, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 133.—Afr. trop.

cinereum, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 85.—Afr. trop.

congoense, *Engl. & Ruhl. l. c.* 78.—Afr. trop.

Couranuum, *Engl. & Ruhl. l. c.* 88.—Afr. trop.

DICHAPETALUM:—

Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,* Ser. III. i. 41.—Afr. trop.

Eickii, *Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 80.—Afr. trop.

fallax, *Ruhl. l. c.* 78.—Afr. trop.

griseo-viride, *Ruhl. l. c.* 84.—Afr. trop.

holopetalum, *Ruhl. l. c.* 77.—Afr. trop.

integripetalum, *Engl. l. c.* 89.—Afr. trop.

leucosepalum, *Ruhl. l. c.* 81.—Afr. trop.

Liberiae, *Engl. & Dinkl. l. c.* 84.—Afr. trop.

Lolo, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo,* Ser. III. i. 42.—Afr. trop.

longitubulosum, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 90.—Afr. trop.

minutiflorum, *Engl. & Ruhl. l. c.* 88.—Afr. trop.

monospermum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 34.—Ins. Philipp.

nitidulum, *Engl. & Ruhl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 77.—Afr. trop.

obliquifolium, *Engl. l. c.* 87.—Afr. trop.

patenti-hirsutum, *Ruhl. l. c.* 86.—Afr. trop.

reticulatum, *Engl. l. c.* 82.—Afr. trop.

Ruhlandii, *Engl. l. c.* xxxiv. 152.—Afr. trop.

salicifolium, *Engl. & Ruhl. l. c.* xxxiii. 89.—Afr. trop.

scabrum, *Engl. l. c.* 86.—Afr. trop.

sulcatum, *Engl. l. c.* 81.—Afr. trop.

tesselatum, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 219 (= *Chailletia tesselata*).—Penins. Mal.

tricapsulare, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 35 (= *Riana tricapsularis*).—Ins. Philipp.

venenatum, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 280.—Afr. trop.

Warneckei, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 83.—Afr. trop.

DICHELOSTEMMA, Kunth = **Brodiaea**, Sw. (Liliac.).

multiflorum, A. A. Heller, Muhlenbergia, ii. 15 = B. multiflora.

volubilis, A. A. Heller, in Bull. S. Calif. Acad. ii. 65 = Stropholirion californicum.

DICHROCEPHALA, L'Hérit. (Compos.).

Bodinieri, *Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot.* xii. (1903) 242.—China.

Leveillei, *Vaniot, l. c.* 241.—China.

minutifolia, *Vaniot, l. c.* 243.—China.

DICHROTRICHUM, Reinw. (Gesner.).

elegans, *K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee,* 375.—N. Guin.

Filarskyi, *K. Schum. l. c.* 374.—N. Guin.

glabrum, *Copeland, ex Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 46.—Ins. Philipp.

minus, *K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee,* 375.—N. Guin.

DICLIPTERA, Juss. (Acanth.).

betschuanica, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 112.—Afr. trop.

inaequalis, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 90 (*errore* inequalis).—Mexic.

japonica, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* xvii. 90 (= *Dianthera japonica*).—Japon.

jujuyensis, *Lindau, ex R. Fries, in Arkiv Bot. Stockh.* i. 398.—Reg. Argent.

katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 151.—Afr. trop.

laxispica, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 113.—Afr. trop.

minor, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 92.—Afr. austr.

montana, *Lindau, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 157.—Peruv.

nervata, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 90.—Mexic.

porphyrea, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 368.—Peruv.

transvaalensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 92.—Afr. austr.

DICLIS, Benth. (Scrophul.).

stellarioides, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 202.—Afr. austr.

umbonata, *Hiern, in Journ. Bot.* 1901, 104.—Afr. austr.

DICOMA, Cass. (Compos.).

Antunesii, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 425.—Afr. trop.

Dinteri, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1024.—Afr. trop.

DICOMA:—

incana, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 96.—Madag.

membranacea, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1025.—Afr. trop.

vaginata, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 442.—Afr. trop.

DICRAEANTHUS, Engl. Jahrb. xxxviii. (1905) 94. *PODOSTEMACEAE.*

africanus, *Engl. l. c.* 96.—Afr. trop.

DICRAEIA, Thou. (Podost.).

[Podostemon, Michx. I. K.]

violascens, *Engl. Jahrb.* xxx. 312.—Afr. trop.

DICRAEOPETALUM, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. (1902) 161. *LEGUMINOSAE.*

stipulare, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

DICRANOSTIGMA, Hook. f. & Thoms. (Papav.).

[Stylophorum, Nutt. I. K.]

leptopodum, *Fedde, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 45 (= *Glaucium leptopodum*).—China.

DIDELOTIA, Baill. (Legum.).

Engleri, *Dinkl. & Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 80.—Afr. trop.

DIDIEREA, Baill. (Sapind.).

ascendens, *Drake, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxxiii. 241.—Madag.

comosa, *Drake, l. c.*—Madag.

dumosa, *Drake, l. c.*—Madag.

procera, *Drake, l. c.*—Madag.

DIDISSANDRA, C. B. Clarke (Cyrtandr.).

Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 98.—China.

ophiorrhizoides, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 373.—N. Guin.

DIDYMOCARPUS, Wall. (Gesner.).

mollissima, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 433 (= *Chirita mollissima*).—Penins. Mal.

Viola, *F. N. Williams, l. c.* 434 (= *Chirita Viola*).—Penins. Mal.

DIDYMOCHLAMYS, Hook. f. (Rubiac.).

Connellii, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 34.—Guiana.

DIDYMOPANAX, Decne. (Aral.).

rugosum, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 31.—Guiana.

DIDYMOPLEXIS, Griff. (Orchid.).

cornuta, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 1.—Java.

minor, *J. J. Sm. l. c.*—Java.

striata, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 104 B.—Java.

DIEFFENBACHIA, Schott (Arac.).

cordata, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 135.—Peruv.

Weberbaueri, *Engl. l. c.*—Peruv.

DIELSIA, Gilg, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. (1904) 88. *RESTIACEAE.*

cygnorum, *Gilg, l. c.*—Austral.

DIGITALIS, Tourn. (Scrophul.).

comosa, R. Br. ex Britten, in Journ. Bot. 1904, 178 = Isoplexis Sceptrum.

Gyspergerae, *Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* i. 137.—Corsica.

DIGITARIA, Heist. (Gramin.).

[Panicum, Linn. I. K.]

exilis, *Stapf, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1905, 344 (= *Paspalum exile*).—Afr. trop.

formosana, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 323.—China.

Henryi, *Rendle, l. c.*—China.

pedicellaris, *Prain, Bengal Pl.* 1182 (= *Paspalum pedicellare*).—Ind. or.

Royleana, *Prain, l. c.* (= *Paspalum Royleanum*).—Ind. or.

tenuispica, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 326.—China.

DIHOLCOS, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 664. *LEGUMINOSAE.*
bisulcatus, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus bisulcatus*).—Am. bor.
decalvans, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
Haydenianus, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus Haydenianus*).—Am. bor.

DIMERIA, R. Br. (Gramin.).
sinensis, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 359.—China.

DIMEROCOSTUS, Kuntze (Scitamin.).
uniflorus, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 427 (= *Costus uniflorus*).—Ecuador; Peruv.

DIMORPHANTHERA, F. Muell. (Vaccin.).
elegantissima, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 335.—N. Guin.

DIMORPHOSTACHYS, Fourn. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).
ciliifera, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 78.—Am. bor.

DIMORPHOTHECA, Vaill. (Compos.).
Dekindtii, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 152.—Afr. trop.

DINOCHLOA, Buese (Gramin.).
Dielsiana, *Pilger, in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 148.—Ins. Philipp.
diffusa, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxvii. 93 (= *Bambusa diffusa*).—Ins. Philipp.
major, *Pilger, in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 149.—Ins. Philipp.

DIOCLEA, H. B. & K. (Compos.).
megacarpa, *Rolfe, in Kew Bull.* 1901, 139.—Am. trop.
multiflora, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 580 (= *Dolichos multiflorus*).—Am. bor.

DIODIA, Gronov. (Rubiac.).
Barbeyana, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 325.—Bras.

DIOLENA, Naud. (Melast.).
amazonica, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 168.—Reg. Amaz.

DIONYSIA, Fenzl (Primul.).
bachtiarica, *Bornm. & Alexeenko, ex Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 515.—Persia.
Haussknechtii, *Bornm. & Strauss, ex Bornm. l. c.* 514.—Persia.
leucotricha, Bornm. ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 165 = aretioides.
peduncularis, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 261.—Persia.
Straussii, *Bornm. l. c.* iii. 591.—Persia.

DIOSANTHOS, St. Lag. = **Dianthus**, Linn. (Caryophyll.).
Fuchsii, Bub. Fl. Pyren. iii. 93 = Dianthus chinensis.
variabile, Bub. l. c. 101 = Dianthus monspessulanus.

DIOSCOREA, Plum. (Dioscor.).
angustifolia, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 701.—Bolivia.
apiensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1112.—Parag.
apiculata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 14.—Afr. trop.
birmanica, *Prain & Burkill, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 185.—Burma.
Concepcionis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1111.—Parag.
Demeusii, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 238.—Afr. trop.
enneaneura, *Prain. & Burkill, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. Suppl. 11.—China.
guaranitica, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1112.—Parag.
Hassleriana, *Chod. l. c.* 1111.—Parag.
Lecardi, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 19.—Afr. trop.
Mandoni, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 701.—Bolivia.
panthaica, *Prain & Burkill, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. Suppl. 6.—China.
platycolpota, *Uline, ex Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 471.—Mexic.
Prazeri, *Prain & Burkill, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. Suppl. 2.—Burma.
sikkimensis, *Prain & Burkill, l. c.* 3.—Reg. Himal.

DIOSCOREA:—
tamifolia, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1110.—Parag.
tenuifolia, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 34.—Penins. Mal.
Tysonii, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 49.—Afr. austr.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 15.—Afr. trop.
Yokusai, *Prain & Burkill, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. *Suppl.* 10.—Japon.
yunnanensis, *Prain & Burkill, l. c.* lxxiii. 186.—China.
zingiberensis, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 93.—China.

DIOSPYROS, Linn. (Ebenac.).
Baumii, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 325.—Afr. trop.
Copelandi, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 45.—Ins. Philipp.
Curtisii, *King & Gamble, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 428.—Penins. Mal.
dumosa, *King & Gamble, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 428.—Penins. Mal.
Kanjilali, *Duthie, in Indian Forester*, xxxi. 307.—Ind. or.
mangabensis, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 578.—Madag.
nitida, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 57.—Ins. Philipp.
siamensis, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 36.—Siam.
subrigida, *Hochr. in Bull. Inst. Buitenz.* xix. 21; *Pl. Bogor. Exsicc.* 14.—Borneo.
subtruncata, *Hochr. l. c.* 17; *l. c.* 15.—Sumatra.
Treubii, *Hochr. l. c.* 26; *l. c.* 14.—Malaya.
Wallichii, *King & Gamble, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 429.—Penins. Mal.
xanthocarpa, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 328.—Afr. trop.

DIOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 372 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
cardiosperma, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. (1902) 188 = O. cardiosperma.
sculpta, Van Tiegh. l. c. 189.—Bras.
surinamensis, Van Tiegh. l. c. = O. subscandens.

DIPCADI, Medic. (Liliac.).
anthericoides, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 193.—Afr. trop.
Baumii, *Engl. & Gilg, l. c.* 194.—Afr. trop.
brevipes, *Baker, in Kew Bull.* 1901, 136.—Afr. trop.
Bussei, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 63.—Afr. trop.
Conrathii, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1000.—Afr. austr.
Dekindtianum, *Engl. Jahrb.* xxxii. 94.—Afr. trop.
Dinteri, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 788.—Afr. trop.
Erlangeri, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 63.—Afr. trop.
Hildebrandtii, *Damm. l. c.* 64.—Madag.
Kelleri, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 788.—Afr. trop.
Kerstingii, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 63.—Afr. trop.
lividescens, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 194.—Afr. trop.
Mechowii, *Engl. Jahrb.* xxxii. 94.—Afr. trop.
megalanthum, *Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xv. 21.—Afr. austr.
oligotrichum, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1000.—Afr. austr.
palustre, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
polyphyllum, *Baker, l. c.* 1001.—Afr. austr.
Rautanenii, *Baker, l. c.* 1000.—Afr. trop.

DIPHOLIS, A. DC. (Sapot.).
Bellonis, *Urb. Symb. Antill.* v. 137.—Ind. occ.
cubensis, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 140 (= *Bumelia cubensis*).—Ind. occ.
domingensis, *Pierre & Urb. l. c.*—Ind. occ.
lanceolata, *Pierre, l. c.* 136.—Ind. occ.
pallens, *Pierre & Urb. l. c.*—Ind. occ.
Sintenisiana, *Pierre, l. c.* 139.—Ind. occ.

DIPHYLLANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 216 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
corymbosus, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 199 = O. corymbosa.
Duparquetianus, Van Tiegh. l. c. 200 = O. Duparquetiana.

DIPHYLLOPODIUM, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 376 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
Klainei, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. (1902) 200.—Afr. trop.
Zenkeri, Van Tiegh. l. c. = O. Zenkeri.

DIPLACHNE, Beauv. (Gramin.).
acuminata, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 128.—Am. bor.
barbata, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 240.—Bras.
guatemalensis, *Hack. l. c.* 275.—Am. cent.
Menyharthii, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 772.—Afr. trop.
Peacocki, *Maiden & Betche, in Agric. Gaz. N. S. Wales*, xv. 925.—Austral.
procumbens, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 128.—Am. bor.

DIPLACUS, Nutt. = **Mimulus**, Linn. (Scrophul.).
aridus, Abrams, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 540.—Calif.

DIPLADENIA, A. DC. (Apocyn.).
angustifolia, *Malme, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 258.—Parag.

DIPLANTHERA, Thou. = **Cymodocea**, Koen. (Naiad.).
uninervis, F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 221 = C. australis.

DIPLOPELTIS, Endl. (Sapind.).
eriocarpa, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2730.—Austral.

DIPLORHYNCHUS, Welw. (Apocyn.).
angustifolia, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. t. 107.—Afr. trop.

DIPLOSIPHON, Decne. = **Blyxa**, Thou. (Hydrocharid.).
caulescens, Maxim. in Matsum. Ind. Pl. Jap. ii. 31 = B. caulescens.
leiocarpa, Maxim. l. c. 32 = B. leiocarpa.

DIPLOSPORA, DC. (Rubiac.).
Beccariana, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 225.—Penins. Mal.
Kunstleri, *King & Gamble, l. c.* 226.—Penins. Mal.
Minahassae, *Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 77.—Celebes.
polysperma, *Valet. in Ic. Bogor.* t. 142.—Hab.?
velutina, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 226.—Penins. Mal.
Wrayi, *King & Gamble, l. c.* 225.—Penins. Mal.

DIPLOSTEPHIUM, H. B. & K. (Compos.).
Jelskii, *Hieron, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 476.—Peruv.

DIPLOSYPHON, Matsum. Ind. Pl. Jap. ii. 31 = DIPLOSIPHON, Decne. = **Blyxa**, Thou. (Hydrocharid.).

DIPLOTAXIS, DC. (Crucif.).
versicolor, *Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xi. (1879) 249.—Ital.

DIPLOTHEMIUM, Mart. (Palm.).
Hasslerianum, *Barb. Rodr. Palm. Hassl. Nov.* 10.—Parag.

DIPLOTROPIS, Benth. (Legum.).
Taubertiana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. *Beibl.* lxxii. 26.—Bras.

DIPLUSODON, Pohl (Lythrac.).
Burchellii, *Koehne, in Engl. Pflanzenreich Lythrac.* 208.—Bras.
velutinus, *Koehne, l. c.* 202.—Bras.

DIPODIUM, R. Br. (Orchid.).
scandens, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 488 (= *Leopardanthus scandens*).—Java.

DIPORIDIUM, Wendl. f. = **Ochna**, Linn. (Ochnac.).
acutifolium, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 356 = O. acutifolia.
Baillonii, Van Tiegh. l. c. 357.—Madag.
Baroni, Van Tiegh. l. c. 359.—Madag.
cinnabarinum, Van Tiegh. l. c. xviii. 52 = O. cinnabarina.

DIPORIDIUM:—
cordatum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 127 = O. squarrosa.
Decaisnei, Van Tiegh. l. c. = O. Decaisnei.
emarginatum, Van Tiegh. l. c.—Madag.
Goetzei, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 359.—Afr. trop.
Greveanum, Van Tiegh. l. c. 357.—Madag.
Hoepfneri, Van Tiegh. l. c. 358 = O. Hoepfneri.
Holstii, Van Tiegh. l. c. 356 = O. Holstii.
Holtzii, Van Tiegh. l. c. 52 = O. Holtzii.
inerme, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 127 = O. inermis.
Jallae, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 359.—Afr. trop.
leiocladum, Van Tiegh. l. c. 360.—Hort.
leucophloeos, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 126 = O. leucophloeos.
Macowani, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 357.—Afr. austr.
poulocondorense, Van Tiegh. l. c. 360.—Cochinch.
prunifolium, Van Tiegh. l. c. 356 = O. prunifolia.
purpureocostatum, Van Tiegh. l. c. = O. purpureo-costata.
purpureum, Van Tiegh. l. c. 360.—Hort.
rovumense, Van Tiegh. l. c. xviii. 52 = O. rovumensis.
rubrum, Van Tiegh. l. c. xvi. 356.—Madag.
rufescens, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 127 = O. squarrosa.
Sacleuxi, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 354.—Afr. trop.
Schimperi, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 127.—Afr. trop.
Schweinfurthianum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 358 = O. Schweinfurthiana.
Staudtii, Van Tiegh. l. c. xviii. 52 = O. Staudtii.
Stuhlmanni, Van Tiegh. l. c. xvi. 356 = O. Stuhlmannii.
uniflorum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 126.—Afr. austr.
Vahli, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 358.—Afr. trop.
Walkerii, Van Tiegh. l. c. xviii. 52 = O. Wightiana.
zanguebaricum, Van Tiegh. l. c. xvi. 359.—Afr. trop.

DIPOROCHNA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 377 = **Ochna**, Linn. (Ochnac.).
Brassae, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 391.—Afr. trop.
Duparqueti, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
Gilgiana, Van Tiegh. l. c. xviii. 58 = O. Gilgiana.
Gilgii, Van Tiegh. l. c. xvi. 391 = O. Gilgiana.
Hierni, Van Tiegh. l. c. 390.—Afr. trop.
latisepala, Van Tiegh. l. c. 391.—Afr. trop.
membranacea, Van Tiegh. l. c. 390 = O. membranacea.
Oliveri, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
paniculata, Van Tiegh. l. c. 391.—Afr. trop.
Quintasi, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
rubescens, Van Tiegh. l. c. 390.—Afr. trop.

DIPTERANTHUS, Barb. Rodr. (Orchid.).
corniger, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 215.—Bras.
pellucidus, *Cogn. l. c.* 214 (= *Zygostates pellucida*).—Bras.

DIPTEROCARPUS, Gaertn. f. (Dipterocarp.).
angustialatus, *Heim, in Bot. Tidsskr.* xxv. 43.—Siam.
exilis, *Aresch. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxix. no. 2, 42, nomen.—Hab. ?
lasiopodus, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 22.—Ins. Philipp.
parvifolius, *Heim, in Bot. Tidsskr.* xxv. 43.—Siam.
Schmidtii, *Heim, l. c.* 42.—Siam.

DIPTERONIA, Oliver (Sapind.).
Dyeriana, *Henry, in Gard. Chron.* 1903, t. 23.—China.

DIRICHLETIA, Klotzsch (Rubiac.).
Ellenbeckii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 336.—Afr. trop.

DISA, Berg (Orchid.).
calophylla, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 58.—Afr. trop.
coccinea, *Kraenzl. l. c.* 59.—Afr. trop.
comosa, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxi. 206 (= *Monadenia comosa*).—Afr. austr.
Engleriana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 58.—Afr. trop.
huillensis, *Fritsch. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 1110.—Afr. trop.

DISA:—
ignea, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 57.—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 25.—Afr. trop.
leucostachys, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxx. 285.—Afr. trop.
Marlothii, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 148.—Afr. austr.
praestans, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 59.—Afr. trop.
Schlechteriana, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 149.—Afr. austr.
stolonifera, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 222.—Afr. trop.
uliginosa, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxx. 285.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 26.—Afr. trop.

DISCARIA, Hook. (Rhamn.).
andina, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901) repr. 25.—Patag.
cognata, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901) repr. 26; *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 564 (= *Notophaena cognata*).—Am. austr.
discolor, *P. Dusén, in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 21.—Patag.
foliosa, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901) repr. 26.—Patag.
magellanica, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 560 (= *Notophaena magellanica*).—Reg. Magell.
trinervis, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 529.—Reg. Argent.

DISCHIDIA, R. Br. (Asclep.).
beiningiana, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 356.—Ins. Bismarck.
dirhiza, *Schlechter, l. c.* 357.—N. Guin.
euryloma, *Schlechter, l. c.* 358.—Ins. Bismarck.
galactantha, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 358.—N. Guin.
Hahliana, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 473.—Ins. Carol.
listerophora, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 359.—Ins. Bismarck.
litoralis, *Schlechter, l. c.*—Ins. Bismarck.
otantha, *Schlechter, in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 127.—Ins. Philipp.
pectenoides, *H. H. W. Pearson, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 377.—Ins. Philipp.
purpurea, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 30.—Ins. Philipp.
saccata, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 127.—Ins. Philipp.
Schumanniana, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 360.—N. Guin.
Shelfordii, *H. H. W. Pearson, in Ann. Bot.* xvii. 617.—Borneo.
subpeltigera, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 360.—N. Guin.

DISCHIDIOPSIS, Schlechter, in Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. (1904) 128. *ASCLEPIADACEAE.*
papuana, *Schlechter, l. c.* (= *Dischidia papuana*).—N. Guin.
philippinensis, *Schlechter, l. c.*—Ins. Philipp.

DISCHISMA, Choisy (Selag.).
crassum, *Rolfe, in Dyer, Fl. Cap.* v. 116.—Afr. austr.

DISCHISTOCALYX, Lindau = **Distichocalyx**, T. Anders. (Acanth.).
togoensis, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxiii. 188.—Afr. trop.

DISCIPHANIA, Eichl. (Menisperm.).
Glaziovii, *Taub. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 15, nomen.—Bras.

DISCLADIUM, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 214 = **Ochna**, Linn. (Ochnac.).
Bernieri, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 125 = O. Bernieri.
Chapelieri, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 352.—Madag.
comorensis, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 125 = O. comorensis.
Dalzelli, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 161.—Ind. or.

DISCLADIUM:—
Gaudichaudi, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 163.—Ind. or.
Harmandi, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 351.—Cochinch.
Humbloti, Van Tiegh. l. c. 352.—Madag.
Koenigii, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 162.—Ind. or.
Leschenaulti, Van Tiegh. l. c.—Ind. or.
lucidum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 125 = O. squarrosa.
microphyllum, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 161 = O. microphylla.
mossambicense, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 125 = O. mossambicensis.
nitidum, Van Tiegh. l. c. = O. squarrosa.
obtusatum, Van Tiegh. l. c. = O. squarrosa.
Planchoni, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 351.—Ind. or.
squarrosum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 125 = O. squarrosa.
Wallichii, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 241, 351 = O. Wallichii.

DISCOCALYX, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. (1902) 211. *MYRSINACEAE.*
angustifolia, *Mez, l. c.* 214.—Ins. Philipp.
cybianthoides, *Mez, l. c.* 213 (= *Cybianthus philippinensis*).—Ins. Philipp.
effusa, *Mez, l. c.* 213.—Ins. Philipp.
ladronica, *Mez, l. c.* 214.—Ins. Marianne.
Listeri, *Mez & Stapf, ex Mez, l. c.* 212.—Ins. Tonga.
minor, *Mez, l. c.* 213.—Ins. Philipp.
orthoneura, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 344.—N. Guin.
philippinensis, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 212 (= *Badula philippinensis*).—Ins. Philipp.
Schlechteri, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 345.—Ins. Bismarck.
Vidalii, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 213.—Ins. Philipp.

DISPERIS, Sw. (Orchid.).
rhodoneura, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 81.—N. Guin.
togoensis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 2.—Afr. trop.

DISPORUM, Salisb. (Liliac.).
canadense, *Shafer, in Ann. Carneg. Mus.* i. 109.—Am. bor.

DISSOTHRIX, A. Gray (Compos.).
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 411.—Parag.

DISSOTIS, Benth. (Melast.).
aquatica, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 217.—Afr. trop.
Gilgiana, *Wildem. l. c.*—Afr. trop.
Mahoni, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7896.—Afr. trop.
paucistellata, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 99.—Afr. trop.
Proschii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 5.—Afr. trop.
rubroviolacea, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 365.—Afr. trop.
spectabilis, *Gilg, l. c.* 366.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 218.—Afr. trop.

DISTICHLIS, Rafin. (Gramin.).
multinervosa, *Piper, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xviii. 147 (= *Melica multinervosa*).—Am. bor.
stricta, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 602 (= *Uniola stricta*).—Am. bor.

DITASSA, R. Br. (Asclep.).
subulata, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 694.—Venez.

DIURANTHERA, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2734 (1902). *LILIACEAE.*
major, *Hemsl. l. c.*—China.
minor, *C. H. Wright, ex Hemsl. l. c.* (= *Paradisea minor*).—China.

DIURIS, Sm. (Orchid.).
Purdiei, *Diels, in Journ. Muell. Soc. W. Austral.* i. no. 11, 79.—Austral.

DIZYGOTHECA, N. E. Br. (Aral.).
pleurandroides, *Viguier, in Journ. de Bot.* xix. 24.—N. Caled.

DODECATHEON, Linn. (Primul.).
hernalinum, Greene, ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 245 = patulum.
brachycarpum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 906.—Am. bor.
campestre, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 432.—Am. bor.
Hugeri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 906.—Am. bor.
lactiflorum, *Greene, Pittonia*, v. 112.—Calif.
latilobum, *Elmer, ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 239.—Am. bor.
macrocarpum, *Knuth, l. c.* 241.—Am. bor.
multiflorum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 631.—Am. bor.
philoscia, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 227.—Am. bor.
sanctarum, *Greene, Pittonia*, v. 113.—Calif.
Stanfieldii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 906.—Am. bor.

DODONAEA, Linn. (Sapind.).
amblyophylla, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 346.—Austral.
caespitosa, *Diels, l. c.* 347.—Austral.
cryptandroides, *Diels, l. c.*—Austral.
Hackettiana, *Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 21.—Austral.

DOLICHOMETRA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiv. (1904) 331. *RUBIACEAE.*
leucantha, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

DOLICHOS, Linn. (Legum.).
adenophorus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 333.—Afr. trop.
argyrophyllus, *Harms, l. c.* xxxiii. 179.—Afr. trop.
bellus, *Harms, l. c.* xxx. 334.—Afr. trop.
Boivini, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 103.—Madag.
dubius, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 64.—Afr. trop.
Ellenbeckii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 177.—Afr. trop.
esculentus, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 61.—Afr. trop.
formosoides, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 177.—Afr. trop.
Gululu, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 65.—Afr. trop.
Hendrickxii, *Wildem. l. c.* Sér. V. i. 156.—Afr. trop.
Katali, *Wildem. l. c.* 157.—Afr. trop.
Lagopus, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 490.—China.
serpens, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 63.—Afr. trop.
Stolzii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 178.—Afr. trop.
trinervis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 66.—Afr. trop.
ugoniensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 179.—Afr. trop.
Verdickti, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 68.—Afr. trop.

DOLIOCARPUS, Roland. (Dillen.).
platystigma, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 173.—Bras.

DOMBEYA, Cav. (Stercul.).
albiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 308.—Afr. trop.
auriculata, *K. Schum. l. c.* xxx. 352.—Afr. trop.
Bagshawei, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 127.—Afr. trop.
Dinteri, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1005.—Afr. austr.
erythroleuca, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 353.—Afr. trop.
faucicola, *K. Schum. l. c.* xxxiv. 323.—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 13.—Afr. trop.
Kindtiana, *Wildem. ex Wildem. & Th. Dur. l. c.* 14.—Afr. trop.
leucorrhoea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 353.—Afr. trop.
macrotis, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 309.—Afr. trop.
malacoxylon, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
monticola, *K. Schum. l. c.* xxxiv. 324.—Afr. trop.
schoenodoter, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 310.—Afr. trop.
Taylori, *Baker f. in Journ. Bot.* 1901, 125.—Afr. trop.

DOMBEYA:—
viscosa, *Lignier & Bey, in Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. V. viii. 258, nomen.—Hab. ?
vitifolia, *Lignier & Bey, l. c.* nomen.—Bourbon.

DONAX, Lour. (Scitamin.).
[CLINOGYNE, Salisb. I. K.]
virgata, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 33 (= *Clinogyne virgata*).—Ind. or.

DONDIA, Adans. = **Suaeda**, Forsk. (Chenopod.).
erecta, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 364 = S. depressa.
Moquini, A. Nelson, l. c. 363 = S. Torreyana.
multiflora, A. Nelson, l. c. 364 = S. suffrutescens.

DONELLA, Pierre = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).
Klainii, Pierre, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. viii. 42 = C. Klainii.
pruniformis, Pierre, l. c. = C. pruniforme.
Welwitschii, Pierre, l. c. 41 = C. Welwitschii.

DONNELLIA, C. B. Clarke, ex Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxxiii. (1902) 261. *COMMELINACEAE.*
grandiflora, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Callisia grandiflora*).—Am. cent.

DOPATRIUM, Buch.-Ham. (Scrophul.).
Dortmanna, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 189.—Afr. trop.
stachytarphetoides, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 362.—Afr. trop.

DORELLA, Bub. Fl. Pyren. iii. (1901) 231 = **Camelina**, Crantz (Crucif.).
oleifera, Bub. l. c. 232 = C. sativa.

DORONICUM, Tourn. (Compos.).
argenteum, Dalz. ex Cooke, Fl. Bombay, ii. 52 = Senecio Edgeworthii.
longicaule, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 414.—Hispan.

DORSTENIA, Plum. (Urtic.).
ciliata, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 114.—Afr. trop.
Ellenbeckiana, *Engl. l. c.* 116.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 838.—Afr. trop.
Harmsiana, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 115.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 69.—Afr. trop.
lukafuensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 28.—Afr. trop.
mundamensis, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 115.—Afr. trop.
tenuifolia, *Engl. l. c.* 116.—Afr. trop.
turbinata, *Engl. l. c.* 115.—Afr. trop.
Unyikae, *Engl. l. c.* xxx. 291.—Afr. trop.
usambarensis, *Engl. l. c.* xxxiii. 114.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. ex Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 26.—Afr. trop.

DORYALIS, E. Mey. (Bixac.).
[DOVYALIS, E. Mey. I. K.]
Antunesii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxii. 136.—Afr. trop.

DORYSTEPHANIA, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 123 (1904). *ASCLEPIADACEAE.*
luzonensis, *Warb. in Perkins, l. c.*—Ins. Philipp.

DOWNINGIA, Torr. (Campan.).
pusilla, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 28 (= *Clintonia pusilla*).—Patag.

DOYERRA, Grosourdy, Medic. Bot. Criollo, i. i. (1864) 201; et ex Bello in Anal. Soc. Esp. Hisp. Nat. x. (1881) 278. *CUCURBITACEAE.*
angosturensis, *Grosourdy, l. c.* i. ii. 339; ii. i. 289.—Venez.
emeto-cathartica, *Grosourdy, l. c.* i. ii. 338; ii. i. 289.—Ind. occ.

DRABA, Dill. (Crucif.).
alajica, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 14.—Turkestan.
albertina, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 312.—Am. bor.
argyrea, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 251.—Am. bor.
atuelica, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 289.—Reg. Argent.
aureiformis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 278.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, Pl. Baker.* iii. 6.—Am. bor.
Benthamiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxviii. 10, nomen.—Ecuador.

DRABA:—
brachystylis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 240.—Am. bor.
cachemirica, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 418.—Ind. or.
cana, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 241.—Am. bor.
chubutensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 214.—Patag.
coloradensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 555.—Am. bor.
columbiana, *Rydb. l. c.* 1902, 242.—Am. bor.
confusa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 29.—Mexic.
darwasica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 60.—As. cent.
decumbens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 240.—Am. bor.
dictyota, *Greene, Pittonia*, iv. 313.—Am. bor.
graminea, *Greene, Pl. Baker.* iii. 5.—Am. bor.
graminifolia, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 5.—Patag.
Hatcheriana, *Gilg, ex Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 444.—Patag.
Helleri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 479.—Am. bor.
hissarica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 59.—As. cent.
karr-aikensis, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 6.—Patag.
McCallae, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 241.—Am. bor.
Macouniana, *Rydb. l. c.* 240.—Am. bor.
media, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 12.—Turkestan.
megasperma, *Fernald & Knowlton, in Rhodora*, vii. 65.—Am. bor.
mexicana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 29.—Mexic.
nipponica, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 41.—Japon.
nitida, *Greene, Pl. Baker.* iii. 7.—Am. bor.
nivicola, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 29.—Mexic.
odudiana, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 62.—As. cent.
oligantha, *Greene, Pittonia*, iv. 313.—Am. bor.
oodakensis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 42.—Japon.
orbiculata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 29.—Mexic.
oxyloba, *Greene, Pl. Baker.* iii. 6.—Am. bor.
Parryi, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 241.—Am. bor.
Pringlei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 30.—Mexic.
pycnosperma, *Fernald & Knowlton, in Rhodora*, vii. 67.—Am. bor.
rosularis, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 290.—Reg. Argent.
Sakuraii, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 40.—Japon.
shiroumana, *Makino, l. c.* xviii. 75.—Japon.
sinanensis, *Makino, l. c.* xvii. 40.—Japon.
sobolifera, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 251.—Am. bor.
Tranzschelii, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 14.—Turkestan.
uber, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 366.—Am. bor.
uncinalis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 251.—Am. bor.
valida, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 55.—Am. bor.
viridis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 27.—Am. bor.

DRABELLA, Fourr. = **Draba**, Dill. (Crucif.).
ciliaris, Bub. Fl. Pyren. iii. 197 = Draba aizoides.
Columnae, Bub. l. c. 200 = D. muralis.
Dedeana, Bub. l. c. 198 = D. Dedeana.
frigida, Bub. l. c. 199 = D. tomentosa.
incana, Bub. l. c. 200 = D. incana.
nemoralis, Bub. l. c. = D. nemorosa.
variabilis, Bub. l. c. 199 = D. fladnizensis.
verna, Bub. l. c. 201 = Erophila vulgaris.

DRACAENA, Vand. (Liliac.).
americana, *Donn. Sm. in Sarg. Trees & Shrubs*, 207, t. 98.—Am. cent.
Bueyei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 16.—Afr. trop.

DRACAENA :—
conferta, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xli. 35.—Penins. Mal.
congensis, Engl. in Wildem. Énum. Pl. Laurent, 42. nomen.—Afr. trop.
cuspidibracteata, Engl. Jahrb. xxxii. 96.—Afr. trop.
Deisteliana, Engl. l. c.—Afr. trop.
deremensis, Engl. l. c. 95.—Afr. trop.
Ellenbeckiana, Engl. l. c.—Afr. trop.
kewensis, Hort. Sand. in Gard. Chron. 1903, I. Suppl. Apr. 25. t. 109.—N. Caled.
Laurentii, Wildem. Énum. Pl. Laurent, 42.—Afr. trop.
penangensis, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xli. 36.—Penins. Mal.
pendula, Ridley, l. c.—Penins. Mal.
prolata, C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 115.—Afr. trop.
Soyauxiana, Baker, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 857.—Afr. trop.
transvaalensis, Baker, l. c. iv. 1001.—Afr. austr.

DRACOCEPHALUM, Linn. (Labiat.).
Biondianum, Diels, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 94.—China.
Komarovi, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xxiii. 207.—As. cent.
Krylovi, Lipsky, l. c. xxiv. 121.—Altai.
radicans, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xiv. (1904) 180.—China.
simplex, Vaniot, l. c. 179.—China.

DRACONTIUM, Linn. (Arac.).
longipes, Engl. Jahrb. xxxvii. 122.—Reg. Amaz.
Pittieri, Engl. l. c.—Am. cent.

DRACONTOMELON, Blume (Anacard.).
papuanum, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 301.—N. Guin.

DRACOPHYLLUM, Labill. (Epacrid.).
arboreum, Cockayne, in Trans. N. Z. Inst. xxxiv. 318.—Ins. Chatham.
paludosum, Cockayne, l. c.—Ins. Chatham.

DRIMIA, Jacq. (Liliac.).
confertiflora, Damm. in Engl. Jahrb. xxxviii. 62.—Afr. trop.

DRIMIOPSIS, Lindl. & Paxt. (Liliac.).
Bussei, Damm. in Engl. Jahrb. xxxviii. 62.—Afr. trop.
Erlangeri, Damm. l. c. 63.—Afr. trop.

DRIMYS, Forst. (Magnol.).
rivularis, Vieill. ex Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1900, 331.—N. Caled.

DROOGMANSIA, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. (1902) 53. LEGUMINOSAE.
huillensis, Wildem. l. c. 57 (= Meibomia huillensis).—Afr. trop.
megalantha, Wildem. l. c. 56 (= Desmodium megalanthum).—Afr. trop.
pteropus, Wildem. l. c. 54 (= Dolichos pteropus).—Afr. trop.
Stuhlmannii, Wildem. l. c. 55 (= Desmodium Stuhlmannii).—Afr. trop.

DROSERA, Linn. (Droser.).
Aliciae, Hamet, in Journ. de Bot. 1905, [114].—Austral.
androsacea, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 205.—Austral.
bulbigena, A. Morrison, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. xxii. 417.—Austral.
Hamiltoni, C. R. P. Andrews, in Journ. Muell. Soc. W. Austral. i. no. 11, 81.—Austral.
miniata, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 206.—Austral.
modesta, Diels, l. c. 209.—Austral.
pycnoblasta, Diels, l. c. 207.—Austral.
Sewelliae, Diels, l. c. 206.—Austral.

DRYANDRA, R. Br. (Proteac.).
Purdieana, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 174.—Austral.

DRYMARIA, Willd. (Caryophyll.).
depressa, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 153.—Am. bor.

DRYMOCALLIS, Fourr. = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).
gracilis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 177.—Am. bor.
viscida, Parish, in Coult. Bot. Gaz. xxxviii. 460.—Calif.

DRYMOPHLOEUS, Zipp. (Palm.).
Mooreanus, Hort. ex Gard. Chron. 1903, I. 266.—Hab. ?

DRYOBALANOPS, Gaertn. f. (Dipterocarp.).
kayanensis, Becc. Nelle Foreste di Borneo, 572.—Borneo.
Rappa, Becc. l. c.—Borneo.

DUDLEYA, Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1903) 12. CRASSULACEAE.
Abramsi, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 14.—Calif.
acuminata, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 26.—Calif.
albiflora, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 13.—Calif.
aloides, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 15.—Calif.
angustiflora, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 14.—Calif.
Anthonyi, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 18.—Calif.
bernardina, Britton, ex Britton & Rose, l. c. 19.—Calif.
Brandegei, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 21.—Calif.
Brauntoni, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 24.—Calif.
brevipes, Rose, ex Britton & Rose, l. c.—Calif.
Bryceae, Britton, ex Britton & Rose, l. c. 17.—Calif.
caespitosa, Britton & Rose, l. c. 27 (= Cotyledon caespitosa).—Calif.
Candelabrum, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 17.—Calif.
candida, Britton, ex Britton & Rose, l. c. 18.—Calif.
compacta, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 25.—Calif.
congesta, Britton, ex Britton & Rose, l. c.—Calif.
Cotyledon, Britton & Rose, l. c. 28 (= Sedum Cotyledon).—Calif.
cultrata, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 16.—Calif.
cymosa, Britton & Rose, l. c. 21 (= Cotyledon cymosa).—Calif.
delicata, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 24.—Calif.
Eastwoodiae, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 25.—Calif.
elongata, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 26.—Calif.
farinosa, Britton & Rose, l. c. 15 (= Echeveria farinosa).—Calif.
gigantea, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 23.—Calif.
Goldmani, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 19.—Calif.
grandiflora, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 16.—Calif.
Greenei, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 17.—Calif.
Hallii, Rose, ex Britton & Rose, l. c.—Calif.
Helleri, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 27.—Calif.
humilis, Rose, ex Britton & Rose, l. c.—Calif.
ingens, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 18.—Calif.
lanceolata, Britton & Rose, l. c. 23 (= Echeveria lanceolata).—Calif.
laxa, Britton & Rose, l. c. 18 (= Cotyledon laxa).—Calif.
linearis, Britton & Rose, l. c. 16 (= Cotyledon linearis).—Calif.
Lingula, Britton & Rose, l. c. 26 (= Cotyledon Lingula).—Calif.
lurida, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 22.—Calif.
minor, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 19.—Calif.
nevadensis, Britton & Rose, l. c. 20 (= Cotyledon nevadensis).—Calif.
nubigena, Britton & Rose, l. c. 22 (= Cotyledon nubigena).—Calif.
ovatifolia, Britton, ex Britton & Rose, l. c. 20.—Calif.
Palmeri, Britton & Rose, l. c. 24 (= Cotyledon Palmeri).—Calif.
paniculata, Britton & Rose, l. c. 27.—Calif.
Parishii, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 21.—Calif.
pauciflora, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 22.—Calif.
Plattiana, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 20 (= Cotyledon Plattiana).—Calif.
pulverulenta, Britton & Rose, l. c. 13 (= Echeveria pulverulenta).—Calif.
pumila, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 14.—Calif.
Purpusi, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 20 (= Cotyledon Purpusi).—Calif.
reflexa, Britton, in N. Am. Fl. xxii. 86.—Calif.
rigida, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 23.—Calif.
rigidiflora, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 18.—Calif.
robusta, Britton, ex Britton & Rose, l. c. 21.—Calif.
rubens, Britton & Rose, l. c. 23 (= Cotyledon rubens).—Calif.
Rusbyi, Britton & Rose, l. c. 13 (= Cotyledon Rusbyi).—Am. bor.
saxosa, Britton & Rose, l. c. 15 (= Cotyledon saxosum).—Calif.
septentrionalis, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 26.—Calif.

DUDLEYA :—
Setchellii, Britton & Rose, in Bull. N. York. Bot. Gard. iii. 15.—Calif.
Sheldoni, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 20.—Calif.
tenuis, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 14.—Calif.
Xanti, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 23.—Calif.

DUGEZIA, Montrouz. ex Beauvis. Gen. Montrouz. 82 (1901) = **Lysimachia**, Tourn. (Primul.).
glandulosa, Montrouz. l. c. = L. decurrens.

DUGUETIA, A. St. Hil. (Anonac.).
riparia, Huber, in Bol. Mus. Para. iii. 416.—Bras.

DUNALIA, H. B. & K. (Solan.).
ferruginea, Sod. & Damm. in Engl. Jahrb. xxxvi. 394.—Ecuador.

DUNBARIA, Wight & Arn. (Legum.).
villosa, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 35 (= Glycine villosa).—Japon.

DUNNIA, Tutch. in Journ. Linn. Soc. xxxvii. (1905) 69. RUBIACEAE.
sinensis, Tutch. l. c. 70.—China.

DURANDEA, Planch. (Linac.).
pentagyna, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 278 (= Ancistrocladus pentagynus).—N. Guin.
rotundata, Warb. in K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.

DURAVIA, Greene, Leaflets, Bot. Obs. i. (1904) 23. POLYGONACEAE.
Bidwelliae, Greene, l. c. (= Polygonum Bidwelliae).—Calif.
Bolanderi, Greene, l. c. (= Polygonum Bolanderi).—Calif.
californica, Greene, l. c. (= Polygonum californicum).—Calif.
Greenei, Greene, l. c. (= Polygonum Greenei).—Calif.

DUSENIELLA, K. Schum. in Just, Jahresb. xxviii. I. (1902) 475. COMPOSITAE.
patagonica, K. Schum. l. c. (= Dusenia patagonica).—Patag.

DUVALIA, Haw. (Asclep.).
propinqua, Berger, in Monatsschr. Kakt. 1904, 24.—Afr. austr.

DUVALJOUVEA, Palla, in Koch, Syn. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. III. iii. 2555 (1905). CYPERACEAE.
pilosa, Palla, l. c. (= Cyperus pilosus).—As. trop.
serotina, Palla, l. c. 2556 (= Cyperus serotinus).—Eur.

DUVERNOYA, E. Mey. (Acanth.).
[ADHATODA, Nees. I. K.]
americana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 405.—Bras.
asystasioides, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxviii. 72.—Afr. trop.
Verdickii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 152.—Afr. trop.

DYCKIA, Schult. f. (Bromel.).
eminens, Mez, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 5.—Bras.
Hassleri, Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 824; iii. 134.—Parag.
horridula, Mez, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 5.—Bras.

DYSCHORISTE, Nees (Acanth.).
[CALOPHANES, D. Don. I. K.]
erecta, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 17.—Afr. austr.
humilis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 628.—Parag.
Pringlei, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 32.—Mexic.
transvaalensis, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 17.—Afr. austr.
Verdickii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 144.—Afr. trop.

DYSODIA, Cav. (Compos.).
Jelskii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 498.—Peruv.
littoralis, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 163 (1903).—Calif.

DYSOPHYLLA, Blume (Labiat.).
Martini, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xiv. (1904) 178.—China.

DYSOXYLUM, Blume (Meliac.).
altissimum, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 25.—Ins. Philipp.
Baillioni, Pierre, Fl. Cochinch. sub t. 352 A, expl. fig. = Loureiri.
Betchei, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 178. —Ins. Samoa.
grandifolium, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 28.—Ins. Philipp.
longicalicinum, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 165.—N. Guin.
longipetalum, C. DC. l. c.—N. Guin.
Macgregorii, C. DC. l. c. 164.—N. Guin.
magnifolium, C. DC. l. c. 166.—N. Guin.
Nymanianum, Harms, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 282.—N. Guin.
pauciflorum, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 32.—Ins. Philipp.
Robertsii, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 178. —N. Caled.
rubrum, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 32.—Ins. Philipp.
stellato-puberulum, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 167.—N. Guin.
variabile, Harms, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 282.—N. Guin.

E

EATONIA, Rafin. (Gramin.).
glabra, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 10:3.—Am. bor.
intermedia, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 602. —Am. bor.
pennsylvanica, Shafer, in Ann. Carneg. Mus. i. 120. —Am. bor.
robusta, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 602.—Am. bor.

EBERMAIERA, Nees (Acanth.).
subcapitata, C. B. Clarke, in Bot. Tidsskr. xxiv. 318.—Malaya.

EBUROPHYTON, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. (1904) 48. ORCHIDACEAE.
Austinae, A. A. Heller, l. c. 49 (= Chloraea Austinae). —Calif.

ECASTAPHYLLUM, P. Br. (Legum.).
pachycarpum, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 749.—Afr. trop.

ECBOLIUM, Kurz (Acanth.).
Flanagani, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 78.—Afr. austr.
Schlechteri, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxviii. 72.—Afr. trop.

ECDYSANTHERA, Hook. & Arn. (Apocyn.).
annamensis, Vernet, in Bull. Econom. Indo-Chine, vii. 1159.—Cochinch.
cambodiensis, Pierre, in Rev. Cult. Colon. xi. 228.—Cochinch.
Godefroyana, Pierre, l. c.—Cochinch.
Langbiani, Vernet, in Bull. Econom. Indo-Chine, vii. 1163.—Siam.
linearicarpa, Pierre, in Rev. Cult. Colon. xi. 228.—Cochinch.
napeensis, Pierre, l. c. (= Micrechites napeensis).—Cochinch.
Quintareti, Pierre, l. c., nomen.—Cochinch.
Tournieri, Pierre, l. c., nomen.—Cochinch.

ECHEANDIA, Orteg. (Liliac.).
flexuosa, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. 73.—Mexic.
macrocarpa, Greenm. l. c.—Mexic.
Pringlei, Greenm. l. c. xl. 28.—Mexic.

ECHEVERIA, DC. = **Cotyledon**, Linn. (Crassul.).
australis, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 6.—Am. cent.
Byrnesi, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 20.—Mexic.
clavifolia, Berger, in Gartenfl. 1904, 201.—Hort.

ECHEVERIA:—
cuspidata, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 9.—Mexic.
elegans, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 22.—Mexic.
expatriata, Rose, l. c. 26.—Hab.?
Goldmani, Rose, l. c. 17.—Mexic.
guatemalensis, Rose, ex Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem. vii. 68, nomen.—Am. cent.
heterosepala, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 8.—Mexic.
humilis, Rose, ex Britton & Rose, l. c.—Mexic.
Lozani, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 23.—Mexic.
maculata, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 7.—Mexic.
minutiflora, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 9.—Mexic.
montana, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 6.—Mexic.
multicaulis, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 294.—Mexic.
obtusifolia, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 8.—Mexic.
Palmeri, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 10.—Mexic.
pinetorum, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 20.—Mexic.
platyphylla, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 7.—Mexic.
Pringlei, Rose, ex Britton & Rose, l. c. 6 = C. Pringlei.
pulchella, Berger, in Gartenfl. 1904, 204.—Hort.
pulvinata, Rose, ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7918 = C. pulvinata.
Purpusi, Britton, in N. Am. Fl. xxii. 26.—Mexic.
pusilla, Berger, in Gartenfl. 1904, 203.—Hort.
rubromarginata, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 23.—Mexic.
scaphophylla, Hort. ex Berger, in Gartenfl. 1904, 201. —Hybr.?
Schaffneri, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 9 = C. Schaffneri.
scopulorum, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 25.—Mexic.
sessiliflora, Rose, l. c. 16.—Mexic.
simulans, Rose, l. c. 22.—Mexic.
sobrina, Berger, in Gartenfl. 1904, 206.—Hort.
sodalis, Berger, l. c. 202.—Hort.
subrigida, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 10 = C. subrigida.
subsessilis, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 19.—Mexic.
tenuis, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 7.—Mexic.
tolucensis, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 22.—Mexic.
turgida, Rose, l. c. 21.—Mexic.
Walpoleana, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 295.—Mexic.

ECHIDNOPSIS, Hook. f. (Asclep.).
Bentii, N. E. Br. ex Hook. f. in Bot. Mag. t. 7760.—Arab.
somalensis, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 477.—Afr. trop.

ECHINOCACTUS, Link & Otto (Cact.).
amazonicus, Witt, in Monatsschr. Kakt. 1902, 29.—Bras.
apricus, Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 205.—Urug.
Arechavaletai, Speg. ex Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 208, t. 11.—Urug.
Arechavaletai, K. Schum. ex Arech. l. c. 242, t. 24.—Urug.
Baldianus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 505. —Reg. Argent.
cachensis, Speg. l. c. 498 (= Echinopsis cachensis).—Reg. Argent.
caespitosus, Speg. l. c. 495.—Reg. Argent.
catamarcensis, Speg. l. c. 500.—Reg. Argent.
cataphractus, Dams, in Monatsschr. Kakt. 1904, 172.—Parag.?
chionanthus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 499.—Reg. Argent.
Damsii, K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr. i. 119.—Parag.
Delaetii, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1901, 186.—Hort.
elachisanthus, Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1904, 387.—Urug.
Falconeri, Orcutt, Seed Pl. Co. Cat. Cact. 1903, 13; et in W. Amer. Sci. xiii. 31.—Mexic.
Fiebrigii, Guerke, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iv. 183.—Bolivia.
Fiedlerianus, K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr. i. 121. —Chili.

ECHINOCACTUS:—
floricomus, Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 183.—Urug.
Fordii, Orcutt, Seed Pl. Co. Cat. Cact. 1903, 13; et in W. Amer. Sci. xiii. 31.—Calif.
Fricii, Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 241.—Urug.
Froehlichianus, K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr. i. 124.—Chili.
Graessneri, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1903, 130. —Bras.
haematanthus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 498.—Reg. Argent.
Knippelianus, Quehl. in Monatsschr. Kakt. 1902, 9.—Parag.
leucocarpus, Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 239. —Urug.
loricatus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 502 —Reg. Argent.
melanocarpus, Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 220.—Urug.
Mihanovichii, Fric & Guerke, in Monatsschr. Kakt. 1905, 142.—Parag.
pauciareolatus, Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 246.—Urug.
peruvianus, K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr. i. 113. —Peruv.
pseudominusculus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 488 (= Echinopsis pseudominuscula).—Urug.
pulcherrimus, Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 222. —Urug.
pygmaeus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 497. —Reg. Argent.
Reichei, K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr. i. 110.—Chili.
saltensis, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 487 (= Echinopsis saltensis).—Reg. Argent.
sanjuanensis, Speg. l. c. 501.—Reg. Argent.
Schottii, Small, Fl. S. E. U. S. 814.—Am. bor.
Soehrensii, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1901, 75. —Chili.
spiniflorus, K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr. i. 88. —Reg. Argent.
stellatus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 505.—Reg. Argent.
Stuckertii, Speg. l. c. 502.—Reg. Argent.
thionanthus, Speg. l. c. 499.—Reg. Argent.
uruguayensis, Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 218. —Urug.
Wrightii, Small, Fl. S. E. U. S. 815.—Am. bor.

ECHINOCEREUS, Engelm. = **Cereus**, Haw. (Cact.).
Berlandieri, Small, Fl. S. E. U. S. 818 = C. Berlandieri.
dubius, Small, l. c. = C. dubius.
Fendleri, Small, l. c. = C. Fendleri.
mouncanthus, Heese, in Gartenfl. 1904, 215.—Mexic.
Poselgeri, Small, Fl. S. E. U. S. 813 = C. Poselgeri.
procumbens, Small, l. c. = C. procumbens, A. Gray.
rubescens, Dams, in Monatsschr. Kakt. 1905, 92. —Hab.?

ECHINOCHLOA, Beauv. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).
longearistata, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 84. —Am. bor.
Walteri, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 78 = P. Crus-Galli.

ECHINOCYSTIS, Torr. & Gray (Cucurb.).
inermis, Congd. in Zoe, v. 134 (1901).—Calif.
scabrida, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 500. —Calif.

ECHINODORUS, Rich. (Alismac.).
brevipedicellatus, Buchen. in Engl. Pflanzenreich, Alismat. 29 (= Sagittaria brevipedicellata).—Bras.
longiscapus, Arech. in Anal. Mus. Montevid. iv. t. 67. —Urug.
longistylis, Buchen. in Engl. Pflanzenreich, Alismat. 34.—Bras.
natans, Bub. Fl. Pyren. iv. 8 = Elisma natans.
patagonicus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 174.—Patag.
Sellowianus, Buchen. in Engl. Pflanzenreich, Alismat. 30.—Bras.
uruguayensis, Arech. in Anal. Mus. Montevid. iv. t. 66.—Urug.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. iv. 5 = Alisma Plantago.

ECHINOPS, Linn. (Compos.).
angustilobus, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 363.—Afr. trop.
brevisectus, *S. Moore, l. c.* xxxvii. 174.—Afr. trop.
velutinus, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 440.—Afr. trop.

ECHINOPSIS, *Zucc.* = **Cereus**, Haw. (Cact.).
albispinosa, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1903, 154.—Hab.?
ancistrophora, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 492.—Reg. Argent.
Baldiana, Speg. l. c. 490.—Reg. Argent.
cachensis, Speg. l. c. 493.—Reg. Argent.
cordobensis, Speg. l. c. 489.—Reg. Argent.
deminuta, Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1904, 386.—Reg. Argent.
Fiebrigii, Guerke, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iv. 184.—Bolivia.
intricatissima, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 491.—Reg. Argent.
melanopotamica, Speg. l. c. 492.—Reg. Argent.
minuana, Speg. l. c. 488.—Reg. Argent.
mirabilis, Speg. l. c. 489.—Reg. Argent.
molesta, Speg. l. c. 490.—Reg. Argent.
pseudominuscula, Speg. l. c. 488.—Reg. Argent.
pygmaea, R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. Ser. IV. i. no. 1, 120.—Reg. Argent.
saltensis, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 487.—Reg. Argent.
Silvestrii, Speg. l. c. 486.—Reg. Argent.
Spegazzinii, K. Schum. ex Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 488 = rhodotricha.
tacuarembense, Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 254.—Urug.

ECHINOSPERMUM, Sw. (Borag.).
cenchroides, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 522 (= *Lappula cenchrusoides*).—Am. bor.
collinum, *K. Schum. l. c.* (= *Lappula collina*).—Am. bor.
coronatum, *K. Schum. l. c.* (= *Lappula coronata*).—Am. bor.
desertorum, *K. Schum. l. c.* (= *Lappula desertorum*).—Am. bor.
heterospermum, *K. Schum. l. c.* (*errore* heteropesmum) (= *Lappula heterosperma*).—Am. bor.
Matsudairai, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 52.—Japon.
montanum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 523 (= *Lappula montana*).—Am. bor.
occidentale, *K. Schum. l. c.* (= *Lappula occidentalis*).—Am. bor.
patagonicum, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 37.—Patag.

ECHITES, P. Br. (Apocyn.).
cobanensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 6.—Am. cent.
Riedelii, *Malme, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 196 (= *Haemadictyon Riedelii*).—Parag.
Rosana, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 6.—Am. cent.
Smithii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 29.—Mexic.

ECHIUM, Tourn. (Borag.).
aequale, *Coincy, in Journ. de Bot.* xvi. 232.—Afr. bor.
Barrattei, *Coincy, l. c.* 228.—Afr. bor.
Bonnetii, *Coincy, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 748.—Ins. Canar.
confusum, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1900, 298.—Eur.; Afr. bor.
dumosum, *Coincy, l. c.* xvi. 231.—Afr. bor.
exasperatum, *Webb, ex Coincy, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 491.—Ins. Cap. Verd.
gentianoides, *Webb, ex Coincy, l. c.* 498.—Ins. Canar.
granatense, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1900, 300.—Hispan.
petiolatum, *Barratte & Coincy, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 1306.—Afr. bor.
velutinum, *Coincy, in Journ. de Bot.* 1900, 260.—Afr. bor.
vulnerans, *Merino, in Bol. Soc. Arag.* iii. 189.—Hispan.
Webbii, *Coincy, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 270.—Ins. Canar.
Wildpretii, *H. H. W. Pearson, ex Hook. f. in Bot. Mag.* t. 7847.—Ins. Canar.

ECTOZOMA, Miers = **Juanulloa**, Ruiz & Pav. (Solan.)
Ulei, Damm. in Engl. Jahrb. xxxvii. 170.—Reg. Amaz.

EDWINIA, A. A. Heller (Saxifr.).
californica, *Small, in N. Am. Fl.* xxii. 176.—Calif.
macrocalyx, *Small, l. c.*—Am. bor.

EGASSEA, Pierre, ex Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. (1903) 31. *OLACACEAE.*
laurifolia, *Pierre, ex Wildem. l. c.*—Afr. trop.
Pierreana, *Wildem, in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 32.—Afr. trop.

EHRETIA, Linn. (Borag.).
Gurkeana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo.* Sér. IV. 223.—Afr. trop.
mollis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* vi. 5 (= *Menais mollis*).—Ins. Philipp.
viscosa, *Fernald, in Sargent, Trees & Shrubs*, 25.—Mexic.
Zenkeri, *Guerke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 25.—Afr. trop.

EICHHORNIA, Kunth (Ponteder.).
diversifolia, *Urb. Symb. Antill.* iv. 147 (= *Heteranthera diversifolia*).—Ind. occ.

EKEBERGIA, Sparrm. (Meliac.).
complanata, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 132.—Afr. trop.

ELAEAGNUS, Tourn. (Elaeagn.).
mollis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 78.—China.
Yoshinoi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 155.—Japon.

ELAEOCARPUS, Burm. (Tiliac.).
argenteus, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 26.—Ins. Philipp.
Balansae, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 366.—Tonkin.
Beccarii, *Aug. DC. l. c.* 367.—Borneo.
dubius, *Aug. DC. l. c.* 366.—Tonkin.
ellipticus, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 67 = decipiens.
macranthus, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 38.—Ins. Philipp.
Miquelii, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 27 (= *Monoceras robusta*).—Sumatra.
novo-guineensis, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 314.—N. Guin.
octantherus, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 367.—Borneo.
pendulus, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 27.—Ins. Philipp.
philippinensis, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 101.—Ins. Philipp.
Teysmannii, *Koord. & Valet. in Ic. Bogor.* t. 128, descr.—Celebes.
tonganus, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 20.—Ins. Tonga.
tonkinensis, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 365.—Tonkin.
Treubii, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 29.—Ins. Amboin.
Valetonii, *Hochr. l. c.*—Ins. Bangka.
villosiusculus, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 101.—Ins. Philipp.

ELAEODENDRON, Jacq. f. (Celastr.).
Ehrenbergii, *Urb. Symb. Antill.* v. 92.—Ind. occ.

ELASMOCARPUS, Hochst. ex Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. (1903) 87 = **Indigofera**, Linn. (Legum.).
ervoides, Hochst. l. c. 89 = I. ervoides.
ornithopodioides, Hochst. l. c. 87 = I. anabaptista.

ELATINE, Linn. (Elatin.).
nivalis, *Speg. in Com. Mus. Buenos Aires*, i. 321.—Am. austr.

ELATOSTEMA, Forst. (Urtic.).
angusticuneatum, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 126.—Afr. trop.
fruticulosum, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 254.—N. Guin.
Henriquesii, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 125.—Afr. trop.
Novae-Britanniae, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 253.—Ins. Bismarck.
parvulum, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 127.—Afr. trop.

ELATOSTEMMA:—
peltatum, *Hemsl. in Kew Bull.* 1901, 143.—Ins. Fiji.
Preussii, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 126.—Afr. trop.
trichanthum, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 255.—N. Guin.
velutinum, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 253 (= *Procris velutina*).—N. Guin.
Weinlandii, *K. Schum. l. c.* 254.—N. Guin.
Welwitschii, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 124.—Afr. trop.

ELEIOTIS, DC. (Legum.).
trifoliolata, *Cooke, Fl. Bombay*, 342.—Ind. or.

ELEOCHARIS, R. Br. (Cyper.).
appendiculata, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 20.—Chili.
Boissieri, *Podp. in Verh. Zool.-bot. Ges. Wien*, lii. 677.—Eur.
flavescens, *Urb. Symb. Antill.* iv. 116 (= *Scirpus flavescens*).—Ind. occ.
fennica, *Kneuck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1901, 212.—Eur.
funebris, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 177.—Patag.
Kirkii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 410.—Afr. trop.
Lechleri, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 24.—Chili.
liukiuensis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 111.—Ins. Liukiu.
Macounii, *Fernald, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1044.—Am. bor.
macrostachya, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 184.—Am. bor.
melanomphala, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 24.—Chili.
melanostachys, *C. B. Clarke, l. c.* 20.—Chili.
nipponica, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 110.—Japon.
pachycarpa, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 22.—Chili.
plantaginoidea, *W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* ix. 267 (= *Scirpus plantaginoides*).—Ind. or.; Madag.
platypus, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxviii. 3.—Ecuador.
praticola, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 182.—Am. bor.
Ravenelii, *Britton, l. c.* 184.—Am. bor.
Reichei, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 25.—Chili.
Savatieri, *C. B. Clarke, ex Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 203.—Japon.
simulans, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 20.—Chili.
Smallii, *Britton, in Torreya*, iii. (1903) 23.—Am. bor.
Vincentina, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 18.—Chili.

ELEPHANTELLA, Rydb. (Scrophul.).
attollens, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 4 (= *Pedicularis attollens*).—Am. bor.

ELETTARIOPSIS, Baker (Scitamin.).
cyanescens, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 31.—Penins. Mal.
Schmidtii, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 269.—Malaya.

ELIONURUS, Humb. & Bonpl. (Gramin.).
Pobeguinii, *Stapf, in Journ. de Bot.* 1905, 99.—Afr. trop.

ELLEANTHUS, Presl (Orchid.).
attenuatus, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 684.—Venez.
puber, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 333.—Bras.
sprucéanus, *Cogn. l. c.* 332.—Bras.

ELLERTONIA, Wight (Apocyn.).
Mcgregorii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 59.—Ins. Philipp.

ELMERA, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 97 (1905). *SAXIFRAGACEAE.*
racemosa, *Rydb. l. c.* (= *Heuchera racemosa*).—Am. bor.

ELSHOLTZIA, Willd. (Labiat.).
Bodinieri, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 176.—China.
kachinensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 206.—Burma.
Labordei, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 177.—China.

ELVASIA, DC. (Ochnac.).
canescens, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* 1902, 205.—Am. trop.
Schomburgkii, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par.* Sér. VIII. xvi. 409.—Guian.
Sprucei, *Van Tiegh. l. c.*—Bras.

ELVIRA, Cass. (Compos.).
inelegans, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 212 (=*Desmocephalum inelegans*).—Ins. Galap.
repens, *Robinson, l. c.* (=*Microcoecia repens*).—Ins. Galap.

ELYMUS, Linn. (Gramin.).
angustifolius, *Davy, in Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 80.—Calif.
barbatus, *F. Kurtz, in Bol. Acad. Ci. Cordoba,* xv. 522, nomen.—Reg. Argent.
cinereus, *Scribn. & Merrill, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1902, 467.—Am. bor.
curvatus, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1903, 233.—Am. bor.
divergens, *Davy, in Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 80.—Calif.
dagestanicus, *Alex. in Act. Hort. Tiflis,* vi. i. 97.—Reg. Caucas.
glaber, *Davy, in Univ. Calif. Publ. Bot.* i. 57 (=*Sitanion glabrum*).—Am. bor.
hirsutiglumis, *Scribn. & Sm. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 157.—Am. bor.
hispidulus, *Davy, in Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 79.—Calif.
multisetus, *Davy, in Univ. Calif. Publ. Bot.* i. 57 (=*Sitanion multisetum*).—Am. bor.
Parishii, *Davy & Merrill, l. c.* 58.—Am. bor.
pubescens, *Davy, in Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 78.—Am. bor.
pubiflorus, *Davy & Merrill, in Univ. Calif. Publ. Bot.* i. 58 (=*Sitanion pubiflorum*).—Am. bor.
strigosus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1905, 609.—Am. bor.
velutinus, *Scribn. & Merrill, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1902, 466.—Am. bor.
villiflorus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1905, 609.—Am. bor.

ELYNANTHUS, Nees (Cyper.).
antarcticus, Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. viii. 267 (=*Chaetospora antarctica*).—Reg. Magell.
laxus, Macl. l. c. (=*Chaetospora laxa*).—Chili.

ELYTROPHORUS, Beauv. (Gramin.).
globularis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 995.—Afr. austr. or.
interruptus, *Pilg. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 176.—Afr. trop.

EMBELIA, Burm. f. (Myrsin.).
australiana, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 331 (=*Samara australiana*).—Austral.
Barbeyana, *Mez, l. c.* 308 (=*Ribesiodes villosum*).—Madag.
Baronii, *Mez, l. c.*—Madag.
bataanensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 44.—Ins. Philipp.
biflora, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 323.—Borneo.
Boivinii, *Mez, l. c.* 309.—Madag.
Clarkei, *Bedd. & Mez, ex Mez, l. c.* 328.—Ind. or.
comorensis, *Mez, l. c.* 308.—Ins. Comor.
corymbifera, *Mez, l. c.* 312.—Borneo.
effusa, *Mez, l. c.* 311.—Borneo.
erythrocarpa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 96.—Afr. trop.
Fordii, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 326 (=*Ardisia Fordii*).—China.
frangulifolia, *Mez, l. c.* 321 (=*Ardisia frangulifolia*).—Arch. Mal.
fulva, *Mez, l. c.* 312.—Borneo.
Gilgii, *Mez, l. c.* 330.—Afr. trop.
Hillebrandii, *Mez, l. c.* 331.—Ins. Sandwic.
incumbens, *Mez, l. c.* 307.—Madag.

EMBELIA:—
laeta, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 326 (=*Myrsine laeta*).—China.
myriantha, *Mez, l. c.* 304.—Borneo.
myrtifolia, *Mez, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 107.—China.
nitida, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 309.—Ins. Maurit.
nyassana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 96.—Afr. trop.
obovata, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 305.—Madag.
penangiana, *Mez, l. c.* 311.—Penins. Mal.
polypodioides, *Mez, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 108.—China.
Porteana, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 302.—Ins. Philipp.
procumbens, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2724.—China.
prunifolia, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 316.—China.
pulchella, *Mez, l. c.* 324.—Ind. or.
pyrifolia, *Mez, l. c.* 306 (=*Ardisia pyrifolia*).—Madag.
retata, *Mez, l. c.* 322.—Java.
retusa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 95.—Afr. trop.
rigida, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 311.—Sumatra.
Rowlandii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 96.—Afr. trop.
ruminata, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 331 (=*Myrsine ruminata*).—Afr. austr.
Sarasinorum, *Mez, l. c.* 313.—Celebes.
saxatilis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2724.—China.
scandens, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 317 (=*Calispermum scandens*).—Cochinch.
subcoriacea, *Mez, l. c.* 329.—Ind. or.
tenuis, *Mez, l. c.* 314.—Borneo.
undulata, *Mez, l. c.* 327 (=*Samara undulata*).—Ind. or.
Zollingeri, *Mez, l. c.* 310.—Java.

EMILIA, Cass. (Compos.).
debilis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 172.—Afr. trop.
protracta, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 46.—Afr. trop.

EMINIA, Taub. (Legum.).
[RHYNCHOSIA, Lour. I. K. S. i.]
Harmsiana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 198.—Afr. trop.
major, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 331.—Afr. trop.

ENANTIA, Oliv. (Anonac.).
polycarpa, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* vi. 69 (=*Xylopia polycarpa*).—Afr. trop.

ENCELIA, Adans. (Compos.).
Actoni, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxix. 47.—Calif.
adenophora, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 109.—Mexic.
angustifolia, *Greenm. l. c.* 110.—Mexic.
Chaseae, *Millsp. ex Millsp. & Chase, in Field Columb. Mus. Bot.* iii. 125.—Mexic.
collodes, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 110.—Mexic.
Conzattii, *Greenm. l. c.* 111.—Mexic.
pilosa, *Greenm. l. c.*—Mexic.
squarrosa, *Greenm. l. c.* 112.—Mexic.
suffrutescens, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Sér. IV. i. no. 1, 83.—Reg. Argent.
virginensis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 272.—Am. bor.

ENCEPHALARTOS, Lehm. (Cycad.).
Laurentianus, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. V. i. 10.—Afr. trop.
Vromii, *Matte, Recherches App. Lib. Lign. Cycad.* 70, nomen.—Hab.?

ENCEPHALOSPHAERA, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 322 (1904). *ACANTHACEAE.*
vitellina, *Lindau, l. c.* 323.—N. Granat.

ENDIANDRA, R. Br. (Laurac.).
coriacea, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 14.—Ins. Philipp.
micrantha, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lxviii. 228.—Java.

ENDLICHERIA, Nees (Laurac.).
[AYDENDRON, Nees. I. K.]
glaberrima, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 236.—Peruv.
verticillata, *Mez, l. c.* 235.—Bras.

ENDOLEPIS, Torr. = **Atriplex**, Linn. (Chenop.).
ovata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 248.—Am. bor.

ENDORIMA, Rafin. = **Baldwinia**, Nutt. (Compos.).
atropurpurea, Small, Fl. S. E. U. S. 1283 = B. atropurpurea.
uniflora, Barnhart, in Small, l. c. = B. uniflora.

ENDOSPERMUM, Benth. (Euphorb.).
peltatum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 35.—Ins. Philipp.

ENGELHARDTIA, Leschen. (Jugland.).
subsimplicifolia, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 6.—Ins. Philipp.

ENGLEROPHOENIX, Kuntze = **Maximiliana**, Mart. (Palm.).
attaleoides, Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras. t. 76 (=*Attalea spectabilis*).—Bras.
longirostrata, Barb. Rodr. l. c. 77 = M. longirostrata.

ENICOSTEMA, Blume (Gentian.).
latiloba, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 564.—Afr. trop.

ENKIANTHUS, Lour. (Ericac.).
cernuus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* viii. (214) (=*Meisteria cernua*).—Japon.
Meisteria, *Maxim. Mél. Biol.* xii. 742 (=*Meisteria cernua*).—Japon.

ENNEADYNAMIS, Hab. Fl. Pyren. iii. 109 = **Parnassia**, Tourn. (Saxifr.).
Polonorum, Bub. l. c. 110 = P. palustris.

ENOMEGRA, A. Nelson, Analyt. Key Fl. Pl. Rocky Mts. 27 (1902). *PAPAVERACEAE.*
bipinnatifida, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 366 (=*Argemone bipinnatifida*).—Am. bor.
hispida, *A. Nelson, Analyt. Key Fl. Pl. Rocky Mts.* 27 (=*Argemone hispida*).—Am. bor.

ENTADA, Adans. (Legum.).
Boiviniana, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 51 (=*Piptadenia Boiviniana*).—Madag.
chrysostachys, *Drake, l. c.* (=*Acacia chrysostachys*).—Madag.
Grandidieri, *Drake, l. c.* (=*Piptadenia Grandidieri*).—Madag.
nana, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 244.—Afr. trop.
rotundifolia, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 153.—Afr. trop.

ENTEROPOGON, Nees (Gramin.).
gracilior, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 403.—China.

EPERUA, Aubl. (Legum.).
Schomburgkiana, *Benth. in Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 226.—Guiana.

EPHEDRA, Tourn. (Gnetac.).
Fedtschenkoi, *Paulsen, in Bot. Tidsskr.* xxvi. 254.—As. cent.

EPIBLASTUS, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch Südsee (1905) 136. *ORCHIDACEAE.*
ornithidioides, *Schlechter, l. c.* 137.—N. Guin.
sciadanthus, *Schlechter, l. c.* (=*Dendrobium sciadanthum*).—Austral.

EPIBLEPHARIS, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xv. (1901) 392 = **Luxemburgia**, A. St. Hil. (Ochnac.).
Gardneri, Van Tiegh. l. c.—Bras.
Glaziouiana, Van Tiegh. l. c.—Bras.
major, Van Tiegh. l. c. 393.—Bras.

EPICAMPES, J. & C. Presl (Gramin.).
arundinacea, *Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires,* xi. 107 (=*Diachyrium arundinaceum*).—Reg. Argent.
crassiculmis, *Piper, in Proc. Biol. Soc. Washington,* xviii. 144.—Mexic.
leptoura, *Piper, l. c.* 143.—Mexic.
macrotis, *Piper, l. c.* 144.—Mexic.

EPIDENDRUM, Linn. (Orchid.).
biflorum, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 337.—Am. cent.
Claesianum, *Cogn. in Gard. Chron.* 1901, t. 70.—N. Granat.
crassinervium, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 182.—Bolivia.
densifolium, *Kraenzl. l. c.* 186.—Peruv.
dermatanthum, *Kraenzl. l. c.* 184.—Peruv.
erythronioides, *Small, Fl. S. E. U. S.* 328.—Am. bor.
euspathum, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 182.—Peruv.
Feddeanum, *Kraenzl. l. c.* 188.—Peruv.
Frons-bovis, *Kraenzl. l. c.* 181.—Peruv.
Huacapistanae, *Kraenzl. l. c.* 183.—Peruv.
Johnstoni, *Ames, in J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 684.—Venez.
Lambeauanum, *Wildem. in Chron. Orch.* ii. (1904) 29; *Dict. Ic. Orch. Epidendr.* t. 24.—N. Granat.
macrocyphum, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 185.—Peruv.
macrogastrium, *Kraenzl. l. c.* 187.—Peruv.
monzonense, *Kraenzl. l. c.* 88.—Peruv.
Moyobambae, *Kraenzl. l. c.* 185.—Peruv.
oaxacanum, *Rolfe, in Ames, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 120.—Mexic.
pachychilum, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 184.—Peruv.
pachygastrium, *Kraenzl. l. c.* 183.—Peruv.
physopus, *Kraenzl. l. c.* 87.—Peruv.
Pringlei, *Rolfe, in Ames, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 120.—Mexic.
rhopalorhachis, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 160.—Peruv.
saxicola, *Kraenzl. l. c.* 187.—Peruv.
sessiliflorum, *Edwall, in Revista Centr. Sci. Campinas*, ii. 194.—Bras.
viridifuscatum, *Wildem. in Chron. Orch.* ii. 35.—Am. cent.
Weberbauerianum, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 87.—Peruv.

EPILOBIUM, Dill. (Onagrac.).
angulatum, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 432.—As. or.
apricum, *Suksd. in W. Amer. Sci.* xi. 77.—Am. bor.
canescens, *Thell. ex Naeg. & Thell. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zurich*, l. 252.—Eur. cent.
cylindrostigma, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxv. (1905) 95.—Manchuria.
erectum, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxxiv. 390.—N. Zel.
fasciculatum, *Suksd. in W. Amer. Sci.* xi. 77.—Am. bor.
hakkodense, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* x. (1901) 34.—Japon.
Makinoense, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 73.—Japon.
Mouillefarinei, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 554.—Hybr.
Ninckii, *Corbière, ex Ninck, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 555.—Hybr.
nudicarpum, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 432.—As. or.
numidicum, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis*, 127.—Afr. bor.
ovatifolium, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 567.—Am. bor.
Palmeri, *Rydb. l. c.* 569.—Am. bor.
patagonicum, *Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 357.—Patag.
quadrangulum, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 72.—Japon.
rubescens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 568.—Am. bor.
stramineum, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
tenue, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxv. (1905) 95.—As. bor. or.
Yabei, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 72.—Japon.

EPIPACTIS, Adans. (Orchid.).
atroviridis, *Linton, Fl. Derby.* 270.—Anglia.

EPIPHYLLANTHUS, Berger, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1905, 84. *CACTACEAE.*
obtusangulus, *Berger, l. c.* (= *Cereus obtusangulus*).—Bras.

EPIPHYLLUM, Haw. (Cact.).
delicatum, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1902, ii. 411.—Bras.

EPIPOGUM, S. G. Gmel. (Orchid.).
japonicum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 131.—Japon.

EPIPREMNUM, Schott (Arac.).
carolinense, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 459.—Ins. Carol.

EPITABERNA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. (1903) 316. *APOCYNACEAE.*
myrmoecia, *K. Schum. l. c.* 317.—Afr. trop.

ERAGROSTIS, Host (Gramin.).
aridicola, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 180.—Reg. Argent.
angolensis, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1903, 199.—Afr. trop.
angusta, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 772.—Afr. trop.
annulata, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. (1903) 63.—Afr. or. trop.
auriculata, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 773.—Afr. trop.
Boehmii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 303.—Afr. trop.
brachyphylla, *Hack. l. c.* 305.—Afr. trop.
capitata, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1012.—Am. bor.
costata, *Turner, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxx. 91.—Austral.
crassinervis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 774.—Afr. austr.
densissima, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 304.—Ecuad.
Dielsii, *Pilg. ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 76.—Austral.
distans, *Hack. in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 81.—Ins. Philipp.
gracillima, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 775.—Afr. trop.
harpachnoides, *Hack. in Osterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 306.—China.
hereroensis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 775.—Afr. trop.
hirsuta, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1042.—Am. bor.
Hugoniana, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 414.—China.
invalida, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 129.—Afr. trop.
macropoda, *Pilg. in Urb. Symb. Antill.* iv. 106.—Ind. occ.
matogrossensis, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 140.—Bras.
orthoclada, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. iv. 281.—Parag.
ramosa, *Hack. l. c.* i. 776.—Afr. trop.
serpula, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 66.—Afr. or. trop.
trachyphylla, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 269.—Afr. trop.
Warmingii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 305.—Venez.

ERANTHEMUM, Linn. (Acanth.).
cortatum, *C. B. Clarke, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 89.—Ins. Philipp.
pratense, Panch. ex Beauvis. Gen. Montrouz. 89 = variabile.
Pumilio, *C. B. Clarke, in Bot. Tidsskr.* xxiv. 350.—Malaya.

ERANTHIS, Salisb. (Ranunc.).
Vaniotiana, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 299.—As. bor.

EREMANTHUS, Less. (Compos.).
Jelskii, *Hieron, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 462.—Peruv.

EREMOBIUM, Boiss. = **Malcomia**, R. Br. (Crucif.).
aegyptiacum, Hochst. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genèv. vii–viii. 159 = M. aegyptiaca.

EREMOPHILA, R. Br. (Myopor.).
caerulea, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 542 (= *Pholidia caerulea*).—Austral.
calorhabdos, *Diels, l. c.* 545.—Austral.
calycina, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 28.—Austral.
chamaephila, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 543.—Austral.

EREMOPHILA:—
dichroantha, *Diels, l. c.* 541.—Austral.
elachantha, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 542.—Austral.
Georgei, *Diels, l. c.* 543.—Austral.
Hastieana, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 27.—Austral.
interstans, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 540 (= *Pholidia interstans*).—Austral.
ionantha, *Diels, l. c.*—Austral.
pachyphylla, *Diels, l. c.* 539.—Austral.
platythamnos, *Diels, l. c.*—Austral.
pterocarpa, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 28.—Austral.
pustulata, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 145.—Austral.
scaberula, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 20.—Austral.
spathulata, *Fitzg. l. c.* i. 28.—Austral.
virgata, *Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxvii. 242.—Austral.
Websteri, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 100.—Austral.
xanthotricha, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 537.—Austral.

EREMOSPATHA, Mann & H. Wendl. (Palm.).
Cabrae, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 95 (= *Calamus Cabrae*).—Afr. trop.
Haullevilleana, *Wildem, l. c.* 96.—Afr. trop.

EREMURUS, Bieb. (Liliac.).
comosus, *O. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 772.—Turkestan.
Isabellinus, *Vilm. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. (1905) 419.—Hybr.
Korshinskii, *O. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. iv. 771.—Turkestan.
lactiflorus, *O. Fedtsch. l. c.* 773.—Turkestan.

ERIA, Lindl. (Orchid.).
cristata, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 78.—Penins. Mal.
cymbiformis, *J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* i. 152.—Sumatra.
Elmeri, *Ames, Orchid.* i. 93.—Ins. Philipp.
falcata, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 404.—Java.
globifera, *Rolfe, in Gard. Chron.* 1905, ii. 449.—Anam.
graciliscapa, *Rolfe, in Ames, Orchid.* i. 93.—Ins. Philipp.
hainanensis, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 16.—China.
Hosei, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 174.—Borneo.
Junghuhnii, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 405.—Java.
leucotricha, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 180.—N. Guin.
moluccana, *Schlechter & J. J. Sm. in J. J. Sm. Orch. Ambon*, 74.—Ins. Malay.
oligotricha, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 181.—N. Guin.
pendula, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 78.—Malaya.
phaeotricha, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 181.—N. Guin.
philippinensis, *Ames, Orchid.* i. 94.—Ins. Philipp.
podochiloides, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 182.—N. Guin.
pseudo-stellata, *Schlechter, l. c.*—Ins. Bismarck.
quinquangularis, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 76.—Ins. Ambon.
ramuana, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 183.—N. Guin.
rotundifolia, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 78.—Penins. Mal.
torricellensis, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 183.—N. Guin.
unifolia, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 402.—Java.
xanthotricha, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 184.—N. Guin.

ERIACHNE, R. Br. (Gramin.).
inermis, *Pilg. ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 75.—Austral.
nana, *Pilg. ex Diels & Pritz. l. c.*—Austral.

ERIANTHUS, Michx. (Gramin.).
pollinioides, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 350.—China.
scriptorius, Bub. Fl. Pyren. iv. 252 = E. Ravennae.

ERICA, Tourn. (Ericac.).
aemula, *Guthrie & Bolus, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 116. —Afr. austr.
aghillana, *Guthrie & Bolus, l. c.* 160.—Afr. austr.
Alexandri, *Guthrie & Bolus, l. c.* 195.—Afr. austr.
Alfredii, *Guthrie & Bolus, l. c.* 254.—Afr. austr.
alticola, *Guthrie & Bolus, l. c.* 217.—Afr. austr.
amphigena, *Guthrie & Bolus, l. c.* 241.—Afr. austr.
annectens, *Guthrie & Bolus, l. c.* 61.—Afr. austr.
argyraea, *Guthrie & Bolus, l. c.* 140.—Afr. austr.
astroites, *Guthrie & Bolus, l. c.* 108.—Afr. austr.
Atherstonei, *Diels, ex Guthrie & Bolus, l. c.* 120. —Afr. austr.
auriculata, *Guthrie & Bolus, l. c.* 119.—Afr. austr.
berzelioides, *Guthrie & Bolus, l. c.* 76.—Afr. austr.
Bodkinii, *Guthrie & Bolus, l. c.* 265.—Afr. austr.
brachysepala, *Guthrie & Bolus, l. c.* 171.—Afr. austr.
brevicaulis, *Guthrie & Bolus, l. c.* 291.—Afr. austr.
Burnetti, *Hort. in Fl. des Serres*, t. 845.—Hybr.
casta, *Guthrie & Bolus, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 62.—Afr. austr.
chartacea, *Guthrie & Bolus, l. c.* 243.—Afr. austr.
chionophila, *Guthrie & Bolus, l. c.* 161.—Afr. austr.
chrysocodon, *Guthrie & Bolus, l. c.* 122.—Afr. austr.
clavisepala, *Guthrie & Bolus, l. c.* 231.—Afr. austr.
collina, *Guthrie & Bolus, l. c.* 213.—Afr. austr.
comata, *Guthrie & Bolus, l. c.* 294.—Afr. austr.
confusa, *Guthrie & Bolus, l. c.* 153.—Afr. austr.
consobrina, *Guthrie & Bolus, l. c.* 257.—Afr. austr.
crateriformis, *Guthrie & Bolus, l. c.* 224.—Afr. austr.
cryptanthera, *Guthrie & Bolus, l. c.* 143.—Afr. austr.
curtophylla, *Guthrie & Bolus, l. c.* 216.—Afr. austr.
debilis, *Guthrie & Bolus, l. c.* 148.—Afr. austr.
Dodii, *Guthrie & Bolus, l. c.* 207.—Afr. austr.
drakensbergensis, *Guthrie & Bolus, l. c.* 166.—Afr. austr.
eriophoros, *Guthrie & Bolus, l. c.* 234.—Afr. austr.
flavisepala, *Guthrie & Bolus, l. c.* 309.—Afr. austr.
floccifera, *Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 41.—Afr. austr.
georgica, *Guthrie & Bolus, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 109.—Afr. austr.
gracilipes, *Guthrie & Bolus, l. c.* 280.—Afr. austr.
grata, *Guthrie & Bolus, l. c.* 153.—Afr. austr.
Greyii, *Guthrie & Bolus, l. c.* 231.—Afr. austr.
Grisbrookii, *Guthrie & Bolus, l. c.* 271.—Afr. austr.
Gysbertii, *Guthrie & Bolus, l. c.* 90.—Afr. austr.
haematosiphon, *Guthrie & Bolus, l. c.* 83.—Afr. austr.
Harveiana, *Guthrie & Bolus, l. c.* 170.—Afr. austr.
heliophila, *Guthrie & Bolus, l. c.* 110.—Afr. austr.
heterophylla, *Guthrie & Bolus, l. c.* 142.—Afr. austr.
inconstans, *Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 41.—Afr. austr.
irrorata, *Guthrie & Bolus, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 111.—Afr. austr.
kingaensis, *Engl. Jahrb.* xxx. 370.—Afr. trop.
lanipes, *Guthrie & Bolus, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 269. —Afr. austr.
lasiocarpa, *Guthrie & Bolus, l. c.* 284.—Afr. austr.
leptostachya, *Guthrie & Bolus, l. c.* 217.—Afr. austr.
longisepala, *Guthrie & Bolus, l. c.* 57.—Afr. austr.
macilenta, *Guthrie & Bolus, l. c.* 100.—Afr. austr.
Macowanii, *Cufino, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1905, 200. —Afr. austr.
macra, *Guthrie & Bolus, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 194. —Afr. austr.
macropus, *Guthrie & Bolus, l. c.* 72.—Afr. austr.
macrotrema, *Guthrie & Bolus, l. c.* 289.—Afr. austr.
Maderi, *Guthrie & Bolus, l. c.* 228.—Afr. austr.
Mariae, *Guthrie & Bolus, l. c.* 68.—Afr. austr.
maritima, *Guthrie & Bolus, l. c.* 221.—Afr. austr.
melanacme, *Guthrie & Bolus, l. c.* 264.—Afr. austr.
micrandra, *Guthrie & Bolus, l. c.* 189.—Afr. austr.
microcodon, *Guthrie & Bolus, l. c.* 226.—Afr. austr.
milanjiana, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 141.—Afr. trop.
Mundii, *Guthrie & Bolus, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 151. —Afr. austr.
myriocodon, *Guthrie & Bolus, l. c.* 145.—Afr. austr.
Nabea, *Guthrie & Bolus, l. c.* 271 (= *Nabea montana*). —Afr. austr.
nematophylla, *Guthrie & Bolus, l. c.* 64.—Afr. austr.
nervata, *Guthrie & Bolus, l. c.* 303.—Afr. austr.
nigrimontana, *Guthrie & Bolus, l. c.* 264.—Afr. austr.

ERICA :—
nobilis, *Guthrie & Bolus, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 267. —Afr. austr.
occidentalis, *Merino, in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 67; *et in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 483.—Hispan.
ocellata, *Guthrie & Bolus, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 167.—Afr. austr.
oligantha, *Guthrie & Bolus, l. c.* 148.—Afr. austr.
onusta, *Guthrie & Bolus, l. c.* 226.—Afr. austr.
oreophila, *Guthrie & Bolus, l. c.* 141.—Afr. austr.
oxyandra, *Guthrie & Bolus, l. c.* 116.—Afr. austr.
oxysepala, *Guthrie & Bolus, l. c.* 230.—Afr. austr.
papyracea, *Guthrie & Bolus, l. c.* 269.—Afr. austr.
parvula, *Guthrie & Bolus, l. c.* 170.—Afr. austr.
primulina, *Bolus, ex Guthrie & Bolus, l. c.* 51.—Afr. austr.
Priori, *Guthrie & Bolus, l. c.* 216.—Afr. austr.
propinqua, *Guthrie & Bolus, l. c.* 276.—Afr. austr.
pulvinata, *Guthrie & Bolus, l. c.* 212.—Afr. austr.
reenensis, *Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 37.—Afr. austr.
rhodantha, *Guthrie & Bolus, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 288.—Afr. austr.
rhodopis, *Bolus, ex Guthrie & Bolus, l. c.* 97 (= *Eremia rhodopis*).—Afr. austr.
ribisaria, *Guthrie & Bolus, l. c.* 132.—Afr. austr.
saxicola, *Guthrie & Bolus, l. c.* 295.—Afr. austr.
scytophylla, *Guthrie & Bolus, l. c.* 162.—Afr. austr.
Sonderiana, *Guthrie & Bolus, l. c.* 244.—Afr. austr.
straminea, *Wendl. Eric.* iii. *fasc.* xxvii. 19.—Afr. austr.
subverticillaris, *Diels, ex Guthrie & Bolus, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 224.—Afr. austr.
tenuipes, *Guthrie & Bolus, l. c.* 145.—Afr. austr.
Thodei, *Guthrie & Bolus, l. c.* 284.—Afr. austr.
trichoclada, *Guthrie & Bolus, l. c.* 147.—Afr. austr.
ustulescens, *Guthrie & Bolus, l. c.* 233.—Afr. austr.
Vallis-Gratiae, *Guthrie & Bolus, l. c.* 103.—Afr. austr.
xanthina, *Guthrie & Bolus, l. c.* 69.—Afr. austr.
xerophila, *Bolus, ex Guthrie & Bolus, l. c.* 74.—Afr. austr.

ERICHSENIA, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2777 (1905). *LEGUMINOSAE*.
uncinata, *Hemsl. l. c.*—Austral.

ERIGERON, Linn. (Compos.).
acutatus, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 38.—Am. bor.
adenophorus, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 94.—Mexic.
alcicornutus, *Greenm. l. c.* xli. 256.—Mexic.
Aliciae, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 317.—Am. bor.
amplifolius, *Howell, l. c.*—Am. bor.
araneosus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 404.—Ind. occ.
Baumii, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 407.—Afr. trop.
calcicola, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 256.—Mexic.
cascadensis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 6.—Am. bor.
commixtus, *Greene, Pittonia*, v. 58.—Am. bor.
domingensis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 403.—Ind. occ.
dubius, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 16 (= *Inula dubia*).—Japon.
Earlei, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 126.—Am. bor.
fragilis, *Greene, in Bull. S. Calif. Acad. Sci.* i. (1902) 39.—Calif.
glacialis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 270 (= *Aster glacialis*).—Am. bor.
incanescens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 23. —Am. bor.
irazuensis, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 36.—Am. cent.
jacinteus, *Hall, in Univ. Calif. Publ. Bot.* i. 127.—Am. bor.
laetevirens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 506. —Am. bor.
Leibergii, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 41. —Am. bor.
leucotrichus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 23. —Am. bor.
mirus, *Anct. in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 182. —Am. bor.
morelensis, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 256.—Mexic.
myrionactis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1229.—Am. bor.

ERIGERON :—
nauseosus, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 270. —Am. bor.
nematophyllus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 124.—Am. bor.
oaxacanus, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 257.—Mexic.
obtusatus, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 38.—Am. bor.
oreophilus, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 257.—Mexic.
pacificus, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 319.—Am. bor.
Peasei, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 126.—Am. bor.
platyphyllus, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 145.—Am. bor.
polycladus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 403.—Ind. occ.
popayanensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 586.—N. Granat.
Remyanus, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901) repr. 68.—Patag.
salicinus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 125.—Am. bor.
Setchellii, *Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 568.—Calif.
setulosus, *Greene, in Pittonia*, iv. (1901) 319.—Am. bor.
simulans, *Greene, Pl. Baker.* iii. 31.—Am. bor.
Smithii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 125.—Am. bor.
spathulifolius, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 317.—Am. bor.
striatus, *Greene, in Bull. S. Calif. Acad.* i. 39.—Am. bor.
Tracyi, *Greene, Pittonia*, v. 59.—Am. bor.
vetensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 126.—Am. bor.
viscidus, *Rydb. l. c.* 1901, 24.—Am. bor.
Vreelandii, *Rydb. l. c.* 1905, 125.—Am. bor.
yukonensis, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 186.—Am. bor.

ERIOBOTRYA, Lindl. (Rosac.).
ambigua, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 19.—Ins. Philipp.

ERIOCAULON, Linn. (Eriocaul.).
aequinoctiale, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 47.—Venez.
altogibbosum, *Ruhl. ex Pilg. in Engl. Bot. Jahrb.* xxx. 146.—Bras.
Barbeyanum, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 78.—Ind. or.
bombayanum, *Ruhl. l. c.* 104.—Ind. or.
Burchellii, *Ruhl. l. c.* 50.—Bras.
decipiens, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 245. —Afr. trop.
epapillosum, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 57.—Bras.
Faberi, *Ruhl. l. c.* 95.—China.
fulvum, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 248.—Afr. trop.
Glaziovii, *Ruhl. l. c.* 51.—Bras.
guadalajarense, *Ruhl. l. c.* 60.—Mexic.
Hanningtonii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 253.—Afr. trop.
Heudelotii, *N. E. Br. l. c.* 256.—Afr. trop.
Henryanum, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 86.—China.
infaustum, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 253. —Afr. trop.
Koernickei, *Britton, in Journ. Bot.* 1900, 482.—Bras.
Lasiolepis, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 86 (= *Lasiolepis brevifolia*).—Ind. or.
latifolium, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iv. t. (1902) 21.—Urug.
lineare, *Small, Fl. S. E. U. S.* 236.—Am. bor.
longirostrum, *Silv. & Ruhl. ex Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 113.—Bras.
macrophyllum, *Ruhl. l. c.* 77.—Java.
magnificum, *Ruhl. l. c.* 48.—Bras.
majusculum, *Ruhl. l. c.* 45.—Bras.
Mannii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 241.—Afr. trop.
Merrillii, *Ruhl. ex Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 150. —Ins. Philipp.
mutatum, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 256. —Afr. trop.
neglectum, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 59. —Bras.
obtusum, *Ruhl. l. c.* 46.—Bras.
Palmeri, *Ruhl. l. c.* 46.—Mexic.
Parkeri, *Robinson, in Rhodora*, v. 175.—Am. bor.

ERIOCAULON :—
pectinatum, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 85.—Ind. or.
peruvianum, *Ruhl. l. c.* 58.—Peruv.
pictum, *Fritsch. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 1102.—Afr. trop.
Pilgeri, *Ruhl. in Engl. Bot. Jahrb.* xxx. 147.—Bras.
plumale, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 251.—Afr. trop.
pseudoquinquangulare, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 73.—Ind. or.
redactum, *Ruhl. l. c.* 113.—Ind. or.
Ritchieanum, *Ruhl. l. c.* 73.—Ind. or.
robusto-brownianum, *Ruhl. l. c.* 77.—Ind. or.
senegalense, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 251.—Afr. trop.
subglaucum, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 68.—Zeylan.
subulatum, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 255.—Afr. trop.
Stuhlmanni, *N. E. Br. l. c.* 259.—Afr. trop.
sumatranum, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 88.—Sumatra.
Tanakae, *Ruhl. l. c.* 84.—Japon.
Tatei, *Ruhl. l. c.* 117.—Austral.
tofieldifolium, *Schinz. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. i. 779.—Afr. trop.
tonkinense, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 72.—Tonkin.
Ulaei, *Ruhl. l. c.* 47.—Bras.
Vauthieri, *Ruhl. l. c.* 37.—Bras.

ERIOCEPHALUS, Linn. (Compos.).
Dinteri, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1018.—Afr. trop.
Eenii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 351.—Afr. trop.
scariosissimus, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1019.—Afr. trop.

ERIOCHLOA, H. B. & K. (Gramin.).
acrotricha, *Hack. ex Schinz, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxviii. 399 (=*Panicum acrotrichum*).—Afr. trop.
borumensis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 165.—Afr. trop.

ERIOCOELUM, Hook. f. (Sapind.).
pendulum, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 91.—Afr. trop.

ERIODENDRON, DC. (Malv.).
grandiflorum, *Conzatti, Gén. Veget. Mexic.* 125 (=*Ceiba grandiflora*).—Mexic.

ERIODICTYON, Benth. (Hydrophyll.).
trichocalyx, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 108.—Calif.

ERIOGONUM, Michx. (Polygon.).
Ameghinoi, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 156.—Patag.
anserinum, *Greene, in Pittonia*, iv. (1901) 320.—Am. bor.
arcuatum, *Greene, l. c.* 319.—Am. bor.
azaleastrum, *Greene, l. c.* v. 67.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, Pl. Baker.* iii. 15.—Am. bor.
baratum, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxix. 52.—Calif.
capitatum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 27.—Calif.
chloranthum, *Greene, Pl. Baker.* iii 15.—Am. bor.
deductum, *Greene, Pittonia*, v. 71.—Calif.
floridanum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 867.—Am. bor.
fruticosum, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 23.—Am. bor.
junceum, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 77.—Calif.
laxifolium, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 23.—Am. bor.
longulum, *Greene, Pittonia*, v. 70.—Calif.
modocense, *Greene, l. c.* 68.—Calif.
montanum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 570.—Am. bor.
neglectum, *Greene, Pittonia*, v. 69.—Am. bor.
oblanceolatum, *Greene, l. c.* 71.—Calif.
orendense, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 21.—Am. bor.
ovatum, *Greene, Pittonia*, v. 69.—Calif.
reclinatum, *Greene, l. c.* 67.—Am. bor.
revolutum, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 54.—Am. bor.
Rydbergii, *Greene, Pittonia*, v. 68.—Am. bor.
salicinum, *Greene, Pl. Baker.* iii. 16.—Am. bor.
salinum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 240.—Am. bor.

ERIOGONUM :—
scapigerum, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 286.—Am. bor.
Smallianum, *A. A. Heller, in Bull. S. Calif. Acad.* ii. 68.—Calif.
sulphureum, *Greene, Pittonia*, v. 70.—Calif.
ternatum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 570.—Am. bor.
variabile, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 24.—Calif.
vegetius, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 239.—Am. bor.
viridescens, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 25.—Calif.

ERIOLAENA, DC. (Stercul.).
glabrescens, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 370.—Tonkin.

ERIOLOBUS, M. Roem. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).
Tschonoskii, Rehder, in Sargent, Trees & Shrubs, 73 = P. Tschonoskii.

ERIONEURON, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 143 (1903). *GRAMINEAE*.
pilosum, Nash, l. c. 144 (=*Uralepis pilosa*).—Am. bor.

ERIOPHORUM, Linn. (Cyper.).
altaicum, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 267.—As. cent.
mandshuricum, *Meinsh. l. c.* 268.—As. cent.
ocreatum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 401.—Am. bor.
opacum, *Fernald, in Rhodora*, vii. 86.—Reg. bor.
paucinervium, *Eaton, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 182.—Am. bor.
viridi-carinatum, *Fernald, in Rhodora*, vii. 89.—Am. bor.

ERIOPHYLLUM, Lag. (Compos.).
idoreum, *Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 524.—Calif.
lanceolatum, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 355.—Am. bor.
leucophyllum, *Howell, l. c.* (=*Bahia leucophylla*).—Am. bor.

ERIOSEMA, DC. (Legum.).
affinis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 200.—Afr. trop.
brachyrhachis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. *Beibl.* lxxii. 30.—Bras.
cupreum, *Harms, l. c.* 32.—Bras.
erythropalum, *Harms, l. c.*—Bras.
Glaziovii, *Harms, l. c.* 31.—Bras.
Hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 907.—Parag.
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 120.—Afr. trop.
laxiflorum, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. *Beibl.* lxxii. 30.—Bras.
Proschii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vi. 4.—Afr. trop.
stenophyllum, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. *Beibl.* lxxii. 31.—Bras.
tacuaremboense, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 397.—Urug.
ukingense, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 332.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 201.—Afr. trop.
yerbalium, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 906.—Parag.

ERIOSPERMUM, Jacq. (Liliac.).
brevipes, *Baker, in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, xlix. 175.—Afr. trop.
Bussei, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 64.—Afr. trop.
dissitiflorum, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 997.—Afr. austr.
hygrophilum, *Baker, l. c.* 998.—Afr. austr.
Junodi, *Baker, in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 175; *et in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 783.—Afr. austr.
longepetiolatum, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 64.—Afr. trop.
platyphyllum, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 998.—Afr. austr.
reflexum, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 858.—Afr. trop.
Schinzii, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 997.—Afr. austr.
togoense, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 65.—Afr. trop.
tortuosum, *Damm. l. c.*—Afr. trop.

ERIOSTEMON, Sm. (Rutac.).
affinis, *Sprague, in Gard. Chron.* 1903, i. 307.—Austral.
apricus, *Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 321.—Austral.
deserti, *Pritz. ex Diels & Pritz. l. c.* 320.—Austral.
fabianoides, *Diels, ex Diels & Pritz. l. c.* 323.—Austral.
Fitzgeraldi, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 37.—Austral.
tomentellus, *Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 320.—Austral.

ERITHALIS, P. Br. (Rubiac.).
revoluta, *Urb. Symb. Antill.* iii. 379.—Ind. occ.

ERITRICHIUM, Schrad. (Borag.).
argenteum, *W. F. Wight, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 411.—Am. bor.
dubium, *O. Fedtsch. Fl. Pamir*, 153.—As. cent.
elongatum, *W. F. Wight, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 408.—Am. bor.
mesembryanthemoides, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902) repr. 38.—Patag.
nipponicum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 51.—Japon.
pamiricum, *B. Fedtsch. ex O. Fedtsch. Fl. Pamir*, 53.—As. cent.
Ruprechtianum, *Rouy, Illustr. Pl. Eur.* t. 393.—Reg. arct.
splendens, *Kearney, ex W. F. Wight, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 410.—Am. bor.

ERLANGEA, Sch. Bip. (Compos.).
alternifolia, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 313 (=*Bothriocline alternifolia*).—Afr. trop.
Bagshawei, *S. Moore, l. c.* xxxvii. 164.—Afr. trop.
boranensis, *S. Moore, l. c.* xxxv. 310.—Afr. trop.
brachycalyx, *S. Moore, l. c.* 308.—Afr. trop.
calycina, *S. Moore, l. c.* 311.—Afr. trop.
centaurioides, *S. Moore, l. c.* 313 (=*Stephanolepis centaurioides*).—Afr. trop.
cordifolia, *S. Moore, l. c.* (=*Gutenbergia cordifolia*).—Afr. trop.
Gregorii, *S. Moore, l. c.* 309.—Afr. trop.
laxa, *S. Moore, l. c.* 313 (=*Bothriocline laxa*).—Afr. trop.
longipes, *S. Moore, l. c.* (=*Bothriocline longipes*).—Afr. trop.
marginata, *S. Moore, l. c.* 310 (=*Vernonia marginata*).—Afr. trop.
misera, *S. Moore, l. c.* (=*Vernonia misera*).—Afr. trop.
Morambaliae, *S. Moore, l. c.* 313 (=*Vernonia Morambaliae*).—Afr. trop.
pauciseta, *S. Moore, l. c.* (=*Bothriocline pauciseta*).—Afr. trop.
ruwenzoriensis, *S. Moore, l. c.* 309.—Afr. trop.
Schimperi, *S. Moore, l. c.* 313 (=*Bothriocline Schimperi*).—Afr. trop.
Smithii, *S. Moore, l. c.* 307.—Afr. trop.
spissa, *S. Moore, l. c.*—Afr. trop.
ugandensis, *S. Moore, l. c.* xxxvii. 165.—Afr. trop.

ERNODEA, Sw. (Rubiac.).
angusta, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 438.—Am. bor.
Cokeri, *Britton, ex Coker, in Shattuck, Bahama Is.* 264.—Ins. Baham.

ERODIUM, L'Hérit. (Geran.).
longipes, *Rub. Fl. Pyren.* iii. 321.—Eur.

EROPHILA, DC. (Crucif.).
acrocarpa, *Brenner, in Meddel. Soc. Faun. Fl. Fenn.* xxix. 131.—Fennia.
angustata, *Brenner, l. c.*—Fennia.
ovalis, *Brenner, l. c.* 129.—Fennia.
radiosa, *Brenner, l. c.* 128.—Fennia.
rhomboidea, *Brenner, l. c.* 130.—Fennia.

ERUCA, Tourn. (Crucif.).
sylvestris, Rub. Fl. Pyren. iii. 194 = sativa.

ERVATAMIA, Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 126 (1902). *APOCYNACEAE*.
coronaria, *Stapf, l. c.* 127.—Afr. trop.
Heyneana, *Cooke, Fl. Bombay*, ii. 134 (=*Tabernaemontana Heyneana*).—Ind. or.

ERYCIBE, Roxb. (Convolv.).
Forbesii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 15.—Sumatra.
Henryi, *Prain, l. c.*—China.
leucoxyloides, *King, ex Prain, l. c.* 16.—Penins. Mal.
magnifica, *Prain, l. c.* 18.—Penins. Mal.
peguensis, *Prain. Bengal Pl.* 724.—Ind. or.
sapotacea, *Hallier f. & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 16.—Penins. Mal.

ERYNGIOPHYLLUM, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. (1903) 113. *COMPOSITAE.*
Rosei, *Greenm. l. c.*—Mexic.

ERYNGIUM, Tourn. (Umbell.).
californicum, *Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 343.—Calif.
compactum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 863.—Am. bor.
crassisquamosum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2765.—Mexic.
eurycephalum, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 13, 12.—Bras.
globosum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2765.—Mexic.
grande, *Hemsl. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 332.—Mexic.
guatemalense, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2766.—Am. cent.
horridum, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 13, 15.—Bras.
longispinum, *Coult. & Rose, ex Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2766.—Mexic.
medium, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2767.—Mexic.
megapotamicum, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 13, 13.—Bras.
Painteri, *Hemsl. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 333.—Mexic.
Palmeri, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2765.—Mexic.
paraguariense, *Urb. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1123.—Parag.
pilularioides, *Hemsl. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 333.—Mexic.
Pringlei, *Hemsl. & Rose, l. c.*—Mexic.
puberulentum, *Hemsl. & Rose, l. c.* 334.—Mexic.
Regnellii, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 13, 9.—Bras.
stenolobum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2766.—Mexic.
Watsoni, *Coult. & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 334.—Mexic.
Wiegandii, *Adam. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 178.—Turcia.

ERYSIMUM, Tourn. (Crucif.).
alpestre, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 277.—Am. bor.
Amasianum, *Hausskn. & Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 2.—As. Min.
ammophilum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 51.—Calif.
angustatum, *Rydb. in Bull. N. York, Bot. Gard.* ii. 171.—Am. bor.
concinnum, *Eastw. in Zoe*, v. 103 (1901).—Calif.
gaudanense, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 33.—Turkestan.
ischnostylum, *Freyn & Sint, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 570.—As. cent.
leucanthemum, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 413 (= *Cheiranthus leucanthemus*).—Turkestan.
nevadense, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 52.—Am. bor.
nivale, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 558 (= *Cheiranthus nivalis*).—Am. bor.
oblanceolatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 557.—Am. bor.
ponticum, *Hausskn. & Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 1.—As. Min.
radicatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 558.—Am. bor.

ERYTHEA, S. Wats. (Palm.).
aculeata, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 196 (1905).—Mexic.
Brandegeei, *Purpus, in Gartenfl.* 1903, 11.—Calif.

ERYTHRAEA, Renealm. (Gentian.).
Ameghinoi, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 31.—Patag.
micrantha, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 83.—Mexic.
minima, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 443.—Am. bor.

ERYTHRINA, Linn. (Legum.).
arborea, *Small, Fl. S. E. U. S.* 647.—Am. bor.
Bagshawei, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 145.—Afr. trop.
Baumii, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 263.—Afr. trop.
Droogmansiana, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 19.—Afr. trop.
edulis, *Triana, ex Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1169, descr. ampl.—N. Granat.
esculenta, *Sprague, l. c.* 1167.—Ecuador.
Gilletti, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 151.—Afr. trop.
Purpusi, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 158 (1903).—Calif.

ERYTHROCHITON, Nees & Mart. (Rutac.).
trifoliatum, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 153.—Peruv.

ERYTHROCHLAMYS, Guerke (Labiat.).
Kelleri, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 978.—Afr. trop.
leucosphaera, *Briq. l. c.* 976.—Afr. trop.

ERYTHROCOCCA, Benth. (Euphorb.).
Paxii, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 212.—Afr. trop.

ERYTHRODES, Blume = **Physurus**, Rich. (Orchid.).
Blumei, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 87 = P. Blumei.
bracteata, Schlechter, l. c. = P. bracteatus.
Henryi, Schlechter, l. c. = P. chinensis.
papuana, Schlechter, l. c.—N. Guin.
purpurascens, Schlechter, l. c. 86.—N. Guin.
viridiflora, Schlechter, l. c. 87 = P. viridiflorus.

ERYTHRONIUM, Linn. (Liliac.).
Bolanderi, *Baker, in Gard. Chron.* 1897, t. 299.—Calif.
obtusatum, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 67.—Am. bor.
parviflorum, *Goodd. l. c.*—Am. bor.

ERYTHROPYXIS, Engl. Jahrb. xxxii. (1902) 102 = **Erytropyxis**, Pierre (Styrac.).

ERYTHROXYLUM, P. Br. (Linac.).
calothamnus, *Lignier & Bey, in Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. V. viii. 276, nomen.—Hab.?
comorense, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 149.—Ins. Comor.
compactum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 313.—Mexic.
cymosum, *Lignier & Bey, in Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. V. viii. 277, nomen.—Madag.
delagoense, *Schinz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 876.—Afr. austr.
ecarinatum, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 39.—Ins. Amboin.
excelsum, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. *Mém.* III. 63, nomen.—Bras.
marginatum, *Lignier & Bey, in Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. V. viii. 277, nomen.—Hab.?
Mocquerysi, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 562.—Madag.
Moonii, *Hochr. in Bull. Inst. Bot. Buitenz.* xxii. (1905) 54.—Zeylan.
pallidum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 314.—Mexic.
Pringlei, *Rose, l. c.*—Mexic.
pulchellum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 149.—Afr. trop.
reticulatum, *Northrop, in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 43.—Ind. occ.
Urbanii, *O. E. Schulz, in Urb. Symb. Antill.* iv. 314.—Ind. occ.

ERYTROPYXIS, Pierre (Styrac.).
Eetveldeana, *Engl. Jahrb.* xxxii. 103 (= *Rhaptopetalum Eetveldeanum*).—Afr. trop.
Soyauxii, *Engl. l. c.* (= *Rhaptopetalum Soyauxii*).—Afr. trop.

ESCALLONIA, Mutis (Saxifr.).
Britteniana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 330.—Patag.
langleyensis, *Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 131.—Hybr.

ESCHSCHOLZIA, Cham. (Papav.).
absinthiifolia, *Greene, Pittonia*, v. 239.—Calif.
alcicornis, *Greene, l. c.* 273.—Calif.

ESCHSCHOLZIA:—
aliena, *Greene, Pittonia*, v. 260.—Am. bor.
angularis, *Greene, l. c.* 238.—Calif.
apiculata, *Greene, l. c.* 235.—Calif.
arizonica, *Greene, l. c.* 261.—Am. bor.
arvensis, *Greene, l. c.* 253.—Calif.
asprella, *Greene, l. c.* 272.—Calif.
australis, *Greene, l. c.* 249.—Calif.
Bakeri, *Greene, l. c.* 284.—Calif.
benedicta, *Greene, l. c.* 228.—Calif.
Bernardina, *Greene, l. c.* 255.—Calif.
bicornuta, *Greene, l. c.* 249.—Calif.
Biolettii, *Greene, l. c.* 232.—Calif.
biternata, *Greene, l. c.* 271.—Calif.
Brandegei, *Greene, l. c.* 248.—Calif.
calosperma, *Greene, l. c.* 246.—Calif.
caruifolia, *Greene, l. c.* 281.—Calif.
Clevelandi, *Greene, l. c.* 248.—Calif.
cognata, *Greene, l. c.* 252.—Calif.
columbiana, *Greene, l. c.* 231.—Am. bor.
confinis, *Greene, l. c.* 237.—Calif.
Covillei, *Greene, l. c.* 275.—Calif.
crassula, *Greene, l. c.* 266.—Ins. San Benito.
crossophylla, *Greene, l. c.* 268.—Calif.
cruciata, *Greene, l. c.* 279.—Calif.
cyathifera, *Greene, l. c.* 263.—Calif.
debilis, *Greene, l. c.* 227.—Calif.
diversiloba, *Greene, l. c.* 256.—Calif.
dolichocarpa, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 487.—Calif.
dumetorum, *Greene, Pittonia*, v. 283.—Calif.
Eastwoodiae, *Greene, l. c.* 227.—Calif.
Elmeri, *Greene, l. c.* 286.—Calif.
exilis, *Greene, l. c.* 265.—Calif.
eximia, *Greene, l. c.* 278.—Calif.
flaccida, *Fedde, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 153.—Calif.
floribunda, *Greene, Pittonia*, v. 247.—Calif.
foeniculacea, *Greene, l. c.* 224.—Calif.
formosa, *Greene, l. c.* 288.—Calif.
granulata, *Greene, l. c.* 235.—Calif.
Helleriana, *Greene, l. c.* 229.—Calif.
humilis, *Greene, l. c.* 285.—Calif.
incisa, *Greene, l. c.* 287.—Calif.
inflata, *Greene, l. c.* 264.—Calif.
isostigma, *Greene, l. c.* 254.—Calif.
Jonesii, *Greene, l. c.* 261.—Am. bor.
juncea, *Greene, l. c.* 228.—Calif.
lacera, *Greene, l. c.* 250.—Calif.
leptomitra, *Greene, l. c.* 265.—Calif.
leucosticta, *Greene, l. c.* 229.—Calif.
Lobbii, *Greene, l. c.* 290.—Calif.
ludens, *Greene, l. c.* 272.—Am. bor.
macrantha, *Greene, l. c.* 242.—Calif.
marcida, *Greene, l. c.* 233.—Calif.
Menziesiana, *Greene, l. c.* 223.—Calif.
micrantha, *Greene, l. c.* 277.—Calif.
microloba, *Greene, l. c.* 250.—Calif.
minuscula, *Greene, l. c.* 270.—Am. bor.
nitrophila, *Greene, l. c.* 240.—Calif.
Orcuttiana, *Greene, l. c.* 254.—Calif.
oregana, *Greene, l. c.* 282.—Am. bor.
paupercula, *Greene, l. c.* 262.—Calif.
petrophila, *Greene, l. c.* 283.—Calif.
physodes, *Greene, l. c.* 259.—Calif.
picta, *Greene, l. c.* 255.—Calif.
procera, *Greene, l. c.* 241.—Calif.
pseudopraecox, *Fedde, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 153.—Calif.
ptarmicoides, *Greene, Pittonia*, v. 270.—Calif.
pulchella, *Greene, l. c.* 291.—Calif.
pusilla, *Greene, l. c.* 281.—Calif.
quadrangularis, *Greene, l. c.* 264.—Calif.
recta, *Greene, l. c.* 245.—Calif.
revoluta, *Greene, l. c.* 247.—Calif.
rigida, *Greene, l. c.* 244.—Calif.
robusta, *Greene, l. c.* 266.—Calif.
rostellata, *Greene, l. c.* 282.—Calif.
rutaefolia, *Greene, l. c.* 271.—Calif.
sanctarum, *Greene, l. c.* 243.—Calif.
scapifera, *Fedde, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 153.—Am. bor.
scariosa, *Greene, Pittonia*, v. 243.—Calif.
shastensis, *Greene, l. c.* 234.—Calif.
straminea, *Greene, l. c.* 257.—Calif.
stricta, *Greene, l. c.* 236.—Calif.
tenuissima, *Greene, l. c.* 285.—Am. bor.
thermophila, *Greene, l. c.* 256.—Calif.

ESCHSCHOLZIA :—
tortuosa, *Greene, Pittonia*, v. 278.—Calif.
trichophylla, *Greene, l. c.* 268.—Calif.
unguiculata, *Greene, l. c.* 292.—Calif.
urceolata, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 468.—Calif.
vaccarum, *Greene, Pittonia*, v. 282.—Am. bor.
vernalis, *Greene, l. c.* 258.—Calif.
xylorrhiza, *Greene, l. c.* 238.—Calif.
yainacensis, *Greene, l. c.* 234.—Calif.

EUCALYPTUS, L'Herit. (Myrtac.).
accedens, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 21.—Austral.
alpina, R. Br. ex Maiden, in Rep. Australas. Assoc. ix. 365 = coccifera.
amplifolia, *Naud. Descr. Emploi Eucalypt.* 28.—Hab.?
Andrewsi, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxix. 472.—Austral.
angophoroides, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 676.—Austral.
angustifolia, R. Br. ex Maiden, Crit. Rev. Eucalypt. 152 = amygdalina.
apiculata, *R. T. Baker & H. G. Sm. Research on Eucalypts*, 198.—Austral.
Banksii, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxix. 774.—Austral.
caerulescens, *Naud. Descr. Emploi Eucalypt.* 47.—Hab.?
calyculata, Herb. Link, ex Maiden, Crit. Rev. Eucalypt. 156 = amygdalina.
Consideneana, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxix. 475.—Austral.
corrugata, Luehm. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 448, nomen = goniantha?
cultrifolia, *Naud. Descr. Emploi Eucalypt.* 64.—Hab.?
Deanei, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxix. 471.—Austral.
desertorum, *Naud. Descr. Emploi Eucalypt.* 56.—Austral.
diptera, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 42.—Austral.
Dunnii, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxx. 336.—Austral.
Fletcheri, *R. T. Baker, in Proc. Soc. N. S. Wales*, xxv. 682.—Austral.
Forrestiana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 439.—Austral.
gracilipes, *Naud. Descr. Emploi Eucalypt.* 37.—Hab.?
Huberiana, *Naud. l. c.* 42.—Hab.?
insignis, *Naud. l. c.* 30.—Hab.?
intermedia, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 674.—Austral.
jugalis, *Naud. Descr. Emploi Eucalypt.* 37.—Hab.?
Kitsoni, *Luehm. ex Maiden, in Vict. Nat.* xxi. 112.—Austral.
lactea, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 691.—Austral.
longicornis, *F. Muell. Phyt. Austral.* xi. 14.—Austral.
Mazeltana, *Naud. Descr. Emploi Eucalypt.* 41.—Hab.?
melliodora, *A. Cunn. ex R. T. Baker & H. G. Sm. Research on Eucalypts*, 122.—Austral.
Moorei, *Maiden & Cambage, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxx. 191.—Austral.
Mulleri, *Naud. Descr. Emploi Eucalypt.* 45.—Hab.?
myrtiformis, *Naud. l. c.* 50.—Hab.?
neglecta, *Maiden, in Vict. Nat.* xxi. 114.—Austral.
nigra, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 689.—Austral.
numerosa, Maiden, Crit. Rev. Eucalypt. 155 = amygdalina?
ovalifolia, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 680.—Austral.
pastoralis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 27.—Austral.
Perriniana, Herb. Perrin, ex Maiden, in Rep. Austr. Ass. Adv. Sci. ix. (1903), 377 = Gunnii.
polybractea, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 692.—Austral.
resinifera, *Hort. Arg. ex Maiden, Crit. Rev. Eucalypt.* 18.—Hab.?
Rossei, R. T. Baker & H. G. Sm. Research on the Eucalypts, 70 = micrantha.
Rudderi, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxix. 779.—Austral.
saligna, *Hort. Berol. ex Maiden, Crit. Rev. Eucalypt.* 18.—Hab.?
Seeana, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxix. 469.—Austral.
scoparia, *Maiden, l. c.* 777.—Austral.

EUCALYPTUS :—
striaticalyx, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 20.—Austral.
translucens, A. Cunn. ex Maiden, Crit. Rev. Eucalypt. 157 = amygdalina.
umbra, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 667.—Austral.
undulata, *Hort. ex Maiden, Crit. Rev. Eucalypt.* 17.—Hab.?
vitellina, *Naud. Descr. Emploi Eucalypt.* 65.—Hab.?
Wilkinsoniana, *R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxv. 678.—Austral.
Woollsiana, *R. T. Baker, l. c.* 684.—Austral.

EUCHRESTA, Benn. (Legum.).
tubulosa, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 492.—China.

EUCLEA, Murr. (Eben.).
angolensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxii. 138.—Afr. trop.
Antunesii, *Guerke, l. c.*—Afr. trop.
Baumii, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 327.—Afr. trop.
Dekindtii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxii. 138.—Afr. trop.
huillensis, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 326.—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 222.—Afr. trop.

EUCLIDIUM, R. Br. (Crucif.).
tenuissimum, *B. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 915 (= *Vella tenuissima*).—Turkestan.

EUCLISIA, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1904) 82. *CRUCIFERAE.*
albida, *Greene, l. c.* 83 (= *Streptanthus albidus*).—Calif.
amplexicaulis, *Greene, l. c.* 84 (= *Caulanthus amplexicaulis*).—Calif.
aspera, *Greene, l. c.* 83 (= *Streptanthus asper*).—Calif.
Bakeri, *Greene, l. c.* 84.—Calif.
Biolettii, *Greene, l. c.* 83 (= *Streptanthus Biolettii*).—Calif.
elatior, *Greene, l. c.* 84.—Calif.
glandulosa, *Greene, l. c.* 82 (= *Streptanthus glandulosus*).—Calif.
hispida, *Greene, l. c.* 83 (= *Streptanthus hispidus*).—Calif.
Mildredae, *Greene, l. c.* (= *Streptanthus Mildredae*).—Calif.
nigra, *Greene, l. c.* (= *Streptanthus niger*).—Calif.
pulchella, *l. c.* (= *Streptanthus pulchellus*).—Calif.
secunda, *Greene, l. c.* (= *Streptanthus secundus*).—Calif.
versicolor, *Greene, l. c.* (= *Streptanthus versicolor*).—Calif.
violacea, *Greene, l. c.*—Calif.

EUCOMIS, L'Hérit. (Liliac.).
Jacquinii, *C. H. Wright, in Gard. Chron.* 1903, ii. 1.—Afr. austr.

EUCORYMBIA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2764 (1903). *APOCYNACEAE.*
alba, Stapf, l. c.—Borneo.

EUCRYPHIA, Cav. (Rosac.).
Patagonica, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 281.—Patag.

EUGENIA, Mich. (Myrtac.).
andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 106.—Ins. Andaman.
Banksii, *Britten & S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 26.—Austral.
Bartonii, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl.* xviii. 2.—N. Guin.
Benjamina, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 106.—Malaya.
Bernardi, *King, l. c.* 115.—Penins. Mal.
Bordenii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 47.—Ins. Philipp.
Burkilliana, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 94.—Penins. Mal.
caudata, *King, l. c.* 105 (= *Myrtus caudata*).—Penins. Mal.
chloroleuca, *King, l. c.* 113.—Penins. Mal.

EUGENIA :—
cisplatina, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 62 (= *Myrcianthes cisplatina*).—Urug.
Clarkeana, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 93.—Penins. Mal.
congesta, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 49.—Ins. Philipp.
corrientina, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 5.—Parag.
corrugata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 96.—Penins. Mal.
Crosbyi, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 38.—Ins. Tonga.
Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 129.—Penins. Mal.
dasyblasta, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 60 (= *Stenocalyx dasyblastus*).—Urug.
dealbata, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 37.—Ins. Tonga.
dumicola, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 7.—Parag.
Duthieana, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 103.—Penins. Mal.
Dyeriana, *King, l. c.* 98.—Penins. Mal.
Gageana, *King, l. c.* 96.—Penins. Mal.
garcinifolia, *King, l. c.* 90.—Malaya.
glauca, *King, l. c.* 102.—Penins. Mal.
glaucicalyx, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 50.—Ins. Philipp.
Goodenovii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 117.—Malaya.
Hassleriana, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 4.—Parag.
Hemsleyana, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 88.—Penins. Mal.
Hoseana, *King, l. c.* 106.—Penins. Mal.
Hulletiana, *King, l. c.* 97.—Malaya.
ibitensis, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 42.—Madag.
inasensis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 120.—Penins. Mal.
Koordersiana, *King, l. c.* 128.—Penins. Mal.
Kunstleri, *King, l. c.* 127.—Penins. Mal.
Lehuntii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* ix. 411.—N. Guin.
leptophylla, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 6.—Parag.
linocieroidea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 118.—Penins. Mal.
longissima, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 50.—Ins. Philipp.
Maslii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 104.—Ins. Andaman.
maracayuensis, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 3.—Parag.
maroana, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 578.—Madag.
mollis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 86.—Malaya.
montigena, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 5.—Parag.
myriantha, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 125.—Penins. Mal.
nicobarica, *King, l. c.* 130.—Ins. Nicobar.
nigricans, *King, l. c.* 114.—Penins. Mal.
oblongifolia, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 62 (= *Stenocalyx oblongifolius*).—Urug.
occidentalis, *Bourd. in Indian Forester*, xxx. 195.—Ind. or.
Pearsoniana, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 116.—Penins. Mal.
perakensis, *King, l. c.* 81.—Penins. Mal.
pergamentacea, *King, l. c.* 87.—Penins. Mal.
pitanga, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 61 (= *Stenocalyx pitanga*).—Urug.
plumbea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 85.—Penins. Mal.
polita, *King, l. c.* 110 (= *Syzygium politum*).—Penins. Mal.
Prainiana, *King, l. c.* 116.—Penins. Mal.
pseudo-formosa, *King, l. c.* 88.—Penins. Mal.
pseudo-subtilis, *King, l. c.* 123.—Penins. Mal.
pseudo-tetraptera, *King, l. c.* 109.—Penins. Mal.
punctulata, *King, l. c.* 122 (= *Syzygium punctulatum*).—Malaya.
quadrata, *King, l. c.* 86.—Penins. Mal.
Rama-Varma, *Bourd. in Indian Forester*, xxx. 147.—Ind. or.
retusa, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 59 (= *Phyllocalyx retusus*).—Urug.
Ridleyi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 99.—Penins. Mal.
samoensis, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 38.—Ins. Tonga.

EUGENIA :—
scalarinervia, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 87.—Penins. Mal.
Scortechinii, King, l. c. 85.—Penins. Mal.
setosa, King, l. c. 120.—Penins. Mal.
simulans, King, l. c. 123.—Penins. Mal.
Stapfiana, King, l. c. 119.—Penins. Mal.
strigosa, Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 60 (=Stenocalyx strigosus).—Urug.
subhorizontalis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 112.—Malaya.
subopposita, F. M. Bailey, Queensl. Fl. 2004.—Austral.
subrufa, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 102.—Penins. Mal.
Swettenhamiana, King, l. c. 126.—Penins. Mal.
tecta, King, l. c. 109.—Penins. Mal.
urceolata, King, l. c. 101 (=Jambosa urceolata).—Malaya.
Valetoniana, King, l. c. 112.—Penins. Mal.
variolosa, King, l. c. 107.—Penins. Mal.
Whytei, Sprague, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 98.—Afr. trop.
Whitfordii, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 49.—Ins. Philipp.
Wrayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 119.—Penins. Mal.

EUKLISIA, Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S. 486 (1903). CRUCIFERAE.
hyacinthoides, Small, l. c. (=Streptanthus hyacinthoides).—Am. bor.

EULOPHIA, R. Br. (Orchid.).
albobrunnea, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiii. 69.—Afr. trop.
arenicola, Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 217.—Afr. trop.
Baumiana, Kraenzl. in Warb. l. c. 213.—Afr. trop.
Beleri, Wildem. Notices Pl. Utiles Congo, 311.—Afr. trop.
bisaccata, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiii. 68.—Afr. trop.
calantha, Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 215.—Afr. trop.
campanulata, Duthie, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 39.—Ind. or.
Campbellii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. 190.—Ind. or.
coeloglossa, Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 216.—Afr. trop.
corymbosa, Schlechter, l. c.—Afr. trop.
cyrtosioides, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxviii. 10.—Afr. trop.
divergens, Fritsch, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 1110.—Afr. trop.
Flanaganii, Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc. xvi. 143.—Afr. austr.
floculenta, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiii. 66.—Afr. trop.
formosana, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 26.—Formosa.
gonychila, Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 217.—Afr. trop.
imperatifolia, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee, 148.—N. Guin.
Lujae, Wildem. in Pl. Nov. Hort. Then. t. 17.—Afr. trop.
Mackinnonii, Duthie, in Journ. As. Soc. Beng. lxxi. 40.—Ind. or.
macra, Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 217.—Afr. trop.
paniculata, Rolfe, in Gard. Chron. 1905, ii. 197.—Madag.
paradoxa, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiii. 68.—Afr. trop.
Rolfeana, Kraenzl. in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 213.—Afr. trop.
sordida, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiii. 67.—Afr. trop.
tricristata, Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 218.—Afr. trop.
undulata, Rolfe, in Gard. Chron. 1905, ii. 198.—Afr. trop.
Warburgii, Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 214.—Afr. trop.
Warneckeana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiii. 67.—Afr. trop.
yunnanensis, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 29.—China.

EULOPHIA :—
Zollingeri, J. J. Sm. Orchid. Java, 223 (=Cyrtopera Zollingeri).—Java, Sumatra.

EULOPHIDIUM, Pfitz. = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).
Ledieni, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 115 = E. maculata.
Warneckeanum, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiii. 70.—Afr. trop.

EUNANUS, Benth. = **Mimulus**, Linn. (Scrophul.).
clivicola, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 60 = M. clivicola.

EUONYMUS, Linn. (Celastr.).
actinocarpa, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. 459.—China.
benguetensis, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 26.—Ins. Philipp.
Forbesiana, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. 457.—China.
Hemsleyana, Loes. l. c. 460.—China.
hians, Koehne, in Gartenfl. 1904. 33.—Hab. ?
hupehensis, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. 454.—China.
kachinensis, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. 193.—Burma.
kiautschovica, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. 453.—China.
lanceifolia, Loes. l. c. 462.—China.
Lawsonii, C. B. Clarke, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. 195.—Reg. Himal.
patens, Rehder, in Sargent, Trees & Shrubs, 127.—China ?
salicifolia, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. 458.—China.
striata, Loes. ex Gilg & Loes. in Engl. Jahrb. xxxiv. Beibl. lxxv. 49.—China.
subsulcatus, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. 194.—Burma.
tonkinensis, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. 453.—Tonkin.
uniflorus, Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe, 1904, repr. 6.—China.
verrucosoides, Loes. in Engl. Jahrb. xxx. 462.—China.
viburnoides, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. 194.—Reg. Himal.
yedoensis, Koehne, in Gartenfl. 1904, 31.—Hort.

EUPATORIASTRUM, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. (1903) 93. COMPOSITAE.
Nelsonii, Greenm. l. c.—Mexic.

EUPATORIUM, Tourn. (Compos.).
aborigenum, Greene, Pittonia, iv. 277.—Am. bor.
Achillea, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 411.—Parag.
angustatum, Greene, Pittonia, iv. 277.—Am. bor.
anisopodum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 477.—Am. cent.
apense, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 708.—Parag.
arizonicum, Greene, Pittonia, iv. 280.—Am. bor.
atromontanum, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxi. 400.—Am. bor.
aureoviride, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 309.—Parag.
bahamense, Northr. in Mem. Torr. Bot. Club, xii. 70; Urb. Symb. Antill. iii. 391.—Ind. occ.
barranquillense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 564.—N. Granat.
boreale, Greene, in Rhodora, iii. 83.—Am. bor.
callacatense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 468.—Peruv.
campylocladum, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 247.—Mexic.
Chapmanii, Small, Fl. S. E. U. S. 1165.—Am. bor.
chotense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 466.—Peruv.
chrysostylum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xli. 274.—Mexic.
Coulteri, Robinson, l. c. xxxvi. 478.—Am. cent.
denudatum, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 413.—Parag.
dictyoneurum, Urb. Symb. Antill. iii. 402.—Ind. occ.
dryophilum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 478.—Mexic.
Eggersii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 566.—Ecuador.
erythropappum, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 248.—Mexic.
Eugenei, Small, Fl. S. E. U. S. 1165.—Am. bor.
eurybiaefolium, Greene, Pittonia, iv. 275.—Am. bor.
fistulosum, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 249.—Am. cent.

EUPATORIUM :—
fuscum, N. E. Br. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. vi. 39.—Guian.
Gonzalezii, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 479.—Mexic.
graminifolium, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. i. 411.—Parag.
Gundlachii, Urb. Symb. Antill. iii. 399.—Ind. occ.
Hartii, Urb. l. c. 395.—Ind. occ.
Hasslerianum, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. iii. 711.—Parag.
herbaceum, Greene, Pittonia, iv. 279.—Am. bor.
Humboldtii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 571.—Amer.
hylobium, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 249.—Mexic.
hylonomum, Robinson, l. c. 250.—Am. cent.
hypodictyon, Robinson, l. c.—Am. cent.
hypomalacum, Robinson, ex Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxxv. (1903) 4.—Am. cent.
illitum, Urb. Symb. Antill. iii. 401.—Ind. occ.
Jaegerianum, Urb. l. c. 394.—Ind. occ.
Jelskii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 464.—Peruv.
Klattianum, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 573.—N. Granat.
Kunthianum, Sch. Bip. ex Hieron. l. c. 569.—N. Granat.
lancifolium, Small, Fl. S. E. U. S. 1167.—Am. bor.
laurifolium, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 251.—Am. cent.
leonense, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 479.—Mexic.
leucoderme, Robinson, l. c. xli. 274.—Mexic.
longifolium, Robinson, l. c. xxxvi. 480.—Mexic.
Loranoanum, Robinson, l. c. xli. 275.—Mexic.
luquense, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 413.—Parag.
Luzii, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 480.—Am. cent.
lysimachioide, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 310.—Parag.
maestrense, Urb. Symb. Antill. iii. 397.—Ind. occ.
maracayuense, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 710.—Parag.
Mariarum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 481.—Mexic.
marrubiifolium, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 466.—Peruv.
medullosum, Urb. Symb. Antill. iii. 393.—Ind. occ.
Meyeri, Pilg. in Engl. Bot. Jahrb. xxx. 203.—Bras.
Michelianum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xli. 276.—Mexic.
Mohrii, Greene, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vi. 762.—Am. bor.
mononeurum, Urb. Symb. Antill. iii. 392.—Ind. occ.
Moritzianum, Sch. Bip. ex Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 565.—Venez.
nemorale, Greene, Pittonia, iv. 278.—Am. bor.
pachypodum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 481.—Mexic.
paezense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 574.—N. Granat.
pansamalense, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 482.—Am. cent.
pasadenense, Parish, in Zoe, v. 75 (1900).—Calif.
pectinatum, Small, Fl. S. E. U. S. 1165.—Am. bor.
petiolare, André, Rev. Hortic. lxxv. (1903) 77.—Mexic.
petraeum, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xli. 275.—Mexic.
pinabetense, Robinson, l. c. xxxvi. 482.—Mexic.
pleianthum, Robinson, l. c. 483.—Mexic.
polystictum, Urb. Symb. Antill. iii. 400.—Ind. occ.
prionobium, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 483.—Mexic.
prionophyllum, Robinson, l. c. 484.—Am. cent.
pseudarboreum, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 469.—Peruv.
pseudofastigiatum, Hieron. l. c. 467.—Peruv.
psoraleum, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 253.—Am. cent.
Radula, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 311.—Parag.
recurvans, Small, Fl. S. E. U. S. 1167.—Am. bor.
rhodolepis, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. iii. 705.—Parag.
rivale, Greenm. in Zoe, v. 186 (1904).—Mexic.
roraimense, N. E. Br. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. vi. 38.—Guian.

EUPATORIUM:—
Rydbergii, Britton, Man. Fl. N. U. S. 921.—Am. bor.
semicrenatum, Urb. Symb. Antill. iii. 398.—Ind. occ.
silvicola, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 254.—Am. cent.
Sladenianum, S. Moore, in Journ. Bot. 1904, 36.—Bras.
Smithii, Greene & Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. vi. 761.—Am. bor.
sotarense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 574.—N. Granat.
stigmatosum, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 413.—Parag.
tacuarembense, Hieron. & Arech. ex Arech. in Anal. Mus. Montevid. Ser. II. i. 8.—Urug.
Tashiroi, Hayata, in Journ. Coll. Sci. Tokyo, xviii. no. 8, 9.—Formosa.
tenuicapitulatum, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 465.—Peruv.
thyrsigerum, Hieron. l. c. xxviii. 570.—N. Granat.
trachyphyllum, Hieron. l. c. xxxvi. 467.—Peruv.
Tracyi, Greene, Pittonia, iv. 278.—Am. bor.
triradiatum, Urb. Symb. Antill. iii. 396.—Ind. occ.
urticoides, Sch. Bip. ex Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 568.—Venez.
verniceosum, Greenm. in Zoe, v. 186 (1904).—Mexic.
viburnifolium, Greene, Pittonia, iv. 276.—Am. bor.
viscidipes, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 484.—Am. cent.

EUPHORBIA, Linn. (Euphorb.).
Abdelkuri, Balf. f. in Rep. Brit. Ass. Glasgow (1901) 854.—Socotra.
albicaulis, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 592.—Am. bor.
albovillosa, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 373.—Afr. austr.
Alluaudi, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 43.—Madag.
angustiflora, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 82.—Afr. trop.
Antunesii, Pax, l. c. 79.—Afr. trop.
argillosa, Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 679.—Parag.
arsenariensis, Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis, 301.—Afr. bor.
breviarticulata, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 84.—Afr. trop.
buruana, Pax, l. c. 85.—Afr. trop.
Bussei, Pax, l. c. xxxiii. 286.—Afr. trop.
calabarica, Burkill, in Kew Bull. 1901, 133.—Afr. trop.
calcicola, Fern. in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 496.—Mexic.
cayensis, Millsp. in Torreya, iv. 172.—Ind. occ.
cirsioides, Costant. & Gall. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1905, 348.—Madag.
colradiana, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 207 (1905).—Mexic.
cynanchoides, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 45.—Madag.
Decorsei, Drake, l. c. 44.—Madag.
Dekindtii, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 78.—Afr. trop.
Dominii, Rohl. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss. 1904, no. 38, 63; et in Magyar Bot. Lap. iii. 233.—Montenegr.
ebracteolata, Hayata, in Journ. Coll. Sci. Tokyo, xx. no. 3, 71.—Japon.
Edmondii, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, vii–viii. 180.—Afr. bor.
elastica, Jumelle, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par. cxl. 1048.—Madag.
elastica, Altamirano & Rose, in Altamirano, El Palo Amarillo, 1.—Mexic.
Ellenbeckii, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. 285.—Afr. trop.
emetica, Padilla, in Anal. Mus. San Salvador, i. 501.—Am. cent.
ericifolia, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. 288.—Afr. trop.
Erlangeri, Pax, l. c. 286.—Afr. trop.
euboea, Halacsy, Consp. Fl. Graec. iii. 107.—Graecia.
evonymicarpa, Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 532.—Reg. Argent.
Eylesii, Rendle, in Journ. Bot. 1905, 52.—Afr. trop.
Genyi, Costant. & Gall. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1905, 347.—Madag.
graciliramea, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 78.—Afr. trop.
griseola, Pax, l. c. 375.—Afr. austr.
Grosseri, Pax, l. c. xxxiii. 288.—Afr. trop.
gymnophora, Pax, l. c. xxxiv. 374.—Afr. trop.
Hassleriana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 399.—Parag.

EUPHORBIA:—
heteracantha, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 83.—Afr. trop.
heteropoda, Pax, l. c. 374.—Afr. trop.
huanayensis, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 208 (1905).—Mexic.
infesta, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 80.—Afr. trop.
interaxillaris, Fern. in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 495.—Mexic.
intercedens, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 75.—Afr. trop.
isacantha, Pax, l. c. 82.—Afr. trop.
jatrophoides, Pax, l. c. xxxiii. 287.—Afr. trop.
kamerunica, Pax, l. c. xxxiv. 75.—Afr. trop.
Kerstingii, Pax, l. c. xxxiii. 285.—Afr. trop.
Knuthii, Pax, l. c. xxxiv. 83.—Afr. austr.
kuriensis, Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 58.—Socotra.
lepidocarpa, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. 287.—Afr. trop.
Leucodendron, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 46.—Madag.
matabelensis, Pax, ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien, xv. 51.—Afr. austr.
mbaluensis, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 85.—Afr. trop.
melanacantha, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 45.—Madag.
missouriensis, Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 595.—Am. bor.
mitis, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 70.—Afr. trop.
monacantha, Pax, l. c. xxxiii. 285.—Afr. trop.
Mulemae, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 209.—Afr. trop.
multiceps, A. Berger, in Monatsschr. Kakt. 1905, 182.—Afr. austr.
muscicola, Fern. in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 495.—Mexic.
Neovolkensii, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 71.—Afr. trop.
nesiotica, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxviii. (1902) 167.—Ins. Galap.
obesa, Hook. f. in Bot. Mag. t. 7888.—Afr. austr.
oncoclada, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 44.—Madag.
pampeana, Speg. in Rev. Jard. Zool. Buenos Aires, i. 30.—Reg. Argent.
penduliflora, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxx. 288.—Afr. trop.
Phillipsiae, N. E. Br. in Gard. Chron. 1903, i. 370.—Afr. trop.
plagiantha, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 44.—Madag.
platyacantha, Drake, l. c. 45.—Madag.
platyacantha, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 84 (1904).—Afr. trop.
Poissoni, Pax, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 62.—Afr. trop.
potosina, Fern. in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 495.—Mexic.
pseudo-Grantii, Pax, in Engl. Jahrb. xxx. 342.—Afr. trop.
pseudo-Holstii, Pax, l. c. xxxiii. 287.—Afr. trop.
pseudopeplus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 164.—Patag.
puberula, Fern. in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 494.—Mexic.
quadrialata, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. 286.—Afr. trop.
Renouardi, Pax, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 61.—Afr. trop.
rubella, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. 287.—Afr. trop.
rubida, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. 83.—Mexic.
rubro-striata, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 44.—Madag.
Schubei, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 373.—Afr. trop.
semiverticillata, Halacsy, Consp. Fl. Graec. iii. 103.—Graecia.
septemsulcata, Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1904, 61.—Socotra.
sinaloensis, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 208 (1905).—Mexic.
taitensis, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiv. 88.—Afr. trop.
tetracantha, Pax, l. c. xxx. 341.—Afr. trop.
tetracanthoides, Pax, l. c. 342.—Afr. trop.
togakusensis, Hayata, in Journ. Coll. Sci. Tokyo, xx. no. 3, 69.—Japon.
trachycarpa, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. 288.—Afr. trop.
Valliniana, Belli, in Ann. di Bot. Roma, i. 9.—Ital.

EUPHORBIA:—
vepretorum, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 45.—Madag.
viperina, A. Berger, in Monatsschr. Kakt. xii. 39.—Afr. austr.
Winkleri, Pax, in Engl. Jahrb. xxx. 342.—Afr. trop.
xylacantha, Pax, l. c. xxxiv. 79.—Afr. trop.
Zahnii, Heldr. ex Halacsy, Consp. Fl. Graec. iii. 100.—Graecia.

EUPHRASIA, Linn. (Scrophul.).
Alboffii, Chab. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 517.—Eur.
alpigena, Vollman, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 457.—Eur.
Heribaudi, Chab. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 497 = stricta.
pecorina, Chab. l. c. 504.—Eur.
Perrieri, Chab. l. c. 508.—Eur.
praecox, Vollmann, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 456.—Eur.
praecurta, Chitr. in Sched. Herb. Fl. Ross. v. 145.—Rossia.
Randii, Robinson, in Rhodora, 1901, 273.—Am. bor.
Songeoni, Chab. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 517.—Eur.
Williamsii, Robinson, in Rhodora, 1901, 272.—Am. bor.

EUPLASSA, Salisb. (Proteac.).
goyazensis, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 28.—Bras.
Taubertiana, K. Schum. l. c.—Bras.

EURYA, Thunb. (Ternstroem.).
emarginata, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 19 (= Ilex emarginata).—Japon.
Henryi, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. sub t. 2761.—China.
obliquifolia, Hemsl. l. c.—China.

EURYCENTRUM, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee, 89. ORCHIDACEAE.
obscurum, Schlechter, l. c. (= Cystorchis obscura).—N. Guin.
salomonense, Schlechter, l. c. 90.—Ins. Salomon.

EURYOPS, Cass. (Compos.).
Antinorii, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 362.—Afr. trop.
floribundus, N. E. Br. in Kew Bull. 1901, 125.—Afr. austr.
Jacksoni, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 361.—Afr. trop.
multinervis, N. E. Br. ex S. Moore, in Journ. Bot. 1903, 135.—Afr. austr.
Osteospermum, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 362.—Afr. trop.
somalensis, S. Moore, l. c.—Afr. trop.
sparsiflorus, S. Moore, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1023.—Afr. trop.

EUSTEPHIOPSIS, R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. Ser. IV. i. no 1 (1905) 162. AMARYLLIDACEAE.
latifolia, R. Fries, l. c. 164.—Reg. Argent.
speciosa, R. Fries, l. c. 163.—Reg. Argent.

EUSTOMA, Salisb. (Gentian.).
Andrewsii, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 177.—Am. bor.

EUTERPE, Gaertn. (Palm.).
badiocarpa, Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro, i. 12.—Bras.
jatapuensis, Barb. Rodr. l. c.—Bras.

EUTETRAS, A. Gray (Compos.).
Pringlei, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xli. 266.—Mexic.

EUTHAMIA, Ell. = **Solidago**, Vaill. (Compos.).
camporum, Greene, Pittonia, v. 74.—Am. bor.
chrysothamnoides, Greene, l. c. 76.—Am. bor.
floribunda, Greene, l. c. 74.—Am. bor.
gymnospermoides, Greene, l. c. 75.—Am. bor.
media, Greene, l. c. 74.—Am. bor.
microcephala, Greene, l. c. 79.—Am. bor.
microphylla, Greene, l. c.—Am. bor.
minor, Greene, l. c. 78.—Am. bor.

EUTHAMIA:—
Nuttallii, Greene, Pittonia, v. 73.—Am. bor.
pulverulenta, Greene, l. c. 75.—Am. bor.
remota, Greene, l. c. 78.—Am. bor.
scabra, Greene, l. c. 80.—Am. bor.

EVELYNA, Poepp. & Endl. (Orchid.).
[ELLEANTHUS, Presl. I. K.]
graminifolia, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* 33.—Peruv.

EVERARDIA, Ridl. (Cyper.).
angusta, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 73.—Guiana.

EVERSMANNIA, Bunge (Legum.).
subspinosa, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 173 (= *Hedysarum subspinosum*).—Reg. Casp.

EVODIA, Forst. (Rutac.).
batjanica, *Valet. in Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 52.—Celebes.
dubia, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 23.—Ins. Philipp.
durifolia, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 279.—N. Guin.
lamprocarpa, *K. Schum. l. c.* 280.—N. Guin.
Maidenii, *K. Schum. l. c.* 279.—Ins. Bismarck.
mindanaensis, *Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull.* i. 25.—Ins. Philipp.
Radlkoferiana, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 281.—N. Guin.
Ridleyi, *Hochr. in Ic. Bogor.* t. 151.—Hab.?
semecarpifolia, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 23.—Ins. Philipp.

EVOLVULUS, Linn. (Convolv.).
arenicola, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 694.—Venez.
guaraniticus, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 685.—Parag.
Hasslerianus, *Chod. l. c.*—Parag.
Lavae, *Schweinf. ex Capua, in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 224.—Afr. trop.
oreophilus, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 151.—Am. bor.
paraguariensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 685.—Parag.
Seleriana, *Fern. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 498.—Mexic.
squamosus, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 449.—Ind. occ.

EXACUM, Linn. (Gentian.).
socotranum, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 286.—Socotra.
zombense, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 46.—Afr. trop.

EXCOECARIA, Linn. (Euphorb.).
Benthamiana, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2741.—Ins. Seychell.

EXOCARPUS, Labill. (Santal.).
Lauterbachianus, *Pilg. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 257.—N. Guin.

EXOCHOGYNE, C. B. Clarke, in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 101. *CYPERACEAE*.
amazonica, *C. B. Clarke, l. c.*—Reg. Amaz.

EXOMICRUM, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 547 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
axillare, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 341 (= *Gomphia axillaris*).—Afr. trop.
Brassae, Van Tiegh. l. c. 339.—Afr. trop.
Cabrae, Van Tiegh. l. c. xviii. 38 = O. Cabrae.
congestum, Van Tiegh. l. c. xvi. 338 = O. congesta.
Conrauanum, Van Tiegh. l. c. xviii. 38 = O. Conrauana.
coriaceum, Van Tiegh. l. c. xvi. 338 = O. coriacea.
densiflorum, Van Tiegh. l. c. 339 = O. densiflora.
Dewevrei, Van Tiegh. l. c. 335 = O. Dewevrei.
djallonense, Van Tiegh. l. c. 340.—Afr. trop.
Dusenii, Van Tiegh. l. c. xviii. 38 = O. Dusenii.
excavatum, Van Tiegh. l. c. xvi. 340.—Afr. trop.
foliosum, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
glaberrimum, Van Tiegh. l. c. 338 = O. glaberrima.
glaucum, Van Tiegh. l. c. 340.—Afr. trop.
insculptum, Van Tiegh. l. c. xviii. 38 = O. insculpta.
Kouiloui, Van Tiegh. l. c. xvi. 339.—Afr. trop.
lolodorfense, Van Tiegh. l. c. 340.—Afr. trop.

EXOMICRUM:—
membranaceum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 340 = O. membranacea.
Oliveri, Van Tiegh. l. c. 338.—Afr. trop.
pellucidum, Van Tiegh. l. c. = O. pellucida.
pseudospicatum, Van Tiegh. l. c. xviii. 38 = O. pseudospicata.
Schefferi, Van Tiegh. l. c. = O. Schefferi.
sulcatum, Van Tiegh. l. c. xvi. 340.—Afr. trop.
triangulare, Van Tiegh. l. c. 339.—Afr. trop.

EXOSPERMUM, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xiv. 279, 333 (1900) = **Zygogynum**, Baill. (Magnol.).
Lecarti, Van Tiegh. l. c. 334 = Z. Vieillardi.

EXOSTEMMA, Rich. (Rubiac.).
acuminatum, *Urb. Symb. Antill.* iii. 378.—Ind. occ.

F

FABIANA, Ruiz & Pav. (Solan.).
Clarenii, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxvii. 167.—Reg. Argent.
Friesii, *Damm. l. c.*—Reg. Argent.
Kurtziana, *Damm. l. c.* 168.—Reg. Argent.

FADOGIA, Schweinf. (Rubiac.).
Butayei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 204.—Afr. trop.
chlorantha, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 388.—Afr. trop.
chrysantha, *K. Schum. l. c.* 389.—Afr. trop.
psammophila, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxii. 147.—Afr. trop.
stigmatoloba, *K. Schum. l. c.* xxx. 414.—Afr. trop.
Thamnus, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 390.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 21.—Afr. trop.

FAGARA, Linn. (Rutac.).
[ZANTHOXYLUM, Linn. I. K.]
Afzelii, *Engl. Jahrb.* xxxii. 119.—Afr. trop.
chiloperone, *Engl. ex Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1282 (= *Zanthoxylum chiloperone*).—Parag.
Clava-Herculis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 675 (= *Zanthoxylum Clava Herculis*).—Am. bor.
deremensis, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 241.—Afr. trop.
Fagara, *Small, Fl. S. E. U. S.* 675 (= *Schinus Fagara*).—Am. bor.
Fischeri, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 242.—Afr. trop.
fruticosa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 675.—Am. bor.
Harmsiana, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 96.—Am. cent.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1284.—Parag.
Holtziana, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 242.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. Enum. Pl. Laurent*, 124.—Afr. trop.
Merkeri, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 242.—Afr. trop.
paraguariensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1283.—Parag.
Regnelliana, *Chod. & Hassl. l. c.* 1283 (= *Zanthoxylum Regnellianum*).—Parag.
usambarensis, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 242.—Afr. trop.
Warburgii, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 160.—Ins. Philipp.

FAGELIA, Schwencke = **Calceolaria**, Linn. (Scrophul.).
Prichardi, Rendle, in Journ. Bot. 1904, 371.—Patag.

FAGONIA, Tourn. (Zygophyll.).
glabra, *Krause, in Engl. Jahrb.* xxxv. 719.—Arabia.
Paulayana, *Wagn. & Vierh. ex Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 34.—Socotra.

FAGOPYRUM, Tourn. (Polygon.).
Fagopyrum, *Shafer, in Ann. Carneg. Mus.* i. 95.—Am. bor.
Polygonum, *Macl. in Torreya*, 1906, 198 (= *Polygonum Fagopyrum*).—Patag.

FAGRAEA, Thunb. (Logan.).
pachyclados, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 349.—N. Guin.

FALCATA, J. F. Gmel. = **Amphicarpaea**, Ell. (Legum.).
japonica, Kom. in Act. Hort. Petrop. xxii. 630.—Manchuria.

FALKIA, Linn. f. (Convolv.).
dichondroides, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 82.—Afr. austr.

FARADAYA, F. Muell. (Verben.).
chrysoclada, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 370.—N. Guin.

FARAMEA, Aubl. (Rubiac.).
chapadensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 100.—Bras.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 181.—Parag.
trinervia, *K. Schum. & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 115.—Am. cent.

FARMERIA, Willis (Podost.).
indica, *Willis, in Ann. Bot. Gard. Perad.* i. 246.—Ind. or.

FAROA, Welw. (Gentian.).
affinis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 99.—Afr. trop.
amara, *Gilg, ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 567.—Afr. trop.
nyasica, *N. E. Br. in Dyer, l. c.* 568.—Afr. trop.

FARSETIA, Turra (Crucif.).
Ellenbeckii, *Engl. Jahrb.* xxxii. 09.—Afr. trop.
fruticosa, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, ix. 249.—Afr. trop.
Robecchiana, *Engl. l. c.* 248.—Afr. trop.

FAUREA, Harv. (Proteac.).
intermedia, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 227.—Afr. trop.
Wentzeliana, *Engl. Jahrb.* xxx. 300.—Afr. trop.

FAURIA, Franch. (Gentian.).
[NEPHROPHYLLIDIUM, Gilg. I. K. S. i.]
Crista-galli, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 15 (= *Menyanthes Crista-galli*).—Japon.

FAXONANTHUS, Greenm. in Sargent, Trees & Shrubs, i. 23, t. 12 (1902). *SCROPHULARIACEAE*.
Pringlei, *Greenm. l. c.*—Mexic.

FEGIMANRA, Pierre (Anacard.).
Afzelii, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 214.—Afr. top.

FELICIA, Cass. (Compos.).
amelloides, *O. Hoffm. ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 53 (= *Cineraria amelloides*).—Afr. austr.
Bergeriana, *O. Hoffm. ex A. Zahlbr. l. c.* (= *Aster Bergerianus*).—Afr. austr.
elongata, *O. Hoffm. ex A. Zahlbr. l. c.* (= *Aster elongatus*).—Afr. austr.
Flanaganii, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 137.—Afr. austr.
lutea, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 123.—Afr. austr.
maritima, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 137.—Afr. austr.
serrulata, *O. Hoffm. ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 52 (= *Aster serrulatus*).—Afr. austr.

FERDINANDIA, Welw. (Bignon.).
[HETEROPHRAGMA, DC. I. K.]

FERETIA, Delile (Rubiac.).
virgata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 344.—Afr. trop.

FERNANDIA, Baill. = **Ferdinandia**, Welw. (Bignon.).
Ferdinandi, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. 332 = Ferdinandia magnifica et F. superba.

FERONIA, Correa (Rutac.).
gabonensis, *Hochr. in Bull. Inst. Buitenz.* xix. 42, nomen.—Hab.?

FERRARIA, Linn. (Irid.).
Randii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1905, 54 (= *Moraea Randii*).—Afr. trop.

FERRIERA, Bub. Fl. Pyren. iii. (1901) 6 = **Paronychia**, Tourn. (Illecebr.).
echinata, Bub. l. c. 7 = P. echinata.
mediterranea, Bub. l. c. = P. argentea.
nivea, Bub. l. c. 9 = P. capitata.
polygonifolia, Bub. l. c. 7 = P. polygonifolia.
serpyllifolia, Bub. l. c. 9 = P. serpyllifolia.

FERULA, Tourn. (Umbell.).
gigantea, B. Fedtsch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Petersb. i. 135.—As. cent.
Grigoriewi, B. Fedtsch. l. c. 137.—As. cent.
schugnanica, B. Fedtsch. l. c. 136.—As. cent.

FESTUCA, Tourn. (Gramin.).
affinis, Boiss. & Heldr. ex Halacsy, Consp. Fl. Graec. iii. 406.—Graecia.
arida, Elmer, in Coult. Bot. Gaz. xxxvi. 52.—Am. bor.
dalmatica, Hand.-Mazz. & Janch. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 382; Beck, in Wiss. Mitth. Bosn. Herzegow. ix. 448.—Eur. austr.
Danthonii, Aschers. & Graebn. Mitteleurop. Fl. ii. 550.—Eur.
dertonensis, Aschers. & Graebn. l. c. 559 (= Bromus dertonensis).—Reg. Medit.; Afr. austr.
Earlei, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 608.—Am. bor.
Elmeri, Scribn. & Merrill, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 468.—Am. bor.
eriostoma, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1903, 32.—Reg. Argent.
exigua, Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Petersb. i. 20.—Turkestan.
Hieronymi, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1903, 33.—Reg. Argent.
idahoensis, Elmer, in Coult. Bot. Gaz. xxxvi. 53.—Am. bor.
ingrata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 608.—Am. bor.
Kronenburgii, Hack. in Allg. Bot. Zeitschr. 1905, 132.—Turkestan.
Merinoi, Pau, in Bol. Soc. Arag. i. 81; et ex Merino, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. ii. 464.—Hispan.
minutiflora, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 608.—Am. bor.
Panciciana, Hand.-Mazz. & Janch. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 382; Beck, in Wiss. Mitth. Bosn. Herzegow. ix. 449.—Eur. austr.
Pietrosii, Zapal. in Bull. Acad. Cracov. 1904, 304.—Galic.
polesica, Zapal. l. c. 303.—Galic.
polonica, Zapal. l. c. 302.—Galic.
proxima, R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. Ser. IV. i. no. 1, 184.—Reg. Argent.
pseudovina, Beck, in Wiss. Mitth. Bosn. Herzegow. ix. 448.—Austria.
Reverchonii, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1903, 30.—Eur.
stenantha, Beck, in Wiss. Mitth. Bosn. Herzegow. ix. 449.—Austria.
sterilis, Jessen, Deutsch. Graeser, 171.—Eur.
sulcata, Beck, in Wiss. Mitth. Bosn. Herzegow. ix. 449.—Austria.
tectorum, Jessen, Deutsch. Graeser, 171.—Eur.
Teneriffae, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1903, 36.—Ins. Teneriff.
trinervia, Hack. l. c. 34.—N. Guin.
Watsoni, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 148.—Am. bor.

FIBICHIA, Koel. = **Cynodon**, Pers. (Gramin.).
Dactylon, Beck, in Wiss. Mitth. Bosn. Herzegow. ix. 436 = C. Dactylon.

FICARIA, Dill. = **Ranunculus**, Linn. (Ranunc.).
Degeni, Herv. in Bull. Acad. Géogr. Bot. xv. (1905) 27.—Hispan.

FICINIA, Schrad. (Cyper.).
distans, C. B. Clarke, in Wildem. Pl. Nov. Hort. Then. i. 30, t. 7.—Afr. austr.
mucronata, C. B. Clarke, in Wildem. l. c. 29.—Afr. austr.

FICUS, Tourn. (Urtic.).
afghanistanica, Warb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers. 369.—Afghan.
angustissima, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 11.—Ins. Philipp.

FICUS:—
aphanoneura, Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 80.—N. Caled.
arayatensis, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 196.—Ins. Philipp.
artocarpoides, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 23.—Afr. trop.
Awkeotsang, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 151.—Formosa.
Barnesii, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 12.—Ins. Philipp.
Barteri, Sprague, in Gard. Chron. 1903, i. 354.—Afr. trop.
benguetensis, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 10.—Ins. Philipp.
Berteroi, Warb. in Urb. Symb. Antill. iii. 468.—Ind. occ.
blepharosepala, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 246.—N. Guin.
blepharostoma, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 197.—Ins. Philipp.
Bordeni, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 11.—Ins. Philipp.
Bubu, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 8.—Afr. trop.
Cabrae, Warb. l. c. 9.—Afr. trop.
Calmsii, Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 73.—Austral.
callabatensis, Warb. in Engl. Jahrb. xxxvi. 210.—Afr. trop.
carolinensis, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 242.—Polynes.
caudatifolia, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 194.—Ins. Philipp.
chaetophora, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 246.—N. Guin.
cnestrophylla, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 34.—Afr. trop.
colpophylla, Warb. l. c. 31.—Afr. trop.
Combsii, Warb. in Urb. Symb. Antill. iii. 456.—Ind. occ.
Conrauі, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 25.—Afr. trop.
corylifolia, Warb. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. III. i. 215; Sér. VI. 27.—Afr. trop.
crassicosta, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 11.—Afr. trop.
crassipes, F. M. Bailey, Queensl. Fl. 1480.—Austral.
cylindrica, Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 72.—Austral.
decussata, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 198.—Ins. Philipp.
Demeusei, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 20.—Afr. trop.
Dewevrei, Warb. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. III. i. 215; Sér. VI. 18.—Afr. trop.
didymophylla, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 200.—Ins. Philipp.
Dielsii, Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 75.—Austral.
discifera, Warb. in Engl. Jahrb. xxxvi. 210.—Afr. trop.
Durandiana, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 18.—Afr. trop.
Eggersii, Warb. in Urb. Symb. Antill. iii. 469.—Ind. occ.
Elmeri, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 9.—Ins. Philipp.
endothrix, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 200.—Ins. Philipp.
ericocarpa, Warb. in Engl. Jahrb. xxx. 294.—Afr. trop.
erubescens, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 29.—Afr. trop.
erythropoecia, K. Schum. & Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 244.—N. Guin.
Finlayana, Warb. in Urb. Symb. Antill. iii. 467.—Ind. occ.
fuscipes, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 245.—N. Guin.
gerontocarpa, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 201.—Ins. Philipp.
gigantifolia, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 9.—Ins. Philipp.
Gilletii, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 19.—Afr. trop.
grenadensis, Warb. in Urb. Symb. Antill. iii. 481.—Ind. occ.
Haenkei, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 195.—Ins. Philipp.

FICUS:—
hararensis, Warb. in Engl. Jahrb. xxxvi 212.—Afr. trop.
Harrisii, Warb. in Urb. Symb. Antill. iii. 457.—Ind. occ.
Hartii, Warb. in Urb. l. c. 458.—Ind. occ.
Hemprichii, Ehrenb. ex Warb. in Engl. Jahrb. xxxvi. 212 = populifolia.
hystricicarpa, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 244.—N. Guin.
inaequibractea, Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 80.—N. Caled.
Inkasuensis, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 22.—Afr. trop.
kimuenzensis, Warb. l. c. 28.—Afr. trop.
kisantuensis, Warb. l. c. 22.—Afr. trop.
kondeensis, Warb. in Engl. Jahrb. xxx. 292.—Afr. trop.
Krugiana, Warb. in Urb. Symb. Antill. iii. 487.—Ind. occ.
lachnocarpa, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 243.—N. Guin.
Langenburgii, Warb. in Engl. Jahrb. xxx. 293.—Afr. trop.
lateralis, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 5.—Afr. trop.
Laurentii, Warb. l. c. 21.—Afr. trop.
Lecardii, Warb. l. c. 24.—Afr. trop.
leiocarpa, Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 81.—N. Caled.
Lingua, Warb. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. III. i. 216; Sér. VI. 24.—Afr. trop.
longipes, Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 78.—N. Caled.
luzonensis, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. vi. 8.—Ins. Philipp.
malunuensis, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 196.—Ins. Philipp.
malvastrifolia, Warb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers. 369.—Persia.
mamillifera, Warb. in Urb. Symb. Antill. iii. 470.—Ind. occ.
manilensis, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 199.—Ins. Philipp.
megacarpa, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 14.—Ins. Philipp.
megalodisca, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 2.—Afr. trop.
megaphylla, Warb. l. c. 1.—Afr. trop.
microsphaera, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 199.—Ins. Philipp.
mindanaensis, Warb. l. c. 195.—Ins. Philipp.
mindoroensis, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 12.—Ins. Philipp.
mitrophora, Warb. in Urb. Symb. Antill. iii. 457.—Ind. occ.
mittuensis, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 3.—Afr. trop.
monbuttuensis, Warb. l. c. 11.—Afr. trop.
Munsae, Warb. l. c. 29.—Afr. trop.
myrmecophila, Warb. in Karst. & Schenck, Vegetationsbilder, iii. (1905), t. 2, et sub tt. 3–4.—Reg. Amaz.
Nekbudu, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 6.—Afr. trop.
niamniamensis, Warb. l. c. 14.—Afr. trop.
nota, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 10.—Ins. Philipp.
nuruensis, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 249.—N. Guin.
octomelifolia, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 1.—Afr. trop.
odorata, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 15.—Ins. Philipp.
omphalophora, Warb. in Urb. Symb. Antill. iii. 466.—Ind. occ.
pachypleura, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 4.—Afr. trop.
pachystemon, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 242.—Ins. Bismarck.
palauanense, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 11.—Ins. Philipp.
pallidinervia, Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 79.—N. Caled.
paludicola, Warb. in Ann. Mus. Congo, Sér. VI. 32.—Afr. trop.
pandurata, Hort. Sand. in Gard. Chron. 1903, i. 245.—Hab.?
Parkinsoni, Hiern, in Journ. Bot. 1901, 3.—Austral.
patellifera, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 241.—N. Guin.

FICUS:—
Picardae, *Warb. in Urb. Symb. Antill.* iii. 484.—Ind. occ.
platesocarpa, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxx. 292.—Afr. trop.
polyantha, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 250.—Ins. Bismarck.
polybractea, *Warb. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 216; Sér. VI. 7.—Afr. trop.
populoides, *Warb. in Urb. Symb. Antill.* iii. 479.—Ind. occ.
portus-Finschii, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 250.—N. Guin.
Pritzelii, *Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 74.—Austral.
prolixoides, *Warb. l. c.* 79.—N. Caled.
propinqua, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 8.—Ins. Philipp.
pseudopalma, *Blanco, Fl. Filip.* ed I. 650; ed. II. 473.—Ins. Philipp.
pseudo-vogelii, *Cheval. in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxxv. 443.—Afr. trop.
pubicosta, *Warb. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 216; Sér. VI. 16.—Afr. trop.
punctifera, *Warb. in Ann. Mus. Congo*, Sér. VI. 35.—Afr. trop.
punctulosa, *Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 81.—N. Caled.
Rivae, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 211.—Afr. trop.
rubricosta, *Warb. in Urb. Symb. Antill.* iii. 486.—Ind. occ.
ruficaulis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 13.—Ins. Philipp.
ruficeps, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxx. 294.—Afr. trop.
rukwaensis, *Warb. l. c.* 295.—Afr. trop.
Ruspolii, *Warb. l. c.* xxxvi. 211.—Afr. trop.
Schlechteri, *Warb. in Tropenpfl.* vii. 582.—As. or. austr.; N. Caled.
Schumanniana, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 243.—N. Guin.
sciarophylla, *Warb. in Ann. Mus. Congo*, Sér. VI. 31.—Afr. trop.
scolopophora, *Warb. l. c.* 33.—Afr. trop.
semecarpifolia, *Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 81.—N. Caled.
Senfftiana, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 247.—Polynes.
setistyla, *Warb. l. c.* 248.—N. Guin.
setistyla, *Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 77, non praec.—Austral.
Sintenisii, *Warb. in Urb. Symb. Antill.* iii. 464.—Ind. occ.
Stahlii, *Warb. l. c.* 470.—Ind. occ.
stenorrhynchus, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 245.—Ins. Bismarck.
stephanocarpa, *Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 75.—Austral.
storthophylla, *Warb. in Ann. Mus. Congo*, Sér. VI. 32.—Afr. trop.
subinflata, *Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 76.—Austral.
subrotundifolia, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 237.—Mexic.
subscabrida, *Warb. in Urb. Symb. Antill.* iii. 486.—Ind. occ.
thelostoma, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 246.—Ins Bismarck.
trichantha, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 201.—Ins. Philipp.
trichostyla, *Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 77.—Austral.
tristipula, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 249.—N. Guin.
umbonigera, *Warb. in Urb. Symb. Antill.* iii. 480.—Ind. occ.
Urbaniana, *Warb. l. c.* 459.—Ind. occ.
variifolia, *Warb. in Ann. Mus. Congo*, Sér. VI. 30.—Afr. trop.
verrucocarpa, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxx. 294.—Afr. trop.
Vidaliana, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 197.—Ins. Philipp.
villosipes, *Warb. in Ann. Mus. Congo*, Sér. VI. 28.—Afr. trop.
virginea, *Banks & Soland. ex Hiern, in Journ. Bot.* 1901, 2.—Austral.
vitifolia, *Warb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 370.—Persia.

FICUS:—
Weinlandii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 248.—N. Guin.
Wildemaniana, *Warb. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 217; Sér. VI. 7.—Afr. trop.
Wilsoni, *Warb. in Urb. Symb. Antill.* iii. 467.—Ind. occ.
Wrightii, *Warb. l. c.* 461.—Ind. occ.
xiphophora, *Warb. in Ann. Mus. Congo*, Sér. VI. 34.—Afr. trop.

FILAGO, Linn. (Compos.).
cossyrensis, *Tin. in Lojac. Fl. Sic.* ii. i. 110 (*non Lojac.*).—Sicil.
cuneata, *Lojac. l. c.* 107.—Sicil.
Gussonei, *Lojac. l. c.* 110.—Sicil.

FILIPENDULA, Tourn. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
Filipendula, Aschers. & Graebn. Mitteleur. Fl. vi. 439 = S. Filipendula.

FIMBRISTYLIS, Vahl (Cyper.).
alamosana, *Fern. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 491.—Mexic.
Drummondii, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 187 (= *Isolepis Drummondii*).—Am. bor.
Fordii, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 236.—China.
fuscoides, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 719.—Malaya.
Henryi, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 237.—China.
Hensii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 419.—Afr. trop.
Holwayana, *Fern. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 492.—Mexic.
koreensis, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 199.—China.
kwantungensis, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 238.—China.
melanospora, *Fern. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 491.—Mexic.
obscura, *Fern. l. c.* 492.—Mexic.
perpusilla, *Harper, in Small, Fl. S. E. U. S.* 188.—Am. bor.
splendida, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 527.—Afr. trop.
transiens, *K. Schum. ex C. B. Clarke, l. c.* 444 (= *Bulbostylis transiens*).—Afr. trop.
yunnanensis, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 247.—China.

FIRMIANA, Marsigli (Stercul.).
[STERCULIA, Linn. I. K.]
bracteata, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 369.—Tonkin.

FISSIPES, Small, Fl. S. E. U. S. 311 (1903). *ORCHIDACEAE.*
acaulis, *Small, l. c.* (= *Cypripedium acaule*).—Am. bor.

FITCHIA, Hook. f. (Compos.).
speciosa, *Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 284.—Ins. Cook.

FLACOURTIA, Comm. (Bixac.).
Kelampagine, *Eeden, Hout. Ned. Oost. Ind.* ed. II. 6, nomen.—Java.
latifolia, *T. Cooke, Fl. Bombay*, 56.—Ind. or.

FLAVERIA, Juss. (Compos.).
campestris, *Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 287.—Am. bor.
floridana, *Johnston, l. c.* 291.—Am. bor.
intermedia, *Johnston, l. c.* 288.—Mexic.
Palmeri, *Johnston, l. c.* 290.—Mexic.
trinervia, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 810 (= *Oedera trinervia*).—Am. trop.

FLEISCHMANNIA, Sch. Bip. (Compos.).
Langlassei, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xli. 273.—Mexic.

FLEMINGIA, Roxb. (Legum.).
nilgiriensis, *Wight, ex Cooke, Fl. Bombay*, 393.—Ind. or.

FLEURYA, Gaudich. (Urtic.).
urticoides, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 122.—Afr. trop.

FLOSCOPA, Lour. (Commelin.).
Elliottii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 88.—Afr. trop.
pauciflora, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. trop.
pusilla, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 185.—Afr. trop.
tuberculata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 87.—Afr. trop.

FLOURENSIA, DC. (Compos.).
atacamensis, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 95 (= *Helianthus atacamensis*).—Chili.
Gayana, *Reiche, l. c.* 94 (= *Helianthus Gayanus*).—Chili.
Navarri, *Reiche, l. c.* (= *Helianthus Navarri*).—Chili.

FLUECKIGERA, Kuntze (Phytolacc.).
[LEDENBERGIA, Klotzsch. I. K. S. i.]
roseo-aenea, *Wildem. in Ic. Hort. Then.* t. 179 (= *Ledenbergia roseo-aenea*).—Bras.

FLUEGGEOPSIS, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee, (1905) 289. *EUPHORBIACEAE.*
keyensis, *K. Schum. l. c.* 290 (= *Phyllanthus keyensis*).—Ins. Malay.
microspermus, *K. Schum. l. c.* 289.—N. Guin.
pelas, *K. Schum. l. c.* 290.—N. Guin.

FOCKEA, Endl. (Asclep.).
dammarana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 56.—Afr. trop.
Lugardi, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 420.—Afr. trop.

FOENICULUM, Tourn. (Umbell.).
graecum, *Calest. in Martelli, Webbia*, 205 (= *Sium graecum*).—Eur.
salsum, *Calest. l. c.* (= *Sium salsum*).—Rossia.

FORASACCUS, Bub. Fl. Pyren. iv. 379 = **Bromus**, Dill. (Gramin.).
arenaceus, Bub. l. c. 383 = B. tectorum.
arvensis, Bub. l. c. 385 = B. arvensis.
asper, Bub. l. c. 388 = B. asper.
commutatus, Bub. l. c. 387 = B. racemosus.
diandrus, Bub. l. c. 380 = B. madritensis.
distichus, Bub. l. c. = B. sterilis.
erectus, Bub. l. c. 384 = B. erectus.
giganteus, Bub. l. c. 383 = B. giganteus.
lanceolatus, Bub. l. c. 384 = B. macrostachys.
maximus, Bub. l. c. 382 = B. rigidus.
mollis, Bub. l. c. 386 = B. mollis.
patulus, Bub. l. c. 387 = B. patulus.
racemosus, Bub. l. c. = B. racemosus.
secalinus, Bub. l. c. 388 = B. secalinus.
squarrosus, Bub. l. c. 386 = B. squarrosus.

FORRESTIA, A. Rich. (Commelin.).
africana, *K. Schum. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 77.—Afr. trop.
chinensis, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 158.—China.
gracilis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 37.—Penins. Mal.
irritans, *Ridley, l. c.* 38.—Penins. Mal.
philippinensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 5.—Ins. Philipp.

FOTHERGILLA, Murr. (Hamamel.).
parvifolia, *Kearney, in Small, Fl. S. E. U. S.* 509.—Am. bor.

FOUQUIERIA, H. B. & K. (Tamaric.).
campanulata, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 457.—Mexic.
fasciculata, *Nash, l. c.* 452 (= *Cantua fasciculata*).—Mexic.
Macdougalii, *Nash, l. c.* 454.—Mexic.
peninsularis, *Nash, l. c.* 455.—Calif.

FOURNIERIA, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Ser. VIII. xix. (1904) 59. *OCHNACEAE.*
scandens, *Van Tiegh. l. c.* (= *Godoya scandens*).—Am. cent.

FRAGARIA, Tourn. (Rosac.).
latiuscula, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xviii. 216.—Am. bor.
retrorsa, *Greene, l. c.*—Am. bor.
Terraenovae, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 501.—Am. bor.

FRANKENIA, Linn. (Franken.).
auriculata, *Pau, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 212.—Hybr.
chubutensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* vii. 238.—Patag.
Clarenii, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 126.—Reg. Argent.
conferta, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 389.—Austral.
florida, *L. Chevall. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 768.—Alger.
Georgei, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 389.—Austral.
setosa, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 3.—Austral.
Suardii, *Petitm. in Monde des Pl.* Sér. II. vi. 47.—Hybr.

FRANSERIA, Cav. (Compos.).
arborescens, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 162 (1903).—Calif.

FRASERA, Walt. (Gentian.).
neglecta, *H. M. Hall, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 388.—Am. bor.

FRAXINUS, Tourn. (Oleac.).
Baroniana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 86.—China.
cataubiensis, *Ashe, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 230.—Am. bor.
Darlingtonii, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 725.—Am. bor.
macropetala, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1903, 494.—Am. bor.
philippinensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 67.—Ins. Philipp.

FREESIA, Klatt (Irid.).
rubella, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 863.—Afr. austr.

FREMYA, Brongn. & Gris = **Xanthostemon**, F. Muell. (Myrtac.).
glauca, Vieill. ex Pampan. & Pampal. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. xii. 682 = X. glaucum.
laurina, Vieill. ex Pampan. & Pampal. l. c. 678 = X. multiflorum.

FREYCINETIA, Gaudich. (Pandan.).
Biroi, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 52.—N. Guin.
ensifolia, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 5.—Ins. Philipp.
lagenicarpa, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 52.—N. Guin.
stenophylla, *Warb. l. c.* 53.—N. Guin.
streptopsifolia, *Warb. l. c.*—N. Guin.

FRITILLARIA, Tourn. (Liliac.).
askabadensis, *Micheli, in Journ. Soc. Hort. Fr.* 1902, 145.—Reg. Caucas.
Brandegei, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1903, 484.—Calif.
chlorantha, *Hausskn. & Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 44.—Persia.
cilicico-taurica, *Hausskn. & Bornm. l. c.* 46.—As. Min.
ionica, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 219.—Graecia.
Michailovskyi, *Fomine, in Monit. Jard. Bot. Tiflis,* i. 18.—Reg. Caucas.
Purdyi, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1902, 75.—Am. bor.
Straussii, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 45.—Persia.
Tuntasia, *Heldr. ex Halacsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 222.—Graecia.
wanensis, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 287.—Orient.

FROELICHIA, Moench (Amaryll.).
campestris, *Small, Fl. S. E. U. S.* 397.—Am. bor.
scoparia, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 136.—Ins. Galap.

FUCHSIA, Plum. (Onagr.).
asperifolia, *Krause, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 169.—Peruv.
dolichantha, *Krause, l. c.* 172.—Peruv.
leptopoda, *Krause, l. c.* 171.—Peruv.
scandens, *Krause, l. c.*—Peruv.
siphonantha, *Krause, l. c.* 173.—Peruv.

FUCHSIA:—
tacsoniiflora, *Krause, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 172.—Peruv.
tuberosa, *Krause, l. c.* 170.—Peruv.
Weberbaueri, *Krause, l. c.*—Peruv.

FUIRENA, Rottb. (Cyper.).
abnormalis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 462.—Afr. trop.
ciliata, *Bush, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1906, 97.—Am. bor.
cylindrica, *Bush, l. c.* 91.—Am. bor.

FUMARIA, Tourn. (Papav.).
Burnati, *Verguin, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* ii. 121.—Hybr.
Camerarii, Bub. Fl. Pyren. iii. 281 = Vaillantii.
Gasparinii, Bub. l. c. 276 = flabellata.
occidentalis, *Pugsley, in Journ. Bot.* 1904, 218.—Anglia
Pla, *Nicotra, in Atti Rendic. Acc. Dafnica, Acireale,* Ser. 2 a, i. (1905); *ex Bot. Centralbl.* cii. (1906) 507.—Ital.
purpurea, *Pugsley, in Journ. Bot.* 1902, 135.—Eur.

FUNKIA, Spreng. (Liliac.).
latifolia, *Miq. Bijdr. Fl. Jap.* 302; *ex Matsum. Ind. Pl. Jap.* ii. 200.—Japon.

FUNTUMIA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2694 (1901). *APOCYNACEAE.*
africana, *Stapf, l. c.* tt. 2696-7 (= *Kickxia africana*).—Afr. trop.
elastica, *Stapf, l. c.* 2694-5 (= *Kickxia elastica*).—Afr. trop.
latifolia, *Stapf, l. c.* (= *Kickxia latifolia*).—Afr. trop.

FURCRAEA, Vent. (Amaryll.).
Deledevanti, *Rivière in Rev. Cult. Colon.* xi. (1902) 68.—Peruv.
Delevanti, Rivière, l. c. 69 = praec.
hexapetala, *Urb. Symb. Antill.* iv. 152 (= *Agave hexapetala*).—Ind. occ.
Watsoniana, *Hort. Sand. ex Gard. Chron.* 1898, i. 242.—Hab. !

FURERA, Bub. Fl. Pyren. iii. 16 = **Corrigiola**, Linn. (Illecebr.).
annua, Bub. l. c. = C. littoralis.
perennis, Bub. l. c. = C. littoralis.

G

GABUNIA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxiii. (1896) 224. *APOCYNACEAE.*
brachypoda, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 137 (= *Tabernaemontana brachypoda*).—Afr. trop.
crispiflora, *Stapf, l. c.* 139 (= *Tabernaemontana crispiflora*).—Afr. trop.
eglandulosa, *Stapf, l. c.* 138.—Afr. trop.
Gentilii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. V. i. 68.—Afr. trop.
glandulosa, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 138.—Afr. trop.
latifolia, *Stapf, l. c.* 137.—Afr. trop.
longiflora, *Stapf, l. c.* 138.—Afr. trop.
psorocarpa, *Pierre, ex Stapf, l. c.* 137.—Afr. trop.

GAERTNERA, Lam. (Logan.).
Drakeana, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 586.—Madag.
hispida, *Aug. DC. l. c.* 585.—Madag.
rhodantha, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 543.—Afr. trop.
salicifolia, *C. H. Wright, ex Baker, l. c.*—Afr. trop.
spicata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 372.—Afr. trop.

GAERTNERIA, Medic. = **Franseria**, Cav. (Compos.).
Grayi, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 35 = F. tomentosa.
linearis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 133.—Am. bor.
tomentosa, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 34 = F. discolor.

GAGEA, Salisb. (Liliac.).
afghanica, *Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo,* ii. (Sept. 1904) repr. 3.—As. cent.
Aitchisoniana, *Terracc. l. c.* (Dec. 1904) repr. 5.—Afghan.
assyria, *Terracc. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1122.—Assyria.
bithynica, *Pasch. Ueber Gagea,* 12.—Eur.
Boissieri, *Pasch. l. c.* 13.—Oriens.
Bornmuelleriana, *Pasch. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 194.—Persia.
Burnati, *Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo,* ii. (Sept. 1904) repr. 4.—Eur. cent.
Capusii, *Terracc. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1115.—Turkestan.
Chaberti, *Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo,* ii. (Sept. 1904) repr. 5.—Afr. bor.
colchica, Albow, ex Terracc. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 1121 = glacialis.
confusa, *Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo,* ii. (Sept. 1904) repr. 5.—Rossia.
Cossoniana, *Pasch. Ueber Gagea,* 11.—Afr. bor.
distans, *Pasch. l. c.* 10.—Hispan.
dubia, *Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo,* ii. (Sept. 1904) repr. 6.—Turcia.
Durieui, *Pasch. Ueber Gagea,* 11, descr.—Afr. bor.
elliptica (sph. ellyptica), *Terracc. in Bol. Soc. Arag.* iv. 238.—Hispan.
Fedtschenkoana, *Pasch. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 190.—Sibir.
Gussonii, *Terracc. in Bol. Soc. Arag.* iv. 231; *Rev. Monogr. Gagea Fl. Spagn.* 45.—Hispan.
hiensis, *Pasch. Ueber Gagea,* 16.—Turkestan.
hissarica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 241.—As. cent.
iberica, *Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo,* ii. (Sept. 1904) repr. 6.—Hispan.
intercedens, *Pasch. in Fedde, Repert Nov. Sp.* i. 192.—Persia.
Jaeschkei, *Pasch. Ueber Gagea,* 20.—Reg. Himal.
Juliae, *Pasch. l. c.* 15.—Cyprus.
Lacaitae, *Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo,* ii. (Dec. 1904) repr. 6.—Sicil.
linearifolia, *Terracc. l. c.* (Sept. 1904) repr. 7.—As. Min.
lusitanica, *Terracc. l. c.* repr. 8; *et in Bol. Soc. Broter.* xx. (1905) 203.—Lusit.
micrantha, *Pasch. Ueber Gagea,* 14.—Syria.
minimoides, *Pasch. l. c.* 16.—Persia.
perpusilla, *Pasch. l. c.* 17.—Persia.
Pinardi, *Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo,* ii. (Sept. 1904) repr. 8.—Lusit.
provisa, *Pasch. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 195.—Sibir.
ramulosa, *Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo,* ii. (Sept. 1904) repr. 9.—Sicil.
rhodiaca, *Terracc. l. c.* (Dec. 1904) repr. 7.—Ins. Rhodes.
Sintenisii, *Pasch. Ueber Gagea,* 17.—As. Min.
Soleimani, *Bornm. in Mitth. Thuring. Bot. Ver.* n. s. xviii. 46, nomen.—Persia.
syriaca, *Terracc. in Boll. Soc. Ort. Palermo,* ii. (Sept. 1904) repr. 9.—Syria.
tenera, *Pasch. Ueber Gagea,* 20.—Turkestan !
tenuis, *Terracc. in Bol. Soc. Broter.* xx. (1905) 205.—Lusit.
uliginosa, *Siehe & Pasch. in Pasch. Ueber Gagea,* 10.—Cilicia.

GAGNEPAINIA, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib. 129 (1904). *ZINGIBERACEAE.*
Godefroyi, *K. Schum. l. c.* 130 (= *Hemiorchis Godefroyi*).—Cambodia.
Harmandii, *K. Schum. l. c.* 129 (= *Hemiorchis Harmandii*).—Cambodia.
Thoreliana, *K. Schum. l. c.* 130 (= *Hemiorchis Thoreliana*).—Cochinch.

GAHNIA, Forst. (Cyper.).
Fitzgeraldi, *Rodw. Tasman. Fl.* 249.—Austral.
graminifolia, *Rodw. l. c.* 250.—Austral.

GAILLARDIA, Fouger. (Compos.).
chrysantha, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1293.—Am. bor.
fastigiata, *Greene, Pittonia,* v. 57.—Am. bor.
gracilis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 276.—Am. bor.
lutea, *Greene, Pittonia,* v. 57.—Am. bor.
trinervata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1293.—Am. bor.

GAIMARDIA, Gaudich. (Centrolepid.).
Fitzgeraldi, *F. Muell. & Rodw. in Rodw. Tasman. Fl.* 285.—Austral.

GALACTIA, P. Br. (Legum.).
brevipes, *Small, Fl. S. E. U. S.* 649.—Am. bor.
camporum, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 480.—N. Granat.
Curtissii, *Britton, in Torreya*, v. 33.—Ind. occ.
decumbens, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 900 (= *Collaea decumbens*).—Parag.
eriosematoides, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. *Beibl.* lxxii. 27.—Bras.
Glaziovii, *Harms, l. c.* 28.—Bras.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 899.—Parag.
lamprophylla, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. *Beibl.* lxxii. 28.—Bras.
paraguariensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 900.—Parag.
rugosa, *Chod. & Hassl. l. c.* 901 (= *Collaea rugosa*).—Parag.
virgata, *Chod. & Hassl. l. c.* 900 (= *Collaea virgata*).—Parag.

GALATELLA, Cass. = **Aster**, Tourn. (Compos.).
arrigens, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 50.—Gallia.
caerulescens, Jord. l. c.—Gallia.
conferta, Jord. l. c. 48.—Gallia.
deflexa, Jord. l. c. 49.—Gallia.
grandiflora, Jord. l. c.—Gallia.
modesta, Jord. l. c.—Gallia.
oligoclada, Jord. l. c. 50.—Eur.
oxyanthea, Jord. l. c. 48.—Gallia.
platyglossa, Jord. l. c. 49.—Gallia.
rosella, Jord. l. c. 48.—Gallia.

GALE, Tourn. = **Myrica**, Linn. (Myricac.).
Hartwegi, Cheval. in Mém. Soc. Nat. Cherbourg, xxxii. 191 (= *M. Hartwegi*).—Am. sept.; Mexic.
japonica, Cheval. l. c. 189.—Japon.
palustris, Cheval. l. c. 177 = M. Gale.
portugalensis, Cheval. l. c. 187.—Lusit.

GALEORCHIS, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 292 (1901). *ORCHIDACEAE.*
spectabilis, *Rydb. l. c.* (= *Orchis spectabilis*).—Am. bor.

GALINSOGA, Ruiz & Pav. (Compos.).
Humboldtii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 612.—Amer.

GALIUM, Linn. (Rubiac.).
Alberti, *Rouy, Fl. Fr.* viii. 10.—Hybr.
ambiguum, *W. F. Wight, in Zoe*, v. 55 (1900).—Calif.
amorganum, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 712.—Eur.
Bornmuelleri, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 14.—As. Min.
chartaceum, *W. F. Wight, in Zoe*, v. 56 (1900).—Calif.
chloroionanthum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 417.—Afr. trop.
coloradoense, *W. F. Wight, in Zoe*, v. 54 (1900).—Am. bor.
Culbertsonii, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 80.—Calif.
Debeauxii, *Degen & Herv. in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xv. (1905) 96.—Eur.
gracilens, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 74.—Japon.
incrassatum, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 724.—Eur.
labradoricum, *Wiegand, in Rhodora*, vi. 21.—Am. bor.
messanense, *Tin. ex Lojac. Fl. Sic.* ii. 1. 23.—Sicil.
muricatum, *W. F. Wight, in Zoe*, v. 56 (1900).—Calif.
ossaeum, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* i. 717.—Eur.
pendulum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 249.—Mexic.
querceticola, *Wołoszcz. Fl. Polon. Exsicc.* no. 952.—Galic.
Schmidelyi, *Chenev. & Wolf, in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève*, ix. 130.—Hybr.
setuliflorum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 75.—Japon.
siccatum, *W. F. Wight, in Zoe*, v. 54 (1900).—Calif.
sparsiflorum, *W. F. Wight, l. c.* 55 (1900).—Calif.
subscabridum, *W. F. Wight, l. c.* 56 (1900).—Calif.
Terracciani, *Lojac. Fl. Sic.* ii. 1. 16.—Sicil.
texanum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1118.—Am. bor.
trifloriforme, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 428.—Corea.

GALPINSIA, Britton = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
interior, Small, Fl. S. E. U. S. 845.—Am. bor.
lavandulaefolia, Small, l. c. = O. Hartwegii.

GALVEZIA, Domb. (Scrophul.).
glabrata, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 167 (1903).—Calif.

GAMOCARPHA, DC. = **Boopis**, Juss. (Calycer.).
Ameghinoi, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 302 = B. Ameghinoi.
calcafuensis, Speg. l. c. 303.—Patag.
patagonica, Speg. l. c.—Patag.
subandina, Speg. l. c. 303.—Patag.

GANOPHYLLUM, Blume (Burser.).
obliquum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxvii. 30 (= *Boswellia obliqua*).—Ins. Philipp.

GARCINIA, Linn. (Guttif.).
Amahia, Hort. ex Boerl. Cat. Hort. Bogor. 76 = ceramica.
Broewes, Hort. ex Boerl. l. c. 70 = celebica.
caloneura, *Boerl. l. c.* 68.—Sumatra.
Cambogia, Hort. ex Boerl. l. c. 77 = Hanburyi.
ceramica, *Boerl. l. c.* 76.—Ins. Ceram.
epunctata, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 86.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 61.—Afr. trop.
kingaensis, *Engl. Jahrb.* xxx. 356.—Afr. trop.
merguensis, Hort. ex Boerl. Cat. Hort. Bogor. 66 = balica.
montana, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxv. 8.—Penins. Mal.
Morella, *Hort. ex Boerl. Cat. Hort. Bogor.* 72 = echinocarpa.
parvifolia, Hort. ex Boerl. l. c. 67 = balica.
Pierreana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 212.—Afr. trop.
Protomelon, Burck, ex Boerl. Cat. Hort. Bogor. 71 = latissima.
purpurea, Hort. ex Boerl. l. c. = indica.
rostrata, Hort. ex Boerl. l. c. 78 = lateriflora.
rubriflora, *Boerl. l. c.* 73.—Ins. Molucc.
Sintaag, Hort. ex Boerl. l. c. 70 = celebica.
Tetangies, Hort. ex Boerl. l. c. 77 = parvifolia.

GARDENIA, Ellis (Rubiac.).
Barnesii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 47.—Ins. Philipp.
Merikin, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 2005.—Austral.
pinnata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxvii. 53 (= *Serissa pinnata*).—Ins. Philipp.
stenopetala, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 218.—Penins. Mal.
viscidissima, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 158.—Afr. trop.
Volkensii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 332.—Afr. trop.

GARNOTIA, Brongn. (Gramin.).
Cheesemani, *Hack. ex Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 303.—Ins. Cook.
japonica, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 55.—Japon.

GARRYA, Dougl. (Cornac.).
Congdoni, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvi. 459.—Calif.
longifolia, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 55.—Mexic.
pallida, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 287.—Am. bor.
rigida, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvi. 461.—Calif.
salicifolia, *Eastw. l. c.* 463.—Calif.

GARUGA, Roxb. (Burser.).
abilo, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 73 (= *Guiacum abilo*).—Ins. Philipp.
pacifica, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 30.—Ins. Tonga.

GASTROCHILUS, Wall. (Scitamin.).
anomalum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 92 (= *Kaempferia anomala*).—Borneo.
javanum, *K. Schum. l. c.* 95.—Java.

GASTRODIA, R. Br. (Orchid.).
abscondita, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 103.—Java.
viridis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 178.—Japon.

GAUDICHAUDIA, H. B. & K. (Malpigh.).
subverticillata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 49.—Mexic.

GAULTHERIA, Kalm (Ericac.).
domingensis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 329.—Ind. occ.
Hartwegiana, *Klotzsch, ex Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. (1903) 217.—Am. cent.
setulosa, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 44.—Guiana.

GAURA, Linn. (Onagr.).
brachycarpa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 848.—Am. bor.
coloradensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 572.—Am. bor.
Pitcheri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 847.—Am. bor.
simulans, *Small, in Bull. N. York. Bot. Gard.* iii. 432.—Am. bor.

GAYA, H. B. & K. (Malv.).
grandiflora, *Baker f. in Journ. Bot.* 1892, 136.—Bras.
Lyallii, *Baker f. l. c.* 137 (= *Plagianthus Lyallii*).—N. Zel.

GAYOIDES, Small, Fl. S. E. U. S. 764 (1903). *MALVACEAE.*
crispum, *Small, l. c.* (= *Sida crispa*).—Am. bor.
imberbe, *Small, l. c.* (= *Sida imberbis*).—Am. bor.

GAYOPHYTUM, A. Juss. (Onagr.).
intermedium, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 569.—Am. bor.

GAZANIA, Gaertn. (Compos.).
angustifolia, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 439.—Afr. trop.
montana, *Spreng. in Carleoft.* 1899, 442; *et in Bull. Soc. Tosc. Ort.* 1902, 44.—Afr. austr.

GEIGERIA, Griessel. (Compos.).
intermedia, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 381.—Afr. austr.
natalensis, *Wood & Evans, ex Wood, in Natal Colon. Herb. Rep.* 1900 (1901) 11; *et in Journ. Bot.* 1901, 172.—Afr. austr.
rivularis, *Wood & Evans, l. c.* 10; *l. c.* 171.—Afr. austr.

GEISSANTHERA, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 231. *ORCHIDACEAE.*
papuana, *Schlechter, l. c.* 232.—N. Guin.

GEISSANTHUS, Hook. f. (Myrsin.).
andinus, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 240.—Ecuador.
argutus, *Mez, l. c.* 238 (= *Ardisia arguta*).—N. Granat.
bogotensis, *Mez, l. c.* 239.—N. Granat.
cestrifolius, *Mez, l. c.* 241 (= *Ardisia cestrifolia*).—N. Granat.
durifolius, *Mez, l. c.* 240 (= *Ardisia durifolia*).—N. Granat.
ecuadorensis, *Mez, l. c.* 239.—Ecuador.
floccosus, *Mez, l. c.* 240.—N. Granat.
floribundus, *Mez, l. c.* 235.—Venez.
fragrans, *Mez, l. c.*—Venez.
furfuraceus, *Mez, l. c.* 240.—N. Granat.
glaber, *Mez, l. c.* 234.—N. Granat.
Goudotianus, *Mez, l. c.* 237.—N. Granat.
Haenkeanus, *Mez, l. c.* 236.—Am. trop.
Kalbreyeri, *Mez, l. c.* 237.—N. Granat.
Lehmannii, *Mez, l. c.* 234.—N. Granat.
lepidotus, *Mez, l. c.* (= *Ardisia lepidota*).—N. Granat.
Mameicillo, *Mez, l. c.* 241 (= *Badula Mameicillo*).—Venez.
multiflorus, *Mez, l. c.* 239.—Bolivia.
Pentlandii, *Mez, l. c.* 236.—Bolivia.
peruvianus, *Mez, l. c.* 238 (= *Ardisia peruviana*).—Peruv.
Pichinchae, *Mez, l. c.* 239.—Ecuador.
quindiensis, *Mez, l. c.* 234.—Ecuador; N. Granat.
serrulatus, *Mez, l. c.* 238 (= *Dicarpum serrulatum*).—N. Granat.
Sodiroanus, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 534.—Ecuador.
submembranaceus, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 237.—N. Granat.

GEISSOIS, Labill. (Saxifr.).
intermedia, *Vieill. ex Pampan. in Ann. di Bot. Roma*, ii. 57.—N. Caled.

GEISSORHIZA, Ker-Gawl. (Irid.).
Briartii, *Wildem. & Th. Dur. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 105.—Afr. trop.
macra, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1001.—Afr. trop.
pauciflora, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
Schlechteri, *Baker, l. c.* i. 863.—Afr. austr.

GENIOSPORUM, Wall. (Labiat.).
Baumii, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 359.—Afr. trop.
fissum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 263.—Afr. trop.

GENIOSTOMA, Forst. (Logan.).
avene, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xii. 23.—Arch. Mal.
caulocarpum, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 348.—N. Guin.
celebicum, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xii. 19.—Celebes.
glabrum, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 41.—Japon.
Miquelianum, *Koord. & Valet. ex Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xii. 22.—Java.
moluccanum, *Valet. l. c.* 19.—Amboina.
oblongifolium, *Koord. & Valet. ex Valet. l. c.* 20.—Java.
Weinlandii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 349.—N. Guin.

GENIPA, Tourn. (Rubiac.).
madagascariensis, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas*, t. 442 A.—Madag.

GENISTA, Linn. (Legum.).
Cazorlana, *Debeaux & Reverch. in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xv. (1905) 65.—Hispan.
Jimenezii, *Pau, ex Munuera, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 82; *et in Bol. Soc. Arag.* i. 28.—Hispan.

GENLISEA, A. St. Hil. (Lentib.).
hispidula, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 437.—Afr. trop. et austr.
roraimensis, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 66.—Guiana.

GENTIANA, Tourn. (Gentian.).
albescens, *Franch. ex Kusn. in Act. Hort. Petrop.* xv. 409.—China.
arenaria, Maxim. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxxv. 191 = Thomsoni.
bisetaea, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 445.—Am. bor.
callistantha, *Diels & Gilg, in Futterer, Durch Asien, Bot.* repr. 14.—Tibet.
Clarkei, *Kusn. in Act. Hort. Petrop.* xv. 419.—Ind. or.
Copelandi, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 53.—Calif.
dolichantha, *Gilg, in Torreya*, v. 109.—Bolivia.
Franchetiana, *Kusn. in Act. Hort. Petrop.* xv. 355.—China.
Futtereri, *Diels & Gilg, in Futterer, Durch Asien, Bot.* repr. 14.—Tibet.
Gormani, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 446.—Am. bor.
Holdereriana, *Diels & Gilg, in Futterer, Durch Asien, Bot.* repr. 17.—Tibet.
Kawakamii, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 67.—Japon.
Lawrencei, *Burkill, in Gard. Chron.* 1905, ii. 307.—Davuria.
Melvillei, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 143.—Burma.
monantha, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 244.—Am. bor.
Moseleyi, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* 1901, 396.—Am. bor.
nevadensis, *Solt. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 170.—Hispan.
occidentalis, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 53.—Am. bor.
Orfordii, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 446.—Am. bor.
perpusilla, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 181 (1904).—Mexic.
polyclada, *Diels & Gilg, in Futterer, Durch Asien, Bot.* repr. 16.—Tibet.
pontica, *Solt. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 169.—As. Min.
pseudohumilis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 16.—Japon.
Rostani, *Reuter, ex Kusn. in Act. Hort. Petrop.* xv. 475.—Eur.
stricta, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 445.—Am. bor.
strictiflora, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 26.—Am. bor.

GENTIANA:—
tirolensis, *Mazzetti, in Zeitschr. Ferdin. Tirol.* xlvi. 289.—Hybr.
tricolor, *Diels & Gilg, in Futterer, Durch. Asien, Bot.* repr. 15.—Tibet.
viridula, *Parish, in Coult. Bot. Gaz.* xxxviii. 461.—Calif.
vulgaris, *Keller, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1905, 316.—Eur.

GENTIANELLA, Moench = **Gentiana**, Tourn. (Gentian.).
Clementis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 631.—Am. bor.
quinquefolia, Small, Fl. S. E. U. S. 929 = G. quinqueflora.

GENYORCHIS, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxviii. (1905) 11, descr. *ORCHIDACEAE.*
micropetala, *Schlechter, l. c.* 13 (= *Bulbophyllum micropetalum*).—Afr. trop.
pumila, *Schlechter, l. c.* 12 (= *Bulbophyllum pumilum*).—Afr. trop.

GEONOMA, Willd. (Palm.).
Dammeri, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 409.—Bras.
Donnell-Smithii, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 32.—Am. cent.
yauaperyensis, *Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, 1902, 88.—Bras.

GEOPHILA, D. Don (Rubiac.).
humifusa, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 102.—Penins. Mal.
pilosa, *H. H. W. Pearson, in Hook. Ic. Pl.* t. 2691.—Malaya.
Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 104.—Penins. Mal.

GEOPRUMNON, Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S. 616 (1903). *LEGUMINOSAE.*
crassicarpum, *Rydb. l. c.* 616 (= *Astragalus crassicarpus*).—Am. bor.
mexicanum, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus mexicanus*).—Am. bor.
pachycarpum, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus pachycarpus*).—Am. bor.
plattense, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus plattensis*).—Am. bor.
succulentum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 658 (= *Astragalus succulentus*).—Am. bor.
tennesseense, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 615 (= *Astragalus tennesseensis*).—Am. bor.

GERANIUM, Tourn. (Geraniac.).
alpicola, *Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 92.—Am. cent.
andicola, *Loesen. l. c.* 93.—Am. cent.
batrachioides, Bub. Fl. Pyren. iii. 303 = pratense.
Brycei, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 120.—Afr. trop.
eginense, *Knuth, in Engl. Jahrb.* xxxii. 217.—Armen.
eriophorum, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 4.—China.
hakusanense, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 123.—Japon.
humifusum, *Knuth, in Engl. Jahrb.* xxxii. 211, nomen.—Afghan.
koreanum, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 433.—Corea.
Lavergneanum, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 4.—China.
linearilobum, *Knuth, in Engl. Jahrb.* xxxii. 214, nomen.—Afr. trop.
longipes, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 56.—Am. bor.
luganense, *Chenev. ex Schroet. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xiv. 121.—Hybr.
melanopotamicum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 254.—Patag.
multisectum, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 120.—Afr. trop.
nervosum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 31.—Am. bor.
orientale, *Freyn, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 18.—As. bor.
Pattersonii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 242.—Am. bor.
Shikokianum, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 123.—Japon.

GERANIUM:—
soboliferum, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 433.—As. or.
strigosum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 243.—Am. bor.

GERARDIA, Linn. (Scrophul.).
asperula, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1078.—Am. bor.
galvesiana, *Greene, Pittonia*, v. 138.—Am. bor.
Gattingeri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1078.—Am. bor.
georgiana, *Boynton, in Biltm. Bot. Studies*, i. 148.—Am. bor.
microphylla, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1077.—Am. bor.
viridis, *Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 838.—Am. bor.

GERBERA, Gronov. (Compos.).
Henryi, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 511.—China.

GERMANEA, Lam. = **Plectranthus**, L'Hérit. (Labiat.).
australis, J. Britten, Bot. Cook Voy. 75 = P. parviflorus.
elegantula, Briq. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 1005 = P. elegantulus.
grallata, Briq. l. c. 1004 = P. grallatus.
myriantha, Briq. l. c. 1001 = P. myrianthus.
pachystachya, Briq. l. c. 1003 = P. pachystachyus.
transvaalensis, Briq. l. c. 1005 = P. transvaalensis.

GESNERIA, Linn. (Gesner.).
[PENTARHAPHIA, Lindl. I. K.]
celsioides, *Urb. Symb. Antill.* ii. 377 (= *Pentarhaphia celsioides*).—Ind. occ.
clandestina, *Urb. l. c.* (= *Pentarhaphia clandestina*).—Ind. occ.
cymosa, *Urb. l. c.* 372.—Ind. occ.
depressa, *Urb. l. c.* 378 (= *Pentarhaphia depressa*).—Ind. occ.
duchartreoides, *Urb. l. c.* 375 (= *Pentarhaphia duchartreoides*).—Ind. occ.
ferruginea, *Urb. l. c.* 373 (= *Pentarhaphia ferruginea*).—Ind. occ.
glandulosa, *Urb. l. c.* (= *Pentarhaphia glandulosa*).—Ind. occ.
gloxinioides, *Urb. l. c.* 377 (= *Pentarhaphia gloxinioides*).—Ind. occ.
incurva, *Urb. l. c.* 374 (= *Pentarhaphia incurva*).—Ind. occ.
mimuloides, *Urb. l. c.* 377 (= *Pentarhaphia mimuloides*).—Ind. occ.
purpurascens, *Urb. l. c.* 380.—Ind. occ.
rupincola, *Urb. l. c.* 382 (= *Heppiella rupincola*).—Ind. occ.
Sintenisii, *Urb. l. c.* 375.—Ind. occ.
Wrightii, *Urb. l. c.* 373 (= *Pentarhaphia triflora*).—Ind. occ.

GEUM, Linn. (Rosac.).
albarracense, *Pau, ex Merino, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 600.—Hispan.
sikkimense, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 200.—Reg. Himal.

GHINIA, Bub. Fl. Pyren. iii. (1901) 158 = **Cardamine**, Tourn. (Crucif.).
alpina, Bub. l. c. 159 = C. alpina.
amara, Bub. l. c. 163 = C. amara.
hirsuta, Bub. l. c. 162 = C. hirsuta.
impatiens, Bub. l. c. 160 = C. impatiens.
pratensis, Bub. l. c. 163 = C. pratensis.
raphanifolia, Bub. l. c. 165 = C. latifolia.
resedifolia, Bub. l. c. 160 = C. resedifolia.
sylvatica, Bub. l. c. 161 = C. hirsuta.

GIGASIPHON, Drake, Hist. Pl. Madag. i. (1902) 85. *LEGUMINOSAE.*
Humblotianum, *Drake, l. c.* (= *Bauhinia Humblotiana*).—Madag.

GILIA, Ruiz & Pav. (Polemon.).
acerosa, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 761.—Am. bor.
candida, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 29.—Am. bor.
carnifolia, *Abrams, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 540.—Calif.
collina, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 445.—Calif.
Crandallii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 634.—Am. bor.
Davyi, *Millik. in Univ. Calif. Publ. Bot.* ii. 30.—Calif.

GILIA :—
Eastwoodae, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 126.—Calif.
exserta, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 65.—Am. bor.
Jaredii, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxviii. i. 489 (= *Navarretia Jaredii*).—Am. bor.
leptantha, *Parish, in Zoe*, v. 74 (1900).—Calif.
linearifolia, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 461.—Am. bor.
Merrillii, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 27.—Am. bor.
modesta, *H. M. Hall, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 389.—Am. bor.
ocellata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxviii. i. 489 (= *Navarretia ocellata*).—Am. bor.
pallida, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 43.—Calif.
patagonica, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 34.—Patag.
peduncularis, *Eastw. ex Millik. in Univ. Calif. Publ. Bot.* ii. 84.—Calif.
pedunculata, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 446.—Calif.
polyantha, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 634.—Am. bor.
Purpusi, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 181 (1904).—Mexic.
roseata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 633.—Am. bor.
sapphirina, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxviii. 71.—Calif.
scabra, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 166 (1903).—Calif.
scariosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 632.—Am. bor.
sparsiflora, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 291.—Am. bor.
spergulifolia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 633.—Am. bor.
subacaulis, *Rydb. l. c.* 1903, 261.—Am. bor.
Traskiae, *Eastw. ex Millik. in Univ. Calif. Publ. Bot.* ii. 26.—Calif.
Tweedyi, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 634.—Am. bor.
uncialis, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 107 (1901).—Calif.
violacea, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 56.—Calif.
Wilcoxii, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 27.—Am. bor.

GILIBERTIA, Ruiz & Pav. (Aral.).
trifida, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 91 (= *Acer trifidum*).—Japon.

GINANNIA, Bub. Fl. Pyren. iv. (1901) 321 = **Holcus**, Linn. (Gramin.).
mollis, Bub. l. c. 322 = H. mollis.
pubescens, Bub. l. c. 321 = H. lanatus.

GIRALDIELLA, Damm. in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. (1905) 20. *LILIACEAE.*
montana, *Damm. l. c.* 21.—China.

GIRARDINIA, Gaudich. (Urtic.).
marginata, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 123.—Afr. trop.

GLADIOLUS, Tourn. (Irid.).
affinis, *Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* t. 35.—Afr. trop.
Arnoldianus, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 27.—Afr. trop.
arvaticus, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 32.—Gallia.
Baumii, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 200.—Afr. trop.
brachylimbus, *Baker, in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zurich*, xlix. 178.—Afr. austr.
Conrathii, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1005.—Afr. austr.
cyclocarpus, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 32.—Gallia.
cymbarius, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 866.—Afr. austr.
densiflorus, *Baker, in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zurich*, xlix. 178.—Afr. austr.
Gawleri, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 36.—Oriens?
germanicus, *Jord. l. c.* 35.—Germania.
glaucus, *Heldr. ex Halacsy, Consp. Fl. Graec.* iii. 150.—Graecia.
Hanru, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 34.—Gallia.

GLADIOLUS :—
inconspicuus, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1005.—Afr. austr.
Junodi, *Baker, l. c.* i. 866.—Afr. austr.
karendensis, *Baker, l. c.* 867.—Afr. austr.
kubangensis, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 200.—Afr. trop.
Lannesii, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 35.—Gallia.
littoralis, *Jord. l. c.* 34.—Gallia.
longanus, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 201.—Afr. trop.
Mackinderi, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7860.—Afr. trop.
malangensis, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 867.—Afr. austr.
micranthus, *Baker, l. c.* iv. 1005.—Afr. austr.
microsiphon, *Baker, l. c.* 1006.—Afr. austr.
morrumbalaensis, *Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* i. 17.—Afr. trop.
narbonensis, Bub. Fl. Pyren. iv. 147 = illyricus.
numidicus, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 35.—Afr. bor.
porrigens, *Jord. l. c.* 33.—Gallia.
reductus, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1006.—Afr. austr.
remotifolius, *Baker, l. c.* i. 867.—Afr. austr.
rigescens, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 33.—Eur.
rigidifolius, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1006.—Afr. austr.
ruricola, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 33.—Gallia.
Schlechteri, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1006.—Afr. austr.
spectabilis, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
trichostachys, *Baker, l. c.* 1007.—Afr. austr.
Verdickii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 29.—Afr. trop.

GLAUCIDIUM, Sieb. & Zucc. (Ranunc.).
pinnatum, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 392.—China.

GLAUCIUM, Tourn. (Papav.).
fimbrilliferum, B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop. xxiii. 366 = fimbrilligerum.
pauciilobatum, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 566.—As. cent.

GLAUX, Tourn. (Primul.).
spicata, *Phil. ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 320.—Quid?

GLAZIOCHARIS, Taub. ex Warm. in Overs. Dansk. Vid. Selsk. Forh. 1901, 175. *BURMANNIACEAE.*
macahensis, *Taub. l. c.*—Bras.

GLEADOVIA, Gamble & Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxix. ii. (1901) 488. *OROBANCHACEAE.*
ruborum, *Gamble & Prain, l. c.* 489.—Ind. or.

GLEDITSCHIA, Clayton (Legum.).
texana, *Sargent, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 1.—Am. bor.

GLINUS, Linn. = **Mollugo**, Linn. (Ficoid.).
oppositifolius, Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 559 = M. oppositifolia.

GLIRICIDIA, H. B. & K. (Legum.).
lutea, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 687.—Venez.

GLOBBA, Linn. (Scitam.).
adhaerens, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 260.—Cochinch.
affinis, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 176.—Borneo.
albo-bracteata, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 152.—Sumatra.
Barthei, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 208.—Ins. Philipp.
bicolor, *Gagnep. l. c.* 210.—Cochinch.
brevifolia, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 145.—Ins. Philipp.
bulbosa, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 202.—China.
cambodgensis, *Gagnep. l. c.* 210.—Cochinch.
campsophylla, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 145.—Ins. Philipp.
chinensis, *K. Schum. l. c.* 153.—China.

GLOBBA :—
colpicola, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 149.—Siam.
ectobolos, *K. Schum. l. c.* 156.—Ins. Philipp.
globulifera, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 209.—Cochinch.
gracilis, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 145.—Ins. Philipp.
graminifolia, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. lxxii.—Cochinch.
heterobractea, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 159.—Ins. Philipp.
macranthera, K. Schum. l. c. 134 = macroclada.
macrocarpa, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 205.—Cochinch.
macroclada, *Gagnep. l. c.* l. 257.—Reg. Himal.
Merrillii, *Ridley, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 83.—Ins. Philipp.
parva, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 211.—Cochinch.
polyphylla, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 140.—Borneo.
pyramidata, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 204.—Cochinch.
rosea, *Gagnep. l. c.* 211.—Cochinch.
strigulosa, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 137.—China.
timorensis, *K. Schum. l. c.* 160.—Timor.
urophylla, *K. Schum. l. c.* 140.—Ins. Molucc.
ustulata, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 208.—Ins. Philipp.
villosula, *Gagnep. l. c.* l. 160.—Cochinch.
violacea, Gagnep. l. c. xlviii. 205 = adhaerens.
Zollingeri, *Gagnep. l. c.* 209.—Arch. Mal.

GLOBULARIA, Tourn. (Selag.).
hippiaefolia, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 16, nomen.—Hispan.

GLOCHIDION, Forst. (Euphorb.).
bicolor, *Hayata, in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xx. no. 3, 18 (= *Phyllanthus bicolor*).—Ind. or.; China.
diversifolium, *Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull.* i. 29 (= *Phyllanthus diversifolius*).—Malaya.
formosanum, *Hayata, in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xx. no. 3, 20.—Formosa.
lanceolatum, *Hayata, l. c.* 16.—Formosa.
magnificum, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 288.—N. Guin.
novo-guineense, *K. Schum. l. c.* 287.—N. Guin.
umbratile, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxx. 370.—Austral.

GLOMERA, Blume (Orchid.).
neo-hibernica, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 135.—Ins. Bismarck.
torricellensis, *Schlechter, l. c.* 136.—N. Guin.

GLOMEROPITCAIRNIA, Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. (1905) 232. *BROMELIACEAE.*
erectiflora, *Mez, l. c.* 233.—Venez.
penduliflora, *Mez, l. c.* 232 (= *Tillandsia penduliflora*).—Ind. occ.

GLORIOSA, Linn. (Liliac.).
Rothschildiana, *O'Brien, in Gard. Chron.* 1903, i. 322.—Afr. trop.

GLOSSONEMA, Decne. (Asclep.).
echinatum, *Hochst. ex Capua, in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 214.—Afr. trop.
Erlangeri, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 322.—Afr. trop.
Rivaei, *K. Schum. l. c.* 323.—Afr. trop.
torricellense, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 132.—N. Guin.

GLOSSORRHYNCHA, Ridl. (Orchid.).
elegantula, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 130.—N. Guin.
hamadryas, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
pilifera, *Schlechter, l. c.* 131.—N. Guin.
squamulosa, *Schlechter, l. c.* 132.—N. Guin.

GLOTTIDIUM, Desv. = **Sesbania**, Pers. (Legum.).
vesicarium, Harper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 472 = S. platycarpa.

GLUMICALYX, Hiern, in Hook. Ic. Pl. t. 2769 (1903). *SCROPHULARIACEAE.*
montanus, *Hiern, l. c.*—Afr. austr.

GLYCERIA, R. Br. (Gramin.).
latifolia, *J. S. Cotton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 573.—Am. bor.
leptorrhiza, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xx. 307.—As. bor.
Novae-Zealandiae, *Petrie, in Trans. & Proc. N. Zeal. Inst.* xxxiii. 329.—N. Zel.

GLYCINE, Linn. (Legum.).
Gilletii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 150.—Afr. trop.
kisantuensis, *Wildem. l. c.*—Afr. trop.
longipes, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 175.—Afr. trop.

GNAPHALIUM, Linn. (Compos.).
Altamiranum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 95.—Mexic.
chartaceum, *Greenm. l. c.*—Mexic.
crenatum, *Greenm. l. c.* 96.—Mexic.
Eggersii, *Urb. Symb. Antill.* iii. 410.—Ind. occ.
exilifolium, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 406.—Am. bor.
jaliscense, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 96.—Mexic.
Jelskii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 483.—Peruv.
krasense, *Derganc, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1904, 112.—Eur.
leptolepis, *Kuntze, Rev. Gen.* iii. II. 152 (= *Helichrysum leptolepis*).—Afr. austr.
Macounii, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xv. 278.—Am. bor.
monticola, *Phil. ex Reiche, Fl. Chile*, iv. 66.—Chili.
oaxacanum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 96.—Mexic.
oblanceolatum, *Greenm. l. c.* 97.—Mexic.
portoricense, *Urb. Symb. Antill.* iii. 409.—Ind. occ.
proximum, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xv. 279.—Am. bor.
pseudo-helichrysum, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 61.—Chili.
sericeo-albidum, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 501.—China.
stenolepis, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1015.—Afr. trop.

GNEPHOSIS, Cass. (Compos.).
exilis, *Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 24.—Austral.
gynotricha, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 613—Austral.
rotundifolia, *Diels, l. c.* 614.—Austral.

GNETUM, Linn. (Gnetac.).
oblongifolium, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 404.—Bras.
paraense, *Huber, l. c.* 403.—Bras.

GNIDIA, Linn. (Thymel.).
Baumiana, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 311.—Afr. trop.
Butayei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 170.—Afr. trop.
Goetzeana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 363.—Afr. trop.
parvula, *Dod, in Journ. Bot.* 1901, 401.—Afr. austr.
pleurocephala, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 310.—Afr. trop.
pulvinata, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 142.—Afr. austr.
Usafuae, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 363.—Afr. trop.

GOCHNATIA, H. B. & K. (Compos.).
arborescens, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 163 (1903).—Calif.

GODETIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
delicata, Abrams, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 539.—Calif.
Dudleyana, Abrams, Fl. Los Angeles, 267.—Calif.
rostrata, Eastw. ex A. A. Heller, Muhlenbergia, ii. 108, nomen.—Calif.

GODOYA, Ruiz & Pav. (Ochnac.).
scandens, *Fourn. ex Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xix. 58 (= *Fourniera scandens*).—Am. cent.

GOELDINIA, Huber, in Bol. Mus. Para. iii. (1902) 438. *LECYTHIDACEAE.*
ovatifolia, *Huber, l. c.*—Bras.
riparia, *Huber, l. c.* 439.—Bras.

GOLDMANIA, Rose, ex Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, xxxiv. (1903) 274. *LEGUMINOSAE.*
constricta, *Micheli & Rose, ex Micheli, l. c.*—Mexic.
platycarpa, *Rose, ex Micheli, l. c.*—Mexic.

GOMESA, R. Br. (Orchid.).
Glaziovii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 248.—Bras.
Theodorea, *Cogn. l. c.* 250 (= *Theodorea gomesoides*).—Bras.

GOMPHIA, Schreb. (Ochnac.).
amplectens, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 87.—Afr. trop.
Luschnathiana, *Steud. ex Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par.* Sér. VIII. xvi. 223.—Bras.
subcordata, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 88.—Afr. trop.

GOMPHOCARPUS, R. Br. (Asclep.).
Buchwaldii, *Schlechter & K. Schum. ex K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 326.—Afr. trop.
chlorojodius, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 333.—Afr. trop.
longissimus, *Gilg, l. c.* 332.—Afr. trop.
Schlechteri, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 325.—Afr. austr.
Stolzianus, *K. Schum. l. c.* 324.—Afr. trop.

GOMPHRENA, Linn. (Amarant.).
alba, *Farmar, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1090.—Austral.
aurea, *Lopr. ex Urb. in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 37; *et in Malpighia*, xiv. 454.—Bras.
chloromalla, *Lopr. l. c.* 36; *et l. c.* 456.—Bras.
eriocalyx, *Lopr. l. c.* 37; *et l. c.* 455.—Bras.
grisea, *Lopr. l. c.* 36; *et l. c.* 454.—Bras.
guaranitica, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 387.—Parag.
Hassleri, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 432.—Parag.
Michelii, *Farmar, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1090.—Austral.
paraguayensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 432.—Parag.
silenoides, *Chod. l. c.* iii. 388.—Parag.
sordida, *Farmar, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1091.—Austral.

GONATOPUS, Engl. (Arac.).
[ZAMIOCULCAS, Schott. I. K.]
angustus, *N. E. Br. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 778.—Afr. trop.

GONATOSTYLIS, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxix. (1906) 56. *ORCHIDACEAE.*
Vieillardii, *Schlechter, l. c.* xxxvi. (1905) 19; *et l. c.* 56 (= *Rhamphidia Vieillardi*).—N. Caled.

GONGROTHAMNUS, Steetz (Compos.).
aurantiacus, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 433.—Afr. trop.

GONIOSTACHYUM, Small, Fl. S. E. U. S. 1012 (1903). *VERBENACEAE.*
graveolens, *Small, l. c.* (= *Lippia graveolens*).—Am. bor.

GONIOTHALAMUS, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
Dielsianus,* *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 266.—N. Guin.
Elmeri, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 13.—Ins. Philipp.
obtusifolius, *Merrill, l. c.* xxxv. 9.—Ins. Philipp.
trunciflorus, *Merrill, l. c.* 10.—Ins. Philipp.

GONOCARYUM, Miq. (Icacin.).
fuscum, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 42.—Ins. Amboin.
fusiforme, *Hochr. l. c.*—Hab.?
melanocarpum, *Hochr. l. c.*—Hab.?
obovatum, *Hochr. l. c.* 43.—Hab.?

GONOLOBUS, Michx. (Asclep.).
calcicola, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 30.—Mexic.

GONZALEA, Pers. (Rubiac.).
bracteosa, *Donn. Sm. in Coult. Bot Gaz.* xxxiii. 252.—Am. cent.

GOODENIA, Sm. (Gooden.).
calogynoides, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 560.—Austral.

GOODENIA:—
decursiva, *Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 25.—Austral.
dimorpha, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxviii. 907.—Austral.
eremophila, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 558.—Austral.
Maideniana, *Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 25.—Austral.
nuda, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 562.—Austral.
Stirlingi, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xv. 492.—Austral.

GOODYERA, R. Br. (Orchid.).
angustifolia, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 92.—N. Guin.
brachiorhynchos, *Schlechter, l. c.* 93.—N. Guin.
Erimae, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
lanceolata, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 86.—Penins. Mal.
nebularum, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 45 (= *Cystorchis nebularum*).—China.
subregularis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 25 (= *Georchis subregularis*).—N. Caled.

GORMANIA, Britton, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1903) 29. *CRASSULACEAE.*
anomala, *Britton, ex Britton & Rose, l. c.* 30.—Calif.
Burnhami, *Britton, ex Britton & Rose, l. c.*—Calif.
debilis, *Britton, ex Britton & Rose, l. c.* (= *Sedum debile*).—Am. bor.
Eastwoodiae, *Rose, ex Britton & Rose, l. c.* 31.—Calif.
Hallii, *Britton, ex Britton & Rose, l. c.* 29.—Am. bor.
laxa, *Britton, ex Britton & Rose, l. c.*—Am. bor.
obtusata, *Britton, ex Britton & Rose, l. c.* (= *Sedum obtusatum*).—Calif.
oregana, *Britton, ex Britton & Rose, l. c.* 30 (= *Sedum oreganum*).—Calif.
retusa, *Rose, ex Britton & Rose, l. c.* 31.—Calif.
Watsoni, *Britton, ex Britton & Rose, l. c.* 29 (= *Cotyledon oregonensis*).—Am. bor.

GOSSYPIANTHUS, Hook. (Amarant.).
Sheldonii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 395.—Am. bor.

GOSSYPIUM, Linn. (Malvac.).
triphyllum, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1004 (= *Fugosia triphylla*).—Afr. trop.
versicolor, *Lignier & Bey, in Bull. Soc. Linn. Norm* Sér. V. viii. 256, nomen.—Guiana.

GOTHOFREDA, Vent. = **Oxypetalum**, R. Br. (Asclep.).
coccinea, Kuntze, Rev. Gen. iii. II. 199 = O. coccineum.

GRABOWSKIA, Schlecht. (Solan.).
Ameghinoi, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 48 (= *Lycium Ameghinoi*).—Patag.
megalosperma, *Speg. l. c.* 46.—Patag.

GRAMMADENIA, Benth. (Myrsin.).
alpina, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 231.—Venez.
asymmetrica, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 246.—Peruv.
costaricana, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 230 (= *Cybianthus costaricanus*).—Am. cent.
Lehmannii, *Mez, l. c.* 231.—N. Granat.
magna, *Mez, l. c.* 232.—N. Granat.
nitida, *Mez, l. c.*—Peruv.
pastensis, *Mez, l. c.*—N. Granat.
Sintenisii, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 425 (= *Ardisia Sintenisii*).—Ind. occ.

GRAMMATOPHYLLUM, Blume (Orchid.).
stapeliaeflorum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 487 (= *Cymbidium stapeliaeflorum*).—Malaya.

GRAMMOSCIADIUM, DC. = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbell.).
coloratum, Calest. in Martelli, Webbia, 186 = C. coloratum.
creticum, Calest. l. c. = C. creticum.
Heldreichii, Calest. l. c. = C. Heldreichii.

GRANGEA, Adans. (Compos.).
anthemoides, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 406.—Afr. trop.

GRAPHEPHORUM, Desv. (Gramin.).
Shearii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 602 (=*Trisetum Shearii*).—Am. bor.

GRATIOLA, Rupp. (Scrophul.).
genuflora, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto*, vii. 8.—Lusitan.
Torreyi, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1066.—Am. bor.

GRAVESIA, Naud. (Melast.).
heterophylla, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 574.—Madag.

GREENMANIA, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 597 (1901). *COMPOSITAE.*
boladorensis, *Hieron. l. c.*—N. Granat.

GREIGIA, Regel (Bromel.).
Sodiroana, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 619. —Ecuador.

GRENACHERIA, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. (1902) 292. *MYRSINACEAE.*
amentacea, *Mez, l. c.* 294 (=*Embelia amentacea*).—Penins. Mal.
Beccariana, *Mez, l. c.* 293.—Borneo.
bracteosa, *Mez, l. c.* 294 (=*Embelia bracteosa*).—Arch. Mal.
cinerascens, *Mez, l. c.* 292.—Borneo.
Lampani, *Mez, l. c.* 294 (=*Embelia Lampani*).—Sumatra.
Wallichiana, *Mez, l. c.* 293.—Penins. Mal.

GREVILLEA, R. Br. (Proteac.).
asteriscosa, *Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 151.—Austral.
brachyclada, *Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 30.—Austral.
ceratocarpa, *Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 157.—Austral.
excelsior, *Diels, l. c.* 151.—Austral.
inconspicua, *Diels, l. c.* 153.—Austral.
incrassata, *Diels, l. c.* 156.—Austral.
Jamesoniana, *Fitzger. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxvii. 243.—Austral.
oncogyne, *Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 149.—Austral.
phanerophlebia, *Diels, l. c.* 157.—Austral.
pimeleoides, *Fitzger. in Journ. Muell. Soc. W. Austral.* i. 37.—Austral.
Pritzelii, *Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 150.—Austral.
Purdieana, *Diels, l. c.* 154.—Austral.
stenophylla, *Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 30.—Austral.
uncinulata, *Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 152.—Austral.

GREWIA, Linn. (Tiliac.).
anemenoclada, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 301. —Afr. trop.
brevicaulis, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 295.—Afr. trop.
brunnea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 301.—Afr. trop.
calymmatosepala, *K. Schum. l. c.* 302.—Afr. trop.
ceramensis, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 30.—Ins. Ceram.
chaunothamnus, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 103.—Afr. trop.
chloophila, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 303.—Afr. trop.
corallocarpa, *K. Schum. l. c.* xxxiv. 320.—Afr. trop.
crinita, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 303.—Afr. trop.
Dehnhardtii, *K. Schum. l. c.* 304.—Afr. trop.
dependens, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
falcistipula, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 296.—Afr. trop.
gigantiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 305.—Afr. trop.
hydrophila, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 297.—Afr. trop.
kakothamnos, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 321.—Afr. trop.
latiunguiculata, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 102.—Afr. trop.
lasiodiscus, *K. Schum. l. c.* 100.—Afr. trop.
leucodiscus, *K. Schum. l. c.* 101.—Afr. trop.
lilacina, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 321.—Afr. trop.

GREWIA:—
maroana, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 568.—Madag.
nematopus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 319.—Afr. trop.
perennans, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 298.—Afr. trop.
philippinensis, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 103.—Ins. Philipp.
pinacostigma, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 298.—Afr. trop.
polyantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 305.—Afr. trop.
Rowlandii, *K. Schum. l. c.* 306.—Afr. trop.
salicifolia, *Lignier & Bry, in Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. V. viii. 266, nomen.—Madag.
stylocarpa, *Warb. ex Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 104.—Ins. Philipp.
suffruticosa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxii. 135.—Afr. trop.
tephrodermis, *K. Schum. l. c.* xxxiv. 320.—Afr. trop.
Urbaniana, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 315.—N. Guin.
Woodiana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 307.—Afr. trop.

GREWIOPSIS, Wildem. & Th. Dur. (Tiliac.).
Trillesiana, *Pierre, ex Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 57.—Afr. trop.

GRIELUM, Linn. (Rosac.).
cuneifolium, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 944.—Afr. austr.

GRIFFITHIELLA, Warm. in Danske Vid. Selsk. Skr. Ser. VI. xi. t. (1901) 12. *PODOSTEMACEAE.*
Hookeriana, *Warm. l. c.* 13 (=*Mniopsis Hookeriana*). —Ind. or.
Willisiana, *Warm. l. c.*—Ind. or.

GRINDELIA, Willd. (Compos.).
aphanactis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 647. —Am. bor.
serrulata, *Rydb. l. c.* 646.—Am. bor.

GRISEBACHIA, Klotzsch (Ericac.).
Pentheri, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 42.—Afr. austr.

GRISOLLEA, Baill. (Olacac.).
Thomassetii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2789.—Ins. Seychell.

GROSSERA, Pax, in Engl. Jahrb. xxxiii. (1903) 281. *EUPHORBIACEAE.*
major, *Pax, l. c.* 282.—Afr. trop.
paniculata, *Pax, l. c.* 281.—Afr. trop.

GRUMILEA, Gaertn. (Rubiac.).
[PSYCHOTRIA, Linn. I. K.]
chalconeura, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 371.—Afr. trop.
dolichantha, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 397.—N. Guin.
orientalis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 336.—Afr. trop.
sycophylla, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 370.—Afr. trop.
Weinlandii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 397.—N. Guin.

GRYPOCARPHA, Greenm. in Sargent, Trees & Shrubs, 145 (1903). *COMPOSITAE.*
Nelsonii, *Greenm. l. c.*—Mexic.

GUADUA, Kunth (Gramin.).
superba, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iv. 479.—Bras.
Weberbaueri, *Pilg. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 152. —Peruv.

GUADUELLA, Franch. (Gramin.).
[GUADELLA, Franch. I. K. S. i.].
densiflora, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 123.—Afr. trop.
Zenkeri, *Pilg. l. c.*—Afr. trop.

GUAREA, Allem. (Meliac.).
angustifolia, *C. DC. in Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 408.—Parag.
bullata, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 192. —Am. cent.
Caoba, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 421.—Am. cent.

GUAREA:—
costulata, *C. DC. in Bol. Mus. Para.* iii. 237.—Bras.
diversifolia, *C. DC. in Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 407.—Parag.
Donnell-Smithii, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 419.—Am. cent.
erythrocarpa, *C. DC. l. c.* 420.—Am. cent.
Guedesii, *C. DC. in Bol. Mus. Para.* iii. 239.—Bras.
Hassleri, *C. DC. in Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 408.—Parag.
microcarpa, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 420.—Am. cent.
odorata, *C. DC. in Bol. Mus. Para.* iii. 239.—Bras.
rhopalocarpa, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 191.—Am. cent.
ripicola, *C. DC. in Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 408.—Parag.
rubescens, *C. DC. l. c.* 407.—Parag.
silvicola, *C. DC. l. c.* 409.—Parag.
subsessiliflora, *C. DC. in Bol. Mus. Para.* iii. 238.—Bras.
Tuerckheimi, *C. DC. in Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 250.—Am. cent.
tuisana, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 421. —Am. cent.
xiroresana, *C. DC. l. c.* 418.—Am. cent.

GUATTERIA, Ruiz & Pav. (Anonac.).
alutacea, *Diels, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 126.—Peruv.
Blainii, *Urb. Symb. Antill.* iv. 239 (=*Asimina Blainii*).—Ind. occ.
caribaea, *Urb. l. c.* 240.—Ind. occ.
juruensis, *Diels, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 126.—Reg. Amaz.
megalophylla, *Diels, l. c.* 127.—Reg. Amaz.
pubescens, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 10, nomen.—Bras.
scytophylla, *Diels, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 127.—Reg. Amaz.

GUELDENSTAEDTIA, Fisch. (Legum.).
Harmsii, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 58.—China.
Henryi, *Ulbr. l. c.* 59.—China.

GUETTARDA, Linn. (Rubiac.).
glabrescens, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 19, nomen.—N. Caled.
Loeseneriana, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 395.—N. Guin.
ngoyensis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 19, nomen.—N. Caled.

GUILANDINA, Linn. = **Caesalpinia**, Linn. (Legum.).
Crista, Small, Fl. S. E. U. S. 591 = C. Crista.
major, Small, l. c.—Am. bor.

GUILIELMA, Mart. = **Bactris**, Jacq. (Palm.).
microcarpa, Huber, in Bol. Mus. Para. iv. 476.—Bras.

GUILLEMINEA, H. B. & K. (Amarant.).
gracilis, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 153.—Reg. Argent.

GUIOA, Cav. (Sapind.).
[CUPANIA, Linn. I. K.]
aptera, *Radlk. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 62.—Ins. Philipp.
lassothyrsa, *Radlk. l. c.* 63.—Ins. Philipp.
subapiculata, *Radlk. l. c.* 64.—Ins. Philipp.

GUIZOTIA, Cass. (Compos.).
scabra, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 184 (=*Veslingia scabra*).—Afr. trop.

GUNNERA, Linn. (Halorag.).
apiculata, *Schindl. in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 121.—Bolivia.
brasiliensis, *Schindl. l. c.* 125.—Bras.
Meziana, Schindl. in Engl. Jahrb. xxxiv. Beibl. lxxvii. 20 = strigosa.
pyramidalis, *Schindl. in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 119.—Ins. Juan Fernandez.
Reichei, *Schindl. l. c.* 114.—Chili.
rheifolia, *Schindl. l. c.* 121.—Peruv.
vestita, *Schindl. l. c.* 125.—Chili.
Wendlandii, *Reinke, ex Schindl. l. c.* 127, descr.—Am. cent.

GUNNIOPSIS, Pax (Ficoid.).
[AIZOON, Linn. I. K. S. i.]
intermedia, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 197.—Austral.

GURANIA, Cogn. (Cucurb.).
megistantha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 251.—Am. cent.
pedata, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 433.—N. Granat.
Tonduziana, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 112.—Am. cent.

GUSTAVIA, Linn. (Myrtac.).
microcarpa, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 164.—Reg. Amaz.
Ulei, *Pilg. l. c.*—Reg. Amaz.

GUTENBERGIA, Sch. Bip. (Compos.).
pembensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 339.—Afr. trop.

GUTIERREZIA, Lag. (Compos.).
argyrocarpa, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 35.—Mexic.
Brachyris, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 780 (= *Brachyris paniculata*).—Bras.; Patag.
linearis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 647.—Am. bor.
myriocephala, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 264.—Am. bor.
scoparia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 647.—Am. bor.

GUZMANIA, Ruiz & Pav. (Bromel.).
caulescens, *Mez & Sod. ex Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 112.—Ecuador.
columnaris, *Mez & Sod. ex Mez, l. c.* 113.—Ecuador.
condensata, *Mez & Werckl, ex Mez, l. c.* iii. 228.—Am. cent.
crateriflora, *Mez & Werckl, ex Mez, l. c.* v. 110.—Am. cent.
densiflora, *Mez, l. c.* iii. 226.—N. Granat.
Donnellsmithii, *Mez, ex Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. (1903) 9.—Am. cent.
elongata, *Mez & Sod. ex Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 115.—Ecuador.
insipida, *Mez & Sod. ex Mez, l. c.* 112.—Ecuador.
lana, *Mez & Sod. ex Mez, l. c.* 111.—Ecuador.
Michelii, *Mez, l. c.* iii. (1903) 226.—N. Granat.
nicaraguensis, *Mez & C. F. Baker, ex Mez, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 436.—Am. cent.
paniculata, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 116.—Peruv.
platysepala, *Mez & C. F. Baker, ex Mez, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 437.—Am. cent.
Sodiroana, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 114.—Ecuador.
strobilifera, *Mez & Werckl, ex Mez, l. c.* 110.—Am. cent.
Weberbaueri, *Mez, l. c.* 114.—Peruv.

GYMINDA, Sarg. (Celastr.).
[MYGINDA, Jacq. I. K. S. i.]
latifolia, *Urb. Symb. Antill.* v. 80 (= *Myginda latifolia*).—Ind. occ.

GYMNADENIA, R. Br. (Orchid.).
Aschersonii, *Bruegg. ex M. Schulze, in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xix. 118.—Hybr.
Chidori, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 47 (= *Habenaria Chidori*).—Japon.
Chodati, *Lendn. ex Schroet. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xiv. 116.—Hybr.
crassinervis, *Finet, in Rev. Gén. Bot.* xiii. 514.—China.
Faberi, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 62 (= *Habenaria Faberi*).—China.
hemipilioides, *Finet, in Rev. Gén. Bot.* xiii. 515.—China.
Mitostigma, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 70 (= *Mitostigma gracilis*).—Japon.
pseudo-diphylax, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 25.—China.
scabrilinguis, *Kraenzl. l. c.* 26.—China.
secundiflora, *Kraenzl. Orchid. Gen. et Sp.* i. 936 (= *Habenaria secundiflora*).—Ind. or.

GYMNADENIOPSIS, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 293 (1901). *ORCHIDACEAE.*
clavellata, *Rydb. l. c.* (= *Habenaria clavellata*).—Am. bor.

GYMNADENIOPSIS:—
integra, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 293 (= *Habenaria integra*).—Am. bor.
nivea, *Rydb. l. c.* (= *Habenaria nivea*).—Am. bor.

GYMNANDRA, Pall. = **Lagotis**, Gaertn. (Selag.).
Thomsoni, C. B. Clarke, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxxv. 194 = L. decumbens.

GYMNANTHES, Sw. (Euphorb.).
albicans, *Urb. Symb. Antill.* iii. 312 (= *Sebastiania albicans*).—Ind. occ.
recurva, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

GYMNEMA, R. Br. (Asclep.).
melananthum, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 344.—Afr. trop.
Schlechterianum, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 123.—Ins. Philipp.
suborbiculare, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 354.—N. Guin.

GYMNOLOMIA, H. B. & K. (Compos.).
auriculata, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 228 (1905).—Mexic.
Jelskii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 487.—Peruv.
nevadensis, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 271.—Am. bor.
Pittieri, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 101.—Am. cent.

GYMNOPODIUM, Rolfe, in Hook. Ic. Pl. t. 2699 (1901). *POLYGONACEAE.*
floribundum, *Rolfe, l. c.*—Am. cent.

GYMNOPOGON, Beauv. (Gramin.).
biflorus, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 139.—Bras.

GYMNOSIPHON, Blume (Burmann.).
capitatus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 439 (= *Ptychomeria capitata*).—Bras.
fimbriatus, *Urb. l. c.* 433 (= *Ptychomeria fimbriata*).—Bras.
Germaini, *Urb. l. c.* 444.—Ind. occ.
Glaziovii, *Urb. l. c.* 435.—Bras.
muticus, *Urb. l. c.* (= *Ptychomeria mutica*).—Bras.
niveus, *Urb. l. c.* 444 (= *Ptychomeria nivea*).—Ind. occ.
parviflorus, *Urb. l. c.* 443.—Ind. occ.
portoricensis, *Urb. l. c.* 445.—Ind. occ.
pusillus, *Urb. l. c.* 438.—Bras.
sphaerocarpus, *Urb. l. c.* 442.—Ind. occ.
suaveolens, *Urb. l. c.* 438 (= *Benitzia suaveolens*).—Venez.
tenellus, *Urb. l. c.* (= *Ptychomeria tenella*).—Bras.

GYMNOSPORIA, Benth. & Hook. f. (Celastr.).
angustifolia, *Bolus & Wolley-Dod, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xiv. 247 (= *Scytophyllum angustifolium*).—Afr. austr.
Baumii, *Loes. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 291.—Afr. trop.
buxifolioides, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxx. 344.—Afr. trop.
Dinteri, *Loes. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 823.—Afr. trop.
glauca, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxviii. 154 (= *Elaeodendron glaucum*, Szyszyl.).—Afr. austr.
Goetzeana, *Loes. l. c.* xxx. 344.—Afr. trop.
laurina, *Bolus & Wolley-Dod, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xiv. 247 (= *Celastrus laurinus*).—Afr. austr.
rhombifolia, *Bolus & Wolley-Dod, l. c.* (= *Celastrus rhombifolius*).—Afr. austr.
sikkimensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 198.—Reg. Himal.

GYMNOSTACHYUM, Nees (Acanth.).
longifolium, *T. Anders. ex Cooke, Fl. Bomb.* ii. 377.—Ind. or.

GYMNOSTEPHIUM, Less. (Compos.).
leve, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 138.—Afr. austr.

GYMNOSTERIS, Greene (Polemon.).
parvula, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 3 (= *Gilia parvula*).—Am. bor.

GYMNOURATELLA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 375 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
pendula, Van Tiegh. l. c. = O. pendula.

GYNANDRIRIS, Parl. = **Iris**, Tourn. (Irid.).
littorea, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 27.—Corsica.
monophylla, Jord. l. c.—Afr. bor.
numidica, Jord. l. c.—Afr. bor.

GYNERIUM, Humb. & Bonpl. (Gramin.).
pilosum, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 218.—Ins. Falkland.
rudiusculum, *Kuntze, ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 125 (= *Cortaderia rudiuscula*).—Reg. Argent.

GYNOGLOTTIS, J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Neerl. i. (1904) 49. *ORCHIDACEAE.*
cymbidioides, *J. J. Sm. l. c.* (= *Coelogyne cymbidioides*).—Sumatra.

GYNOPOGON, Forst. = **Alyxia**, Banks (Apocyn.).
flavescens, Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn. (1894) 261 = A. flavescens.
monilifera, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxvii. 58 = A. monilifera.
parvifolia, Merrill, l. c. xxix. 46.—Ins. Philipp.
pisiforme, Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn. (1894) 261 = A. pisiformis.
spicatum, J. Britten, Bot. Cook Voy. 60 = A. spicata.

GYNOSTEMMA, Blume (Cucurb.).
pentaphylla, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 179 (= *Vitis pentaphylla*).—Japon.

GYNOTROCHES, Blume (Rhizoph.).
parvifolia, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 46.—Ins. Philipp.

GYNOXYS, Cass. (Compos.).
calyculisolvens, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 504.—Peruv.
chagalensis, *Hieron. l. c.* xxviii. 630.—Ecuador.
columbiana, *Hieron. l. c.* 631 (= *Linbum columbianum*).—N. Granat.
cutervensis, *Hieron. l. c.* xxxvi. 506.—Peruv.
Jelskii, *Hieron. l. c.* 507.—Peruv.
Lehmannii, *Hieron. l. c.* xxviii. 629.—N. Granat.
Szyszylowiczii, *Hieron. l. c.* xxxvi. 505.—Peruv.

GYNURA, Cass. (Compos.).
elliptica, *Yabe & Hayata, ex Hayata, in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xviii. no. 8, 25.—Formosa.
japonica, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1904, 61 (= *Senecio japonicus*).—Japon.
pinnatifida, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 489.—China.
Proschii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vi. 8.—Afr. trop.
sinica, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 618.—China.

GYPSOPHILA, Linn. (Caryophyll.).
heteropoda, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 865.—As. cent.
macedonica, *Vandas, in Magyar Bot. Lap.* iv. 111.—Turcia.
modesta, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 62.—Persia.
planifolia, *H. Winkl. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1901) 1902, 48.—As. cent.
serbica, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* iv. 122.—Serbia.
Vaccaria, *Clarke, ex Towns. Fl. Hamp.* ed. II. 72 (= *Saponaria Vaccaria*).—Eur.; As. Min.; Sibir.

GYROSTACHYS, Pers. = **Spiranthes**, Rich. (Orchid.).
cernua, Shafer, in Ann. Carneg. Mus. i. 104.—Am. bor.
gracilis, Shafer, l. c.—Am. bor.
laciniata, Small, Fl. S. E. U. S. 316.—Am. bor.
linearis, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 300.—Am. bor.
ochroleuca, Rydb. l. c.—Am. bor.
stricta, Rydb. l. c. 299.—Am. bor.
xyridifolia, Small, Fl. S. E. U. S. 318.—Am. bor.

GYROSTEMON, Desf. (Phytolacc.).
oligogynus, F. Muell. ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. 196 = ramulosus.
Sheathii, *Fitzg. in Journ. Muell. Soc. W. Austral.* i. no. 11, 81.—Austral.
subnudus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 195 (= *Amperea subnuda*).—Austral.
vimineus, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 30.—Austral.

H

HABENARIA, Willd. (Orchid.).
aggregata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 628.—Am. bor.
amplifolia, *Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 296.—Ins. Cook.
Andrewsii, *White, in Niles, Bog-Trott. Orch.* 258.—Hybr.
Busseana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 54.—Afr. trop.
celebica, *Kraenzl. Orchid. Gen. et Sp.* i. 902.—Celebes.
chloroceras, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 89.—Peruv.
chloroleuca, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 77.—N. Guin.
dactylostigma, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxx. 281.—Afr. trop.
Delavayi, *Finet, in Rev. Gén. Bot.* xiii. 527.—China.
dracaenifolia, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 77.—N. Guin.
Elisabethae, *Duthie, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 44; *et in Collett, Fl. Siml.* 505.—Reg. Himal.
epiphylla, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 78.—N. Guin.
Fargesii, *Finet, in Rev. Gén. Bot.* xiii. 528.—China.
fragrans, *Niles, Bog-Trott. Orch.* 253.—Am. bor.
galipanensis, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 88.—Venez.
Habenaria, *Small, Fl. S. E. U. S.* 316 (= *Orchis Habenaria*).—Am. bor.
Hassleriana, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 929, nomen.—Parag.
Haullevilleana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 172.—Afr. trop.
holotrixis, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 204.—Afr. trop.
Kitondo, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 23.—Afr. trop.
kubangensis, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 205.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 325.—Afr. trop.
macroplectron, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 206.—Afr. trop.
magnifica, *Fritsch, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 1112.—Afr. trop.
media, *Niles, Bog-Trott. Orch.* 252.—Am. bor.
microgymnadenia, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 23.—China.
monophylla, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 206.—Afr. trop.
multiflora, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 45 (= *Piperia multiflora*).—Am. bor.
myriantha, *Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berl.* iii. (1903) 237.—Afr. or. trop.
narcissiflora, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxx. 282.—Afr. trop.
Novae-Hiberniae, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 79.—Ins. Bismarck.
Nuttallii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 315.—Am. bor.
oblongifolia, *Niles, Bog-Trott. Orch.* 250.—Am. bor.
oreophila, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 76.—Mexic.
parvipetala, *J. J. Sm. Orchid. Java*. 41.—Java.
paulensis, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 150.—Bras.
pentaglossa, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 55.—Afr. trop.
perfoliata, *Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 942.—Afr. austr. or.
Pilgeri, *Schlechter, in Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 149.—Bras.
polyschista, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 80.—N. Guin.
Rautaneni, *Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1008.—Afr. trop.
Rautaneniana, *Kraenzl. l. c.* ii. 941.—Afr. trop.
rhopaloceras, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 207.—Afr. trop.
roraimensis, *Rolfe, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 65.—Guian.
Sanbornei, Ames, in Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem. vii. 51, sphalm. = seq.

HABENARIA:—
Sanbornii, *Ames, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvi. 117.—Ind. occ.; Am. cent.
shensiana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 24.—China.
Simpsonii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 315.—Am. bor.
Spegazziniana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 10.—Reg. Argent.
stenoloba, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 1.—Afr. trop.
stenorhynchus, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 55.—Afr. trop.
stereophylla, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 950; *Engl. Jahrb.* xxx. 280.—Afr. trop.
torricellensis, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 80.—N. Guin.
tosariensis, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 43.—Java.
trachychila, *Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1007.—Afr. austr.
trachypetala, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxx. 281.—Afr. trop.
turmerensis, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 89.—Venez.
Wackettii, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 150.—Bras.
yomensis, *Gage, in Rec. Bot. Surv. India*, iii. 105.—Burma.
yunnanensis, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 61.—China.

HABENELLA, Small, Fl. S. E. U. S. 316 (1903). *ORCHIDACEAE*.
Garberi, *Small, l. c.* (= *Habenaria Garberi*).—Am. bor.

HABERLEA, Frivald. (Gesner.).
Ferdinandi-Coburgii, *Urumoff, in Period. Spisan.* lxiii. (1902); *cf. Bot. Centralbl.* xcii. (1903) 207.—Eur.

HAEMANTHUS, Tourn. (Amaryll.).
Arnoldianus, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 30.—Afr. trop.
congolensis, *Wildem. in Journ. Soc. Nat. Hortic. Fr.* 1902, 292.—Afr. trop.
Demeusei, *Wildem. l. c.* 291.—Afr. trop.
diadema, *Linden, ex Wildem. l. c.* 294.—Afr. trop.
fascinator, *Linden, ex Wildem. l. c.* 288.—Afr. trop.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 276.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. in Journ. Soc. Nat. Hortic. Fr.* 1902, 289; *Ann. Soc. Sci. Brux.* xxvii. (1903) ii. 110.—Afr. trop.
Lescrauwaetii, *Wildem. in Gard. Chron.* 1904, i. 274.—Afr. trop.
longitubus, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 114.—Afr. trop.
Radcliffei, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 223.—Afr. trop.

HAEMATOSTAPHIS, Hook. f. (Anacard.).
Pierreana, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 219.—Afr. trop.

HAKEA, Schrad. (Proteac.).
arida, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 162.—Austral.
dolichostyla, *Diels, l. c.* 166.—Austral.
polyanthema, *Diels, l. c.* 161.—Austral.
Pritzelii, *Diels, l. c.* 163.—Austral.

HALACSYA, Doerfl. Sched. Cent. xliv. vol. ii. 108; et in Allg. Bot. Zeitschr. 1903, 47. *BORAGINACEAE*.
Sendtneri, *Doerfl. ll. cc.* (= *Zwackhia aurea*).—Eur.

HALANTHIUM, C. Koch (Chenopod.).
Lipskii, *Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 203.—As. cent.

HALENIA, Borckh. (Gentian.).
chlorantha, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 240.—Mexic.

HALGANIA, Gaudich. (Borag.).
argyrophylla, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 491.—Austral.

HALIMIUM, Willk. (Cistac.).
[HELIANTHEMUM, Tourn. I. K.]
alyssoides, *Gross. in Engl. Pflanzenreich, Cistac.* 37 (= *Hel. alyssoides*).—Eur.
arenicola, *Gross. l. c.* 49 (= *Hel. arenicola*).—Am. bor.
argenteum, *Gross. l. c.* 47 (= *Hel. argenteum*).—Mexic.

HALIMIUM:—
brasiliense, *Gross. in Engl. Pflanzenreich, Cistac.* 45 (= *Hel. brasiliense*).—Am. austr.
canadense, *Gross. l. c.* 51 (= *Hel. canadense*).—Am. bor.
carolinianum, *Gross. l. c.* 44 (= *Hel. carolinianum*).—Am. bor.
chihuahuense, *Gross. l. c.* 45 (= *Hel. chihuahuense*).—Mexic.
corymbosum, *Gross. l. c.* 50 (= *Hel. corymbosum*).—Am. bor.
Coulteri, *Gross. l. c.* 46 (= *Hel. Coulteri*).—Mexic.
georgianum, *Gross. l. c.* 51 (= *Hel. georgianum*).—Am. bor.
glomeratum, *Gross. l. c.* 47 (= *Hel. glomeratum*).—Mexic.
majus, *Gross. l. c.* 50 (= *Hel. majus*).—Am. bor.
Nashii, *Gross. l. c.* 49 (= *Hel. Nashii*).—Am. bor.
patens, *Gross. l. c.* 46 (= *Hel. patens*).—Mexic.
Pringlei, *Gross. ex Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. (1903) 214; *Engl. Pflanzenreich, Cistac.* 46 (= *Hel. Pringlei*).—Mexic.
rosmarinifolium, *Gross. in Engl. Pflanzenreich, Cistac.* 49 (= *Hel. rosmarinifolium*).—Am. bor.
scoparium, *Gross. l. c.* 35 (= *Hel. scoparium*).—Calif.
spartioides, *Gross. l. c.* (= *Hel. spartioides*).—Chili.

HALOPEGIA, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. (1902) 49. *SCITAMINEAE*.
azurea, *K. Schum. l. c.* 50 (= *Donax azurea*).—Afr. trop.
Blumei, *K. Schum. l. c.* 51 (= *Clinogyne Blumei*).—Java.
Cadelliana, *K. Schum. l. c.* (= *Phrynium Cadellianum*).—Ind. or.
macrostachya, *K. Schum. l. c.* 50 (= *Phrynium macrostachyum*).—Ind. or.

HALOPHILA, Thou. (Hydroch.).
Aschersonii, *Ostenf. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 239.—Ind. occ.
decipiens, *Ostenf. l. c.* 260.—Malaya.

HALOPHYTUM, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. (1902) 152. *CHENOPODIACEAE*.
Ameghinoi, *Speg. l. c.* 153 (= *Tetragonia Ameghinoi*).—Patag.

HALORAGIS, Forst. (Halorag.).
aenea, *Schindl. in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 34.—Austral.
breviloba, *Schindl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxvii. 5, nomen; *et in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 56.—Austral.
Brownii, *Schindl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxvii. 5; *et in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 64 (= *Meionectes Brownii*).—Austral.
coronopifolia, *Schindl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxvii. 62, nomen; *et in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 56.—Austral.
diffusa, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 447.—Austral.
erecta, *Eichl. Bluethendiagr.* ii. (1878) 463 (= *Cercodia erecta*).—Am. austr.; N. Zel.
laevis, *Schindl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxvii. 31, nomen; *et in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 51.—Austral.
longifolia, *Schindl. l. c.* 57, nomen; *et l. c.* 35.—Austral.
Meziana, *Schindl. l. c.* 30, nomen; *et l. c.* 29.—Austral.
pedicellata, *Schindl. l. c.* 31, nomen; *et l. c.* 51.—Austral.
podantha, *Schindl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxvii. 40, nomen.—Hab.?
Roei, *Schindl. l. c.* 46, nomen.—Austral.
rubra, *Schindl. l. c.* 30, nomen; *et in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 30.—Austral.
tenuis, *Schindl. in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 27.—Austral.
veronicifolia, *Schindl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxix. 44, nomen; *et in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 35.—Austral.
villosa, *Schindl. in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 31.—Austral.
viridis, *Schindl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxix. 44, nomen; *et in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 46.—Austral.

HALOXYLON, Bunge (Chenopod.).
tamariscifolium, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 71 (= *Anabasis tamariscifolius*).—Hispan.

HAMADRYAS, Comm. (Ranunc.).
Delphinium, Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. viii. 412, sphalm. = Delfini.
sempervivoides, *Sprague, in Hook. Ic. Pl.* t. 2748.—Patag.

HAMOSA, Medic. = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).
austrina, Small, Fl. S. E. U. S. 618.—Am. bor.
leptocarpa, Rydb. in Small, l. c. 617 = A. leptocarpus.
Lindheimeri, Rydb. in Small, l. c. = A. Lindheimeri.
macilenta, Small, l. c. 618.—Am. bor.
Nuttalliana, Rydb. in Small, l. c. 617 = A. Nuttallianus.
scaposa, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 659 = A. scaposus.

HANCOCKIA, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 20 (1903). *ORCHIDACEAE.*
uniflora, *Rolfe, l. c.*—China.

HANCORNIA, Gomez (Apocyn.).
Amapa, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 443; iv. 404.—Bras.

HANNOA, Planch. (Simarub.).
chlorantha, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 270.—Afr. trop.
ferruginea, *Engl. Jahrb.* xxxii. 122.—Afr. trop.

HAPLOCHILUS, Endl. = **Zeuxine**, Lindl. (Orchid.).
viridiflorum, J. J. Sm. in Ic. Bogor. t. 105 B.—Celebes.

HAPLOCHOREMA, K. Schum. (Zingib.).
oligospermum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 90 (= *Kaempferia oligosperma*).—Borneo.
petiolatum, *K. Schum. l. c.*—Borneo.

HAPLOPHYLLUM, Reichb. = APLOPHYLLUM, A. Juss. = **Ruta**, Linn. (Rutac.).
balcanicum, Vandas, in Magyar Bot. Lap. iv. 264.—Turcia.
brevipilum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 37.—Turkestan.
sublanatum, Freyn, l. c. 36.—Turkestan.
vanense, Freyn, l. c. i. 262.—Oriens.

HARMALA, Tourn. = **Peganum**, Linn. (Rutac.).
syriaca, Bub. Fl. Pyren. iii. 354 = P. Harmala.

HARMSIA, K. Schum. (Stercul.).
emarginata, *Schinz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1006.—Afr. trop.
microblastos, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 308.—Afr. trop.

HARMSIELLA, Briq. = **Chartocalyx**, Regel (Labiat.).
Olgae, K. Schum. in Just, Jahresb. xxviii. I. 484 = C. Olgae.

HARMSIOPANAX, Warb. (Aral.).
[Horsfieldia, Bl. I. K.]
aculeata, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxviii. I. 430 (= *Horsfieldia aculeata*).—Java.
Harmsii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 329.—N. Guin.

HARPALYCE, Moç. & Sessé (Legum.).
Goldmani, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 313.—Mexic.
mexicana, *Rose, l. c.* 42.—Mexic.
Pringlei, *Rose, l. c.*—Mexic.
retusa, *Rose, l. c.* 43 (= *Brongniartia retusa*).—Mexic.

HARPERIA, Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. i. (1904) 34. *RESTIACEAE.*
lateriflora, *Fitzg. l. c.* 35.—Austral.

HARPERIA, Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xxix. (1905) 441. *UMBELLIFERAE.*
nodosa, *Rose, l. c.*—Am. bor.

HARPULLIA, Roxb. (Sapind.).
Weinlandii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 310.—N. Guin.

HARRIMANELLA, Coville, in Proc. Wash. Acad. Sci. iii. (1901) 569. *ERICACEAE.*
hypnoides, *Coville, l. c.* 575 (= *Cassiope hypnoides*).—Reg. arct. et subarct.
Stelleriana, *Coville, l. c.* 570, 574 (= *Cassiope Stelleriana*).—Reg. arct. et subarct.

HARTIA, Dunn, in Hook. Ic. Pl. t. 2727 (1902). *TERNSTROEMIACEAE.*
sinensis, *Dunn, l. c.*—China.

HARTMANNIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
Berlandieri, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 328 = O. Delessertiana.
cuprea, Rose, l. c. = O. cuprea.
dissecta, Rose, l. c. = O. dissecta.
Havardii, Rose, l. c. = O. Havardi.
latiflora, Rose, l. c. 329 = O. latiflora.
montana, Rose, l. c.—Mexic.
Palmeri, Rose, l. c.—Mexic.
Reverchoni, Rose, l. c.—Am. bor.

HARVEYA, Hook. (Scrophul.).
Bodkini, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 410.—Afr. austr.
Huttoni, *Hiern, l. c.*—Afr. austr.
macrantha, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 369.—Afr. trop.
pauciflora, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 408 (= *Aulaya pauciflora*).—Afr. austr.
Randii, *Hiern, in Journ. Bot.* 1903, 197.—Afr. austr.
stenosiphon, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 406.—Afr. austr.
sulphurea, *Hiern, l. c.* 405.—Afr. austr.
vestita, *Hiern, l. c.* 406.—Afr. austr.

HASSEANTHUS, Rose, ex Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1903) 37. *CRASSULACEAE.*
Blochmanae, *Rose, l. c.* (= *Sedum Blochmanae*).—Calif.
elongatus, *Rose, l. c.*—Calif.
multicaulis, *Rose, l. c.* 38.—Calif.
variegatus, *Rose, l. c.* 37 (= *Sedum variegatum*).—Calif.

HASSELTIA, H. B. & K. (Tiliac.).
peruviana, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 160.—Peruv.

HASSLEROPSIS, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 285 (1904). *SCROPHULARIACEAE.*
spinosa, *Chod. l. c.*—Parag.

HAVARDIA, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. ii. (1901) 91. *LEGUMINOSAE.*
brevifolia, *Small, l. c.* vi. 92 (= *Pithecolobium brevifolium*).—Am. bor.

HAWORTHIA, Duval (Liliac.).
subspicata, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 998.—Afr. austr.

HAYLOCKIA, Herb. (Amaryll.).
andina, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 160.—Reg. Argent.

HEBENSTREITIA, Linn. (Selag.).
Cooperi, *Rolfe, in Dyer, Fl. Cap.* v. 100.—Afr. austr.
Dregei, *Rolfe, l. c.* 109 (= *Polycenia fruticosa*).—Afr. austr.
elongata, *Bolus, ex Rolfe, l. c.* 99.—Afr. austr.
fenestrata, *Rolfe, l. c.* 109 (= *Polycenia fenestrata*).—Afr. austr.
lanceolata, *Rolfe, l. c.* (= *Polycenia lanceolata*).—Afr. austr.
minutiflora, *Rolfe, l. c.* 105.—Afr. austr.
polystachya, *Rolfe, l. c.* 98.—Afr. austr.
pubescens, *Rolfe, l. c.* 107.—Afr. austr.
Rehmannl, *Rolfe, l. c.* 103.—Afr. austr.
sarcocarpa, *Bolus, ex Rolfe, l. c.* 107.—Afr. austr.
Sutherlandi, *Rolfe, l. c.* 99.—Afr. austr.
Watsoni, *Rolfe, l. c.* 103.—Afr. austr.

HEBERDENIA, Banks (Myrsin.).
[Myrsine, Linn. I. K.]
penduliflora, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 159 (= *Myrsine penduliflora*).—Mexic.

HECHTIA, Klotzsch (Bromel.).
Liebmannii, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 6.—Mexic.
myriantha, *Mez, l. c.*—Mexic.
tehuacana, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 265.—Mexic.

HECKELIA, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 261. *MENISPERMACEAE.*
Nymanii, *K. Schum. l. c.*—N. Guin.

HEDEOMA, Pers. (Labiat.).
lata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1040.—Am. bor.
oblongifolia, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 4.—Am. bor.
ovata, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 245.—Am. bor.
scutellarioides, *Briq. in Engl. & Prantl, Pflanzenf.* iv. III A. 294 (= *Keithia scutellarioides*).—Bras.

HEDYCARYA, Forst. (Monim.).
denticulata, *Perk. & Gilg, in Engl. Pflanzenreich, Monim.* 19.—Ins. Pacif.

HEDYCHIUM, Koen. (Scitam.).
Bousigonianum, *Pierre, ex Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 457.—Cochinch.
erythrostemon, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 47.—Celebes.
oblongum, *K. Schum. l. c.* 48.—Java.
philippinense, *K. Schum. l. c.* 47.—Ins. Philipp.
tenuiflorum, *K. Schum. l. c.* 51.—Reg. Himal.

HEDYOTIS, Linn. (Rubiac.).
flexuosa, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxv. 15.—Penins. Mal.
Havilandi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 164.—Malaya.
Kunstleri, *King, l. c.* 162.—Penins. Mal.
peduncularis, *King, l. c.* 161.—Penins. Mal.
Prainiana, *King, l. c.* 158.—Penins. Mal.

HEDYSARUM, Tourn. (Legum.).
albiflorum, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xix. 252.—Am. bor.
ancyrense, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 265.—Oriens.
auriculatum, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 205.—Am. bor.
bucharicum, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xix. 322.—Oriens.
iomuticum, *B. Fedtsch. l. c.* 246.—Oriens.
Krassnowi, *B. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 916.—Turkestan.
minussinense, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xix. 292.—As. bor.
pabulare, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xv. 185.—Am. bor.
philoscia, *A. Nelson, l. c.*—Am. bor.
pumilum, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xix. 309.—As. bor.
truncatum, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 205.—Am. bor.
ucrainicum, *Kaschm. in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 59.—Rossia.
utahense, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xv. 186.—Am. bor.
viciaefolium, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 266.—Oriens.

HEERIA, Meisn. (Anacard.).
[Anaphrenium, E. Mey. I. K.]
argyrochrysea, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 286.—Afr. trop.
Dekindtiana, *Engl. Jahrb.* xxxii. 132.—Afr. trop.
Dinteri, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 822.—Afr. trop.
longipes, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 287.—Afr. trop.
namaensis, *Schinz & Dinter, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 823.—Afr. austr.
stenophylla, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 287.—Afr. trop.
xylophylla, *Engl. & Gilg, l. c.* 285.—Afr. trop.

HEINSENIA, K. Schum. (Rubiac.).
Lujae, *Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* i. 9.—Afr. trop.

HEISTERIA, Jacq. (Olac.).
lucida, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 98, nomen.—Bras.
minor, *Glaz. l. c.*, nomen.—Bras.
stereoneura, *Pierre, ex Glaz. l. c.*, nomen.—Bras.

HELENIUM, Linn. (Compos.).
badium, *Greene, Pittonia*, v. 55.—Am. bor.
campestre, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1291.—Am. bor.

HELENIUM:—
Helenium, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1292 (= *Leptopoda Helenium*).—Am. bor.
incisum, *Small, l. c.* (= *Leptopoda incisa*).—Am. bor.
integrifolium, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 811 (= *Leptopoda integrifolia*).—Am. bor.
polyphyllum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1291.—Am. bor.

HELIANTHELLA, Torr. & Gray (Compos.).
Cannonae, *Eastw. in Zoe*, v. 82 (1900).—Calif.
Covillei, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 273.—Am. bor.
iostephanoides, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 41.—Mexic.
majuscula, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 148.—Am. bor.

HELIANTHEMUM, Tourn. (Cistac.).
alpestre, Bub. Fl. Pyren. iii. 136 = oelandicum.
brachypodum, *L. Chevall, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 767.—Alger.
canum, *Gross. in Engl. Pflanzenreich, Cistac.* 112 (= *Cistus canus*).—Reg. Medit.
erectum, Bub. Fl. Pyren. iii. 189 = lavandulaefolium.
graecum, Herb. Link, ex Gross. in Engl. Pflanzenreich, Cistac. 63 = lavandulaefolium.
mendocinense, Eastw. ex Gross. l. c. 85 = Halimium occidentale.
nummularium, *Gross. in Engl. Pflanzenreich, Cistac.* 109 (= *Cistus nummularius*).—Reg. Medit.
ruficomum, *Gross. l. c.* 64 (= *Cistus ruficomus*).—Reg. Medit.
Schweinfurthii, *Gross. l. c.* 95.—Arab.
Strickeri, *Gross. l. c.* 92.—Cilicia.
thymifolium, Bub. Fl. Pyren. iii. 135 = glutinosum.
thyrsoideum, *Barnhart, in Small, Fl. S. E. U. S.* 797.—Am. bor.
viscarioides, *Deb. & Reverch. in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xv. (1905) 31.—Hispan.

HELIANTHUS, Linn. (Compos.).
ambiguus, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 993.—Am. bor.
aridus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 127.—Am. bor.
carnosus, *Small, in Torreya*, ii. 75.—Am. bor.
Dalyi, *Britton, in Journ. N. York Bot. Gard.* ii. 89.—Am. bor.
Eggertii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1267.—Am. bor.
elongatus, *Small, l. c.* 1266.—Am. bor.
fascicularis, *Greene, Pl. Baker.* iii. 28.—Am. bor.
filiformis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1265.—Am. bor.
illinoensis, *Gleason, in Ohio Naturalist*, v. 214.—Am. bor.
Jelskii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 490.—Peruv.
Kellermani, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 994; *et in Ohio Nat.* ii. 181.—Am. bor.
oaxacanus, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 107.—Mexic.
resinosus, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1269.—Am. bor.
Rydbergi, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 993.—Am. bor.
saxicola, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1268.—Am. bor.
scrophulariifolius, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 995.—Am. bor.
subrhomboideus, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 992.—Am. bor.
Szyszylowiczii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 491.—Peruv.
utahensis, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 405.—Am. bor.

HELICHRYSUM, Vaill. (Compos.).
abietinum, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 429.—Afr. trop.
achyroclinoides, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 332.—Afr. trop.
albo-brunneum, *S. Moore, l. c.* 334.—Afr. trop.
Antunesii, *Volkens & O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 149.—Afr. trop.
Boormanii, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxx. 366.—Austral.
campanerum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 399.—Afr. austr.
Ceres, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 337.—Afr. trop.
congolanum, *Schlechter & O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 413.—Afr. trop.
Davyi, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 169.—Afr. austr.
Dinteri, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1016.—Afr. trop.

HELICHRYSUM:—
Elliotii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 335.—Afr. trop.
Fleckii, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1017.—Afr. trop.
galbanum, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 169.—Afr. trop.
Goetzeanum, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 428.—Afr. trop.
Gregorii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 335.—Afr. trop.
inodorum, *Fiori, in Fiori & Paol. Fl. Ital.* iii. 280; *Ic. Fl. Ital.* 431.—Ital.
lepidissimum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 399.—Afr. austr.
nandense, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 333.—Afr. trop.
panduratum, *O. Hoffm. ex Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 827.—Afr. trop.
plantaginifolium, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1901, 123.—Afr. trop.
Randii, *S. Moore in Journ. Bot.* 1903, 132.—Afr. austr.
ruwenzoriense, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 338.—Afr. trop.
Saweri, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 170.—Afr. trop.
scleranthoides, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1016.—Afr. trop.
Taylorii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 336.—Afr. trop.
tillandsiifolium, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 429.—Afr. trop.
turbinatum, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 23.—Austral.

HELICIA, Lour. (Proteac.).
Cribbiana, *Bailey, Queensl. Fl.* 1327.—Austral.
Heyana, *Bailey, l. c.* 1329.—Austral.
Nortoniana, *Bailey, l. c.* 1328.—Austral.
Schlechteri, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 256.—N. Guin.
torricelliensis, *Lauterb. l. c.* 257.—N. Guin.

HELICONIA, Linn. (Scitam.).
borinquena, *Griggs, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 658.—Am. cent.
Champneiana, *Griggs, l. c.* 657.—Am. cent.
Collinsiana, *Griggs, l. c.* 648.—Am. cent.
crassa, *Griggs, l. c.* 646.—Am. cent.
distans, *Griggs, l. c.* 657.—Ind. occ.!
Edwardus Rex, *Hort. Sand. in Gard. Chron.* 1903, i. 245.—N. Guin.
elongata, *Griggs, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 653.—Am. cent.
librata, *Griggs, l. c.* 649.—Am. cent.
purpurea, *Griggs, l. c.* 656.—Ind. occ.!
rutila, *Griggs, l. c.* 657.—Ind. occ.!
spissa, *Griggs, l. c.* 652.—Am. cent.
tortuosa, *Griggs, l. c.* 650.—Am. cent.

HELICTERES, Pluk. (Stercul.).
spiralis, *Northrop, in Mem. Torr. Bot. Club.* xii. 50.—Ind. occ.

HELIETTA, Tul. (Rutac.).
cuspidata, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1285 (= *Esenbeckia cuspidata*).—Parag.

HELIOCARPUS, Linn. (Tiliac.).
Donnellsmithii, *Rose, ex Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 110.—Am. cent.
glaber, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 209 (1905).—Mexic.
laevis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 317.—Mexic.
microcarpus, *Rose, l. c.* 316.—Mexic.
velutinus, *Rose, l. c.* 317.—Mexic.

HELIOPHILA, Burm. f. (Crucif.).
odontopetala, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xviii. 383.—Afr. austr.
tabularis, *Dod, in Journ. Bot.* 1901, 397.—Afr. austr.

HELIOPSIS, Pers. (Compos.).
minor, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 796.—Am. bor.

HELIOSPERMA, Reichb. = **Silene** Linn. (Caryophyll.).
Retzdorffianum, Maly, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1903, 357.—Eur.

HELIOTROPIUM, Tourn. (Borag.).
adenense, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxv. 728.—Arabia.

HELIOTROPIUM:—
Anderssonii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 192.—Ins. Galap.
cimaliense, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 439.—Socotra.
derafontense, *Vierh. l. c.* 464.—Socotra.
dissimile, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 42.—Afr. trop.
Hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 817.—Parag.
horizontale, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 435.—Am. bor.
katangense, *Guerke, ex Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 223.—Afr. trop.
kuriense, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 463.—Socotra.
lineare, *C. H. Wright, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 9 (= *Heliophytum lineare*).—Afr. austr.
maximum, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 482.—Parag.
nanum, *Northrop, in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 61.—Ind. occ.
Nelsoni, *C. H. Wright, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 9.—Afr. austr.
oculatum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 58.—Calif.
Paulayanum, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 463.—Socotra.
saxatile? *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 218 (1905).—Mexic.
shoabense, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 465.—Socotra.
sokotranum, *Vierh. l. c.* 462.—Socotra.
spathulatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 262.—Am. bor.
Vatkei, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 39.—Afr. trop.
Wagneri, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 465.—Socotra.
xerophilum, *Cockerell, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 379.—Am. bor.

HELIPTERUM, DC. (Compos.).
adpressum, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 23.—Austral.
craspedioides, *Fitzg. l. c.* 24.—Austral.
pachychaetum, *Fitzg. l. c.* ii. 25.—Austral.
propinquum, *Fitzg. l. c.* i. 24.—Austral.
splendidum, *Hemsl. Bot. Mag.* t. 7933.—Austral.

HELLEBORUS, Tourn. (Ranunc.).
casta-diva, *Busch, in Trav. Soc. Nat. Pétersb. Bot.* xxxiii. (1903) (*Fl. Cauc. Crit.* iii. iii. 225).—Reg. Caucas.
macranthus, *Guerke, Pl. Eur.* ii. 411.—Eur.

HELLERANTHUS, Small, Fl. S. E. U. S. 1011 (1903). *VERBENACEAE.*
quadrangulatus, *Small, l. c.* (= *Verbena quadrangulata*).—Am. bor.

HEMICARPHA, Nees & Arn. = **Scirpus**, Tourn. (Cyper.).
aristulata, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 400.—Am. bor.

HEMICYCLIA, Wight & Arn. (Euphorb.).
Porteri, *Gamble, in Hook. Ic. Pl.* t. 2701.—Ind. or.

HEMIGENIA, R. Br. (Labiat.).
Clotteniana, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xv. 493.—Austral.
cutaxioides, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 42.—Austral.
Macphersoni, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 528.—Austral.
pedunculata, *Diels, l. c.* 529.—Austral.
Pritzelii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 28.—Austral.
saligna, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 528.—Austral.

HEMIGLOCHIDION, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 289 (1905). *EUPHORBIACEAE.*
cupuliformis, *K. Schum. l. c.* (= *Phyllanthus cupuliformis*).—N. Guin.
Finschii, *K. Schum. l. c.* (= *Phyllanthus Finschii*).—N. Guin.
hylodendron, *K. Schum. l. c.*—N. Guin.
Warburgii, *K. Schum. l. c.* (= *Phyllanthus Warburgii*).—N. Guin.

HEMIGRAPHIS, Nees (Acanth.).
repanda, *Lindau, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 385 (= *Ruellia repanda*).—Java; N. Guin.
sordida, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 386.—N. Guin.
Weinlandii, *K. Schum. l. c.* 385.—N. Guin.

HEMIHABENARIA, Finet, in Rev. Gén. de Bot. xiii. (1902) 532. *ORCHIDACEAE.*
radiata, *Finet, l. c.* 533 (= *Habenaria radiata*).—Japon.
stenantha, *Finet, l. c.* 532 (= *H. stenantha*).—Sikkim.
Susannae, *Finet, l. c.* (= *H. Susannae*).—China.

HEMIMERIS, Pers. (Scrophul.).
[Alonsoa, Ruiz & Pav. I. K.]
centrodes, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. II. 167.—Afr. austr.
elegans, *Hiern, in Journ. Bot.* 1901, 102.—Afr. austr.
latipes, Backh. ex Hiern, in Dyer, Fl. Cap. iv. II. 165 = montana.

HEMIORCHIS, Kurz (Scitam.).
rhodorrhachis, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 120.—Reg. Himal.

HEMIOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 374 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
elegans, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 242.—Bras.
pulchella, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 374 = O. pulchella.

HEMIZONIA, DC. (Compos.).
grandiflora, *Abrams, in Torreya*, ii. 122.—Am. bor.
speciosa, *Congd. in Zoe*, v. 135 (1901).—Calif.

HEMIZYGIA, Briq. (Labiat.).
Cooperi, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 992.—Afr. austr.
Dinteri, *Briq. l. c.* 995.—Afr. trop.
foliosa, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 172.—Afr. austr.
Galpiniana, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 993.—Afr. austr.
Hoepfneri, *Briq. l. c.* 994.—Afr. trop.
linearis, *Briq. l. c.* 997 (= *Orthosiphon linearis*).—Afr. trop.
serrata, *Briq. l. c.* 996.—Afr. trop.

HENRIETTEA, DC. (Melast.).
horridula, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 182.—Bras.
lasiostylis, *Pilg. l. c.* 183.—Reg. Amaz.

HENSMANIA, Fitzger. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxviii. (1903) 105. *LILIACEAE.*
turbinata, *Fitzger. l. c.* 106 (= *Xerotes turbinata*).—Austral.

HEPPIELLA, Regel (Gesner.).
corymbosa, *Urb. Symb. Antill.* ii. 368 (= *Gesneria corymbosa*).—Ind. occ.

HEPTAPLEURUM, Gaertn. (Aral.).
Hoi, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 498.—China.
macrophyllum, *Dunn, l. c.* 499.—China.
productum, *Dunn, l. c.*—China.

HERACLEUM, Linn. (Umbell.).
bivittatum, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 855.—China.
coreanum, *Boissieu, l. c.* 854.—China.
Fargesii, *Boissieu, l. c.* 853.—China.
Souliei, *Boissieu, l. c.* 852.—China.
vicinum, *Boissieu, l. c.* 853.—China.

HERDERIA, Cass. (Compos.).
lancifolia, *O. Hoffm. ex Th. Dur. & Wildem. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 22.—Afr. trop.

HERMANNIA, Linn. (Stercul.).
angolensis, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 302.—Afr. trop.
boranensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 311.—Afr. trop.
damarana, *Baker f. in Journ. Bot.* 1901, 127.—Afr. trop.
Donaldsoni, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
Eenii, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
Erlangeriana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 311.—Afr. trop.

HERMANNIA:—
Johanseni, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl.* t. 2709.—Afr. austr.
oligosperma, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 312.—Afr. austr.
rudis, *N. E. Br. in Journ. Bot.* 1901, 398.—Afr. austr.
waltherioides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 312.—Afr. trop.

HERMBSTAEDTIA, Reichb. (Amarant.).
laxiflora, *Lopr. in Malpighia*, xiv. 430; *et in Engl. Jahrb.* xxx. 105.—Afr. trop.
transvaalensis, *Lopr. l. c.* 429; *et l. c.* 105.—Afr. austr.

HERMESIAS, Loefl. = **Brownea**, Jacq. (Legum.).
hybrida, Hort. ex Knuth, Handb. Blütenb. iii. 359.—Quid?

HERMINIUM, Linn. (Orchid.).
Mackinnoni, *Duthie, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 44.—Ind. or.
Souliei, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 51.—China.
tanguticum, *Rolfe, l. c.*—China.

HERNANDIA, Plum. (Laurac.).
didymantha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 120.—Am. cent.

HERPETICA, Cook & Collins, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. (1903) 159. *LEGUMINOSAE.*
alata, *Cook & Collins, l. c.* (= *Cassia alata*).—Ind. occ.

HERSCHELIA, Lindl. (Orchid.).
[Disa, Berg. I. K.]
excelsa, *Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1009 (= *Disa excelsa*).—Afr. austr.
Goetzeana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxx. 286.—Afr. trop.

HESPERALOË, Engelm. (Liliac.).
funifera, *Trel. in Missouri Bot. Gard. Rep.* 1902, 36 (= *Yucca funifera*).—Mexic.

HESPERANTHA, Ker-Gawl. (Irid.).
Bachmanni, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 863.—Afr. austr.
bifolia, *Baker, l. c.* 865.—Afr. austr.
fistulosa, *Baker, l. c.* iv. 1004.—Afr. austr.
longicollis, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
subulata, *Baker, l. c.* i. 865.—Afr. austr.
Widmeri, *Brauverd, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 990.—Afr. austr.

HESPERASTER, Cockerell, in Torreya, i. (1901) 142. *LOASACEAE.*
chrysanthus, *Cockerell, l. c.* 143 (= *Mentzelia chrysantha*).—Am. bor.
decapetalus, *Cockerell, l. c.* 142 (= *Bartonia decapetala*).—Am. bor.
densus, *Cockerell, l. c.* 143 (= *Mentzelia densa*).—Am. bor.
laevicaulis, *Cockerell, l. c.* (= *Bartonia laevicaulis*).—Am. bor.
multiflorus, *Cockerell, l. c.* (= *Bartonia multiflora*).—Am. bor.
nudus, *Cockerell, l. c.* (= *Bartonia nuda*).—Am. bor.
perennis, *Cockerell, l. c.* (= *Mentzelia perennis*).—Am. bor.
pumila, *Cockerell, l. c.* (= *Mentzelia pumila*).—Am. bor.
Rusbyi, *Cockerell, l. c.* (= *Mentzelia Rusbyi*).—Am. bor.
speciosus, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 174 (= *Mentzelia speciosa*).—Am. bor.
strictus, *Osterh. l. c.*—Am. bor.

HESPERASTRAGALUS, A. A. Heller, Muhlenbergia, ii. 86 (1905). *LEGUMINOSAE.*
didymocarpus, *A. A. Heller, l. c.* 87 (= *Astragalus didymocarpus*).—Calif.
Gambellianus, *A. A. Heller, l. c.* (= *Astragalus Gambellianus*).—Calif.

HESPERIS, Linn. (Crucif.).
adenosepala, *Borb. ex Murr, in Magyar Bot. Lap.* i. (1902) 379.—Rossia.
macedonica, *Adam. in Denkschr. Akad. Wien, Math. Nat.* lxxiv. 124.—Turcia.
oblongipetala, *Borb. ex Murr, in Magyar Bot. Lap.* i. 379.—Eur.

HESPEROMECON, Greene, Pittonia, v. (1903) 146. *PAPAVERACEAE.*
affine, *Greene, l. c.* 147.—Calif.
angustum, *Greene, l. c.* 149.—Calif.
lineare, *Greene, l. c.* 146 (= *Platystigma lineare*).—Calif.
luteolum, *Greene, l. c.* 150.—Calif.
Platystemon, *Greene, l. c.* 148 (= *Platystemon linearis*).—Calif.
pulchellum, *Greene, l. c.* 150.—Calif.
strictum, *Greene, l. c.* 149.—Calif.

HETAERIA, Blume (Orchid.).
parvifolia, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 87.—Penins. Mal.

HETERISIA, Rafin. = **Saxifraga**, Tourn. (Saxifr.).
Eastwoodiae, Small, in N. Am. Fl. xxii. 156.—Am. bor.
Mertensiana, Small, l. c. = S. Mertensiana.

HETEROCENTRON, Hook. & Arn. (Melast.).
[Heeria, Schlecht. I. K.]
occidentale, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 327.—Mexic.

HETEROMERA, Montrouz. ex Beauvis. Gen. Montrouz. 84 = **Leptostylis**, Benth. (Sapot.).
rotundifolium, Montrouz. l. c. 85 = L. micrantha.

HETEROPORIDIUM, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1903) 378 = **Ochna**, Linn. (Ochnac.).
abyssinicum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 378.—Afr. trop.
arabicum, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.

HETEROPSIS, Kunth (Arac.).
longispathacea, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 53.—Bras.
rigidifolia, *Engl. l. c.* 51.—Bras.

HETEROPTERIS, H. B. & K. (Malpigh.).
anceps, *Niedenzu, in Arb. Inst. Braunsb.* ii. 19.—Bras.
arborescens, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 203 (1905).—Mexic.
bahiensis, *Niedenzu, in Arb. Inst. Braunsb.* ii. 26.—Am. austr.
ciliata, *Niedenzu, l. c.* 42.—Bras.
Gardneriana, *Niedenzu, l. c.* 18.—Bras.
Glaziouiana, *Niedenzu, l. c.* 27.—Bras.
Grisebachiana, *Niedenzu, l. c.* 48.—Bras.
Hassleriana, *Niedenzu, l. c.* 25.—Parag.
longifolia, *Niedenzu, l. c.* 53 (= *Banisteria longifolia*).—Ind. occ.
machaerophora, *Niedenzu, l. c.* 14.—Bras.
paraguariensis, *Niedenzu, l. c.* 22.—Parag.
praecox, *Niedenzu, l. c.* 24.—Am. austr.
procoriacea, *Niedenzu, l. c.* 43.—Bras.
reticulata, *Niedenzu, l. c.* 54 (= *Malpighia reticulata*).—Am. austr. trop.
Schenckiana, *Niedenzu, l. c.* 33.—Bras.
transiens, *Niedenzu, l. c.* 39.—Bras.
Warmingiana, *Niedenzu, l. c.* 25.—Bras.

HETEROSPERMUM, Cav. (Compos.).
involucratum, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 99 (= *Bidens involucratus*).—Chili.

HETEROSTECA, Desv. = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).
chadina, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 386.—Ind. occ.

HETEROSTEMMA, Wight & Arn. (Asclep.).
papuanum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 369.—N. Guin.

HETEROTAENIA, Boiss. = **Conopodium**, Koch (Umbell.).
alpestris, Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. 455.—Hispan.
Paui, Merino, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. ii. (1904) 494.—Hispan.

HETEROTHALAMUS, Less. (Compos.).
derivus, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 39.—Guiana.

HETEROTOMA, Zucc. (Campan.).
Goldmanii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 504.—Mexic.
stenodonta, *Fernald, l. c.*—Mexic.

HEUCHERA, Linn. (Saxifr.).
Abramsii, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 109.—Calif.
aceroides, Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S. 503.—Am. bor.
acutifolia, Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xxix. 438 (1905).—Mexic.
alpina, Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot. i. 62.—Am. bor.
arkansana, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 101.—Am. bor.
calycosa, Small, Fl. S. E. U. S. 504.—Am. bor.
columbiana, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 116.—Am. bor.
crinita, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 482.—Am. bor.
diversifolia, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 102.—Am. bor.
elegans, Abrams, in Bull. S. Calif. Acad. i. 67.—Am. bor.
flabellifolia, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 115.—Am. bor.
flavescens, Rydb. l. c. 114.—Am. bor.
glaberrima, Rydb. l. c. 108.—Am. bor.
gracilis, Rydb. l. c. 114.—Am. bor.
Halstedii, Rydb. l. c. 104.—Mexic.
Hartwegii, Rydb. l. c. 102.—Calif.
hemisphaerica, Rydb. l. c. 112.—Calif.
hirsuta, Rydb. l. c. 109.—Calif.
hirsuticaulis, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 482.—Am. bor.
lancipetala, Rydb. l. c.—Am. bor.
leptomeria, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 112.—Am. bor.
lithophila, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 105.—Calif.
Lloydii, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 113.—Am. bor.
longiflora, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 482.—Am. bor.
macrorhiza, Small, in Britton, l. c. 1048.—Am. bor.
Merriami, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 199.—Calif.
mexicana, Schaffn. in N. Am. Fl. xxii. 108.—Mexic.
nana, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 111.—Am. bor.
Nuttallii, Rydb. l. c. 103.—Am. bor.
pachypoda, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 111.—Calif.
Parishii, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 109.—Calif.
pilosella, Rydb. l. c. 112.—Calif.
Pringlei, Rydb. l. c. 111.—Calif.
puberula, Mackenzie & Bush, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1905, 103.—Am. bor.
pulchra, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 117.—Am. bor.
reglensis, Rydb. l. c. 108.—Mexic.
roseola, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 481.—Am. bor.
scabra, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 106.—Am. bor.
Sitgreavesii, Rydb. l. c. 110.—N. Mexic.
Suksdorfii, Rydb. l. c. 116.—Am. bor.
tenuifolia, Rydb. l. c.—Am. bor.
Townsendii, Rydb. l. c. 117.—Mexic.
utahensis, Rydb. l. c. 114.—Am. bor.
versicolor, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 112.—Am. bor.
Wootonii, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 113.—N. Mexic.

HEVEA, Aubl. (Euphorb.).
Kunthiana, Huber, in Bol. Mus. Para. iii. 349.—Reg. Amaz.
microphylla, Ule, in Engl. Jahrb. xxxv. 669.—Reg. Amaz.
nigra, Ule, l. c. 667.—Reg. Amaz.
paludosa, Ule, l. c. 666.—Reg. Amaz.
Sieberi, Warb. Kautschukpfl. 33.—Bras.
viridis, Huber, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlix. 48; et in Bol. Mus. Para. iii. 358.—Bras.

HEXALECTRIS, Rafin. (Orchid.).
mexicana, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. 77.—Mexic.
spicata, Barnhart, in Torreya, 1904, 121 (= Arethusa spicata).—Am. bor.

HEXALOBUS, A. DC. (Anonac.).
huillensis, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. vi. 56 (= Uvaria huillensis).—Afr. trop.
monopetalus, Engl. & Diels, l. c. (= Uvaria monopetala).—Afr. trop.
salicifolius, Engl. l. c. 57.—Afr. trop.

HEXAPTERA, Hook. (Crucif.).
purpurea, Hastings, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 622.—Chili.

HEXAPTERELLA, Urb. Symb. Antill. iii. 451 (1903). BURMANNIACEAE.
gentianoides, Urb. l. c.—Bras.

HEXASTYLIS, Rafin. = **Asarum**, Tourn. (Aristoloch.).
callifolia, Small, Fl. S. E. U. S. 1131 = A. callifolium.
heterophylla, Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 347.—Am. bor.
Memmingeri, Small, l. c. 348 = A. Memmingeri.
Ruthii, Small, l. c. = A. Ruthii.
Shuttleworthii, Small, l. c. 347.—Am. bor.
virginica, Small, l. c. 348 = A. virginicum.

HEXISEA, Lindl. (Orchid.).
reflexa, Reichb. f. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 623.—Ind. occ.

HIBBERTIA, Andr. (Dillen.).
Andrewsiana, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 387.—Austral.
concinna, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. xvi. 189.—Austral.
Eatoniae, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 387.—Austral.
Gilgiana, Diels, l. c. 384.—Austral.
nymphaea, Diels, l. c.—Austral.
polyclada, Diels, l. c. 385.—Austral.
silvestris, Diels, l. c. 386.—Austral.
triandra, C. R. P. Andrews, in Journ. Muell. Soc. W. Austral. i. no. 11, 80.—Austral.
Vanieri, Beauvis. Gen. Montrouz. 6.—N. Caled.

HIBISCUS, Linn. (Malvac.).
argentinus, Speg. in Bol. Agric. Buenos Aires, i. 304.—Reg. Argent.
Baumii, Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 290.—Afr. trop.
bicalyculatus, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 39.—Ins. Philipp.
dominicus, Hochr. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 300.—Parag.
Gilletii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 166.—Afr. trop.
Guerkeanus, Hochr. in Th. Dur. & Wildem. in Bull. Soc. Bot. Belg. xl. 9.—Afr. trop.
Hasslerianus, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1902, 51.—Parag.
macropodus, Wagn. & Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1904, 61.—Socotra.
Negundo, Lignier & Bey, in Bull. Soc. Linn. Norm. Sér. V. viii. 254, nomen.—Madag.
nodulosus, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 38.—Madag.
Schlechteri, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee, 316.—Ins. Bismarck.
submonospermus, Hochr. ex Th. Dur. & Wildem. in Bull. Soc. Bot. Belg. xl. 6.—Afr. trop.
violaceus, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 211 (1905).—Mexic.
Whytei, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 87.—Afr. trop.

HIERACIUM, Tourn. (Compos.).
Pro speciebus, subspeciebus varietatibusque europaeis perplurimis criticis vide opera infra citata:—Adlerz, in Bot. Notis. 1903, 165-192, 201-217; Arv.-Touv. & Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, v. (1901) 147-168; Arv.-Touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. Fr. li. pp. xxiii-xci; Belli, in Fiori & Paol. Fl. Ital. iii. 442-505; Bena. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1904, 241; Besse, in Bull. Murith. xxxii. (1903) 173-180; Brenner, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. xxv. (1903) no. 2, et 6; Brenner, in Meddel. Soc. Faun. Fl. Fenn. xxx. 136-142; Dahlst. ex Skottsb. & Vestergren, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvii. no. 7, 13; Dahlst. in Warm. Bot. Faeroes, 629-658; Dahlst. in Arkiv Bot. Stockh. iii. no. 10, pp. 1-74; Dahlst. in Bot. Notis. 1903, 85-88, 221-227; Dahlst. l. c. 1904, 183-191; Dahlst. in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvii. no. 13; Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1902, 162; Johansson, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxviii. Afd. iii. no. 7, 1-156; Johansson, in Bot. Notiser, 1905, 97-128; Käser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. xiii. 138; Käser, in Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn. xxix. 138; Murr, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1903, 377, 460; Murr, in Allg. Bot. Zeitschr. 1904, 97; Norrlin, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. xxvi. no. 7; Omang, in Nyt Mag. Nat. Christiania, xxxviii. 71-94; Omang, l. c. xxxix. 189-254; Omang, l. c. xli. 259-368; Omang, l. c. xliii. 177-313; Rouy, Fl. Fr. ix. 232-453.
aetolicum, Halacsy, Consp. Fl. Graec. ii. 238.—Eur.
alleghaniense, Britton, Man. Fl. N. U. S. 905.—Am. bor.

HIERACIUM:—
aphyllopodioides, F. N. Williams, Prodr. Fl. Brit. 160.—Eur.
arachnotrichum, Arv.-Touv. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, vii-viii. 320.—Pyren.
Ausserdorferi, Hausm. ex A. Kern. & Fritsch, Sched. Fl. Austr.-Hung. ix. 69.—Eur.
Baerianum, Arv.-Touv. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich, xlix. (1904) 226.—Helv.
bosniaphilum, Schneider, ex Maly, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1904, 288.—Eur.
Braunianum, Zahn & Chen. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, ix. (1905) 52.—Ital.
callimorphoides, Zahn, in Sched. Herb. Fl. Ross. v. 21.—Hybr.
Candelabrae, Linton, Brit. Hierac. 43.—Anglia.
capillosum, Pau, in Bol. Soc. Arag. ii. 286.—Hispan.
cinereum, Howell, Fl. N. W. Am. i. 396.—Am. bor.
columbianum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 513.—Am. bor.
cophanense, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 218.—Sicil.
elbanum, Belli ex Baroni, Suppl. Gen. Fl. Tosc. Caruel, 365.—Eur.
exuviatum, Dahlst. ex Jonsson, in Bot. Tidsskr. xxvii. 80.—Island.
floridanum, Britton, in Torreya, i. 42.—Am. bor.
gredense, Rouy, Illustr. Pl. Eur. t. 309.—Hispan.
Grinnellii, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 217.—Calif.
Hazslinszkyi, Pax, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1901, 110.—Eur.
insolare, Rouy, Illustr. Pl. Eur. t. 465.—Corsica.
jaliscense, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 23.—Mexic.
Jaquetianum, Zahn, ex Jaquet, in Mém. Soc. Fribourg. Sci. Nat. i. (1901) 12; ex Bot. Centralbl. xcii. (1903) 105.—Eur.
lasiophylloides, Pau, in Bol. Soc. Arag. ii. 286.—Hispan.
nebrodense, Tin. in Lojac. Fl. Sic. ii. t. 222.—Sicil.
oaxacanum, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 21.—Mexic.
oxyodus, Linton, Brit. Hierac. 42.—Scotia.
Perrotii, Arv.-Touv. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, vii-viii. 321.—Pyren.
plumulosiforme, Schneider, ex Maly, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1904, 291 = thapsiformoides.
pojoritense, Woloszczak, in Magyar Bot. Lap. iii. 21.—Graecia.
prasiophaeum, Cadevall, ex Pau, in Bol. Soc. Arag. ii. 287.—Hispan.
primierense, Bena & Zahn, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 266.—Eur.
prionobium, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 17.—Mexic.
prionophilum, Robinson & Greenm. l. c. 16.—Mexic.
pseuditalicum, Zahn, in Allg. Bot. Zeitschr. 1902, 2.—Eur.
relictum, Dahlst. ex Jonsson, in Bot. Tidsskr. xxvii. 81.—Island.
Rigoanum, Zahn, in Allg. Bot. Zeitschr. 1902, 2.—Eur.
Rosei, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 19.—Mexic.
scoticum, Rouy, Illustr. Pl. Eur. t. 439.—Scotia.
Scullyi, Linton, Brit. Hierac. 72.—Hibernia.
sinense, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xii. (1903) 502.—China.
Soleirolianum, Arv.-Touv. & Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, v. 108.—Corsica.
succisellum, Arv.-Touv. & Briq. l. c. 165.—Eur.
Svanlundii, Dahlst. in Bot. Notiser, 1902, 105.—Eur.
thapsiformoides, Schneider, ex Maly, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1904, 291.—Eur.
trebevicianum, Maly, ex Gross & Kneuck. in Allg. Bot. Zeitschr. 1903, 181, nomen.—Eur.
Vagneri, Pax, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1901, 111.—Eur.
valdefrondosum, Zahn, ex Maly, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1904, 296.—Eur.
valentinum, Pau, in Bol. Soc. Arag. ii. 285.—Hispan.
vitocense, Zahn, in Allg. Bot. Zeitschr. 1901, 178.—Eur.
Wrightii, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 19.—Mexic.
Zahnii, Oberny, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 257.—Eur.

HIEROCHLOË, S. G. Gmel. (Gramin.).
hirta, Hayek, Sched. Fl. Stir. iii-iv. 15 (= Savastana hirta).—Reg. bor.

HILAIRELLA, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xix. (1904) 22. *OCHNACEAE.*
neglecta, *Van Tiegh. l. c.* 24.—Bras.
polyandra, *Van Tiegh. l. c.*—Bras.

HILARIA, H. B. & K. (Gramin.).
texana, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 68.—Am. bor.

HILDEBRANDTIA, Vatke (Convolv.).
sepalosa, *Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. II. 70.—Afr. trop.

HILLIA, Jacq. (Rubiac.).
Ulei, *K. Schum. in Karst. & Schenck, Vegetationsbilder*, ii. (1904) sub tt. 1–2.—Reg. Amaz.

HIMERANTHUS, Endl. (Solan.).
Ameghinoi, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 44.—Patag.
patagonicus, *Speg. l. c.* 43.—Patag.

HIPPEASTRUM, Herb. (Amaryll.).
flammigerum, *Holmb. in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires*, Ser. III. i. (1902) 411.—Reg. Argent.
granatiflorum, *Holmb. l. c.* ii. 79.—Reg. Argent.
Holmbergii, *Hicken, in Anal. Soc. Ci. Argent.* lv. 232.—Reg. Argent.
iguapense, *Wagner, in Wien, Ill. Gart. Zeit.* xxviii. 251.—Bras.
marginatum, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no 1, 161.—Reg. Argent.
puniceum, *Urb. Symb. Antill.* iv. 151 (= *Amaryllis punicea*).—Ind. occ.
teretifolium, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1901, 144.—Uruguay.

HIPPEOPHYLLUM, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 107. *ORCHIDACEAE.*
hamadryas, *Schlechter, l. c.* 108 (= *Oberonia hamadryas*).—N. Guin.
micranthum, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.

HIPPOCRATEA, Linn. (Celastr.).
bipindensis, *Loes. ex Fritsch, in Bot. Centralbl. Beih.* xi. 337; *et in Engl. Jahrb.* xxxiv. 103.—Afr. trop.
Busseana, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 105.—Afr. trop.
camerunica, *Loes. l. c.* 110.—Afr. trop.
clematoides, *Loes. l. c.* 109.—Afr. trop.
delagoensis, *Loes. l. c.* 119.—Afr. austr.
Goetzei, *Loes. l. c.* xxx. 346.—Afr. trop.
huanucana, *Loes. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 163.—Peruv.
iotricha, *Loes. ex Fritsch, in Bot. Centralbl. Beih.* xi. 340; *et in Engl. Jahrb.* xxxiv. 108.—Afr. trop.
Menyharthii, *Schinz, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxviii. 426.—Afr. trop.
pachnocarpa, *Loes. ex Fritsch, in Bot. Centralbl. Beih.* xi. 342.—Afr. trop.
Preussii, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 112.—Afr. trop.
Scheffleri, *Loes. l. c.* 115.—Afr. trop.
Schlechteri, *Loes. l. c.* 114.—Afr. trop. et austr.
Staudtii, *Loes. l. c.* 113.—Afr. trop.
unguiculata, *Loes. l. c.* 118.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 208.—Afr. trop.
Warmingii, *Peyr. ex Fritsch, in Bot. Centralbl. Beih.* xi. 343.—Bras.
yaundina, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 117.—Afr. trop.

HIPPOCREPIS, Linn. (Legum.).
commutata, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 274.—Hispan.

HIPTAGE, Gaertn. (Malpigh.).
luzonica, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 33.—Ins. Philipp.
minor, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 487.—China.

HIRAEA, Jacq. (Malpigh.).
obovata, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 424.—Bras.

HIRTELLA, Linn. (Rosac.).
myrmecophila, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 148.—Reg. Amaz.
porosa, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 30 (= *Grangeria porosa*).—Madag.
Ulei, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 148.—Reg. Amaz.

HOECKIA, Engl. & Graebn. ex Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 598 (1901). *VALERIANACEAE.*
Aschersoniana, *Engl. & Graebn. l. c.*—China.

HOFFMANNIA, Sw. (Rubiac.).
arborescens, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 417.—Am. cent.
calycosa, *Donn. Sm. l. c.* xl. 4.—Am. cent.
lineolata, *Donn. Sm. l. c.* 5.—Am. cent.

HOFFMANSEGGIA, Cav. (Legum.).
nana, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 476.—Reg. Argent.
patagonica, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 44.—Patag.

HOFMEISTERIA, Walp. (Compos.).
viscosa, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 263.—Am. bor.

HOHENBERGIA, Schult. f. (Bromel.).
[AECHMEA, Ruiz & Pav. I. K.]
Fawcettiana, K. Schum. in Just, Jahresb. xxviii. I. 411, sphalm. = Fawcettii.

HOLARRHENA, R. Br. (Apocyn.).
angustata *Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn.* (1894) 196, nomen.—Cochinch.
crassifolia, *Pierre, l. c.*, nomen.—Cochinch.
microterantha, *K. Schum. in Bull. Soc. Études Colon.* a. 515.—Afr. trop.
procumbens, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxvii. 59 (= *Echites procumbens*).—Ins. Philipp.
Wulfsbergii, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 164.—Afr. trop.

HOLCOPHACOS, Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S. 618 (1903). *LEGUMINOSAE.*
distortus, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus distortus*).—Am. bor.
Engelmannii, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus Engelmannii*).—Am. bor.

HOLCUS, Linn. (Gramin.).
triflorus, *Trab. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 367.—Afr. bor.

HOLIGARNA, Buch.-Ham. (Anacard.).
nigra, *Bourd. in Ind. Forester*, xxx. 95.—Ind. or.

HOLLANDAEA, F. Muell. (Proteac.).
Lamingtoniana, *Bailey, Queensl. Fl.* 1354.—Austral.

HOLODISCUS, Maxim. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
fissus, Schneider, Ill. Handb. Laubholzk. i. (1905) 495 = S. discolor.
glabrescens, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 40.—Am. bor.
microphyllus, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 559.—Am. bor.
saxicola, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 41.—Calif.

HOLOTHRIX, Rich. (Orchid.).
Culveri, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 147.—Afr. austr.
triloba, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 938 (= *Deroemeria triloba*).—Afr. trop.

HOMALIUM, Jacq. (Samyd.).
acuminatum, *Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 280.—Ins. Cook.
Gentilii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 46.—Afr. trop.
Gilgianum, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 320.—N. Guin.
javanicum, *Koord. & Valet. in Ic. Bogor.* t. 100, descr. ampl.—Java.
molle, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 100.—Afr. trop.

HOMALOBUS, Nutt. = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).
aboriginum, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 554 = A. aboriginum.
acerbus, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 666 = A. Dodgianus.
californicus, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 86 = A. californicus.
camporum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 666.—Am. bor.
Clementis, Rydb. l. c. 1904, 568.—Am. bor.
curvicarpus, A. A. Heller, Muhlenbergia, ii. 86.—Calif.
decurrens, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 563.—Am. bor.
Fendleri, Rydb. l. c. 1905, 667 = A. Fendleri.
flexuosus, Rydb. l. c. 666 = A. flexuosus.

HOMALOBUS:—
Grallator, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 666 = A. Grallator.
Hallii, Rydb. l. c. 667 = A. Hallii.
junciformis, Rydb. l. c. 666 = A. junciformis.
macrocarpus, Rydb. l. c. 667 = A. lonchocarpus.
proximus, Rydb. l. c.—Am. bor.
Salidae, Rydb. l. c.—Am. bor.
tegetarius, Rydb. l. c. 1904, 563 = A. tegetarius.
wingatensis, Rydb. l. c. = A. wingatanus.
Wolfii, Rydb. l. c. 562.—Am. bor.

HOMALOMENA, Schott (Arac.).
argentea, *Ridley, in Journ. Bot.* 1902, 35.—Penins. Mal.
brevispatha, *Engl. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 274.—Malaya.
crassa, *Ridley, in Journ. Bot.* 1902, 36.—Penins. Mal.
crinipes, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 124.—Am. trop.?
Curtisii, *Ridley, in Journ. Bot.* 1902, 34.—Penins. Mal.
falcata, *Ridley, l. c.* 35.—Penins. Mal.
Lauterbachii, *Engl. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 61.—N. Guin.
mixta, *Ridley, in Journ. Bot.* 1902, 36.—Penins. Mal.
multinervia, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
propinqua, *Ridley, l. c.* 35.—Penins. Mal.
Ridleyana, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 123.—Hab.?

HOODIA, Sweet (Asclep.).
Lugardi, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 491.—Afr. trop.

HOOKERA, Salisb. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).
congesta, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 116 = B. congesta.
multipedunculata, Abrams, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 537.—Calif.
synandra, A. A. Heller, in Bull. S. Calif. Acad. ii. 65.—Calif.
volubilis, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 116 = Stropholirion californicum.

HOPEA, Roxb. (Dipterocarp.).
acuminata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 30.—Ins. Philipp.
avellanea, *Heim, in Bot. Tidsskr.* xxv. 46.—Siam.
linggensis, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* 103.—Arch. Mal.
ovalifolia, *Boerl. l. c.* 102.—Arch. Mal.
Schmidtii, *Heim, in Bot. Tidsskr.* xxv. 46.—Siam.
siamensis, *Heim, l. c.*—Siam.

HOPKINSIA, Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. i. (1904) 33. *RESTIACEAE.*
scabrida, *Fitzg. l. c.* 34.—Austral.

HORDEUM, Tourn. (Gramin.).
daghestanicum, *Alex. in Sched. Herb. Fl. Ross.* iv. 29.—Reg. Caucas.
Kronenburgii, *Hack. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 133.—Turkestan.
rupestre, *Alex. in Act. Hort. Tiflis*, vi. 96.—Reg. Caucas.

HORKELIA, Cham. & Schlecht. = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).
Chandleri, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 177.—Am. bor.
glandulosa, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 195.—Calif.
Rydbergii, Elmer, in Coult. Bot. Gaz. xxxix. 50.—Calif.
Wilderae, Parish, in Coult. Bot. Gaz. xxxviii. 460.—Calif.

HORNSTEDTIA, Retz. (Scitam.).
[AMOMUM, Linn. I. K.]
araneosa, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 196 (= *Amomum araneosum*).—Burma.
costata, *K. Schum. l. c.* 198 (= *Amomum costatum*).—Reg. Himal.
elongata, *K. Schum. l. c.* 192 (= *Amomum elongatum*).—Java.
Fenzlii, *K. Schum. l. c.* 195 (= *Amomum Fenzlii*).—Ins. Nicobar.
foetens, *K. Schum. l. c.* 200 (= *Amomum foetens*).—Java.
Havilandii, *K. Schum. l. c.* 193 (= *Amomum Havilandii*).—Borneo.
linguiformis, *K. Schum. l. c.* 196 (= *Amomum linguiforme*).—Reg. Himal.

HORNSTEDTIA :—
loroglossa, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 196 (= *Amomum loroglossum*).—Reg. Himal.
lycostoma, *K. Schum. l. c.* 194 (= *Amomum lycostomum*).—N. Guin.
macrodus, *K. Schum. l. c.* 191 (= *Amomum macrodus*).—Penins. Mal.
minor, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 57; *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 199 (= *Elettaria minor*).—Java.
minuta, *K. Schum. l. c.* 197 (= *Elettaria minuta*).—Java.
mollis, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 59.—Java.
paludosa, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 200 (= *Amomum paludosum*).—Java.
paradoxa, *Ridley, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 85.—Ins. Philipp.
penicillata, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 193 (= *Amomum penicillatum*).—Celebes.
phaeochoana, *K. Schum. l. c.* 191 (= *Amomum phaeochoanum*).—Borneo.
philippinensis, *Ridley, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 86.—Ins. Philipp.
Piniagu, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 93 (= *Donacodes Piniagu*).—Java.
punicea, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 197 (= *Alpinia punicea*).—Java.
reticulata, *K. Schum. l. c.* 193 (= *Amomum reticulatum*).—Borneo.
sarawacensis, *K. Schum. l. c.* 191 (= *Amomum sarawacense*).—Borneo.
Scottiana, *K. Schum. l. c.* 194 (= *Amomum Scottii*).—Austral.
sphaerocephala, *K. Schum. l. c.* 192 (= *Amomum sphaerocephalum*).—Penins. Mal.
villosa, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 58 (= *Donacodes villosa*).—Java.

HORSFIELDIA, Willd. (Myristic.).
[MYRISTICA, Linn. I. K. S. i.]
Merrillii, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 49.—Ins. Philipp.
ramuensis, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 266.—N. Guin.
Schlechteri, *Warb. l. c.* 267.—N. Guin.

HOSTA, Tratt. = **Funkia**, Spreng. (Liliac.).
latifolia, Matsum. Ind. Pl. Jap. ii. 200 = F. latifolia.

HOSTMANNIA, Planch. = **Elvasia**, DC. (Ochnac.).
essequebensis, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 414 = E. essequebensis.
Sagoti, Van Tiegh. l. c.—Guiana.

HOULLETIA, Brongn. (Orchid.).
roraimensis, *Rolfe, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 63.—Guiana.

HOUSTONIA, Gronov. (Rubiac.).
calycosa, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 739 (= *Hedyotis calycosa*).—Am. bor.
filifolia, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1109.—Am. bor.
lanceolata, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 861.—Am. bor.
montana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1325.—Am. bor.
parvula, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 221 (1905).—Mexic.
peninsularis, *T. S. Brandegee, l. c.* 160 (1903).—Calif.
prostrata, *T. S. Brandegee, l. c.* 105 (1901).—Calif.
tenuis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1109.—Am. bor.

HOYA, R. Br. (Asclep.).
anulata, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 362.—N. Guin.
camphorifolia, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 129.—Ins. Philipp.
dictyoneura, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch Südsee*, 362.—N. Guin.
Fischeriana, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 129.—Ins. Philipp.
gracilipes, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 363.—N. Guin.
incrassata, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 130.—Ins. Philipp.
litoralis, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 363.—N. Guin.
luzonica, *Schlechter, in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 130.—Ins. Philipp.
marginata, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 364.—Ins. Bismarck.

HOYA :—
Merrillii, *Schlechter, in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 131.—Ins. Philipp.
obreniformis, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* ix. 51.—Ind. or.
quinquenervia, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 132.—Ins. Philipp.
rosea, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 365.—N. Guin.
rubida, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. l. c.* 366.—Ins. Bismarck.
subcalva, *Burkill, in Kew Bull.* 1901, 141.—N. Guin.
trigonolobos, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 366.—Ins. Bismarck.

HUEGELIA, Benth. = **Gilia**, Ruiz & Pav. (Polemon.).
floccosa, Howell, Fl. N. W. Am. i. 458 = G. floccosa.

HUERNIA, R. Br. (Asclep.).
concinna, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 497.—Afr. trop.
macrocarpa, *N. E. Br. l. c.* 498 (= *Stapelia macrocarpa*).—Abyss.
Pillansii, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1904, i. 50.—Afr. austr.

HUFELANDIA, Nees (Laurac.).
[BEILSCHMIEDIA, Nees. I. K.]
costaricensis, *Mez & Pittier, ex Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. (1903) 226.—Am. cent.

HUGERIA, Small, Fl. S. E. U. S. 896 (1903). *VACCINIACEAE.*
erythrocarpa, *Small, l. c.* 897 (= *Vaccinium erythrocarpum*).—Am. bor.

HUGONIA, Linn. (Linac.).
Baumannii, *Engl. Jahrb.* xxxii. 104.—Afr. trop.
Durandea, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 19, nomen.—N. Caled.
gabunensis, *Engl. Jahrb.* xxxii. 105.—Afr. trop.
micans, *Engl. l. c.* 104.—Afr. trop.
obtusifolia, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1901, 119.—Afr. trop.
villosa, *Engl. Jahrb.* xxxii. 105.—Afr. trop.

HUMBOLDTIA, Vahl (Legum.).
Bourdilloni, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 200.—Ind. or.

HUMULUS, Linn. (Urtic.).
neomexicanus, *in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvi. 185 (*errore pro* Humuli Lupuli, *var.* neomexicani).

HUNTERIA, Roxb. (Apocyn.).
Ballayi, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 281.—Afr. trop.

HUTTUM, Adans. = **Barringtonia**, Forst. (Myrtac.).
acutangulum, Britten, in Journ. Bot. 1901, 67 = B. acutangula.
calyptratum, Britten, l. c. = B. calyptrata.
edule, Britten, l. c. = B. edulis.
racemosum, Britten, l. c. = B. racemosa.
speciosum, Britten, l. c. = B. Butonica.

HYBANTHUS, Jacq. = **Ionidium**, Vent. (Violac.).
parietariifolius, Loesen. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. (1903) 214 = I. oppositifolium.
tarapotinus, Ule, in Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 158.—Peruv.
verbenaceus, Loesen. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 215 = I. verbenaceum.

HYBIDIUM, Fourr. = **Centranthus**, DC. (Valerian.).
asturiense, Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. iii. 13.—Hispan.
grandiflorum, Jord. l. c. 14.—Ins. Balear.
hebecarpum, Jord. l. c. 13.—Ins. Balear.
micranthum, Jord. l. c.—Eur.

HYDATELLA, Diels, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. (1904) 93. *CENTROLEPIDACEAE.*
australis, *Diels, l. c.*—Austral.
leptogyne, *Diels, l. c.*—Austral.

HYDNOPHYTUM, Jack (Rubiac.).
punamense, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 401.—Ins. Bismarck.
subnormale, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 400.—N. Guin.

HYDRANGEA, Gronov. (Saxifr.).
Arbostiana, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 115.—China.
cinerea, *Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 484.—Am. bor.
integerrima, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 461 (= *Cornidia integerrima*).—Chili.
Kawienskii, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 115.—China.
Maximowiczii, *Léveillé, l. c.* 114.—China.

HYDRANTHUS, Kuhl & Van Hasselt, ex Reichb. f. Xen. Orch. ii. (1862) 20 = **Dipodium**, R. Br. (Orchid.).
scandens, Kuhl & Van Hasselt, l. c. = D. pictum.

HYDROBRYUM, Endl. (Podost.).
Johnsonii, *Willis, in Ann. Bot. Gard. Perad.* i. 241 (= *Podostemon Johnsonii*).—Ind. or.
sessile, *Willis, l. c.* 239.—Ind. or.

HYDROCOTYLE, Tourn. (Umbell.).
ceratocarpa, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 22.—Austral.
exigua, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 13, 5.—Bras.
galapagensis, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 184.—Ins. Galap.
villosa, Ecklon, ex Baker & Wright, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 53 = Dichondra repens.

HYDROPHACE, Hall. = **Lemna**, Linn. (Lemnac.).
minor, Bub. Fl. Pyren. iv. 23 = L. minor.
trisulca, Bub. l. c. = L. trisulca.

HYDROSME, Schott (Arac.).
[AMORPHOPHALLUS, Blume. I. K.]
aspera, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 123.—Sumatra.
Forbesii, *Engl. l. c.*—Sumatra.
Gregoryana, *Engl. l. c.* xxxvi. 237.—Afr. trop.
longituberosa, *Engl. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 273.—Malaya.
Stuhlmannii, *Engl. Jahrb.* xxxiv. 152.—Afr. trop.
Warneckei, *Engl. l. c.* xxxvi. 236.—Afr. trop.

HYDROSTACHYS, Thou. (Podost.).
triaxialis, *Engl. & Gilg. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 241.—Afr. trop.

HYGROPHILA, R. Br. (Acanth.).
affinis, *Lindau, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 376.—Afr. trop.
angusta, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 324.—Bras.
brasiliensis, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 628.—Parag.
corymbosa, *Lindau, in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 38.—Ins. Philipp.
Evae, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 6.—Afr. trop.
glutinifolia, *Lindau, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 374.—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 142.—Afr. trop.
microthamnia, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 408.—Afr. trop.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 243.—Mexic.
sessilifolia, *Lindau, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 375.—Afr. trop.
Teuszii, Ind. Kew. Suppl. i. 218, sphalm. = Teucrii.

HYMENOCALLIS, Salisb. (Amaryll.).
arenicola, *A. K. Northr. in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 29.—Ins. Baham.
graminifolia, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 74.—Mexic.
Pringlei, *Greenm. l. c.*—Mexic.
riparia, *Greenm. l. c.* xli. 235.—Mexic.

HYMENOCLEA, Torr. & Gray (Compos.).
fasciculata, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 270.—Am. bor.

HYMENODICTYON, Wall. (Rubiac.).
fimbriolatum, *K. Schum. ex Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 225.—Afr. trop.
Koordersii, *K. Schum. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 78.—Celebes.

HYMENOPAPPUS, L'Hérit. (Compos.).
eriopoda, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 274. —Am. bor.
ochroleucus, *Greene, Pl. Baker.* iii. 30.—Am. bor.
parvulus, *Greene, l. c.*—Am. bor.
sulphureus, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1007. —Am. bor.

HYMENOSTEGIA, Harms (Legum.).
Dinklagei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 78.—Afr. trop.

HYMENOXYS, Cass. (Compos.).
canescens, *Cock. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 484 (= *Picradenia canescens*).—Am. bor.
Cooperi, *Cock. l. c.* 494 (= *Picradenia Cooperi*).—Calif.
Davidsonii, *Cock. l. c.* 508 (= *Picradenia Davidsonii*). —Am. bor.
Earlei, *Cock. l. c.* 492 (= *Picradenia Earlei*).—Am. bor.
floribunda, *Cock. l. c.* 485 (= *Picradenia floribunda*). —Am. bor.
helenioides, *Cock. l. c.* 461 (= *Picradenia helenioides*). —Am. bor.
insignis, *Cock. in Torreya*, iv. 170 (= *Actinella insignis*).—Mexic.
latissima, *Cock. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 495.—Calif.
Lemmoni, *Cock. l. c.* 477 (= *Picradenia Lemmoni*).—Calif.
Metcalfei, *Cock. l. c.* 492.—Am. bor.
olivacea, *Cock. l. c.* 497.—Am. bor.
Richardsoni, *Cock. l. c.* 468 (= *Picradenia Richardsoni*).—Am. bor.
Rusbyi, *Cock. l. c.* 496 (= *Picradenia Rusbyi*).—Calif.
subintegra, *Cock. l. c.* 480.—Am. bor.
texana, *Cock. l. c.* 499 (= *Picradenia texana*).—Am. bor.
Vaseyi, *Cock. l. c.* 493 (= *Picradenia Vaseyi*).—Am. bor.

HYOBANCHE, Linn. (Scrophul.).
glabrata, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 417 (= *Haematobanche sanguinea*).—Afr. austr.
rubra, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 129.—Afr. austr.

HYPECOUM, Tourn. (Papav.).
deuteroparviflorum, *Fedde, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 166.—Oriens.

HYPERASPIS, Briq. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. (1903) 975. *LABIATAE.*
Kelleri, *Briq. l. c.*—Afr. trop.

HYPERBAENA, Miers = **Pachygone**, Miers (Menisp.).
oblongifolia, Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 421 = P. oblongifolia.

HYPERICOPHYLLUM, Steetz (Compos.). [JAUMEA, Pers. I. K.]
angolense, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 122. —Afr. trop.
congoense, *N. E. Br. l. c.* 123.—Afr. trop.
elatum, *N. E. Br. l. c.* 122.—Afr. trop.
scabridum, *N. E. Br. l. c.*—Afr. trop.

HYPERICUM, Tourn. (Hyperic.).
bacciforme, Bub. Fl. Pyren. iii. 343 = H. androsaemum.
Baumii, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 306.—Afr. trop.
Biondii, *Keller, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 551.—China.
Bissellii, *Fern. in Rhodora*, iv. 186.—Am. bor.
Bodinieri, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 7.—China.
bryophytum, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvi. 60.—Am. bor.
Buschianum, *Woron. ex Busch, in Act. Hort. Petrop.* xxiv. (1905) 291, 561, nomen.—Reg. Caucas.
consimile, *Keller, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 552.—Java.
elatoides, *Keller, l. c.* 549.—China.
ericoides, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iv. i. (1902) 18.—Urug.
exiguum, Bub. Fl. Pyren. iii. 343 = humifusum.
Giraldii, *Keller, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 548.—China.
interior, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 359.—Am. bor.
kouytchense, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 7.—China.
lateriflorum, *Léveillé, l. c.*—China.
lobocarpum, *Gatt. Fl. Tennessee*, 120.—Am. bor.

HYPERICUM:—
longifolium, *Léveillé. in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 7.—China.
nikkoense, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 103.—Japon.
nummulariaefolium, Bub. Fl. Pyren. iii. 348 = nummularium.
obtusifolium, *Keller, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 551.—China.
obtusifolium, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. (1903) 80.—Japon.
oliganthemum, *Keller, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 553.—Japon.
pedunculatum, *Keller, l. c.* 549.—China.
pseudomaculatum, *Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xii. 83.—Am. bor.
pseudotenellum, *Vandas, in Magyar Bot. Lap.* iv. 263. —Turcia.
Scallanii, *Keller, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 549.—China.
simulans, *Keller, l. c.* 547.—Japon.
splendens, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 291. —Am. bor.
Thomsonii, *Keller, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 552.—China.
tosaense, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 79.—Japon.
turgidum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 789.—Am. bor.
uniglandulosum, *Hausskn. ex Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 130.—As. Min.
vulgare, Bub. Fl. Pyren. iii. 345 = perforatum.

HYPHAENE, Gaertn. (Palm.).
aurantiaca, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxx. 267.—Afr. trop.

HYPOBATHRUM, Blume (Rubiac.).
brevipes, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lix. (1902) 112.—Java.

HYPOCHOERIS, Linn. (Compos.).
chillensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 655 (= *Apargia chillensis*).—N. Granat.
palustris, *Wildem. Rés. Voy. Belgica, Bot.* 180 (= *Achyrophorus palustris*).—Reg. Magell.
Poeppigii, *P. Dusén, in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 31.—Patag.

HYPODISCUS, Nees (Restiac.).
capitatus, *Mast. ex Dod, in Journ. Bot.* 1901, 402.—Afr. austr.
Dodii, *Mast. l. c.*—Afr. austr.

HYPOESTES, Soland. (Acanth.).
cinerea, *C. B. Clarke, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 89.—Ins. Philipp.
Schmidtii, *C. B. Clarke, in Bot. Tidsskr.* xxiv. 351.—Malaya.
subcapitata, *C. B. Clarke, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 90.—Ins. Philipp.
udongensis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxviii. i. 466, sphalm. = mlangensis.
Vidalii, *C. B. Clarke, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 90.—Ins. Philipp.

HYPOLAENA, R. Br. (Restiac.).
fasciculata, *Fitzger. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxviii. 108.—Austral.
Mahoni, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 265.—Afr. trop.
ramosissima, *Gilg, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 89.—Austral.

HYPOLYTRUM, Rich. (Cyperac.).
congense, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 487.—Afr. trop.
lancifolium, *C. B. Clarke, l. c.* 488.—Afr. trop.
longiscaposum, *C. B. Clarke, l. c.* 489.—Afr. trop.
senegalense, *C. B. Clarke, l. c.* 488.—Afr. trop.

HYPOPITYS, Dill. (Monotrop.).
americana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 880.—Am. bor.
fimbriata, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 429 (= *Monotropa fimbriata*).—Am. bor.

HYPOXIS, Linn. (Amaryll.).
Curtissii, *Rose, in Small, Fl. S. E. U. S.* 287.—Am. bor.
Ecklonii, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 859.—Afr. austr.
caespitosa, *Baker, l. c.* 858.—Afr. austr.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 276.—Afr. trop.

HYPOXIS:—
grandis, *Pollard, in Small, Fl. S. E. U. S.* 287.—Am. bor.
Junodi, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 859.—Afr. austr.
leucotricha, *Fritsch, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 1109.—Afr. trop.
longifolia, *Baker, in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 176.—Afr. austr.
longipes, *Baker, in Vierteljahrsschr. l. c.*—Afr. austr.
micrantha, *Pollard, in Small, Fl. S. E. U. S.* 287.—Am. bor.
mollis, *Baker, in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 177.—Afr. austr.
nigricans, *Conrath, in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 177.—Afr. austr.

HYPSOPHILA, F. Muell. (Celastr.).
Dielsiana, *Loes. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 62.—Austral.

HYPTIODAPHNE, Urb. Symb. Antill. ii. (1901) 453. *THYMELAEACEAE.*
crassifolia, *Urb. l. c.* 454 (= *Daphne crassifolia*).—Ind. occ.

HYPTIS, Jacq. (Labiat.).
Baumii, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 354. —Afr. trop.
frondosa, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 108.—Bras.
helophila, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 189.—Bras.
indivisa, *Pilg. l. c.* 190.—Bras.
juruana, *Loes. ex Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 187.—Reg. Amaz.
lasiocalyx, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 190.—Bras.
Lindmaniana, *Briq. in Arkiv Bot. Stockh.* ii. no. 10, 4. —Bras.
Loeseneriana, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 191.—Bras.
mattogrossensis, *Pilg. l. c.*—Bras.

HYSSOPUS, Tourn. (Labiat.).
cretaceus, *Dub. in Sched. Herb. Fl. Ross.* v. 51.—Rossia.

HYSTRIX, Moench = **Asprella**, Humb. (Gramin.).
elymoides, Mackenzie & Bush, in Mackenzie, Fl. Jacks. County, 39 = A. Hystrix.

I

IANTHE, Salisb. = **Hypoxis**, Linn. (Amaryll.).
aquatica, F. N. Williams, in Journ. Bot. 1901, 293 = H. aquatica.
curculigioides, F. N. Williams, l. c. = H. curculigioides, *Bolus non Wall.*
glabella, F. N. Williams, l. c. = H. glabella.
gracilipes, F. N. Williams, l. c. = H. gracilipes.
leptantha, F. N. Williams, l. c. = H. occidentalis.
Maximiliani, F. N. Williams, l. c. = H. Maximiliani.
minuta, F. N. Williams, l. c. = H. minuta.
monophylla, F. N. Williams, l. c. = H. monophylla.
occidentalis, F. N. Williams, l. c. = H. occidentalis.
pusilla, F. N. Williams, l. c. = H. pusilla.
Schlechteri, F. N. Williams, l. c. = H. Schlechteri.
serrata, F. N. Williams, l. c. = H. serrata.
stellata, F. N. Williams, l. c. = H. stellata.
umbraticola, F. N. Williams, l. c. = H. umbraticola.

IBERIS, Dill. (Crucif.).
Cottiana, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 11. —Gallia.
extensa, *Jord. l. c.*—Hab. ?
humilis, *Jord. l. c.* 12.—Gallia.
montana, *Jord. l. c.*—Gallia.
praeruptorum, *Jord. l. c.*—Gallia.
roseo-purpurea, *Sagorski, in Mitth. Thuring. Bot. Ver.* n. s. xvi. 49.—Turcia.

IBERVILLEA, Greene = **Maximowiczia**, Cogn. (Cucurb.).
tenella, Small, Fl. S. E. U. S. 1136 = M. tripartita.
tenuisecta, Small, l. c. = M. Lindheimeri.

IBIDIUM, Salisb. = **Spiranthes**, Rich. (Orchid.).
cernuum, House, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 381 = S. cernua.

IBIDIUM:—
gracile, House, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 381 = S. gracilis.
ochroleucum, House, l. c. = Gyrostachys ochroleuca.
plantagineum, House, l. c. = S. latifolia, *Torr.*
porrifolium, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1906, 610 = S. porrifolia.
strictum, House, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 381 = Gyrostachys stricta.
vernalis, House, l. c. = S. vernalis.

ICHNANTHUS, Beauv. (Gramin.).
apiculatus, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* no. 30, 1.—Am. bor.
sericans, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 458.—Bras.

IGUANURA, Blume (Palm.).
ferruginea, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 40.—Penins. Mal.
Sanderiana, *Ridley, in Gard. Chron.* 1904, i. 50.—Borneo.
spectabilis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 40.—Penins. Mal.

ILEX, Tourn. (Ilicin.).
alternifolia, *Loes. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 81 (= *Viburnum alternifolium*).—Java.
amara, *Loes. l. c.* 457.—Am. trop.
andicola, *Loes. l. c.* 161.—Bolivia.
andorensis, *Loes. l. c.* 394.—Peruv.
anonoides, *Loes. l. c.* 164.—Peruv.
apicidens, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 22.—Guiana.
ardisioides, *Loes. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 359.—China.
Azevinho, *Sol. in Lowe, Man. Fl. Madeir.* 12.—Ins. Mader.
Beccariana, *Loes. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 96.—Borneo.
biserrulata, *Loes. l. c.* 463.—Bras.
Blanchetii, *Loes. l. c.* 415.—Bras.
bogotensis, *Loes. l. c.* 82.—Sumatra.
borneensis, *Loes. l. c.* 284.—Borneo.
Brandegeeana, *Loes. l. c.* 148.—Calif.
bronxensis, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 604.—Am. bor.
buxifolioides, *Loes. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 225.—Boliv.
casiquiarensis, *Loes. l. c.* 437.—Bras.
celebesiaca, *Loes. l. c.* 205.—Celebes.
Championii, *Loes. l. c.* 349.—China.
cissoidea, *Loes. l. c.* 430.—Borneo.
Clarkei, *Loes. l. c.* 274.—Ind. or.
cochinchinensis, *Loes. l. c.* 230 (= *Hexadica cochinchinensis*).—Cochinch.
crassifolioides, *Loes. l. c.* 160.—Peruv.
densiflora, Zipp. ex Loes. l. c. 82 = alternifolia.
dictyoneura, *Loes. l. c.* 58.—Tonkin.
Engleriana, *Loes. l. c.* 428.—Sumatra.
ericoides, *Loes. l. c.* 176.—Peruv.
friburgensis, *Loes. l. c.* 371.—Bras.
Glazioviana, *Loes. l. c.* 194.—Bras.
Goudotii, *Loes. l. c.* 400.—N. Granat.
Guayusa, *Loes. l. c.* 310.—Am. trop.
Harmsiana, *Loes. l. c.* 433.—Borneo.
Havilandii, *Loes. l. c.* 423.—Borneo.
Henryi, *Loes. l. c.* 491.—China.
hypoglauca, *Loes. l. c.* 80 (= *Prinos hypoglaucus*).—Ins. Banca.
hypopsile, *Loes. l. c.* 213.—Bras.
hypotricha, *Loes. l. c.* 103.—Ind. or.
intermedia, *Loes. l. c.* 273.—China.
Jenmanii, *Loes. l. c.* 412.—Guiana.
Karstenii, *Loes. l. c.* 165.—N. Granat.
kelungensis, *Loes. l. c.* 335.—China.
Lechleri, *Loes. l. c.* 177.—Peruv.
leucoclada, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 148.—Japon.
liukiuensis, *Loes. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 336.—Ins. Liukiu.
longipetiolata, *Loes. l. c.* 383.—Bras.
loretoica, *Loes. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 166.—Peruv.
Macrolaurus, *Loes. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 438.—Ecuador.
malaccensis, *Loes. l. c.* 432.—Ind. or.
Mandonii, *Loes. l. c.* 226.—Boliv.
Martii, *Loes. l. c.* 448.—Bras.

ILEX:—
matangicola, *Loes. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 115.—Borneo.
Matthewsii, *Loes. l. c.* 176.—Peruv.
Maximowicziana, *Loes. l. c.* 339.—China.
metabaptista, *Loes. l. c.* 238.—China.
microsticta, *Loes. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 164.—Peruv.
minimifolia, *Loes. in Nov. Act. Nat. Cur.* lxxviii. 174.—Boliv.
naiguatina, *Loes. l. c.* 169.—Venez.
oligoneura, *Loes. l. c.* 464.—Bras.
Oliveriana, *Loes. l. c.* 406.—Guiana.
organensis, *Loes. l. c.* 219.—Bras.
Pierreana, *Loes. l. c.* 382.—Bras.
pseudoebenacea, *Loes. l. c.* 386.—Boliv.
pseudoembelioides, *Loes. l. c.* 204.—Celebes.
pseudoodorata, *Loes. l. c.* 285.—Ind. or.
pseudotheezans, *Loes. l. c.* 370.—Bras.
quitensis, *Loes. l. c.* 232 (= *Rhamnus quitensis*).—Am. austr.
sarawaccensis, *Loes. l. c.* 434.—Borneo.
sclerophylloides, *Loes. l. c.* 77.—Malaya.
Schwackeana, *Loes. l. c.* 416.—Bras.
Sellowii, *Loes. l. c.* 122.—Bras.
Stapfiana, *Loes. l. c.* 431.—Borneo.
sumatrana, *Loes. l. c.* 233.—Sumatra.
szechwanensis, *Loes. l. c.* 347.—China.
tarapotina, *Loes. l. c.* 393.—Peruv.
Taubertiana, *Loes. l. c.* 125.—Bras.
teratopis, *Loes. l. c.* 93.—Am. trop.
tonkiniana, *Loes. l. c.* 332.—Tonkin.
trichoclada, *Loes. l. c.* 178.—Boliv.
trichothyrsa, *Loes. l. c.* 456.—Bras.
umbellulata, *Loes. l. c.* 100 (= *Ehretia umbellulata*).—Ind. or.; Burma.
villosula, *Loes. l. c.* 306.—Peruv.
virgata, *Loes. l. c.* 191.—Bras.
Vitis-Idaea, *Loes. l. c.* 183.—Bras.
Warburgii, *Loes. l. c.* 326.—China.
Wattii, *Loes. l. c.* 322.—Ind. or.
Weberbaueri, *Loes. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 165.—Peruv.

ILLICIUM, Linn. (Magnol.).
Dunnianum, *Tutch. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 62.—China.
micranthum, *Dunn, in Hook. Ic. Pl.* t. 2714.—China.

ILLIGERA, Blume (Combret.).
luzonensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 18 (= *Henschelia luzonensis*).—Ins. Philipp.

ILLIPE, Koen. = **Bassia**, Koen. (Sapot.).
Betis, Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull. i. 46 (= *Azaola Betis*).—Ins. Philipp.
coriacea, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 41.—Ins. Philipp.
multiflora, Merrill, l. c.—Ins. Philipp.
ramiflora, Merrill, l. c. 42.—Ins. Philipp.

ILYSANTHES, Rafin. (Scrophul.).
Bolusii, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 367.—Afr. austr.
conferta, *Hiern, l. c.* 365.—Afr. austr.
Muddii, *Hiern, l. c.* 366.—Afr. austr.
Plantaginella, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 49.—Afr. trop.
Schlechteri, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 365.—Afr. austr.

IMPATIENS, Riv. (Geran.).
acmanthera, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 17.—Reg. Himal.
aganantha, *Hook. f. l. c.* 16.—Reg. Himal.
Aitchisoni, *Hook. f. l. c.* 9.—Ind. or.
Andersoni, *Hook. f. l. c.* 27.—Burma.
annulifer, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.
aurella, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 34.—Am. bor.
Bagshawei, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 129.—Afr. trop.
Balfourii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7878.—Reg. Himal.
bivittata, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 16.—Reg. Himal.
bracteolata, *Hook. f. l. c.* 31.—Ind. or.
Brandisii, *Hook. f. l. c.* 29.—Burma.
burmanica, *Hook. f. l. c.* 27.—Burma.
chrysantha, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7786.—Ind. or.

IMPATIENS:—
citrina, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 17.—Reg. Himal.
Craddockii, *Hook. f. l. c.* 29.—Burma.
curvipes, *Hook. f. l. c.* 25.—Burma.
cuspidifera, *Hook. f. l. c.* 27.—Ind. or.
Dahlii, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 313.—Ins. Bismarck.
decipiens, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 17.—Reg. Himal.
depauperata, *Hook. f. l. c.* 31.—Ind. or.
drepanophora, *Hook. f. l. c.* 17.—Reg. Himal.
Duthiei, *Hook. f. l. c.* 11.—Reg. Himal.
ecalcarata, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 84.—Am. bor.
exilis, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 18.—Reg. Himal.
falcifer, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7923; *et in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 18.—Reg. Himal.
filicornu, C. B. Clarke, ex Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India, iv. 19 = exilis.
flammea, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 350.—Afr. trop.
Flemingii, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 9.—Ind. or.
florigera, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* 13.—Reg. Himal.
florulenta, *Hook. f. l. c.* 25.—Burma.
formosa, *Hook. f. l. c.* 28.—Ind. or.
Gamblei, *Hook. f. l. c.* 15.—Reg. Himal.
Gammiei, *Hook. f. l. c.* 16.—Reg. Himal.
graciliflora, *Hook. f. l. c.* 15.—Reg. Himal.
gratioloides, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 350.—Afr. trop.
Helferi, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 28.—Burma.
Hobsoni, *Hook. f. l. c.* 15.—Reg. Himal.
Inayatii, *Hook. f. l. c.* 10.—Ind. or.
infundibularis, *Hook. f. l. c.* 13.—Reg. Himal.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 82.—Afr. trop.
khasiana, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 27.—Reg. Himal.
Kingii, *Hook. f. l. c.* 14.—Reg. Himal.
Lauterbachii, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 312.—N. Guin.
leptocarpa, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 17.—Reg. Himal.
linearifolia, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 313.—N. Guin.
lutea, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 19.—Reg. Himal.
manipurensis, *Hook. f. l. c.* 31.—Ind. or.
Mannii, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* 27.—Ind. or.
Marianae, *Reichb. f. ex Hook. f. l. c.*—Ind. or.
Masoni, *Hook. f. l. c.* 29.—Burma.
maxima, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 351.—Afr. trop.
micromeris, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 26.—Burma.
microsciadia, *Hook. f. l. c.* 16.—Reg. Himal.
minimiflora, *Hook. f. l. c.*—Reg. Himal.
Mokimi, *Hook. f. l. c.* 26.—Burma.
nepalensis, *Hook. f. l. c.* 14.—Reg. Himal.
nigrescens, *Hook. f. l. c.* 28.—Ind. or.
nummularifolia, *Hook. f. l. c.* 14.—Reg. Himal.
occultans, *Hook. f. l. c.* 17.—Reg. Himal.
Pantlingii, *Hook. f. l. c.* 16.—Reg. Himal.
peguana, *Hook. f. l. c.* 29.—Burma.
polyphylla, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 311.—Ins. Bismarck.
praetermissa, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 29; *et in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 18.—Reg. Himal.
Prainii, *Hook. f. l. c.* 14.—Reg. Himal.
prostrata, *Hook. f. l. c.* 31.—Ind. or.
psittacina, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7809.—Ind. or.
rangoonensis, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 29.—Burma.
refracta, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 83.—Afr. trop.
Rodatzii, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 312.—N. Guin.
Schlechteri, *Warb. l. c.* 311.—N. Guin.
scitula, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 14.—Reg. Himal.
Scullyi, *Hook. f. l. c.* 15.—Reg. Himal.
serratifolia, *Hook. f. l. c.* 18.—Reg. Himal.
serrulata, *Hook. f. l. c.* 10.—Ind. or.
stricta, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* 28.—Ind. or.
striolata, *Hook. f. l. c.*—Ind. or.

IMPATIENS :—

trichocladon, *Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 16.—Reg. Himal.

trichera, *Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 312.—N. Guin.

uncipetala, *C. B. Clarke, ex Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 18.—Reg. Himal.

Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 84.—Afr. trop.

violoides, *Edgew. ex Hook. f. in Rec. Bot. Surv. India*, iv. 8.—Ind. or.

Wallichii, *Hook. f. l. c.* 15.—Reg. Himal.

Wattii, *Hook. f. l. c.* 30.—Ind. or.

IMPERATA, Cyrill. (Gramin.).

angolensis, *Fritsch, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 1096.—Afr. trop.

Cheesemani, *Hack. in Trans. Proc. N. Z. Inst.* xxxv. 378.—Ins. Kermadec.

longifolia, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 136.—Bras.

INDIGOFERA, Linn. (Legum.).

acutisepala, *Conrath, in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 179.—Afr. austr.

adenoides, *Baker f. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 182.—Afr. austr.

angustiloba, *Baker f. l. c.* 183.—Afr. austr.

Bagshawei, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 142.—Afr. trop.

Baumiana, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 257.—Afr. trop.

brevicalyx, *Baker f. in Journ. Bot.* 1903, 237.—Afr. trop.

Butayei, *Wildem, in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 132.—Afr. trop.

caudata, *Dunn, in Gard. Chron.* 1902, ii. 210.—China.

Cloiselii, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 146.—Madag.

Conzattii, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 310.—Mexic.

Dalzellii, *Cooke, Fl. Bombay*, 311.—Ind. or.

Deflersii, *Baker f. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich.* xlix. 194.—Arabia.

depauperata, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 40.—Madag.

desmodioides, Baker, ex Drake, Hist. Pl. Madag. i. 156 = pityophylla.

erythrogrammoides, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 133.—Afr. trop.

Fleckii, *Baker f. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 185.—Afr. austr.

Georgei, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 268.—Austral.

griquana, *Schlechter, ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 23.—Afr. austr.

griseoides, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 257.—Afr. trop.

jaliscensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 310.—Mexic.

Kaessneri, *Baker f. in Journ. Bot.* 1903, 326.—Afr. trop.

Kelleri, *Baker f. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 187.—Afr. trop.

Krookii, *Schlechter, ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 24.—Afr. austr.

laxeracemosa, *Baker f. in Journ. Bot.* 1903, 241.—Afr. trop.

leptophylla, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 494, sphalm. = heptaphylla.

longemucronata, *Baker f. in Journ. Bot.* 1903, 330.—Afr. trop.

longipes, *N. E. Brown. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 180.—Afr. austr.

lotononoides, *Baker f. in Journ. Bot.* 1903, 187.—Afr. trop.

Micheliana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 310.—Am. cent.

minbuensis, *Gage, in Rec. Bot. Surv. India*, iii. 40.—Burma.

minutiflora, Hochst. ex Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. (1903) 93 = viscosa.

moeroensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 133.—Afr. trop.

monantha, *Baker f. in Journ. Bot.* 1903, 193.—Afr. trop.

moniliformis, *Baker f. l. c.* 323.—Afr. trop.

montana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 311.—Mexic.

namtalensis, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 258.—Afr. trop.

INDIGOFERA :—

Phillipsiae, *Baker f. in Journ. Bot.* 1903, 265.—Afr. trop.

pityophylla, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 156.—Madag.

platycarpa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 47.—Mexic.

propinqua, Hochst. ex Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. (1903) 92 = viscosa.

pseudosubulata, *Baker f. in Journ. Bot.* 1903, 264.—Afr. trop.

Rautanenii, *Baker f. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 189.—Afr. trop.

Rehmanni, *Baker f. l. c.* 190.—Afr. austr.

Ruspoli, *Baker f. l. c.* 192.—Afr. trop.

scabrida, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 487.—China.

Schlechteri, *Baker f. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 192.—Afr. austr.

scopa, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 60.—Afr. trop.

sokotrana, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 32.—Socotra.

subquadriflora, *Hochst. ex Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. (1903) 90.—Afr. trop.

Thomsoni, *Baker f. in Journ. Bot.* 1903, 189.—Afr. trop.

transvaalensis, *Baker f. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich*, xlix. 193.—Afr. austr.

trifolioides, *Baker f. in Rec. Albany Mus.* i. 279.—Afr. austr.

tulearensis, *Baill. ex Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 152.—Madag.

variabilis, *N. E. Br. ex Baker f. in Journ. Bot.* 1903, 192.—Afr. trop.

variabilis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 131.—Afr. trop.

wituensis, *Baker f. in Journ. Bot.* 1903, 218.—Afr. trop.

Zenkeri, *Harms, ex Baker f. l. c.* 241.—Afr. trop.

INDOVETHIA, Boerl. (Violac.).

Beccariana, *Bartell. in Malpighia*, xv. 172.—Borneo.

INGA, Scop. (Legum.).

gracilior, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 431.—N. Granat.

macrantha, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 687.—Venez.

olivacea *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 430.—N. Granat.

INODES, O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 529. *PALMAE.*

Blackburniana, *O. F. Cook, l. c.* 531 (= *Sabal Blackburnianum*).—Ind. occ.

causiarum, *O. F. Cook, l. c.*—Ind. occ.

glauca, *Damm. in Urb. Symb. Antill.* iv. 127.—Ind. occ.

Palmetto, *O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 532 (= *Corypha Palmetto*).—Am. bor.

Rosei, *O. F. Cook, l. c.* 534.—Mexic.

Schwarzii, *O. F. Cook, l. c.* 532.—Am. bor.

texana, *O. F. Cook, l. c.* 534.—Am. bor.

uresana, *O. F. Cook, l. c.* (= *Sabal uresana*).—Mexic.

vestita, *O. F. Cook, l. c.* 533.—Ind. occ.

INTSIA, Thou. (Legum.).
[AFZELIA, Sm. I. K.]

acuminata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 20.—Ins. Philipp.

Bakeri, *Prain, in Sc. Mem. Med. Off. India*, xii. 13 (= *Afzelia Bakeri*).—Penins. Mal.

INULA, Linn. (Compos.).

acervata, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 340.—Afr. trop.

arenaria, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 527, sphalm. = Isatis arenaria.

chrysantha, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 614.—China.

Giraldii, *Diels, l. c.* 613.—China.

limosa, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 414.—Afr. trop.

paludosa, *O. Hoffm. l. c.*—Afr. trop.

subscaposa, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 341.—Afr. trop.

vulgaris, Williams, Prodr. Fl. Brit. 14 = I. Conyza.

IOCHROMA, Benth. (Solan.).

brevistamineum, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 387.—Ecuador.

IOCHROMA :—

Sodiroi, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 385.—Ecuador.

solanifolia, *Damm. l. c.* 386.—Ecuador.

suffruticosa, *Damm. l. c.*—Ecuador.

IODES, Blume (Olac.).

reticulata, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 90.—Afr. trop.

IONIDIUM, Vent. (Violac.).

Bourdaisii, Brongn. ex Beauvis. Gen. Montrouz. 81 = ilicifolium.

glaucum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 734.—Parag.

Glaziovii, *Eichl. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 31, nomen.—Bras.

graminifolium, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 735.—Parag.

guaraniticum, *Chod. & Hassl. l. c.* v. 68.—Parag.

paraguariense, *Chod. l. c.* ii. 734.—Parag.

rivalis, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iv. i. (1902) 3.—Urug.

Talemei, *Donn. Sm. in Contr. Bot. Gaz.* xi. 1.—Am. cent.

IONOXALIS, Small, Fl. S. E. U. S. 665 (1903). *OXALIDACEAE.*

Martiana, *Small, l. c.* (= *Oxalis Martiana*).—Am. bor.

vespertilionis, *Small, l. c.* (= *Oxalis vespertilionis*).—Am. bor.

violacea, *Small, l. c.* (= *Oxalis violacea*).—Am. bor.

IPHIGENIA, Kunth (Liliac.).

flexuosa, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. iv. 995.—Afr. trop.

Schlechteri, *Engl. Jahrb.* xxxii. 89.—Afr. austr.

IPHIONA, Cass. (Compos.).

pinnatisecta, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. iv. 1017.—Afr. trop.

IPOMOEA, Linn. (Convolv.).

Atherstonei, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 53.—Afr. austr.

Barretti, *Rendle, in Journ. Bot.* 1902, 190.—Afr. austr.

bellecomans, *Rendle, l. c.* 1901, 16.—Afr. austr.

Bowieana, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 55 (= *Merremia Bowieana*).—Afr. austr.

Brasseuriana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 116.—Afr. trop.

Buchii, *Urb. Symb. Antill.* iii. 356.—Ind. occ.

calcarata, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 180.—Afr. trop.

caudata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 498.—Mexic.

Choisiana, *W. F. Wight. in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* ix. 298.—As. et Austral. trop.

cornucopia, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 688.—Parag.

crinita, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 216 (1905).—Mexic.

curtipes, *Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 140.—Afr. trop.

Dammeriana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 115.—Afr. trop.

Debeerstii, *Wildem. l. c.* 114.—Afr. trop.

Ecenii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 21.—Afr. trop.

Edithae, *Gage, in Rec. Bot. Surv. India*, iii. 81.—Burma.

flavo-purpurea, *Urb. Symb. Antill.* iii. 345.—Ind. occ.

furcyensis, *Urb. l. c.* 351.—Ind. occ.

Gerrardiana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 21.—Afr. austr.

gracilisepala, *Rendle, l. c.* 12.—Afr. austr.

granulosa, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 687.—Parag.

Grisebachii, *Urb. Symb. Antill.* iii. 353.—Ind. occ.

guaranitica, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. v. 689.—Parag.

Hanningtoni, *Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii 152 (= *Argyreia Hanningtoni*).—Afr. trop.

Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. v. 693.—Parag.

Hierniana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 58.—Afr. trop.

Hildeana, *Rendle, l. c.* 18.—Afr. trop.

Hovatum, *Rendle, l. c.* 58.—Madag.

illustris, *Prain, Bengal Pl.* 735.—Ind. or.

irengana, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 51.—Guiana.

IPOMOEA :—
Lambtoniana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 16.—Afr. austr.
leuconeura, *Urb. Symb. Antill.* iii. 350.—Ind. occ.
lanceolata, *Urb. l. c.* 355.—Ind. occ.
Lugardi, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 163. —Afr. trop.
lukafuensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 112.—Afr. trop.
macrosiphon, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxx. 387.—Afr. trop.
Mahoni, *C. H. Wright, in Gard. Chron.* 1903, i. 257. —Afr. trop.
malvaefolia, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 65 (= *Merremia malvaefolia*).—Afr. austr.
megacarpa, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 218 (1905).—Mexic.
minuta, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 113.—Reg. Argent.
nematoloba, *Urb. Symb. Antill.* iii. 349.—Ind. occ.
nitens, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 689.—Parag.
Ommannei, *Rendle, in Journ. Bot.* 1902, 190.—Afr. austr.
peninsularis, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 168 (1903).—Calif.
petunioides, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 63.—Afr. austr.
praetermissa, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 56.—Afr. austr.
Pringsheimiana, *Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 185 (= *Rivea Pringsheimiana*).—Afr. trop.
pseudo-malvaeoides, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 691.—Parag.
Randii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 18.—Afr. trop.
recta, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 114.—Afr. trop.
rhodesiana, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 57.—Afr. trop.
Robertsiana, *Rendle, l. c.* 18.—Afr. austr.
rubrocincta, *Urb. Symb. Antill.* iii. 347.—Ind. occ.
sarmentacea, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 15.—Afr. austr.
Saundersiana, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 60.—Afr. austr.
scopulorum, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 169 (1903).—Calif.
Scotellii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 18.—Afr. trop.
Seleri, *Millsp. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 23. —Am. cent.
sinaloensis, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 217 (1905).—Mexic.
spinulosa, *T. S. Brandegee, l. c.* 169 (1903).—Calif.
sublucens, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 17.—Afr. austr.
tastensis, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 168 (1903).—Calif.
tetraptera, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 65.—Afr. austr.
tomentosa, *Urb. Symb. Antill.* iii. 344 (= *Convolvulus tomentosus*).—Ind. occ.
trinitensis, *Urb. l. c.* 346.—Ind. occ.
Tuerckheimii, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 8.—Am. cent.
turneroides, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 688.—Parag.
undulata, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 60.—Afr. austr.
valenzuelensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 687.—Parag.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 113. —Afr. trop.
viridiflora, *Urb. Symb. Antill.* iii. 348.—Ind. occ.
Walpersiana, *Duchassaing, ex Urb. l. c.* 345.—Ind. occ.
Whyteana, *Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 158. —Afr. trop.
xiphosepala, *Baker, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 58.—Afr. austr.

IRESINE, P. Br. (Amarant.).
chenopodioides, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 390.—Parag.
Hassleriana, *Chod. l. c.*—Parag.
tomentosa, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 540.—Reg. Argent.

IRIS, Tourn. (Irid.).
amabilis, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1903, 484. —Calif.

IRIS :—
arctica, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 132.—Am. bor.
Aschersoni, *Foster, in Garden,* 1902, 288.—Cilicia.
Bolleana, *Siehe, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 115.—Cilicia.
bucharica, *Foster, in Gard. Chron.* 1902, i. 385.—Oriens.
chrysantha, *Baker, in Bot. Mag.* t. 7784.—Persia?
chrysophylla, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 633.—Am. bor.
coerulea, *B. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 917.—Turkestan.
Collettii, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7889.—Burma.
Corygei, *Hort. ex Lynch, Book Iris,* 146.—Hab.?
dengerensis, *B. Fedtsch. in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 157.—Turkestan.
Elisabethae, *Siehe, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 115.—Hab.?
Ewbankiana, *Foster, in Gard. Chron.* 1901, i. 307.—Oriens.
foliosa, *Mackenzie & Bush, Fl. Jacks. County,* 63; *et in Trans. Acad. St. Louis,* xii. 80.—Am. bor.
galatica, *Siehe, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 115.—Cappadoc.
Hausknechti, Siehe, in Gard. Chron. 1901, i. 313 = Sieheana.
Haynei, *Mallett, in Gard. Chron.* 1904, i. 266.—Palaest.
Heldreichi, *Siehe, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 114.—Cilicia.
hissarica, *O. Fedtsch. ex Kneuck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 157.—Turkestan.
issica, *Siehe, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 115.—Cilicia.
Kuschakewiczi, *B. Fedtsch. in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 158.—Turkestan.
Lamancei, *Hort. ex Lynch, Book Iris,* 81.—Am. bor.
linifolia, *O. Fedtsch. in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 159.—Turkestan.
Masiae, *Hort. ex Foster, in Garden,* 1902, 288.—As. Min.
Narbuti, *O. Fedtsch. in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 158.—Turkestan.
narynensis, *O. Fedtsch. l. c.* 159.—Turkestan.
pelogonus, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 68.—Am. bor.
Sieheana, *Lynch, Book Iris,* 184.—As. Min.
Talischi, *Forster, ex Sprenger, Bull. Soc. Tosc. Ort.* 1901, 328.—Persia.
Tauri, *Siehe in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 114.—Cilicia.
Urumovi, *Vel. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 155.—Eur.
warleyensis, *Foster, in Gard. Chron.* 1902, i. 386.—Oriens.

IRVINGELLA, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. IX. i. (1905) 276. *SIMARUBACEAE.*
Boto, *Van Tiegh. l. c.* 278.—Afr. trop.
Chevalieri, *Van Tiegh. l. c.* 277.—Afr. trop.
Harmandiana, *Van Tiegh. l. c.* 279.—Cochinch.
Klainei, *Van Tiegh. l. c.* 278.—Afr. trop.
malayana, *Van Tiegh. l. c.* 276 (= *Irvingia malayana*). —Penins. Mal.
Oliveri, *Van Tiegh. l. c.* (= *Irvingia Oliveri*).—Cochinch.
rubra, *Van Tiegh. l. c.* 277.—Afr. trop.
Smithii, *Van Tiegh. l. c.* 276 (= *Irvingia Smithii*).—Afr. trop.
Spirei, *Van Tiegh. l. c.* 277.—Afr. trop.
Tholloni, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.

IRVINGIA, Hook. f. (Simarub.).
caerulea, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. IX. i. 256.—Afr. trop.
Duparqueti, *Van Tiegh. l. c.* 255.—Afr. trop.
erecta, *Van Tiegh. l. c.* 257.—Afr. trop.
fusca, *Van Tiegh. l. c.* 256.—Afr. trop.
glaucescens, *Engl. Jahrb.* xxxii. 124.—Afr. trop.
Griffoni, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. IX. i. 255. —Afr. trop.
Hookeriana, *Van Tiegh. l. c.* 254.—Afr. trop.
laeta, *Van Tiegh. l. c.* 256.—Afr. trop.
nodosa, *Van Tiegh. l. c.* 254.—Afr. trop.
pauciflora, *Van Tiegh. l. c.* 257.—Afr. trop.
platycarpa, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.
tenuinucleata, *Van Tiegh. l. c.* 256.—Afr. trop.
velutina, *Van Tiegh. l. c.* 254.—Afr. trop.

IRYANTHERA, Warb. (Myristic.).
juruensis, *Warb. in Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 137.—Reg. Amaz.
Ulei, *Warb. l. c.*—Reg. Amaz.

ISACHNE, R. Br. (Gramin.).
angustifolium, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1903, 377.—Ind. occ.
Beneckii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 459.—Java.
debilis, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 322.—China.
grisea, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 57.—Ins. Bismarck.
pauciflora, *Hack. in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 80.—Ins. Philipp.
rigidifolia, *Urb. Symb. Antill.* iv. 85 (= *Agrostis rigidifolia*).—Ind. occ.

ISCHAEMUM, Linn. (Gramin.).
Goebelii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 149.—Ind. or.
nilagiricum, *Hack. l. c.* 150.—Ind. or.

ISCHNOSIPHON, Koern. (Scitam.).
longiflorus, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 160.—Bras.
simplex, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 411.—Bras.
sphenophyllus, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 161.—Bras.

ISERTIA, Schreb. (Rubiac.).
alba, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 434.—N. Granat.
Perdiei, *Sprague, l. c.*—N. Granat.

ISMENE, Salisb. = **Hymenocallis**, Salisb. (Amaryll.).
festalis, Worsley, in Gard. Chron. 1905, ii. 322. —Hybr.

ISOCOMA, Nutt. = **Bigelovia**, Nutt. (Compos.).
hirtella, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 6 = B. Wrightii.

ISOGLOSSA, Oerst. (Acanth.).
Bolusii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 82.—Afr. austr.
Candelabrum, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 113.—Afr. trop.
Cooperi, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 84.—Afr. austr.
delicatula, *C. B. Clarke, l. c.* 83.—Afr. austr.
Grantii, *C. B. Clarke, l. c.* 82.—Afr. austr.
Macowanii, *C. B. Clarke, l. c.* 83.—Afr. austr.
stipitata, *C. B. Clarke, l. c.* 82.—Afr. austr.
sylvatica, *C. B. Clarke, l. c.* 80.—Afr. austr.
Woodii, *C. B. Clarke, l. c.* 81.—Afr. austr.

ISOLONA, Engl. (Anonac.).
campanulata, *Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl.* vi. 85.—Afr. trop.
congolana, *Engl. & Diels, l. c.* 84 (= *Monodora congolana*).—Afr. trop.
Dewevrei, *Engl. & Diels, l. c.* 83 (= *Monodora Dewevrei*).—Afr. trop.
Hexsenii, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 300, descr.—Afr. trop.
hexaloba, *Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl.* vi. 82. —Afr. trop.
Thonneri, *Engl. & Diels, l. c.* 83 (= *Monodora Thonneri*).—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. & Diels, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,* iii. 301, descr.—Afr. trop.

ISOMERIS, Nutt. (Cappar.).
globosa, *A. A. Heller, Muhlenbergia,* ii. 50.—Calif.

ISOPOGON, R. Br. (Proteac.).
alcicornis, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 134.—Austral.

ISOPTERA, Scheffer (Dipterocarp.).
Burckii, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* 111.—Arch. Mal.

ISOPYRUM, Linn. (Ranunc.).
Boissieui, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 6 (= *Anemone Boissieui*).—China.
Cavaleriei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 280.—China.
Franchetii, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 405.—China.

ISOSTIGMA, Less. (Compos.).
acaule, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 394 (= *Bidens acaulis*).—Parag.
Riedelii, *Chod. l. c.*—Parag.

ISOSTYLIS, Spach = **Banksia**, Gaertn. (Proteac.).
dentata, J. Britten, Bot. Cook Voy. 84 = B. dentata.
ericifolia, J. Britten, l. c. 83 = B. ericaefolia.
integrifolia, J. Britten, l. c. = B. integrifolia.
serrata, J. Britten, l. c. = B. serrata.

ISOTRIA, Rafin. = **Pogonia**, Juss. (Orchid.).
affinis, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 297 = P. affinis.

ISOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 546 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
humilis, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 266 = O. humilis.
spectabilis, Van Tiegh. l. c. 267 = O. spectabilis.

ITERIA, Hort. ex Gartenfl. 1903, 649, sphalm. = **Stevia**, Cav. (Compos.).
odorata, Hort. l. c. = Stevia odorata.

ITOA, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2688 (1901). *BIXACEAE.*
orientalis, *Hemsl. l. c.*—China.

IXIOLAENA, Benth. (Compos.).
Websteri, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 93.—Austral.

IXONANTHES, Jack (Linac.).
grandiflora, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 30.—Ins. Bangka.

IXORA, Linn. (Rubiac.).
Albersii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 355.—Afr. trop.
atrata, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 106.—Afr. trop.
bracteata, *Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 283.—Ins. Cook.
collina, *Beauvis. Gen. Montrouz.* 60 (= *Pancheria collina*).—N. Caled.
congesta, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 107.—Afr. trop.
dolichophylla, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 337.—Malaya.
euosmia, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 355.—Afr. trop.
humilis, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 79.—Penins. Mal.
mangabensis, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 585.—Madag.
Mocquerysi, *Aug. DC. l. c.*—Madag.
multibracteata, *H. H. W. Pearson, ex King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 74.—Penins. Mal.
narcissodora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 356.—Afr. trop.
nematopoda, *K. Schum. l. c.* 357.—Afr. trop.
odorata, *Koord. et Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lix. (1902) 163 (= *Pavetta odorata*).—Java.
phellopus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 357.—Afr. trop.
pulcherrima, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 476.—Ins. Carol.
reginae, *Aresch. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxix. no. 2, 83, nomen.—Hab. ?
rosea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 358.—Afr. trop.
Scortechinii, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 80.—Penins. Mal.
triantha, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 476.—Ins. Carol.
umbellata, *Valet. ex Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lix. (1902) 162.—Java.
Valetonii, *K. Schum. ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 85.—Celebes.
viridiflora, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 358.—Afr. trop.

J

JABOROSA, Juss. (Solan.).
andina, *F. Kurtz, in Bol. Acad. Ci. Cordoba*, xv. 515, nomen.—Reg. Argent.
desiderata, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 41.—Patag.

JACARANDA, Juss. (Bignon.).
chapadensis, *Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, 63.—Bras.

JACARATIA, DC. = **Jarucatia**, Marcg. (Passifl.).
Hassleriana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 546.—Parag.

JACKSONIA, R. Br. (Legum.).
decumbens, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 238.—Austral.
eremodendron, *E. Pritz. l. c.* 239.—Austral.
mollissima, *Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 22.—Austral.

JACOBINIA, Moric. (Acanth.).
boliviensis, *Woodr. Gard. India*, ed. V. 415 (= *Drejera boliviensis*).—Bolivia.
elegantissima, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 417.—Peruv.
mendax, *Lindau, l. c.* 418.—Peruv.
mollis, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 91.—Mexic.
oaxacana, *Greenm. l. c.*—Mexic.
rigida, *Lindau, ex Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 198 (= *Sericographis rigida*).—Bras.

JACQUEMONTIA, Choisy (Convolv.).
cearensis, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 320.—Bras.
havanensis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 342 (= *Convolvulus havanensis*).—Ind. occ.
macrocephala, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 219 (1905).—Mexic.
reclinata, *House, ex Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 435.—Am. bor.
serpyllifolia, *Urb. Symb. Antill.* iii. 341 (= *Convolvulus serpyllifolius*).—Ind. occ.
verticillata, *Urb. l. c.* 339 (= *Ipomoea verticillata*).—Ind. occ.

JACQUINIA, Linn. (Myrsin.).
aciculata, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 450.—Ind. occ.
aculeata, Mez, l. c. 444 = ruscifolia.
Barbasco, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Theophrast.* 32 (= *Chrysophyllum Barbasco*).—Ind. occ.
brasiliensis, *Mez, l. c.* 35.—Bras.
Curtissii, *Britton, in Torreya*, v. 44.—Ind. occ.
Donnell-Smithii, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Theophrast.* 39.—Am. cent.
flammea, *Millsp. ex Mez, l. c.* 40.—Am. cent.
geniculata, *Mez, l. c.* 33.—Venez.
gracilis, *Mez, l. c.* 39.—N. Granat.
keyensis, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 444.—Ind. occ.
Liebmannii, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Theophrast.* 38.—Mexic.
ovalifolia, *Mez, l. c.* 41.—Venez.
petiolata, *J. K. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 693.—Venez.
Schiedeana, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Theophrast.* 41.—Mexic.
Sprucei, *Mez, l. c.* 43.—Ecuador.
submembranacea, *Mez, l. c.* 39.—Mexic.

JAMBOSA, DC. (Myrtac.).
[EUGENIA, Mich. I. K.]
Barnesii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 37.—Ins. Philipp.
bataanensis, *Merrill, l. c.* 36.—Ins. Philipp.
Garciae, *Merrill, l. c.*—Ins. Philipp.
longipedicellata, *Merrill, l. c.* 37.—Ins. Philipp.
luzonensis, *Merrill, l. c.*—Ins. Philipp.
Weinlandii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 326.—N. Guin.

JANUSIA, A. Juss. (Malpigh.).
mexicana, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 203 (1905).—Mexic.

JAPARANDIBA, Adans. = **Gustavia**, Linn. (Myrtac.).
Spruceana, Ule, in Karst. & Schenck, Vegetationsbilder, ii. (1904) sub tt. 1–2.—Reg. Amaz.

JASMINUM, Tourn. (Oleac.).
aculeatum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 76 (= *Mogorium aculeatum*).—Ins. Philipp.
blandum, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 179.—Afr. trop.
dichotomum, *Vahl, Enum. Pl.* i. 26.—Afr. trop.

JASMINUM:—
gardeniodorum, *Gilg, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 8.—Afr. trop.
Listeri, *King, ex Gage, in Rec. Bot. Surv. Ind.* i. 349.—Ind. or.
Radcliffei, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 178.—Afr. trop.
Steudneri, *Schweinf. ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 12.—Afr. trop.

JASONIA, Cass. (Compos.).
obtusifolia, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* i. 28.—Hispan.

JATROPHA, Linn. (Euphorb.).
Baumii, *Pax, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 283.—Afr. trop.
Ellenbeckii, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 284.—Afr. trop.
fallax, *Pax, l. c.*—Afr. trop.
Loeflingii, *Aresch. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxix. no. 2. 43, nomen.—Hab. ?
maracayensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 618.—Parag.
vernicosa, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 206 (1905).—Calif.

JEPSONIA, Small (Saxifr.).
heterandra, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 201.—Calif.

JESSENIA, Karst. (Palm.).
Glazioviana, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxi. *Beibl.* lxx. 21.—Bras.

JOHRENIA, DC. (Umbell.).
longifolia, *Calest. in Martelli, Webbia*, 224 (= *Eriosynaphe longifolia*).—Rossia; As. cent.
nudiuscula, *Palibin, Beitr. Fl. Transbaik. ex Bot. Centralbl.* xcii. 558 (= *Phloiodicarpus nudiusculus*).—Dahuria.

JOINVILLEA, Gaudich. (Flagell.).
borneensis, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 198.—Borneo.

JONESIELLA, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 661. *LEGUMINOSAE.*
asclepiadoides, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus asclepiadoides*).—Am. bor.

JUGLANS, Linn. (Jugland.).
major, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 50.—Am. bor.

JULIANIA, Schlecht. (Julianiac.).
amplifolia, *Hemsl. & Rose, in Ann. Bot.* xvii. (1903) 444.—Mexic.
glauca, *Hemsl. & Rose, l. c.*—Mexic.
mollis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2722.—Mexic.

JULOCROTON, Mart. (Euphorb.).
integer, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 397.—Parag.
phyllanthum, *Chod. & Hassl. l. c.* v. 501.—Parag.
rupestris, *Chod. & Hassl. l. c.* 498.—Parag.
rutilus, *Chod. & Hassl. l. c.* 501.—Parag.
villosissimus, *Chod. & Hassl. l. c.* 499.—Parag.

JUNCAGO, Tourn. = **Triglochin**, Linn. (Naiad.).
Chabraei, Bub. Fl. Pyren. iv. 8 = Triglochin bulbosum.
maritima, Bub. l. c. 9 = Triglochin maritimum.

JUNCELLUS, Kunth (Cyper.).
nipponicus, *C. B. Clarke, ex Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 202, nomen.—China.

JUNCOIDES, Dill. = **Luzula**, DC. (Juncac.).
bulbosum, Small, in Torreya, i. 74 = L. campestris.
echinatum, Small, l. c.—Am. bor.
erectum, Boulger, in Johns, Flowers of Field, ed. xxix. 755 = L. campestris.
intermedium, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 610 = L. campestris.
multiflorum, Druce, in Ann. Scott. Nat. Hist. 1904, 42.—Scotia.
patagonicum, Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. viii. 302 = L. patagonica.
pumilum, Macl. l. c. = L. pumila.
subcapitatum, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 401.—Am. bor.
subcongestum, Coville, ex A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 105.—Calif.

JUNCUS, Tourn. (Juncac.).
alpestris, Bub. Fl. Pyren. iv. 181 = trifidus.
brevicaudatus, Fernald, in Rhodora, vi. 35.—Am. bor.
brunnescens, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 400.—Am. bor.
bufonum, Bub. Fl. Pyren. iv. 187 = bufonius.
columbianus, Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington, xiv. 87.—Am. bor.
cupreus, Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 292.—Japon.
Dudleyi, Wiegand, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 1046.—Am. bor.
Fauriei, Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 292.—Japon.
Fauriensis, Buchenau, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 127.—Japon.
filicaulis, Buchenau, ex Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxviii. 912.—Austral.
interior, Wiegand, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 1045.—Am. bor.
macrophyllus, Coville, in Univ. Calif. Publ. Bot. i. 65.—Am. bor.
Matthioli, Bub. Fl. Pyren. iv. 177 = effusus.
modicus, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 165.—China.
monostichus, Bartlett, in Rhodora, 1905, 50.—Am. bor.
Murbeckii, Beck, in Wiss. Mitth. Bosn. Herzegow. ix. 478.—Hybr.
neo-mexicanus, Wiegand, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 447.—Am. bor.
oronensis, Fernald, in Rhodora, vi. 36.—Am. bor.
parous, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 401.—Am. bor.
saximontanus, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 401.—Am. bor.
setchuensis, Buchenau, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 17, descr.—China.
textilis, Buchenau, in Abh. Nat. Ver. Brem. xvii. 336.—Calif.
truncatus, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 399.—Am. bor.
umbellifer, Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 292.—China.

JUNGIA, Linn. f. (Compos.).
bogotensis, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 657.—N. Granat.
dentata, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xli. 278 (= Pleocarphus dentatus).—Chili.
Jelskii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 512.—Peruv.
Lehmannii, Hieron. l. c. xxviii. 655.—N. Granat.
revoluta, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xli. 278; Reiche, Fl. Chile, iv. 458 (= Pleocarphus revolutus).—Chili.
Trianae, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 656.—N. Granat.

JUNIPERUS, Tourn. (Conif.).
Tremolsii, Pau, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xiv. (1904) 212.—Hybr.
triangularis, Hort. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xxvi. 543 = taxifolia.

JURINEA, Cass. (Compos.).
bipinnata, Adam. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat. lxxiv. 144.—Turcia.
Gouani, Rouy, Fl. Fr. ix. 101.—Gallia.
Kirghisorum, Janisch. in Trav. Soc. Nat. Univ. Imp. Kasan, xl. I. (1905), ex Fedde, Repert. Nov. Sp. iii. (1906) 30.—Rossia.
Paulsenii, O. Hoffm. ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1903, 155.—As. cent.
Velenovskyi, Podp. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, lii. 660.—Eur.

JURUASIA, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. (1904) 402. ACANTHACEAE.
acuminata, Lindau, l. c. 408.—Bras.
rotundata, Lindau, l. c.—Bras.

JUSSIEUA, Linn. (Onagr.).
californica, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 326.—Am. bor.
epilobioides, Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 909.—Parag.
pseudo-Narcissus, Chod. & Hassl. l. c. 907.—Parag.

JUSTICIA, Houst. (Acanth.).
alboreticulata, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 370.—Bras.

JUSTICIA—
alpina, Lindau, in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 159.—Peruv.
axillaris, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 633 (= Rhytiglossa axillaris).—Parag.
Baumii, S. Moore, in Journ. Bot. 1901, 304.—Afr. trop.
Bolusii, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 65.—Afr. austr.
Bowiei, C. B. Clarke, l. c. 59.—Afr. austr.
Brycei, C. B. Clarke, l. c. 67.—Afr. austr.
Burchellii, C. B. Clarke, l. c. 59.—Afr. austr.
campestris, Lindau, in Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 197 (= Dianthera campestris).—Am. austr.
Canbyi, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 32.—Mexic.
cheiranthifolia, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 58 (= Adhatoda cheiranthifolia).—Afr. austr.
concavibracteata, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 407.—Bras.
cyanantha, Lindau, l. c. 414.—Bras.
dasyclados, Lindau, l. c. iii. 688 (= Rhytiglossa dasyclados).—Parag.
diamantina, Lindau, l. c. v. 371.—Reg. Argent.
dubiosa, Lindau, l. c. iv. 413.—Bras.
euosmia, Lindau, in Engl. Jahrb. xxx. 118.—Afr. trop.
fittonioides, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 411.—Bras.
flavidiflora, Lindau, l. c. 409.—Bras.
galapagana, Lindau, ex Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxviii. (1902) 203.—Ins. Galap.
hylophila, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 408.—Bras.
incerta, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 66.—Afr. austr.
Kaessneri, S. Moore, in Journ. Bot. 1902, 345.—Afr. trop.
Kraussii, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 62.—Afr. austr.
linarioides, S. Moore, in Journ. Bot. 1902, 308.—Afr. trop.
Loheri, C. B. Clarke, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 91.—Ins. Philipp.
loretensis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 410.—Peruv.
luzonensis, C. B. Clarke, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 91.—Ins. Philipp.
Matthewsii, Rusby, ex Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 634 (= Beloperone Matthewsii).—Parag.
mutica, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 61.—Afr. austr.
obtusifolia, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 633 (= Rhytiglossa oblongifolia).—Parag.
oreadum, S. Moore, ex Kuntze, Rev. Gen. iii. ii. 248.—Boliv.
pallidior, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 58.—Afr. austr.
patentiflora, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2792.—China.
polygaloides, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 633 (= Dianthera polygaloides).—Parag.
potamogeton, Lindau, l. c. iv. 412.—Bras.
potamophila, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxiii. 191.—Afr. trop.
praetervisa, Lindau, l. c. 192.—Afr. trop.
pseudoamazonica, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 415.—Bras.
schoensis, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxiii. 193.—Afr. trop.
Smithii, S. Moore, in Journ. Bot. 1901, 304.—Afr. trop.
tarapotensis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 410.—Peruv.
Taylorii, S. Moore, in Journ. Bot. 1901, 303.—Afr. trop.
thymifolia, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 64 (= Adhatoda thymifolia).—Afr. austr.
tremulifolia, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 407.—Peruv.
viridiflavescens, Lindau, l. c. 412.—Bras.
vitzliputzli, Lindau, l. c. 409.—Mexic.
vixspicata, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxiii. 192.—Afr. trop.
Woodii, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. v. 64.—Afr. austr.
yurimaguensis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 411.—Peruv.

K

KAEMPFERIA, Linn. (Scitamin.).
biloba, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib. 81 (= Gastrochilus bilobum).—Penins. Mal.
calophylla, K. Schum. l. c. 80 (= Gastrochilus calophyllum).—Penins. Mal.
campanulata, K. Schum. l. c. 85 (= Stahlianthus campanulatus).—Siam.
clivalis, K. Schum. l. c. 81 (= Gastrochilus clivale).—Penins. Mal.
coenobialis, C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 68 (= Monolophus coenobialis).—China.
Cumingii, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib. 80.—Penins. Mal.
cuneata, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. 545.—Cochinch.!
Evoe, Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, 1902, 3.—Afr. trop.
fallax, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 259.—Cochinch.
fissa, Gagnep. l. c. 168.—Cochinch.
fongyuensis, Gagnep. l. c. xlviii. p. lxxviii.—China.
gracillima, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib. 74.—Borneo.
lancifolia, K. Schum. l. c. 80 (= Gastrochilus lancifolium).—Penins. Mal.
longipes, K. Schum. l. c. 79 (= Gastrochilus longipes).—Penins. Mal.
malaccana, K. Schum. l. c. 81 (= Scaphochlamys malaccana).—Penins. Mal.
minor, K. Schum. l. c. 86 (= Gastrochilus minus).—Penins. Mal.
natalensis, Schlechter & K. Schum. ex K. Schum. l. c. 72.—Afr. austr.
ochroleuca, K. Schum. l. c. 75 (= Gastrochilus ochroleucum).—Siam.
pallida, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 20.—Afr. trop.
Philippiana, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib. 85 (= Monolophus Philippianus).—Ind. or.
stenopetala, K. Schum. l. c. 69.—Afr. austr.
tiliaefolia, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlviii. p. lxxix (= Gastrochilus tiliaefolium).—Ind. or.
yunnanensis, Gagnep. l. c. p. lxxvii.—China.

KALANCHOË, Adans. (Crassul.).
angolensis, N. E. Br. in Gard. Chron. 1905, i. 370.—Afr. trop.
antanosiana, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 41.—Madag.
Baumii, Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 242.—Afr. trop.
beharensis, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 41.—Madag.
Bentii, C. H. Wright, ex Hook. f. Bot. Mag. t. 7765.—Arab.
Bhidei, T. Cooke, Fl. Bombay, i. 467.—Ind. or.
diversa, N. E. Br. in Gard. Chron. 1902, ii. 210.—Afr. trop.
Dyeri, N. E. Br. l. c. 1904, i. 354.—Afr. trop.
Elizae, Berger, in Monatsschr. Kakt. 1903, 69.—Afr. trop.
Goetzei, Engl. Jahrb. xxx. 312.—Afr. trop.
heterophylla, Prain, Bengal Pl. (= Cotyledon heterophylla).—Ind. or.
Kirkii, N. E. Br. in Gard. Chron. 1902, ii. 110.—Afr. trop.
linearifolia, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 41.—Madag.
longiflora, Schlechter, in J. M. Wood, Natal Plants, iv. t. 320.—Afr. austr.
magnidens, N. E. Br. in Gard. Chron. 1905, i. 370.—Afr. trop.
olivacea, Dalz. in Dalz. & Gibs. Bombay Fl. 313.—Ind. or.
prasina, N. E. Br. in Gard. Chron. 1904, i. 211.—Afr. trop.
Rohlfsii, Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma, ix. 252.—Afr. trop.
somaliensis, [Baker] Hook. f. Bot. Mag. t. 7831, descr. ampl.—Afr. trop.

KALLSTROEMIA, Scop. = **Tribulus**, Linn. (Zygophyll.).
adscendens, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxviii. (1902) 156 = T. adscendens.
hirsutissima, Vail, in Small, Fl. S. E. U. S. 670.—Am. bor.

KALMIA, Linn. (Ericac.).
carolina, *Small, Fl. S. E. U. S.* 886.—Am. bor.

KALMIELLA, Small, Fl. S. E. U. S. 866 (1903). *ERICACEAE.*
hirsuta, *Small, l. c.* (= *Kalmia hirsuta*).—Am. bor.

KANAHIA, R. Br. (Asclep.).
consimilis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. 1. 298.—Afr. trop.
glaberrima, *N. E. Br. l. c.* 297 (= *Gomphocarpus glaberrimus*).—Afr. trop.

KAUKENIA, Kuntze = KAUKEN, Burm. = **Mimusops**, Linn. (Sapot.).
Commersonii, Pierre, ex Engl. Monogr. Afr. Pfl. viii. 78 = Mimusops Commersonii.

KAYEA, Wall. (Guttif.).
assamica, *Prain, in Ind. Forest.* xxvii. 62.—Ind. or.
paniculata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 29.—Ins. Philipp.

KEDROSTIS, Medic. (Cucurb.).
cinerea, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 883.—Afr. trop.
Engleri, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 359.—Afr. trop.
minutiflora, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 884.—Afr. trop.
spinosa, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 360.—Afr. trop.

KENTROPHYTA, Nutt. (Legum.).
[ASTRAGALUS, Linn. I. K.]
aculeata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 665 (= *Astragalus aculeatus*).—Am. bor.
impensa, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
Wolfii, *Rydb. l. c.* (= *Homalobus Wolfii*).—Am. bor.

KERACIA, Calest. in Martelli, Webbia, 109, 134 (1905). *UMBELLIFERAE.*
polyodon, *Calest. l. c.* (= *Hohenackeria polyodon*).—Hispan.; Afr. bor.

KERSTINGIA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. (1903) 348. *RUBIACEAE.*
lepidopoda, *K. Schum. l. c.* 349.—Afr. trop.

KETELEERIA, Carr. (Conif.).
Evelyniana, *Mast. in Gard Chron.* 1903, i. 194.—China.
Fabri, *Mast. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 555.—China.

KHAYA, A. Juss. (Meliac.).
euryphylla, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 169.—Afr. trop.

KIBARA, Endl. (Monim.).
depauperata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 13.—Ins. Philipp.
grandifolia, *Merrill, l. c.* xxix. 15.—Ins. Philipp.
microphylla, *Perkins, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 268.—N. Guin.
Schlechteri, *Perkins, l. c.*—N. Guin.

KICKXIA, Blume (Apocyn.).
borneensis, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2693.—Borneo.

KIGELIA, DC. (Bignon.).
Ikbaliae, *Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* i. 1.—Afr. trop.

KINETOSTIGMA, Damm. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iv. (1905) 171. *PALMAE.*
adscendens, *Damm. l. c.* 172.—Am. cent.

KIRKIA, Oliver (Simarub.).
glauca, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 270.—Afr. trop.
lentiscoides, *Engl. Jahrb.* xxxii. 124.—Afr. trop.
tenuifolia, *Engl. l. c.* 123.—Afr. trop.

KITAIBELIA, Willd. (Malvac.).
Lindemuthii, *Hort. ex Le Jardin*, 1905, 76.—Hybr.

KLAINEDOXA, Pierre (Simarub.).
cuprea, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. IX. i. 300.—Afr. trop.
Dybowskii, *Van Tiegh. l. c.* 302.—Afr. trop.
lanceolata, *Van Tiegh. l. c.* 304.—Afr. trop.
latifolia, *Pierre, ex Van Tiegh. l. c.* 301.—Afr. trop.
Lecomtei, *Van Tiegh. l. c.* 302.—Afr. trop.
longifolia, *Pierre, ex Van Tiegh. l. c.* 300.—Afr. trop.
macrocarpa, *Van Tiegh. l. c.* 303.—Afr. trop.
macrophylla, *Pierre, ex Van Tiegh. l. c.* 301.—Afr. trop.
sphaerocarpa, *Van Tiegh. l. c.* 303.—Afr. trop.
spinosa, *Van Tiegh. l. c.* 300.—Afr. trop.
Tholloni, *Van Tiegh. l. c.* 301.—Afr. trop.
Trillesii, *Pierre, ex Van Tiegh. l. c.* 301.—Afr. trop.
tripyrena, *Van Tiegh. l. c.* 303.—Afr. trop.
Zenkeri, *Van Tiegh. l. c.* 302.—Afr. trop.

KLEINIA, Linn. (Compos.).
abyssinica, *A. Berger, in Monatsschr. Kakt.* 1905, 11 (= *Notonia abyssinica*).—Afr. trop.
chordifolia, *A. Berger, l. c.* 20 (= *Senecio chordifolia*).—Afr. austr.
coccinea, *A. Berger, l. c.* 11 (= *Notonia coccinea*).—Afr. trop.
cylindrica, *A. Berger, l. c.* 21.—Afr. austr.?
Galpini, *A. Berger, l. c.* 13 (= *Senecio Galpini*).—Afr. austr.
Hanburyana, *A. Berger, l. c.* 19 (= *Senecio Hanburyanus*).—Afr. austr.?
odora, *A. Berger, l. c.* 38 (= *Cacalia odora*).—Arab.
Schweinfurthii, *A. Berger, l. c.* 11 (= *Notonia Schweinfurthii*).—Afr. trop.
violacea, *A. Berger, l. c.* 38 (= *Notonia kleinioides*).—Afr. trop.

KNAUTIA, Linn. (Dipsac.).
[SCABIOSA, Tourn. Dipsac.]
albanica, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 126.—Eur.
asperifolia, *Borb. Rev. Knaut.* 42.—Hybr.
balcanica, *Davidoff, in Magyar Bot. Lap.* iv. 28.—Bulgar.
brachytricha, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 125.—Eur.
centrifrons, *Borb. Rev. Knaut.* 18.—Eur.
decalvata, *Borb. l. c.* 42.—Hybr.
Dingleri, *Borb. l. c.* 82.—Turcia.
felina, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 511.—Hybr.
helianthа, *Janka, in Borb. Rev. Knaut.* 41.—Bulgar.
leucophaea, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 75.—Eur.
ligerina, Tourl. in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 309 = arvensis.
luteola, *Borb. Rev. Knaut.* 83.—Serbia.
mimica, *Borb. l. c.* 86.—Graecia.
nauplia, *Borb. l. c.* 75.—Graecia.
numidica, *Szabó, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 437.—Reg. Medit.
Petrovicii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 124.—Eur.
pontica, *Borb. Rev. Knaut.* 41.—Graecia.
Ressmannii, *Borb. l. c.* 35.—Austria.
rimosa, *Borb. l. c.* 65.—Ital.
sarajevensis, *Szabó, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 439.—Eur. cent.
transalpina, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 91.—Eur.
turocensis, *Szabó, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 440.—Eur. cent.
Wagneri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 124.—Eur.

KNEIFFIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
arenicola, Small, Fl. S. E. U. S. 842.—Am. bor.
pratensis, Small, l. c.—Am. bor.
riparia, Small, l. c. = Oenothera riparia.

KNIPHOFIA, Moench (Liliac.).
Bachmanni, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 784.—Afr. austr.
concinna, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
Conrathii, *Baker, l. c.* iv. 998.—Afr. austr.
crassifolia, *Baker, l. c.* i. 784.—Afr. austr.
dubia, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 10.—Afr. trop.
Ellenbeckiana, *Engl. Jahrb.* xxxii. 90.—Afr. trop.
flavovirens, *Engl. l. c.* xxx. 273.—Afr. trop.
Goetzei, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
ichopensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1016.—Afr. austr.

KNIPHOFIA:—
Krooki, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xv. 14.—Afr. austr.
longiflora, *Baker, in Kew Bull.* 1901, 134.—Afr. austr.
mpalensis, *Engl. Jahrb.* xxxii. 91.—Afr. trop.
Neumannii, *Engl. l. c.* 90.—Afr. trop.
paludosa, *Engl. l. c.* xxx. 274.—Afr. trop.
pedicellata, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 998.—Afr. austr.
Schlechteri, *Baker, l. c.* i. 784.—Afr. austr.

KNOWLTONIA, Salisb. (Ranunc.).
bracteata, *Harv. ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xviii. 380, descr.—Afr. austr.

KOBRESIA, Willd. (Cyper.).
cercostachys, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 267 (= *Carex cercostachys*).—China.
elachycarpa, *Fernald, in Rhodora*, 1903, 251.—Am. bor.
fragilis, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 267.—China.
gracilis, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 276.—Rossia.
graminifolia, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 268.—China.
macrolepis, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 276.—Rossia.
paniculata, *Meinsh. l. c.* 279.—Rossia.
Prainii, *Kuek. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 50.—Reg. Himal.
Prattii, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 268.—China.

KOCHIA, Roth (Chenopod.).
amoena, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 183.—Austral.
Atkinsiana, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 31.—Austral.
Georgei, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 184.—Austral.
polypterygia, *Diels, l. c.* 183.—Austral.

KOEHNEOLA, Urb. Symb. Antill. ii. (1901) 463. *COMPOSITAE.*
repens, *Urb. l. c.* 464 (= *Tetranthus repens*).—Ind. occ.

KOELERIA, Pers. (Gramin.).
Alboffii, *Domin, in Magyar Bot. Lap.* iii. 344.—Reg. Caucas.
asiatica, *Domin, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 947.—Sibir.
britannica, *Domin, ex Druce, in Journ. Bot.* 1905, 356.—Anglia.
compacta, *Adam. in Magyar Bot. Lap.* iii. 138.—Eur.
Degeni, *Domin, in Magyar Bot. Lap.* iii. 275.—Eur.
glaucovirens, *Domin, l. c.* 273.—Eur.; Oriens; As. cent.
Kurtzii, *Hack. ex Kurtz, in Bol. Acad. Buenos Aires*, xvi. 261.—Am. austr.
montana, *Domin, in Magyar Bot. Lap.* iii. 257.—Eur.
polonica, *Domin, l. c.* 186.—Eur.
pseudocristata, *Domin, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1903, 42.—Europ.
Simonkayi, *Adam. in Denkschr. Akad. Wien, Math. Nat.* lxxiv. 118.—Turcia.
splendens, *Druce, in Journ. Bot.* 1905, 313.—Eur.
supraarenaria, *Domin, ex Druce, l. c.* 355.—Hybr.
tokiensis, *Domin, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 948.—Japon.
trivialis, Bub. Fl. Pyren. iv. 358 = phleoides.

KOELLIA, Moench = **Pycnanthemum**, Michx. (Labiat.).
dubia, Small, Fl. S. E. U. S. 1047.—Am. bor.
Ilugeri, Small, l. c.—Am. bor.
leptodon, Small, l. c. 1046.—Am. bor.

KOLKWITZIA, Graebn. in Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 593 (1901). *CAPRIFOLIACEAE.*
amabilis, *Graebn. l. c.*—China.

KOLOBOPETALUM, Engl. (Menisperm.).
ovatum, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 82.—Afr. trop.

KOORDERSIODENDRON, Engl. (Anacard.).
pinnatum, *Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull.* i. 38 (= *Helicteres pinnata*).—Arch. Mal.

KOPSIA, Blume (Apocyn.).
cochinchinensis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 415.—Cochinch.
elastica, *Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn.* (1894) 325, nomen.—Sumatra.
Harmandiana, *Pierre, l. c.* nomen.—Cochinch.
longiflora, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 47.—Ins. Philipp.

KOPSIA, Dennst. = **Orobanche**, Tourn. (Orobanch.).
Muteli, Bég. in Fiori & Bég. Fl. Ital. ii. 471 = O. Muteli.
purpurea, Bég. l. c. 473 = O. purpurea.
Schultzii, Bég. l. c. 472 = O. Schultzii.

KOSTELETZKYA, Presl (Malvac.).
malvaviscana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 319.—Mexic.
tampicensis, *Rose, l. c.* (= *Hibiscus tampicensis*).—Mexic.
violacea, *Rose, l. c.*—Mexic.

KOZLOVIA, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xxiii. (1904) 146. *UMBELLIFERAE.*
paleacea, *Lipsky, l. c.* 147 (= *Albertia paleacea*).—As. cent.

KRAMERIA, Loefl. (Polygal.).
prostrata, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 200 (1905).—Mexic.

KRASCHENINIKOVIA, Turcz. = **Stellaria**, Linn. (Caryophyll.).
eritrichioides, Diels, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 37.—China.

KRUGIODENDRON, Urb. Symb. Antill. iii. (1902) 313. *RHAMNACEAE.*
ferreum, *Urb. l. c.* 314 (= *Ceanothus ferreus*).—Ind. occ.

KRYNITZKIA, Fisch. & Mey. (Borag.).
mexicana, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 182 (1904).—Mexic.
pustulata, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 96 (= *Oreocarya affinis*).—Am. bor.
Suksdorfii, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 146.—Am. bor.

KUENSTLERA, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. I. (1901) 494 = **Kunstleria**, Prain (Legum.).

KUHNIA, Linn. (Compos.).
Fitzpatricki, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 402.—Am. bor.
Gooddingi, *A. Nelson, l. c.*—Am. bor.
Hitchcocki, *A. Nelson, l. c.* 403.—Am. bor.
reticulata, *A. Nelson, l. c.*—Am. bor.

KUNZEA, Reichb. (Myrtac.).
bracteolata, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxx. 363.—Austral.
jucunda, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 424.—Austral.

KYLLINGA, Rottb. (Cyper.).
albiceps, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 286.—Afr. trop.
appendiculata, K. Schum. ex C. B. Clarke, l. c. 283 = cylindrica.
brevifolia, Boeck. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 228 = intermedia.
Filicula, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 526.—Afr. trop.
flava, *C. B. Clarke, l. c.* 281.—Afr. trop.
kamschatica, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 229.—Sibir.
nigripes, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 285.—Afr. trop.
nigritana, *C. B. Clarke, l. c.* 272.—Afr. trop.
platyphylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 270.—Afr. trop.
ruwenzoriensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 283.—Afr. trop.
senegalensis, *C. B. Clarke, l. c.* 276.—Afr. trop.

KYRSTENIA, Neck. = **Eupatorium**, Tourn. (Compos.).
aboriginum, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 8 = E. aboriginum.
acuta, Greene, l. c. 11.—Mexic.
ageratifolia, Greene, l. c. 9 = E. ageratifolium.
altissima, Greene, l. c. 8 = E. ageratoides.
amplifolia, Greene, l. c. 9 = E. amplifolium.

KYRSTENIA :—
amplissima, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 10.—Mexic.
angustata, Greene, l. c. 8 = E. angustatum.
arizonica, Greene, l. c. 9 = E. arizonicum.
aromatica, Greene, l. c. 8 = E. aromaticum.
bellidifolia, Greene, l. c. 9 = E. bellidifolium.
Benthami, Greene, l. c. = E. Benthami.
betulaefolia, Greene, l. c. 10.—Mexic.
borealis, Greene, l. c. 8 = E. boreale.
brevipes, Greene, l. c. 9 = E. brevipes.
calaminthaefolia, Greene, l. c. = E. calaminthaefolium.
calophylla, Greene, l. c. 11.—Mexic.
ceanothifolia, Greene, l. c. 8 = E. ceanothifolium, *Muhl.*, *non Spreng.*
ciliata, Greene, l. c. 9 = E. ciliatum.
coahuilensis, Greene, l. c. = E. coahuilense.
collina, Greene, l. c. = E. collinum.
deltoidea, Greene, l. c. = E. deltoideum.
Donnell-Smithii, Greene, l. c. = E. Donnell-Smithii.
espinosarum, Greene, l. c. = E. espinosarum.
euonymifolia, Greene, l. c. = E. euonymifolium.
glechonophylla, Greene, l. c. = E. glechonophyllum.
grandidentata, Greene, l. c. = E. grandidentatum.
grandifolia, Greene, l. c. = E. grandifolium.
guadalupensis, Greene, l. c. = E. guadalupense.
herbacea, Greene, l. c. = E. herbaceum.
incarnata, Greene, l. c. 8 = E. incarnatum.
jucunda, Greene, l. c. = E. jucundum.
Koelliaefolia, Greene, l. c. 9 = E. Koelliaefolium.
laeta, Greene, l. c. 11.—Mexic.
melissoides, Greene, l. c. 8 = E. melissoides.
nemoralis, Greene, l. c. = E. nemorale.
occidentalis, Greene, l. c. 9 = E. occidentale.
oreithales, Greene, l. c. = E. oreithales.
parvifolia, Greene, l. c. 12.—Mexic.
paupercula, Greene, l. c. 9 = E. pauperculum.
pazcuarensis, Greene, l. c. = E. pazcuarense.
Rothrockii, Greene, l. c. = E. Rothrockii.
rufa, Greene, l. c. 10.—Mexic.
subintegra, Greene, l. c.—Mexic.
thyrsiflora, Greene, l. c. 9.—Mexic.
Tracyi, Greene, l. c. 8 = E. Tracyi.
viburnifolia, Greene, l. c. = E. viburnifolium.

L

LABATIA, Mart. (Sapot.).
mattogrossensis, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 151.—Bras.

LABISIA, Lindl. (Myrsin.).
acrifolia, *Hallier f. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 669.—Borneo.
obtusifolia, *Hallier f. l. c.* 667.—Borneo.
serrulata, *Hallier f. l. c.* 666, descr.—Sumatra.

LACHENALIA, Jacq. (Liliac.).
brevipes, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 856.—Afr. austr.
petiolata, *Baker, l. c.* 186.—Afr. austr.
Schlechteri, *Baker, l. c.* iv. 999.—Afr. austr.

LACHNAEA, Linn. (Thymel.).
passerinoides, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 132.—Afr. austr.

LACHNASTOMA, Korth. (Rubiac.).
[Coffea, Linn. I. K.]
densiflora, *Koord. & Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* viii. 27 (= *Coffea densiflora*).—Java.

LACHNOCAULON, Kunth (Eriocaul.).
eciliatum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 235.—Am. bor.
Engleri, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 241.—Am. bor.
floridanum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 235.—Am. bor.
minus, *Small, l. c.*—Am. bor.

LACHNOSTACHYS, Hook. (Verben.).
brevispicata, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 511.—Austral.
coolgardiensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 100.—Austral.
Dempsteri, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 512.—Austral.

LACHNOSTACHYS :—
insignis, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 506 (= *Newcastlia insignis*).—Austral.
Rodwayana, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 29.—Austral.

LACHNOSTOMA, H. B. & K. (Asclep.).
gonoloboides, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 84.—Mexic.

LACINARIA, Hill = **Liatris**, Schreb. (Compos.).
alata, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxi. 404.—Am. bor.
aspera, Greene, Pittonia, iv. (1901) 318.—Am. bor.
Earlei, Greene, l. c. 316.—Am. bor.
elegantula, Greene, l. c.—Am. bor.
elongata, Greene, l. c. v. 57.—Am. bor.
formosa, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 149.—Am. bor.
Helleri, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 6 = Liatris Helleri.
kansana, Britton, Man. Fl. N. U. S. 927.—Am. bor.
laevigata, Small, Fl. S. E. U. S. 1175 = Liatris laevigata.
Langloisii, Greene, Pittonia, v. 58.—Am. bor.
ligulistylis, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxi. 405.—Am. bor.
Nashii, Small, Fl. S. E. U. S. 1175.—Am. bor.
nervata, Greene, Pittonia, iv. (1901) 317.—Am. bor.
pilosa, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 6 = Liatris spicata.
polyphylla, Small, Fl. S. E. U. S. 1173.—Am. bor.
scabra, Greene, Pittonia, iv. (1901) 317.—Am. bor.
serotina, Greene, l. c. 315.—Am. bor.
Smallii, Britton, Man. Fl. N. U. S. 927.—Am. bor.
vittata, Greene, Pittonia, iv. (1901) 315.—Am. bor.

LACISTEMA, Sw. (Lacistem.).
Hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 394.—Parag.

LACTUCA, Tourn. (Compos.).
chinensis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 69 (= *Prenanthes chinensis*).—Japon.
crepidioides, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 244.—China.
diversifolia, *Vaniot, l. c.* 245.—China.
erythrocarpa, *Vaniot, l. c.* 319.—China.
Gilletii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 86.—Afr. trop.
Henryi, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 512.—China.
humifusa, *Dunn, l. c.*—China.
lignea, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 318.—China.
longespicata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 87.—Afr. trop.
microsperma, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 403.—N. Guin.
Prattii, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 513.—China.
pseudoabyssinica, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 197.—Afr. trop.
pseudosenecio, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 320, 489.—China.
rubrolutea, *Vaniot, l. c.* 317.—China.
Steelei, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 699.—Am. bor.
tricostata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 88.—Afr. trop.
umbrosa, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 513.—China.
variabilis, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 27 (= *Mulgedium variabile*).—As. Min.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 170.—Afr. trop.
Visianii, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 29.—Eur.

LADYGINIA, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xxiii. (1904) 150. *UMBELLIFERAE.*
bucharica, *Lipsky, l. c.*—As. cent.

LAELIA, Lindl. (Orchid.).
cinnabrosa, *Hort. ex Sand. Orch. Guide*, 276, nomen.—Hybr.

LAGENOPHORA, Cass. (Compos.).
nudicaulis, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 331 (= *Aster nudicaulis*).—Reg. Magell.

LAGERSTROEMIA, Linn. (Lythrac.).
Fordii, *Oliv. & Koehne, ex Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac.* 262.—China.
intermedia, *Koehne, l. c.* 260.—China.
quinquevalvis, *Koehne, l. c.* 268.—Tonkin.
subsessilifolia, *Koehne, l. c.* 267.—Austral.
Thomsonii, *Koehne, l. c.* 257.—Ind. or.

LAGGERA, Sch. Bip. (Compos.).
humilis, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 409.—Afr. trop.

LAGOPHYLLA, Nutt. (Compos.).
Hillmani, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington,* xvii. 98.—Am. bor.

LAMIUM, Tourn. (Labiat.).
coronatum, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 174.—China.
glaberrimum, *Taliew, in Bull. Jard. St. Pétersb.* ii. 136.—Tauria.
kouyangense, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 175.—China.
Reiseri, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* iv. 130.—Serbia.

LAMOUROUXIA, H. B. & K. (Scrophul.).
brachyantha, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 248.—Mexic.

LANDOLPHIA, Beauv. (Apocyn.).
amoena, *Hua, in Journ. de Bot.* xv. 76.—Afr. trop.
Buchananii, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 35 (= *Clitandra Buchananii*).—Afr. trop.
Cameronis, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.
Dawei, *Stapf, l. c.* 590.—Afr. trop.
Dewevrei, *Stapf, l. c.* 52.—Afr. trop.
dondeensis, *Busse, in Tropenpfl.* 1901, 406; *et in Engl. Jahrb.* xxxii. 165.—Afr. trop.
Droogmansiana, *Wildem. in Wildem. & Gentil, Lianes Caoutch. Congo,* 59.—Afr. trop.
Dubardii, *Pierre, in Agric. Prat. Pays Chauds,* iv. 109.—Madag.
Dubreucqiana, *Wildem. in Wildem. & Gentil, Lianes Caoutch. Congo,* 92.—Afr. trop.
ferruginea, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 46.—Afr. trop.
fingimena, *Pierre, in Agric. Prat. Pays Chauds,* iv. 110.—Madag.
Gentilii, *Wildem. Obs. Apocyn. Latex,* 20.—Afr. trop.
hispidula, *Pierre, in Agric. Prat. Pays Chauds,* iv. 108.—Madag.
humilis, *Schlechter, ex Cheval. in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxxv. 514, descr.—Afr. trop.
kilimandjarica, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 34 (= *Clitandra kilimandjarica*).—Afr. trop.
Kirkii, *Dyer, in Hook. Ic. Pl.* t. 2755.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. in Rev. Cult. Col. Par.* viii. 229.—Afr. trop.
leonensis, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 36.—Afr. trop.
Mandrianambo, *Pierre, in Agric. Prat. Pays Chauds,* iv. 107.—Madag.
pachyphylla, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 45.—Afr. trop.
Perrieri, *Jumelle, in Rev. Gén. Bot.* xiii. 290.—Madag.
Pierrei, *Hua, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxxv. 868.—Afr. trop.
Petersiana, *Dyer, in Hook. Ic. Pl.* t. 2756.—Afr. trop.
pyriformis, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 60 (= *Ancylobothrys pyriformis*).—Afr. trop.
Richardiana, *Pierre, in Agric. Prat. Pays Chauds,* iv. 110.—Madag.
robusta, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 43 (= *Ancylobothrys robusta*).—Afr. trop.
Shrallonii, Wildem. in Bull. Soc. Études Colon. x. 581 = Thollonii.
sphaerocarpa, *Jumelle, in Not. Inst. Marseilles Expos. Univers.* 1900, 43; *et in Rev. Gén. Bot.* xiii. 299.—Madag.
Stolzii, *Busse, in Engl. Jahrb.* xxxii. 168.—Afr. trop.
subsessilis, *Pierre, in Agric. Prat. Pays Chauds,* iv. 111.—Madag.
Tayloris, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 45.—Afr. trop.
Thrallonii, Wildem. in Bull. Soc. Études Colon. x. 581 = Thollonii.
tenuis, *Jumelle, in Rev. Cult. Colon.* x. 298; *et Pl. Caoutch. Gutta, Pays Chauds,* 349.—Madag.
ugandensis, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 589.—Afr. trop.

LANGLOISIA, Greene (Polemon.).
punctata, *A. A. Heller, Muhlenbergia,* i. 57.—Calif.

LANKESTERIA, Lindl. (Acanth.).
alba, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 68.—Afr. trop.
brevior, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 110.—Afr. trop.

LANNEA, A. Rich. (Anacard.).
[ODINA, Roxb. I. K.].
ambigua, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 218.—Afr. trop.

LANSIUM, Rumph. (Meliac.).
dubium, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 23.—Ins. Philipp.

LANTANA, Linn. (Verben.).
aristata, *Briq. in Arkiv Bot. Stockh.* ii. no. 10, 17 (= *Lippia aristata*).—Bras.
bahamensis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 450.—Ind. occ.
Balansae, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* vii–viii. 300.—Parag.
bauciana, *H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap.* v. 197.—Afr. austr.
bernardinensis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1066.—Parag.
depressa, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 436.—Am. bor.
Galpiniana, *H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap.* v. 189.—Afr. austr.
Hassleri, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1064.—Parag.
hypoleuca, *Briq. l. c.*—Parag.
Lindmanii, *Briq. in Arkiv Bot. Stockh.* ii. no. 10, 15.—Bras.
micrantha, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* vii–viii. 299.—Parag.
montevidensis, *Briq. l. c.* 301 (= *Lippia montevidensis*).—Parag.
obtusata, *Briq. l. c.* 302.—Bras.
planifolia, *Briq. l. c.*—Bras.
pretoriensis, *H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap.* v. 197.—Afr. austr.
Rehmanni, *H. H. W. Pearson, l. c.* 196.—Afr. austr.
Wilmsii, *H. H. W. Pearson, l. c.*—Afr. austr.

LANTANOPSIS, Wright (Compos.).
Hoffmanni, *Urb. Symb. Antill.* ii. 464.—Ind. occ.

LAOTHOË, Rafin. = **Chlorogalum**, Kunth (Liliac.).
angustifolia, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 91 = C. angustifolium.
divaricata, Greene, l. c. = C. pomeridianum.
Leichtlinii, Greene, l. c. = C. Leichtlinii.
parviflora, Greene, l. c. = C. parviflorum.
purpurea, Greene, l. c. = C. purpureum.

LAPEYROUSIA, Pourr. (Irid.).
setifolia, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 278.—Afr. trop.

LAPITHEA, Griseb. = **Sabbatia**, Adans. (Gentian.).
Boykinii, Small, Fl. S. E. U. S. 929 = S. Boykinii.

LAPORTEA, Gaudich. (Urtic.).
Carruthersiana, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxviii. i. 463 (= *Urticastrum Carruthersianum*).—Afr. trop.
corallodesme, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 252.—N. Guin.
humilis, *Lauterb. l. c.* 251.—N. Guin.
luzonensis, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 168.—Ins. Philipp.
Meyeniana, *Warb. l. c.* (= *Urtica Meyeniana*).—Ins. Philipp.
mindanaensis, *Warb. l. c.*—Ins. Philipp.
Schomburgkii, *Bull. Cat.* 1875, 7; *Nicholson, Dict. Gard.* ii. 235.—Polynes.
torricellensis, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 251.—N. Guin.

LAPPULA, Moench = **Echinospermum**, Sw. (Borag.).
angustata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 636.—Am. bor.
anoplocarpa, Greene, in Ottawa Natural. xvi. 39.—Am. bor.
arida, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 44.—Am. bor.
Besseyi, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 636.—Am. bor.
californica, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 546.—Am. bor.
calycosa, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 30.—Am. bor.

LAPPULA:—
cinerea, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 544.—Am. bor.
columbiana, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 28.—Am. bor.
Cottoni, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 549.—Am. bor.
cucullata, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 29.—Am. bor.
cupulata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 31.—Am. bor.
Cusickii, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 542.—Am. bor.
gracilenta, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 523.—Am. bor.
Hendersoni, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 539.—Am. bor.
infelix, Greene, Pittonia, iv. (1901) 235.—Am. bor.
leucantha, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 152.—Am. bor.
micrantha, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 497.—Calif.
saxatilis, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 541.—Am. bor.
scaberrima, Piper, l. c. 545.—Am. bor.
setosa, Piper, l. c. 544.—Am. bor.
trachyphylla, Piper, l. c. 540.—Am. bor.
velutina, Piper, l. c. 546.—Am. bor.

LAPSANA, Linn. (Compos.).
humilis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* xvii. 87 (= *Prenanthes humilis*).—Japon.

LARETIA, Gill. & Hook. (Umbell.).
compacta, *Reiche, Fl. Chile,* iii. 63 (= *Azorella compacta*).—Chili.

LASALLEA, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1903) 5.—*COMPOSITAE.*
Nuttallii, *Greene, l. c.*—Am. bor.
phyllolepis, *Greene, l. c.* (= *Aster phyllolepis*).—Am. bor.
sericea, *Greene, l. c.* (= *Aster sericeus*).—Am. bor.

LASERPITIUM, Linn. (Umbell.).
Asclepium, *Calest. in Martelli, Webbia,* 270 (= *Thapsia Asclepium*).—Eur.
decussatum, *Calest. l. c.* 271 (= *Thapsia decussata*).—Reg. Medit.
foetidum, *Calest. l. c.* 270 (= *Thapsia foetida*).—Reg. Medit.
Gaveanum, *Beauverd, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 411.—Hybr.
Loscosii, *Calest. in Martelli, Webbia,* 270 (= *Elaeoselinum Loscosii*).—Hispan.
millefolium, *Calest. l. c.* (= *Elaeoselinum millefolium*).—Hispan.
tenuifolium, *Calest. l. c.* (= *Thapsia tenuifolia*).—Hispan.
Thapsia, *Calest. l. c.* 271 (= *Thapsia garganica*).—Reg. Medit.
transtaganum, *Calest. l. c.* (= *Thapsia transtagana*).—Eur.
villosum, *Calest. l. c.* (= *Thapsia villosa*).—Reg. Medit.

LASIANTHUS, Jack (Rubiac.).
angustifolius, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 126.—Penins. Mal.
axillaris, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas,* t. 428 A.—Madag.
brachyphyllus, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 399.—N. Guin.
caloneurus, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 339.—Malaya.
chlorocarpus, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 399.—N. Guin.
chrysotrichus, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. l. c.* 400.—N. Guin.
coriaceus, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 123.—Penins. Mal.
coronatus, *King & Gamble, l. c.* 120.—Penins. Mal.
Curtisii, *King & Gamble, l. c.* 128.—Penins. Mal.
ferrugineus, *King & Gamble, l. c.* 130.—Penins. Mal.
filiformis, *King & Gamble, l. c.* 131.—Penins. Mal.
flavicans, *King & Gamble, l. c.* 116.—Penins. Mal.
formosensis, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* xv. 17.—Formosa.
gracilis, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 132.—Penins. Mal.
Harveyanus, *King & Gamble, l. c.* 129.—Penins. Mal.
lucidus, *King & Gamble, l. c.* 132.—Penins. Mal.

LASIANTHUS:—
malaccensis, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 124.—Penins. Mal.
montanus, *King & Gamble, l. c.* 127.—Penins. Mal.
nervosus, *King & Gamble, l. c.* 129.—Penins. Mal.
oblongus, *King & Gamble, l. c.* 127.—Penins. Mal.
oligoneurus, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 340.—Malaya.
perakensis, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 126.—Penins. Mal.
pergamaceus, *King & Gamble, l. c.* 123.—Penins. Mal.
pseudo-lucidus, *King & Gamble, l. c.* 128.—Penins. Mal.
Ridleyi, *King & Gamble, l. c.* 115.—Penins. Mal.
robustus, *King & Gamble, l. c.* 123.—Penins. Mal.
satsumensis, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* xv. 37.—Japon.
scabridus, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 111.—Penins. Mal.
scalariformis, *King & Gamble, l. c.* 131.—Penins. Mal.
Schmidtii, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 340.—Malaya.
singaporensis, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 117.—Penins. Mal.
subinaequalis, *King & Gamble, l. c.* 120.—Malaya.
subspicatus, *King & Gamble, l. c.* 118.—Penins. Mal.
Tashiroi, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* xv. 37.—Japon.
Wrayi, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 119.—Penins. Mal.

LASIOCORYS, Benth. (Labiat.).
Poggeana, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* v. 470 (= *Leucas Poggeana*).—Afr. trop.

LASIOPETALUM, Sm. (Stercul.).
angustifolium, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 3.—Austral.
Dielsii, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 380.—Austral.
longistamineum, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,* xxx. 355.—Austral.
microcardium, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 381.—Austral.

LASIOPOGON, Cass. (Compos.).
brachypterus, *O. Hoffm. ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien,* xx. (1905) 57.—Afr. austr.

LASIOSTELMA, Benth. (Asclep.).
nanum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 37.—Afr. austr.

LATHYRUS, Tourn. (Legum.).
alatus, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxii. 628 (= *Orobus alatus*).—Manchuria.
Brownii, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1903, 491.—Am. bor.
cryophilus, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 477.—Reg. Argent.
ecirrhosus, *A. A. Heller, Muhlenbergia,* i. 54.—Calif.
Goldsteinae, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1905, 197.—Calif.
laevigatus, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 375.—Urug.
leucanthus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 37.—Am. bor.

LAUREMBERGIA, Berg. (Halorag.).
[SERPICULA, Linn. I. K.]
angolensis, *Schindl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxix. 49, nomen; *et in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 72.—Afr. trop.
brevipes, *Schindl. l. c. Beibl.* lxxvii. 15; *et l. c.* 67 (= *Serpicula brevipes*).—Ind. or.
Engleri, *Schindl. l. c. Beibl.* lxxix. 49, nomen; *et l. c.* 73.—Afr. trop.
glaberrima, *Schindl. l. c.* 49; *et l. c.* 67 (= *Serpicula indica*).—Zeylan.
grandifolia, *Schindl. l. c.* 49; *et l. c.* 66.—Zeylan.
hirsuta, *Schindl. l. c. Beibl.* lxxvii. 15; *et l. c.* 65 (= *Serpicula hirsuta*).—Ind. or.
indica, *Schindl. l. c.*; *et l. c.* 64 (= *Serpicula indica*).—Zeylan.
'avanica, *Schindl. l. c. Beibl.* lxxix. 49; *et l. c.* 69 (= *Serpicula javanica*).—Java.
madagascariensis, *Schindl. l. c. Beibl.* lxxvii. 15; *et l. c.* 71.—Madag.
oppositifolia, *Schindl. l. c. Beibl.* lxxix. 49; *et l. c.* 72.—Maurit.
veronicifolia, *Schindl. l. c.*; *et l. c.* (= *Serpicula veronicaefolia*).—Borbonia.
verticillata, *Schindl. l. c.*; *et l. c.* 71.—Maurit.

LAUREMBERGIA:—
villosa, *Schindl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxvii. 62; *et in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 73.—Afr. trop.
Wangerini, *Schindl. l. c.*; *et l. c.* 64.—Zeylan.
zeylanica, *Schindl. l. c. Beibl.* lxxvii. 16; *et l. c.* 68 (= *Serpicula zeylanica*).—Zeylan.

LAVANDULA, Tourn. (Labiat.).
pannosa, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 411.—Hispan.

LAVARDIA, Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii, Mém. III. (1905) 23 = **Lavradia**, Vell. (Violac.).

LAVAUXIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
flava, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 243.—Am. bor.
graminifolia, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 329 = O. graminifolia.
Howardi, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 368 = O. Howardi.
tubifera, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 329 = O. tubifera.
Watsonii, Small, Fl. S. E. U. S. 844.—Am. bor.

LAVRADIA, Vell. (Violac.).
spicata, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 23, nomen.—Bras.

LEANDRA, Raddi (Melast.).
axilliflora, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 168.—Peruv.
bullifera, *Pilg. l. c.* 169.—Peruv.
caquetana, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 432.—N. Granat.
violascens, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 170.—Reg. Amaz.

LEBETANTHUS, Endl. (Epacrid.).
Myrsinites, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 649 (= *Andromeda Myrsinites*).—Reg. Magell.

LECHEA, Kalm (Cistac.).
moniliformis, *E. P. Bickn. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 632.—Am. bor.

LECYTHIS, Loefl. (Myrtac.).
pneealts, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 431.—N. Granat.

LEDOTHAMNUS, Meissn. (Ericac.).
sessiliflorus, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 45.—Guiana.

LEEA, Royen (Ampel.).
magnifolia, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 37.—Ins. Philipp.

LEERSIA, Soland. (Gramin.).
drepanothrix, *Stapf, in Journ. de Bot.* 1905, 107.—Afr. trop.

LEGNOTIS, Sw. = **Cassipourea**, Aubl. (Rhizoph.).
lanceolata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 445.—Ins. Philipp.

LEIOCARPODICRAEA, Engl. Jahrb. xxxviii. (1905) 98. *PODOSTEMACEAE.*
quangensis, *Engl. l. c.* (= *Dicraea quangensis*).—Afr. trop.
violascens, *Engl. l. c.* (= *Dicraea violascens*).—Afr. trop.
Warmingii, *Engl. l. c.* (= *Dicraea Warmingii*).—Afr. trop.

LEIOTHRIX, Ruhl. in Engl. Pflanzenreich Eriocaul. 225 (1903). *ERIOCAULACEAE.*
angustifolia, *Ruhl. l. c.* 231 (= *Paepalanthus angustifolius*).—Bras.
Arechavaletae, *Ruhl. l. c.* 238.—Urug.
argyroderma, *Ruhl. l. c.* 227.—Bras.
arrecta, *Ruhl. l. c.* 235.—Bras.
Beckii, *Ruhl. l. c.* 226 (= *Paepalanthus Beckii*).—Bras.
crassifolia, *Ruhl. l. c.* 228 (= *Paepalanthus crassifolius*).—Bras.
curvifolia, *Ruhl. l. c.* 233 (= *Paepalanthus curvifolius*).—Bras.
Dielsii, *Ruhl. l. c.* 231.—Bras.
echinocephala, *Ruhl. l. c.* 232.—Bras.
flagellaris, *Ruhl. l. c.* 237 (= *Paepalanthus flagellaris*).—Bras.

LEIOTHRIX:—
flavescens, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich Eriocaul.* 231 (= *Paepalanthus flavescens*).—Am. austr.
fluitans, *Ruhl. l. c.* 225 (= *Paepalanthus fluitans*).—Bras.
fluminensis, *Ruhl. l. c.* 230.—Bras.
fulgida, *Ruhl. l. c.* 233.—Bras.
graminea, *Ruhl. l. c.* 234 (= *Paepalanthus gramineus*).—Bras.
hirsuta, *Ruhl. l. c.* 229 (= *Paepalanthus hirsutus*).—Bras.
luxurians, *Ruhl. l. c.* 236 (= *Paepalanthus luxurians*).—Bras.
mucronata, *Ruhl. l. c.* 232 (= *Paepalanthus mucronatus*).—Bras.
nubigena, *Ruhl. l. c.* 229 (= *Paepalanthus nubigenus*).—Bras.
pedunculosa, *Ruhl. l. c.* 237.—Bras.
pilulifera, *Ruhl. l. c.* 231 (= *Paepalanthus pilulifer*).—Bras.
prolifera, *Ruhl. l. c.* 236 (= *Paepalanthus prolifer*).—Bras.
propinqua, *Ruhl. l. c.* 237 (= *Paepalanthus propinquus*).—Bras.
rufula, *Ruhl. l. c.* 230 (= *Paepalanthus rufulus*).—Bras.
Schlechtendalii, *Ruhl. l. c.* 231 (= *Paepalanthus Schlechtendalii*).—Bras.
spergula, *Ruhl. l. c.* 237.—Bras.
spiralis, *Ruhl. l. c.* 226 (= *Paepalanthus spiralis*).—Bras.
vivipara, *Ruhl. l. c.* 238 (= *Paepalanthus viviparus*).—Bras.

LEMNA, Linn. (Lemnac.).
trinervis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 230.—Am. bor.

LENOPHYLLUM, Rose, in Smithson. Misc. Coll. xlvii. (1904) 159. *CRASSULACEAE.*
acutifolium, *Rose, l. c.* 162.—Mexic.
guttatum, *Rose, l. c.* 160 (= *Sedum guttatum*).—Mexic.
pusillum, *Rose, in N. Am. Fl.* xxii. 28.—Mexic.!
texanum, *Rose, in Smithson. Misc. Coll.* xlvii. 162 (= *Villadia texana*).—Am. bor.
Weinbergii, *Britton, in Smithson. Misc. Coll.* xlvii. 160.—Mexic.

LEOCHILUS, Knowles & Westc. (Orchid.).
labiatus, *Cogn. in Urb. Symb. Antill.* iv. 182 (= *Epidendrum labiatum*).—Ind. occ.

LEONOTIS, R. Br. (Labiat.).
Dinteri, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1090.—Afr. trop.
Engleri, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 121.—Afr. trop.
Goetzei, *Guerke, l. c.* xxx. 393.—Afr. trop.
bereroensis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1092.—Afr. trop.
Newtoni, *Briq. l. c.* 1093.—Afr. trop.
urticifolia, *Briq. l. c.* 1091.—Afr. austr.

LEONTICE, Linn. (Berberid.).
Tempskyana, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 563.—As. cent.

LEONTODON, Linn. (Compos.).
illyricus, *Maly, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* 1904, 271.—Eur.
subincanus, *Fiori, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1905, 290.—Hybr.
tulmentinus, *Fiori, l. c.* 291.—Hybr.

LEONTOPODIUM, R. Br. (Compos.).
Futtereri, *Diels, in Futterer, Durch Asien, Bot.* repr. 22.—Tibet.
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 103.—China.

LEONURUS, Linn. (Labiat.).
tuberiferus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* xix. 146.—Japon.

LEPANTHES, Sw. (Orchid.).
bilabiata, *Fawcett & Rendle, in Trans. Linn. Soc. Bot.* Ser. II. vii. 4.—Ind. occ.
concolor, *Fawcett & Rendle, l. c.* 5.—Ind. occ.
divaricata, *Fawcett & Rendle, l. c.* 11.—Ind. occ.
obtusa, *Fawcett & Rendle, l. c.*—Ind. occ.
quadrata, *Fawcett & Rendle, l. c.* 7.—Ind. occ.

LEPIDAGATHIS, Willd. (Acanth.).
diffusa, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 631 (=*Teliostachya diffusa*).—Parag.
eriocephala, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 409.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 183.—Afr. trop.
Lindauiana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. (1903) 145.—Afr. trop.
macrochila, *Lindau, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 378.—Afr. trop.
nematocephala, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 409.—Afr. trop.
Pobeguini, *Hua, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 576.—Afr. trop.
tenuis, *C. B. Clarke, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 92.—Ins. Philipp.

LEPIDIUM, Linn. (Crucif.).
acutidens, *Abrams, in Bull. S. Calif. Acad.* ii. 41.—Calif.
austrinum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 468.—Am. bor.
costaricense, *Thell. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 713.—Am. cent.
Dioscoridis, Bub. Fl. Pyren. iii. 244 = latifolium.
divergens, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 237.—Am. bor.
diversifolium, *Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 698.—As. cent.
elongatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 234.—Am. bor.
Georginum, *Rydb. l. c.* 1903, 253.—Am. bor.
glaucum, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 312.—Am. bor.
granulare, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 294.—Mexic.
Jonesii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 233.—Am. bor.
Magnolii, Bub. Fl. Pyren. iii. 240 = hirtum.
neglectum, *Thell. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 708.—Am. bor.
oblongum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 468.—Am. bor.

LEPIDOBOLUS, Nees (Restiac.).
deserti, *Gilg, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 91.—Austral.

LEPIDOBOTRYS, Engl. Jahrb. xxxii. 108 (1902). *LINACEAE.*
Staudtii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

LEPIDOPHYLLUM, Cass. (Compos.).
abietinum, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 276 (=*Polyclados abietinus*).—Chili.
phylicaeforme, *Hieron. ex R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 77 (=*Baccharis phylicaeformis*).—Am. austr.

LEPINIA, Decne. (Apocyn.).
solomonensis, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2703.—Ins. Solom.

LEPISANTHES, Blume (Sapind.).
Blumeana, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lxi. 168.—Java.

LEPTACTINIA, Hook. f. (Rubiac.).
gloeocalyx, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 341.—Afr. trop.
hexamera, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
pectrophylax, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 383.—Afr. trop.
prostrata, *K. Schum. l. c.* 382.—Afr. trop.

LEPTASEA, Haw. = **Saxifraga**, Tourn. (Saxifr.).
alaskana, Small, in N. Am. Fl. xxii. 152.—Am. bor.
austromontana, Small, l. c. 153 = S. austromontana.
cherlerioides, Small, l. c. = S. bronchialis.
chrysantha, Small, l. c. 152 = S. chrysantha, *A. Gray.*
fimbriata, Small, l. c. 154 = S. Eschholtzii.
flagellaris, Small, l. c. = S. flagellaris.
Funstonii, Small, l. c.—Am. bor.
Hirculus, Small, l. c. 152 = S. Hirculus.
ledifolia, Small, l. c. 155 = S. ledifolia.
serpyllifolia, Small, l. c. 152 = S. serpyllifolia.
Tolmiei, Small, l. c. 156 = S. Tolmiei.
Van-Bruntiae, Small, l. c. 153 = S. Van-Bruntiae.
vespertina, Small, l. c.—Am. bor.

LEPTILON, Rafin. = **Erigeron**, Linn. (Compos.).
bonariense, Small, Fl. S. E. U. S. 1231 = E. bonariensis.
linifolium, Small, l. c. = E. linifolius.

LEPTOCARPUS, R. Br. (Restiac.).
humilis, *Gilg, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 89.—Austral.

LEPTODERMIS, Wall. (Rubiac.).
pulchella, *Yatabe, in Bot. Mag. Tokyo*, iv. (Oct. 1890) (2) t. 12.—Japon.

LEPTOMERIA, R. Br. (Santal.).
pachyclada, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 178.—Austral.

LEPTONYCHIA, Turcz. (Stercul.).
usambarensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 313.—Afr. trop.

LEPTOPHOENIX, Becc. (Palm.).
minor, *Becc. in Martelli, Webbia*, 298.—N. Guin.

LEPTOSOLENA, Presl (Scitamin.).
insignis, *Ridley, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 84.—Ins. Philipp.

LEPTOSPERMUM, Forst. (Myrtac.).
Bennigsenianum, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 470.—Ins. Carol.
Petersoni, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xv. 781.—Austral.
podanthum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 423.—Austral.

LEPTOSTYLIS, Benth. (Sapot.).
micrantha, *Beauvis. Gen. Montroux.* 88.—N. Caled.

LEPYRODIA, R. Br. (Restiac.).
heleocharoides, *Gilg, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 87.—Austral.

LEPYRODICLIS, Fenzl (Caryophyll.).
[ARENARIA, Rupp. I. K.]
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 38.—China.

LEQUEETIA, Bub. Fl. Pyren. iv. (1901) 57 = **Limodorum**, Tourn. (Orchid.).
violacea, Bub. l. c. 58 = Lim. abortivum.

LERCHEA, Hall. = **Suaeda**, Forsk. (Chenopod.).
conferta, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 482 (=*Dondia conferta*).—Am. bor.

LERESCHIA, Boiss. = **Pimpinella**, Linn. (Umbell.).
Flahaultii, Woronow, in Sched. Herb. Fl. Ross. v. 60.—Reg. Caucas.

LESCHENAULTIA, R. Br (Gooden.).
juncea, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 553.—Austral.
stenosepala, *E. Pritz. l. c.* 552.—Austral.

LESPEDEZA, Michx. (Legum.).
acuticarpa, *Mackenzie & Bush, Fl. Jackson County*, 118; *et in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xii. 16.—Am. bor.
Bicknellii, *House, in Torreya*, v. 167.—Am. bor.
Brittonii, *E. P. Bickn. in Torreya*, i. 103; *et in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1048.—Am. bor.
lanceolata, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 483.—China.
latifolia, *Dunn, l. c.*—China.
Manniana, *Mackenzie & Bush, Fl. Jackson County*, 118; *et in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xii. 15.—Am. bor.
neglecta, *Mackenzie & Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xii. 17.—Am. bor.
prairea, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 641.—Am. bor.
simulata, *Mackenzie & Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xii. 18.—Am. bor.
texana, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 641.—Am. bor.
velutina, *Dunn, in Hook. Ic. Pl.* t. 2700 (Feb. 1901).—China.
velutina, *E. P. Bickn. in Torreya*, i. 102 (Sept. 1901); *et in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1048.—Am. bor.

LESQUERELLA, S. Wats. (Crucif.).
[VESICARIA, Tourn. I. K. S. I.]
arenosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 236 (=*Vesicaria arenosa*).—Am. bor.
diversifolia, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 309.—Am. bor.

LESQUERELLA:—
foliacea, *Greene, Pittonia*, v. 134.—Am. bor.
Macounii, *Greene, l. c.* iv. (1901) 310.—Am. bor.
macrocarpa, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 366.—Am. bor.
nodosa, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 309.—Am. bor.
ovata, *Greene, l. c.* 308.—Am. bor.
parvula, *Greene, l. c.*—Am. bor.
pruinosa, *Greene, l. c.* 307.—Am. bor.
rosea, *Greene, l. c.* 311.—Am. bor.
sessilis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 471.—Am. bor.
Shearis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 237.—Am. bor.
utahensis, *Rydb. l. c.* 1903, 252.—Am. bor.
versicolor, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 310.—Am. bor.

LESSINGIA, Cham. (Compos.).
albiflora, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 217.—Calif.

LETTSOMIA, R. Br. (Convolv.).
campanuliflora, *Gage, in Rec. Bot. Surv. India*, iii. 79.—Burma.
Melvillei, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 144.—Burma.
sphaerocephala, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 19.—Penins. Mal.

LEUCADENDRON, Berg. (Proteac.).
empetrifolium, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. xcviii.—Afr. austr.

LEUCANTHEMUM, Tourn. = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).
ageratifolium, Pau, in Bol. Soc. Arag. i. 31.—Hispan.
laciniatum, Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 473.—Italia.
pluriflorum, Pau, in Bol. Soc. Arag. i. 31.—Eur.
valentinum, Pau, l. c. 48.—Hispan.

LEUCAS, Burm. (Labiat.).
argentea, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 122.—Afr. trop.
Dinteri, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1088.—Afr. trop.
Engleri, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 124.—Afr. trop.
nakurensis, *Guerke, l. c.* 123.—Afr. trop.
Neumannii, *Guerke, l. c.*—Afr. trop.
Newtonii, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1089.—Afr. trop.
ogadensis, *Guerke, in Engl. Jahrb* xxxvi. 124.—Afr. trop.
Poggeana, *Briq. in Engl. Jahrb.* xix. 198.—Afr. trop.

LEUCERES, Calest. in Martelli, Webbia, 207 (1905). *UMBELLIFERAE.*
castellanus, *Calest. l. c.* 208 (=*Endressia castellana*).—Hispan.

LEUCERIA, Lag. (Compos.).
canescens, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 426 (=*Chabraea canescens*).—Chili.
chillanensis, *Phil. in Reiche, l. c.* 413.—Chili.
concinna, *Reiche, l. c.* 422 (=*Chabraea concinna*).—Chili.
coquimbana, *Reiche, l. c.* 421 (=*Chabraea coquimbana*).—Chili.
eriocephala, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 21.—Patag.
Gayana, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 429 (=*Chabraea Gayana*).—Chili.
glabriuscula, *Reiche, l. c.* 414 (=*Chabraea glabriuscula*).—Chili.
Landbecki, *Reiche, l. c.* 423 (=*Chabraea Landbecki*).—Chili.
lithospermifolia, *Reiche, l. c.* 430 (=*Chabraea lithospermifolia*).—Chili.
microcephala, *Reiche, l. c.* 429.—Chili.
modesta, *Reiche, l. c.* 415 (=*Chabraea modesta*).—Chili.
multifida, *S. Moore, ex Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 376 (=*Chabraea multifida*).—Am. austr.
nutans, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 430 (=*Chabraea nutans*).—Chili.
paucicapitata, *Reiche, l. c.* 428.—Chili.
polyclados, *Reiche, l. c.* 415 (=*Chabraea polyclados*).—Chili.
purpurea, *S. Moore, ex Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 376 (=*Chabraea purpurea*).—Fuegia.
rosea, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 427 (=*Chabraea rosea*).—Chili.

LEUCERIA:—
salina, P. Dusén, in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. viii. 32 (= Chabraea salina).—Patag.
thermarum, Reiche, Fl. Chile, iv. 423 (= Chabraea thermarum).—Chili.

LEUCONOTIS, Jack (Apocyn.).
elastica, Becc. Nelle Foreste di Borneo, 358.—Borneo.

LEUCONYMPHAEA, Ludw. = **Nymphaea**, Linn. (Nymphaeac.).
Gibertii, Morong, ex Conard, Monog. Nymphaea, 211 = N. Gibertii.

LEUCOPHYLON, Lowe, Man. Fl. Madeir. ii. 32, 34 (1868) = LEUCOXYLUM, Soland. = **Heberdenia**, Banks (Myrsin.).
excelsum, Lowe, l. c. = H. excelsa.

LEUCOPOGON, R. Br. (Epacrid.).
brevistylis, Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. ii. 28.—Austral.
cinereus, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. 472.—Austral.
denticulatus, Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. ii. 26.—Austral.
Dielsianus, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. 476.—Austral.
glaucifolius, Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxviii. 104.—Austral.
hamulosus, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. 478.—Austral.
hispidus, E. Pritz. l. c.—Austral.
marginatus, Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. i. 27.—Austral.
Milligani, Rodw. Tasman. Fl. 118 (= Styphelia Milligani).—Austral.
minutifolius, Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. ii. 27.—Austral.
mollis, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. 471.—Austral.
nutans, E. Pritz. l. c. 477.—Austral.
oliganthus, E. Pritz. l. c. 474.—Austral.
psammophilus, E. Pritz. l. c. 478.—Austral.
tamminensis, E. Pritz. l. c. 479.—Austral.

LEUCOSMIA, Benth. (Thymel.).
Chermsideana, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. xiv. 35.—Austral.

LEUCOSPERMUM, R. Br. (Proteac.).
Bolusii, Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlviii. p. xcv.—Afr. austr.
Macowani, Gand. l. c. p. xciv.—Afr. austr.

LEUCOSTEGANE, Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc. x. (1901) 37. LEGUMINOSAE.
latistipulata, Prain, l. c. 38.—Ind. or.

LEUCOTHOË, D. Don (Ericac.).
platyphylla, Small, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 290.—Am. bor.

LEUROCLINE, S. Moore, in Journ. Bot. 1901, 257. BORAGINACEAE.
lithospermoides, S. Moore, l. c.—Afr. trop.
somalensis, S. Moore, l. c. 258 (= Lobostemon somalensis).—Afr. trop.

LEVEILLEA, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xii. (1903) 29 = **Bi-Levelllea**, Vaniot (Compos.).
chinensis, Vaniot, l. c. xiii. (1904) 16 (= Blumea chinensis).—China.
Martini, Vaniot, l. c. xii. 30.—China.
procera, Vaniot, l. c. xiii. 16 (= Blumea procera).—Ind. or.; Burma.
riparia, Vaniot, l. c. (= Blumea riparia).—Java.
vestita, Vaniot, l. c. (= Blumea semivestita).—Ind. or.

LEVIERIA, Becc. (Monim.).
acuminata, Perk. in Engl. Pflanzenreich, Monim. 21 (= Mollinedia acuminata).—Austral.
Beccariana, Perk. l. c.—N. Guin.
nitens, Perk. l. c.—N. Guin.

LEYSSERA, Linn. (Compos.).
montana, Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc. xvi. 138.—Afr. austr.

LIABUM, Adans. (Compos.).
Alibum, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 627 (= Alibum liaboides).—Ecuador.

LIABUM:—
caliense, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 623.—N. Granat.
caulescens, Hieron. l. c. xxxvi. 500.—Peruv.
Eggersii, Hieron. l. c. xxviii. 624.—Ecuador.
homogamum, Hieron. l. c. 626.—N. Granat.
Jelskii, Hieron. l. c. xxxvi. 499.—Peruv.
pseudosalviifolium, Hieron. l. c. 502.—Peruv.
rosulatum, Hieron. l. c. 501.—Peruv.
salviifolium, Hieron. l. c. xxviii. 622.—Ecuador.
Szyszylowiczii, Hieron. l. c. xxxvi. 503.—Peruv.
Tonduzii, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 270.—Am. cent.

LIATRIS, Schreb. (Compos.).
Halei, K. Schum. in Just, Jahresb. xxviii. I. 477 (= Laciniaria Halei).—Am. bor.
platylepis, K. Schum. l. c. (= Laciniaria platylepis).—Am. bor.

LICHTENSTEINIA, Cham. & Schlecht. (Umbell.).
Kolbeana, Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc. xvi. 136.—Afr. austr.

LICUALA, Thunb. (Palm.).
borneensis, Becc. Nelle Foreste di Borneo, 385.—Borneo.
elegantissima, Ridley, in Gard. Chron. 1904, I. 50.—Borneo.
longepedunculata, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xli. 42.—Penins. Mal.
Micholitzi, Ridley, in Gard. Chron. 1904, I. 50.—Borneo.
micrantha, Becc. in Martelli, Webbia, 289.—N. Guin.
olivaeformis, Becc. Nelle Foreste di Borneo, 385.—Borneo.
paniculata, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xli. 42.—Penins. Mal.

LIEBRECHTSIA, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. (1902) 70. LEGUMINOSAE.
esculenta, Wildem. l. c. 74.—Afr. trop.
katangensis, Wildem. l. c. 72.—Afr. trop.
Kotschyi, Wildem. l. c. 73 (= Vigna Kotschyi).—Afr. trop.
scabra, Wildem. l. c. 75.—Afr. trop.
Schweinfurthii, Wildem. l. c. 73.—Afr. trop.
spartioides, Wildem. l. c. 204 (= Vigna spartioides).—Afr. trop.

LIGHTFOOTIA, L'Hérit. (Campan.).
divaricata, Engl. Jahrb. xxxii. 117.—Afr. trop.
Goetzeana, Engl. l. c. xxx. 419.—Afr. trop.
kagerensis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 176.—Afr. trop.
laricifolia, Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 397.—Afr. trop.
rupestris, Engl. Jahrb. xxx. 419.—Afr. trop.

LIGULARIA, Cass. (Compos.).
[SENECIO, Tourn. 1. K.]
dolichobotrys, Diels, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 107.—China.
Fargesii, Diels, l. c. xxix. 621 (= Senecio Fargesii).—China.
jaloensis, Kom. in Act. Hort. Petrop. xviii. 420.—As. or.
Przewalskii, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 621 (= Senecio Przewalskii).—China.
Schmidtii, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 191 (= Senecio Schmidtii).—Japon.
tenuipes, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 621 (= Senecio tenuipes).—China.
tussilaginea, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, 1904, 52 (= Arnica tussilaginea).—Japon.
villifera, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 623 (= Senecio villifera).—China.

LIGUSTICUM, Linn. (Umbell.).
affine, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 223.—Am. bor.
alpestre, Calest. in Martelli, Webbia, 210 (= Peucedanum alpestre).—Rossia.
Delavayanum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxviii. I. 461, sphalm. = Ligustrum Delavayanum.
ibukiense, Yabe, in Journ. Coll. Sci. Tokyo, xvi. no. 4, 68.—Japon.
madrense, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 336.—Mexic.
Monnieri, Calest. in Martelli, Webbia, 211 (= Selinum Monnieri).—Eur.; As. cent.

LIGUSTICUM:—
pseudo-angelica, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 845.—China.
tenuilobum, Calest. in Martelli, Webbia, 211 (= Aulacospermum tenuilobum).—Rossia; Sibir.
tenuisectum, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 843.—China.
tsusimense, Yabe, in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 30.—Japon.
venosum, Calest. in Martelli, Webbia, 211 (= Cnidium venosum).—Eur.

LIGUSTRUM, Tourn. (Oleac.).
acuminatum, Koehne, in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers. 201.—Hab.?
acutissimum, Koehne, l. c. 192.—China.
macrocarpum, Koehne, l. c. 201.—Hab.?
Prattii, Koehne, l. c. 203.—China.
Regelianum, Hort. ex Koehne, in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers. 192; et in Mitth. Deutsch. Dendrol. Ges. 1904, 70.—Japon.
yunnanense, L. Henry, in Rev. Hortic. 1902, 497.—China.

LILIUM, Tourn. (Liliac.).
amabile, Palib. in Act. Hort. Petrop. xix. 113.—As. bor.
cernuum, Kom. in Act. Hort. Petrop. xx. 461.—As. bor.
myriophyllum, Wilson, in Flora & Sylva, 1905, 330.—China.
Palibinianum, Yabe, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 134.—China.
tsingtauense, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. Beibl. lxxv. 24.—China.

LIMACIA, Lour. (Menisperm.).
Esiangkara, F. M. Bailey, Queensl. Fl. 1997.—Austral.

LIMNANTHEMUM, S. P. Gmel. (Gentian.).
abyssinicum, N. E. Brown, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. I. 584.—Afr. trop.
Kirkii, N. E. Brown, l. c. 585.—Afr. trop.
Rautanenii, N. E. Brown, l. c.—Afr. trop.
senegalense, N. E. Brown, l. c. 586.—Afr. trop.
Whytei, N. E. Brown, l. c. 585.—Afr. trop.

LIMNOPHILA, R. Br. (Scrophul.).
Cavaleriei, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xv. (1905) 85.—China.

LIMNOPHYTON, Miq. (Alismac.).
angolense, Buchenau, in Engl. Pflanzenreich, Alismat. 23.—Afr. trop.

LIMNORCHIS, Rydb. (Orchid.).
arizonica, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 629.—Am. bor.
Behringiana, Rydb. l. c. 620.—As. bor.
borealis, Rydb. l. c. 621 (= Habenaria borealis).—Am. arct.
brachypetala, Rydb. ex Britton & Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 161.—Am. bor.
brevifolia, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 631 (= Habenaria brevifolia).—Mexic.
convallariaefolia, Rydb. l. c. 628 (= Platanthera convallariaefolia).—Reg. arct.
dilatata, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 294 (= Habenaria dilatata).—Am. bor.
ensifolia, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 629.—Am. bor.
foliosa, Rydb. l. c. 622.—Am. bor.
fragrans, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 294.—Am. bor.
gracilis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 627 (= Platanthera gracilis).—Am. bor.
graminifolia, Rydb. l. c. (= Platanthera graminea).—Am. bor.
huronensis, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 294 (= Orchis huronensis).—Am. bor.
laxiflora, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 630.—Am. bor.
leptoceratitis, Rydb. in Britton & Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 162.—Am. bor.
major, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 617.—Am. bor.
media, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 294.—Am. bor.

LIMNORCHIS:—
purpurascens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 269.—Am. bor.
sparsiflora, *Rydb. l. c.* 631 (= *Habenaria sparsiflora*).—Am. bor.
Thurberi, *Rydb. l. c.* 624 (= *Habenaria Thurberi*).—Am. bor.
viridiflora, *Rydb. l. c.* 1901, 616.—Am. arct.

LIMODORUM, Tourn. (Orchid.).
graminifolium, *Small, Fl. S. E. U. S.* 322.—Am. bor.
pinetorum, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 421.—Am. bor.
Simpsonii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 322 (= *Calopogon Simpsonii*).—Am. bor.
turkestanicum, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 18.—Turkestan.

LIMONIA, Linn. (Rutac.).
Demeusei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 159.—Afr. trop.
Engleriana, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 163.—Ins. Philipp.
Lacourtiana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 159.—Afr. trop.
Warneckei, *Engl. Jahrb.* xxxvi. 246.—Afr. trop.

LIMONIUM, Tourn. = **Statice**, Linn. (Plumbag.).
auriculaefolium, Druce, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 77 = S. auriculaefolia.
Neumani, C. E. Salmon, in Journ. Bot. 1904, 361.—Hybr.
occidentale, Druce, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 77 = S. occidentalis.
patagonicum, Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. viii. 656 = Statice patagonica.
recurvum, C. E. Salmon, in Journ. Bot. 1903, 67.—Brit.

LINANTHUS, Benth. = **Gilia**, Ruiz & Pav. (Polemon.).
concinnus, Millik. in Univ. Calif. Publ. Bot. ii. 53.—Calif.
croceus, Eastw. in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 442.—Calif.
densiflorus, Millik. in Univ. Calif. Publ. Bot. ii. 56 = G. densiflora.
Eastwoodae, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 125.—Calif.
floribundus, Greene, ex Millik. in Univ. Calif. Publ. Bot. ii. 55 = G. floribunda.
graciosus, Millik. in Univ. Calif. Publ. Bot. ii. 59.—Calif.
longitubus, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 43 = G. micrantha.
maculatus, Millik. in Univ. Calif. Publ. Bot. ii. 55 = G. maculata.
magnificus, Millik. l. c. 53.—Calif.
mariposianus, Millik. l. c. 67.—Calif.
nudicaulis, Howell, in Fl. N. W. Am. i. 456 = G. nudicaulis.
Nuttallii, Greene, ex Millik. in Univ. Calif. Publ. Bot. ii. 54 = G. Nuttallii.
Plaskettii, Eastw. in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 443.—Calif.

LINARIA, Tourn. (Scrophul.).
bastetana, *Rouy, Illustr. Pl. Eur.* t. 415.—Hispan.
Mascdae, *Merino, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 489.—Hispan.
Pattae, K. Schum. in Just, Jahresb. xxviii. I. 492, sphalm. = Jattae.

LINDENBERGIA, Lehm. (Scrophul.).
Melvillei, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 144.—Burma.
Pirottae, *Almagia, in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 140.—Afr. trop.

LINDERA, Thunb. (Laurac.).
aromatica, *Brandis, in Hook. Ic. Pl.* t. 2784.—Burma.
pentantha, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lxviii. 240.—Java.

LINDERNIA, All. (Scrophul.).
[VANDELLIA, Linn. I. K.]
rupestris, *Engl. Jahrb.* xxx. 402.—Afr. trop.

LINDMANIA, Mez (Bromel.).
petiolata, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 864.—Peruv.
Rusbyi, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 6.—Boliv.

LINKIA, Cav. = **Persoonia**, Sm. (Proteac.).
lanceolata, J. Britten, Bot. Cook Voy. 80 = P. lanceolata.

LINNAEA, Gronov. (Caprifol.).
longiflora, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 280.—Am. bor.

LINOCIERA, Sw. (Oleac.).
angolensis, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 20 (= *Mayepea africana*).—Afr. trop.
congesta, *Baker, l. c.*—Afr. trop.
jamaicensis, *Urb. Symb. Antill.* ii. 456.—Ind. occ.
Johnsoni, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 20.—Afr. trop.
urophylla, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 378.—Afr. trop.
Welwitschii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 20 (= *Mayepea Welwitschii*).—Afr. trop.

LINOSPADIX, Becc. (Palm.).
Julianetti, *Becc. in Martelli, Webbia*, 295.—N. Guin.
Leopoldi, *Hort. Sander, ex Gard. Chron.* 1903, I. Suppl. Apr. 25, t. 106.—Hab.?
parvulus, Becc. in Martelli, Webbia, 293, sphalm. = pusillus.
pusillus, *Becc. l. c.* 295.—N. Guin.
Schlechterii, *Becc. l. c.* 296.—N. Guin.

LINOSYRIS, Cass. = **Aster**, Linn. (Compos.).
Linosyris, Degen, in Magyar Bot. Lap. iv. 127 = A. Linosyris.

LINUM, Tourn. (Linac.).
alpestre, Bub. Fl. Pyren. iii. 335 = perenne.
arkansanum, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 644.—Am. bor.
arvense, Bub. Fl. Pyren. iii. 333 = angustifolium.
bahamense, *Northr. in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 42.—Ins. Baham.
bulgaricum, *Podp. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1902, 642.—Eur.
Carteri, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 424.—Am. bor.
compactum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 241.—Am. bor.
crenatum, *Podp. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1902, 637.—Eur.
Curtissii, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 424.—Am. bor.; Ind. occ.
Harperi, *Small, Fl. S. E. U. S.* 663.—Am. bor.
hungaricum, *Podp. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1902, 636.—Eur.
Jimenezii, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 70; *et ex Munuera, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 80.—Hispan.
Karoi, *Freyn, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 15.—As. bor.
marginatum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 663.—Am. bor.
pseudoelegans, *Podp. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1902, 639.—Eur.
sanctum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 664.—Am. bor.
serbicum, *Podp. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1902, 641.—Eur.
thracicum, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* iv. 128.—Serbia.
turcicum, *Podp. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, 1902, 637.—Eur.

LIPARIS, Rich. (Orchid.).
acaulis, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 102.—N. Guin.
amboinensis, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 31.—Ins. Ambon.
atrosanguinea, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 71.—Penins. Mal.
bicolor, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 270.—Java.
bicuspidata, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 109 C.—Borneo.
bilobulata, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 279.—Java.
cleistogama, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 33.—Ins. Ambon.
confusa, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 275.—Java.
divergens, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 109 E.—Sumatra.
epiphytica, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 6.—Afr. trop.
genychila, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 103.—N. Guin.
Giraldiana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 27.—China.
glaucescens, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 109 D.—Borneo.
latilabris, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 6.—China.
macrotis, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 104.—N. Guin.

LIPARIS:—
major, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 104.—N. Guin.
Minahassae, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 109 A.—Celebes.
pectinifera, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 105.—N. Guin.
platychila, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
pseudo-disticha, *Schlechter, l. c.* 106.—N. Guin.
serrulata, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
seychellarum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 60.—Ins. Seychell.
torricellensis, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 107.—N. Guin.
tunensis, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 109 B.—Ins. Malay.
vittata, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 71.—Sumatra.
yunnanensis, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 8.—China.

LIPPIA, Houst. (Verben.).
Balansae, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 305.—Parag.
Baumii, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 350.—Afr. trop.
bothrioura, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1162.—Parag.
calliclada, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 306.—Parag.
chrysantha, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 87.—Mexic.
contermina, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1157.—Parag.
coriacea, *Briq. l. c.* 1160.—Parag.
Darwinii, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 65 (= *Neosparton Darwinii*).—Am. austr.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 821.—Parag.
Helleri, *Britton, in Torreya*, iii. 105.—Ind. occ.
heterophylla, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 313.—Parag.
hypoleuca, K. Schum. in Just, Jahresb. xxviii. I. 496, sphalm. = hypoleia.
Lindmanii, *Briq. in Arkiv Bot. Stockh.* ii. no. 10, 20.—Bras.
modesta, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 311.—Parag.
obscura, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1155.—Parag.
paraguariensis, *Briq. l. c.* 1163.—Parag.
pedunculata, *H. H. W. Pearson, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xv. 175.—Afr. austr.
phaeocephala, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1158.—Parag.
phryxocalyx, *Briq. l. c.* 1161.—Parag.
polycephala, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 307.—Parag.
polytricha, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1158.—Parag.
pulchra, *Briq. in Arkiv Bot. Stockh.* ii. no. 10, 18.—Bras.
scaposa, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1162.—Parag.
sclerophylla, *Briq. l. c.* 1067.—Parag.
tegulifera, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 309.—Parag.
trachyphylla, *Briq. l. c.* 312.—Parag.
tristis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1159.—Parag.

LIRIODENDRON, Linn. (Magnol.).
chinense, *Sargent, Trees & Shrubs*, 103, t. 52.—China.

LIRIOPE, Lour. (Haemodor.).
kansuensis, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 79 (= *Ophiopogon kansuensis*).—China.

LIRIOSMA, Poepp. (Olac.).
grandiflora, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. *Mém.* III. 99, nomen.—Bras.

LISIANTHUS, Linn. (Gentian.).
acuminatus, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxxi. 493.—Mexic.
arcuatus, *Perkins, l. c.* 492.—Am. cent.
axillaris, *Perkins, l. c.* 490 (= *Lisianthius axillaris*).—Am. cent.
brevidentatus, *Perkins, l. c.* 491 (= *Lisianthius brevidentatus*).—Am. cent.
corymbosus, *Perkins, l. c.*—Am. cent.

LISIANTHUS:—
domingensis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 333.—Ind. occ.
gracilis, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxxi. 493.—Ind. occ.
laxiflorus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 332.—Ind. occ.
Quelchii, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 50.—Guian.
Seemanii, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxxi. 491 (= *Lisianthius Seemanii*).—Am. cent.
Skinneri, *Perkins, l. c.* 492 (= *Lisianthius Skinneri*).—Am. cent.

LISSOCHILUS, R. Br. (Orchid.).
Busseana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 65.—Afr. trop.
Eylesii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1905, 53.—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 22.—Afr. trop.
leucanthus, *Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1009.—Afr. trop.
Mahoni, *Rolfe, in Bot. Mag.* t. 8047.—Afr. trop.
morrumbalaensis, *Wildem. in Pl. Nov. Hort. Then.* t. 15.—Afr. trop.
multicolor, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 65.—Afr. trop.
seleensis, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 131.—Afr. trop.
Ugandae, *Rolfe, in Bot. Mag.* t. 8044.—Afr. trop.

LISTERA, R. Br. (Orchid.).
amplexicaulis, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 1560.—Austral.
Inayati, *Duthie, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 41.—Ind. or.
microglottis, *Duthie, l. c.* 42.—Ind. or.
nipponica, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 9.—Japon.
Savatieri, *Maxim. ex Kom. in Act. Hort. Petrop.* xx. 526.—As. bor.
Yatabei, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 8.—Japon.

LISTROSTACHYS, Reichb. f. (Orchid.).
[Angraecum, Bory. 1. K.]
bracteosa, *Rolfe, Orchid Rev.* x. 296.—Ins. Maurit.
cirrhosa, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 73.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 145.—Afr. trop.
Droogmansiana, *Wildem. in Belgique Coloniale*, viii. 426; *et in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 24.—Afr. trop.
falcata, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 146.—Afr. trop.
fimbriata, *Rolfe, ex Mahon, in Gard. Chron.* 1904, i. 166.—Afr. trop.
Gentilii, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 147.—Afr. trop.
hamata, *Rolfe, in Orchid Rev.* ix. 61.—Afr. trop.
ichneumonea, *Reichb. f. in Gard. Chron.* 1887, ii. 681 (= *Angraecum ichneumoneum*).—Afr. trop.
Kindtiana, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 148.—Afr. trop.
linearifolia, *Wildem. l. c.* 149.—Afr. trop.
Margaritae, *Wildem. l. c.* 150.—Afr. trop.
refracta, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 74.—Afr. trop.
Scheffleriana, *Kraenzl. l. c.* 75.—Afr. trop.

LITHOPHRAGMA, Torr. & Gray = **Tellima**, R. Br. (Saxif.).
australis, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 86.—Am. bor.
austromontana, A. A. Heller, Muhlenbergia, ii. 53.—Calif.
breviloba, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 86.—Am. bor.
bulbifera, Rydb. l. c.—Am. bor.
Catalinae, Rydb. l. c. 88.—Calif.
intermedia, Rydb. l. c.—Calif.
laciniata, Eastw. in N. Am. Fl. xxii. 87.—Calif.
trifida, Eastw. l. c. 89.—Calif.
trifoliata, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 200.—Calif.
triloba, Rydb. in N. Am. Fl. xxii. 87.—Calif.

LITHOSPERMUM, Tourn. (Borag.).
xibiflorum, *Vaniot, in Monde des Plantes*, Sér. II. vii. 42.—China.
mirabile, *Small, Fl. S. E. U. S.* 999.—Am. bor.
Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 31.—Mexic.
tschimganicum, *B. Fedtsch. in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 42.—Turkestan.

LITSEA, Lam. (Laurac.).
accedentoides, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lxviii. 166.—Java.

LITSEA:—
Clarkei, *Prain, Bengal Pl.* 903.—Ind. or.
confusa, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lxviii. 161.—Java.
papuana, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 269.—N. Guin.
pubescens, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lxviii. 190.—Java.
resinosa, *Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxii. 231 (= *Tetranthera resinosa*).—Java.
verruculata, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lxviii. 173.—Java.

LITTONIA, Hook. (Liliac.).
grandiflora, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 34.—Afr. trop.

LIVISTONA, R. Br. (Palm.).
Benthami, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 1683.—Austral.
macrophylla, *Roster, in Bull. Soc. Tosc. Ort.* xxix. (1904) 82.—Quid?
Merrillii, *Becc. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 45.—Ins. Philipp.
Muelleri, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 1683.—Austral.
rupicola, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 41.—Penins. Mal.
sinensis, Griff. Palms Brit. Ind. 131 = chinensis.
Vidalii, *Becc. in Martelli, Webbia*, 343.—Ins. Philipp.
Whitfordii, *Becc. l. c.* 341.—Ins. Philipp.

LOASA, Adans. (Loasac.).
Spegazzinii, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 588.—Patag.

LOBELIA, Adans. = **Scaevola**, Linn. (Gooden.).
Koenigii, W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. 310 = S. Koenigii.

LOBELIA, Plum. (Campan.).
bracteata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1146.—Am. bor.
Dekindtiana, *Engl. Jahrb.* xxxii. 147.—Afr. trop.
dolichothyrsa, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 607.—China.
elongata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1144.—Am. bor.
Erlangeriana, *Engl. Jahrb.* xxxii. 118.—Afr. trop.
fonticola, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 398.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 85.—Afr. trop.
glandulifera, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1144.—Am. bor.
Gouldii, *Fitzg. in Vict. Natural.* xviii. 104.—Austral.
Halei, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1145.—Am. bor.
heterodonta, *Sprague, in Gard. Chron.* 1904, ii. 252.—Ind. occ.
Krookii, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xviii. 407.—Afr. austr.
longisepala, *Engl. Jahrb.* xxxii. 117—Afr. trop.
minutidentata, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 397.—Afr. trop.
minutiflora, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* i. 30.—Hispan.
Nelsonii, *Fern. in Proc. Am. Acad.* xxxvi. 503.—Mexic.
regalis, *Fern. l. c.*—Mexic.
rosulata, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 402.—Afr. austr.
Sonderi, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xviii. 404 (= *Mezleria Dregeana*).—Afr. austr.
Toppii, *Luehm. in Vict. Natural.* xvii. 169.—Austral.
usafuensis, *Engl. Jahrb.* xxx. 420.—Afr. trop.
Wentzeliana, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Winfridae, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 549.—Austral.

LOBOGYNE, Schlechter (Orchid.).
papuana, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 126.—N. Guin.

LOBOSTEMON, Lehm. (Borag.).
alopecuroideus, *C. H. Wright, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 39 (= *Echium alopecuroideum*).—Afr. austr.
collinus, *Schlechter, ex C. H. Wright, l. c.* 26.—Afr. austr.
Galpinii, *C. H. Wright, l. c.* 41.—Afr. austr.
lithospermoides, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. ii. 60.—Afr. trop.
nitidus, *Bolus, ex C. H. Wright, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 38.—Afr. austr.
pilicaulis, *C. H. Wright, l. c.* 30.—Afr. austr.
pubiflorus, *C. H. Wright, l. c.* 39.—Afr. austr.

LOBOSTEPHANUS, N. E. Br. in Hook. Ic. Pl. t. 2692 (1901). *ASCLEPIADACEAE.*
palmatus, *N. E. Br. l. c.*—Afr. austr.

LOLIUM, Linn. (Gramin.).
cylindricum, *Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* ii. 761 (= *Lepturus cylindricus*).—Reg. Medit.; Afr. austr.
Trabuti, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 128.—Alger.

LOMANDRA, Labill. = **Xerotes**, R. Br. (Juncac.).
filiformis, J. Britten, Bot. Cook. Voy. 95 = X. filiformis.
multiflora, J. Britten, l. c. = X. multiflora.

LOMATIA, R. Br. (Proteac.).
pinnatifolia, *Hort. ex Annesley, Beaut. Trees & Shrubs*, 9.—Hab.?

LOMATIUM, Rafin. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).
purpureum, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 226.—Am. bor.

LONCHITIS, Bub. Fl. Pyren. iv. (1901) 50 = **Serapias**, Linn. (Orchid.).
cordigera, Bub. l. c. = S. cordigera.
longipetala, Bub. l. c. 52 = S. Pseudo-cordigera.
oxyglottis, Bub. l. c. = S. Lingua.

LONCHOCARPUS, H. B. & K. (Legum.).
affinis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 196.—Afr. trop.
Busseі, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 172.—Afr. trop.
discolor, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 421.—Bras.
dubius, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 196.—Afr. trop.
Ehrenbergii, *Urb. Symb. Antill.* iii. 283.—Ind. occ.
eriocalyx, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 89.—Afr. trop.
eriocarinalis, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 267.—Mexic.
Fischeri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 173.—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 195.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. Enum. Pl. Laurent*, 117.—Afr. trop.
littoralis, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 157 (1903).—Calif.
Menyharthii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 998.—Afr. austr.
neurophyllus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 282.—Ind. occ.
Wentzelianus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 330.—Afr. trop.

LONICERA, Linn. (Caprifol.).
aemulans, *Rehder, in Rep. Missouri Bot. Gard.* xiv. 59.—China.
alseuosmoides, *Graebn. ex Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 594.—China.
arizonica, *Rehder, in Sargent, Trees & Shrubs*, i. 45.—Am. bor.
barbinervis, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 426.—Corea.
Charlotti, Hort. ex W. Watson, in Gard. Chron. 1903, ii. 251 = etrusca.
dasystyla, *Rehder, in Rep. Missouri Bot. Gard.* xiv. 158.—Tonkin.
ferruginea, *Rehder, in Sargent, Trees & Shrubs*, i. 43.—China.
flavescens, *Small. Fl. S. E. U. S.* 1126.—Am. bor.
gigantea, Hort. ex Carrière, in Rev. Hort. 1882, 558 = etrusca.
Giraldii, *Rehder, in Rep. Missouri Bot. Gard.* xiv. 160.—China.
Harmsii, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 101.—China.
Hemsleyana, *Rehder, in Rep. Missouri Bot. Gard.* xiv. 112 (= *Caprifolium Hemsleyanum*).—China.
kabylica, *Rehder, ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. (1903) 290.—Alger.
Kachkarovii, *Rehder, in Rep. Missouri Bot. Gard.* xiv. 119.—Tibet.
Koehneana, *Rehder, in Sargent, Trees & Shrubs*, i. 41.—China.
leycesterioides, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 100.—China.
longa, *Rehder, in Rep. Missouri Bot. Gard.* xiv. 61.—China.

LONICERA:—
mexicana, *Rehder, in Rep. Missouri Bot. Gard.* xiv. 65 (= *Xylosteum mexicanum*).—Mexic.
mucronata, *Rehder, l. c.* 83.—China.
pekinensis, *Rehder, l. c.* 95.—China.
Rehderi, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 49.—Ins. Philipp.
rhododendroides, *Graebn. in Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 595.—China.
saccata, *Rehder, in Sargent, Trees & Shrubs*, i. 39.—China.
serpyllifolia, *Rehder, in Rep. Missouri Bot. Gard.* xiv. 58.—China.
setchuensis, *Rehder, l. c.* 107.—China.
sororia, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 644.—Am. bor.
subaequalis, *Rehder, in Rep. Missouri Bot. Gard.* xiv. 172.—China.
vegeta, *Rehder, l. c.* 111.—China.
vesicaria, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 427.—Corea.

LOPHANTHUS, Benth. (Labiat.).
Krylovi, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 122.—Altai.
subnivalis, *Lipsky, l. c.* xxiii. 209.—As. cent.
tschimganicus, *Lipsky, l. c.* 212.—As. cent.

LOPHATHERUM, Brongn. (Gramin.).
sinense, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 421.—China.

LOPHIRA, Banks (Dipterocarp.).
Barteri, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* xv. 186.—Afr. trop.
lanceolata, *Van Tiegh. l. c.* 187.—Afr. trop.
macrophylla, *Van Tiegh. l. c.* 186.—Afr. trop.
spathulata, *Van Tiegh. l. c.* 187.—Afr. trop.
Tholloni, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.

LOPHOLAENA, DC. (Compos.).
cneorifolia, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1021 (= *Doria cneorifolia*).—Afr. trop.
disticha, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 134 (= *Othonna disticha*).—Afr. austr.
dolichopappa, *S. Moore, l. c.* (= *Senecio dolichopappus*).—Afr. trop.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 133.—Afr. austr.
segmentata, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1021 (= *Senecio segmentatus*).—Afr. austr.

LOPHOPETALUM, Wight (Celastr.).
torricellense, *Loes. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 303.—N. Guin.

LOPHOSCIADIUM, DC. (Umbell.).
meoides, *Calest. in Martelli Webbia*, 238 (= *Ferula meoides*).—Eur.

LOPHOSTACHYS, Pohl (Acanth.).
guatemalensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 119.—Am. cent.

LOPHOTOCARPUS, Dur. (Alismac.).
Seubertianus, *Buchen. in Engl. Pflanzenreich, Alismat.* 36 (= *Lophiocarpus Seubertianus*).—Bras.

LORANTHUS, Linn. (Loranth.).
alatus, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 175.—Afr. trop.
Albizziae, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 74.—Afr. trop.
Bagshawei, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 206.—Afr. trop.
Baumii, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 228.—Afr. trop.
brazzavillensis, *Wildem. in Th. Dur. & Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 102.—Afr. trop.
Butayei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 28.—Afr. trop.
Buvumae, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 207.—Afr. trop.
Dekindtianus, *Engl. Jahrb.* xxxii. 120.—Afr. trop.
Dinteri, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 860.—Afr. trop.
dolichoclades, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 258.—N. Guin.
elongatus, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 75.—Afr. trop.
Friesianus, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 258.—N. Guin.

LORANTHUS:—
Fuelleborni, *Engl. Jahrb.* xxx. 304.—Afr. trop.
glaucophyllus, *Engl. l. c.* xxxii. 129.—Afr. trop.
irebuensis, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 76.—Afr. trop.
Kimuenzae, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 29.—Afr. trop.
latibracteatus, *Engl. Jahrb.* xxx. 303.—Afr. trop.
mangheensis, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 77.—Afr. trop.
mayombensis, *Wildem. l. c.* 78.—Afr. trop.
Menyharthii, *Engl. & Schinz, ex Schinz, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxviii. 409.—Afr. trop.
musozensis, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 204.—Afr. trop.
nigrescens, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. I. i. 177.—Afr. trop.
Novae-Britanniae, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 250.—Ins. Bismarck.
Novae-Guineae, *F. M. Bailey, Contrib. Fl. Brit. N. Guin. reimpr. ex Rep. Brit. N. Guin.* 1901-2, 3.—N. Guin.
Pittosporae, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 205.—Afr. trop.
proteicola, *Engl. Jahrb.* xxx. 303.—Afr. trop.
Pungu, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 175.—Afr. trop.
quinquangulus, *Engl. & Schinz, ex Schinz, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxviii. 409.—Afr. trop.
rubiginosus, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 173.—Afr. trop.
zambesiacus, *Engl. & Schinz, ex Schinz, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxviii. 409.—Afr. trop.
senegalensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 30.—Afr. trop.
tenuifolius, *Engl. Jahrb.* xxx. 302 (1901).—Afr. trop.
tenuifolius, *F. M. Bailey, in Bot. Bull. Dept. Agric. Queensl.* xvi. 1 (1903).—Austral.
Terminaliae, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 228.—Afr. trop.
vittatus, *Engl. Jahrb.* xxx. 301.—Afr. trop.

LORTIA, Rendle (Euphorb.).
major, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 289.—Afr. trop.

LOTONONIS, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
trifolioides, *Schlechter, ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 16.—Afr. austr.
Wylei, *Wood, Natal Pl.* iv. t. 350; *et in Gard. Chron.* 1904, ii. 182 (Wyliei).—Afr. austr.

LOTOXALIS, Small, Fl. S. E. U. S. 666 (1903). *OXALIDACEAE.*
Berlandieri, *Small, l. c.* (= *Oxalis Berlandieri*).—Am. bor.

LOTUS, Tourn. (Legum.).
cupreus, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 74.—Calif.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 324.—Afr. trop.
longebracteatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 254.—Am. bor.
macedonicus, *Adamov. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 1.—Eur.
medioximus, *Husnot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 418.—Gallia.
minoriflorus, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 92, nomen.—Ins. Mader.
oxyphyllus, *Engl. Jahrb.* xxx. 325.—Afr. trop.

LOUTERIDIUM, S. Wats. (Acanth.).
costaricense, *Radlk. & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 422.—Am. cent.

LOXOCALYX, Hemsl. (Labiat.).
ambiguus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 107 (= *Leonurus ambiguus*).—Japon.

LOXOCARYA, R. Br. (Restiac.).
myrioclada, *Gilg, ex Diels & Pritz. in Eng. Jahrb.* xxxv. 90.—Austral.

LOZANELLA, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xli. (1905) 236. *URTICACEAE.*
trematoides, *Greenm. l. c.*—Mexic.

LUCILIA, Cass. (Compos.).
frigida, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 41 (= *Gnaphalium frigidum*).—Chili.

LUCINAEA, DC. (Rubiac.).
membranacea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 178.—Malaya.
paniculata, *King, l. c.* 177.—Penins. Mal.
Ridleyi, *King, l. c.* 178.—Malaya.

LUCUMA, Molina (Sapot.).
martinicensis, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 105.—Ind. occ.
obpyriformis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xv. 493.—Austral.
quadrifida, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 106 (= *Achras quadrifida*).—Ind. occ.
Stahliana, *Pierre, l. c.* 104.—Ind. occ.
Urbani, *Pierre, l. c.* 103 (= *Radlkoferella Urbani*).—Ind. occ.

LUDWIGIA, Linn. (Onagr.).
maritima, *Harper, in Torreya*, iv. 163.—Am. bor.
pulvinaris, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 324.—Afr. trop.
simulata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 836.—Am. bor.

LUETKEA, Bong. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).
cinerascens, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 53 = S. cinerascens.

LUGONIA, Wedd. (Asclep.).
micrantha, *Malme, ex R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 115.—Reg. Argent.

LUISIA, Gaudich. (Orchid.).
Morsei, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 33.—China.

LUNDIA, DC. (Bignon.).
Damazii, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 230.—Bras.

LUPINUS, Tourn. (Legum.).
adscendens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 256.—Am. bor.
amplus, *Greene, Pl. Baker.* iii. 36.—Am. bor.
aphronorus, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 76.—Am. bor.
arceuthinus, *Greene, Pl. Baker.* iii. 35.—Am. bor.
arenicola, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 75.—Calif.
argentinus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 257.—Am. bor.
argophyllus, *Cockerell, in Torreya*, ii. 42.—Am. bor.
austromontanus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 69.—Calif.
axillaris, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 76.—Am. bor.
Benthami, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 61.—Calif.
brachypodus, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 642.—Am. bor.
Bridgesii, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 112.—Calif.
candicans, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 35.—Am. bor.
chiapensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 307.—Mexic.
comatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 257.—Am. bor.
compactiflorus, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 306.—Mexic.
confusus, *Rose, l. c.* 307.—Mexic.
corymbosus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 69.—Calif.
Culbertsonii, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 73.—Calif.
cyaneus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 35.—Am. bor.
dasyphyllus, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 73.—Calif.
deflexus, *Congd. in Muhlenbergia*, i. 38.—Calif.
depressus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 255.—Am. bor.
desertorum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 72.—Calif.
dichrous, *Greene, Pl. Baker.* iii. 35.—Am. bor.
Evermannii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 255.—Am. bor.
flavescens, *Rydb. l. c.* 1902, 245.—Am. bor.
geophilus, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 307.—Mexic.
giganteus, *Rose, l. c.*—Mexic.
glabrior, *Rose, l. c.* 308.—Mexic.
glareosus, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxix. 53.—Calif.
grandis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 306.—Mexic.
gredensis, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 413.—Hispan.

LUPINUS:—
horizontalis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 74.—Calif.
hypolasius, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 74.—Calif.
hypoleucus, *Greene, l. c.*—Calif.
Jonesii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 256 (non Blank.).—Am. bor.
Jonesii, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 79 (1905).—Am. bor.
laxus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 258.—Am. bor.
leptostachyus, *Greene, Pl. Baker.* iii. 36.—Am. bor.
leucanthus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 259.—Am. bor.
longifolius, *Abrams, Fl. Los Angeles*, 209.—Calif.
lucidulus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 245.—Am. bor.
macranthus, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 308.—Mexic.
maculatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 257.—Am. bor.
neglectus, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 308.—Mexic.
Nelsoni, *Rose, l. c.*—Mexic.
odoratus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 71.—Calif.
paraguariensis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 836.—Patag.
persistens, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 308 (April, 1905).—Mexic.
persistens, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 62 (Dec. 1905).—Calif.
potosinus, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 309.—Mexic.
Pringlei, *Rose, l. c.*—Mexic.
proximus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 67.—Calif.
pulcherrimus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 258.—Am. bor.
purpurascens, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 66.—Calif.
reflexus, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 309.—Mexic.
ruber, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 73.—Calif.
rubricaulis, *Greene, Pl. Baker.* iii. 35.—Am. bor.
Rydbergii, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 78.—Am. bor.
Scheuberae, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 244.—Am. bor.
shastensis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 67.—Calif.
simulans, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 310.—Mexic.
spathulatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 244.—Am. bor.
splendens, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 309.—Mexic.
submontanus, *Rose, l. c.* 47.—Mexic.
tenuifolius, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 322.—Urug.
vernicius, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 310.—Mexic.
violaceus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 65.—Calif.
viridifolius, *A. A. Heller, l. c.* 64.—Calif.
Watsoni, *A. A. Heller, l. c.* i. 114.—Calif.

LUVUNGA, Buch.-Ham. (Rutac.).
borneensis, *Hochr. in Bull. Inst. Buitenz.* xix. 41; *Pl. Bogor. Exsicc.* 19.—Borneo.

LUXEMBERGIA, A. St. Hil. (Ochnac.).
circumdata, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xix. 5.—Bras.
Gaudichaudi, *Van Tiegh. l. c.* 4.—Bras.

LUZIOLA, Juss. (Gramin.).
contracta, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 8.—Bras.

LUZULA, DC. (Juncac.).
chinensis, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 161.—China.
Gesneri, Bub. Fl. Pyren. iv. 170 = Forsteri.
saltuensis, *Fernald, in Rhodora*, v. 195.—Am. et As. bor.

LYCHNIS, Tourn. (Caryophyll.).
attenuata, *Farr, in Trans. Proc. Bot. Soc. Pennsylv.* i. 419.—Am. bor.
kiusiana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 57.—Japon.
striata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 408.—Am. bor.
yunnanensis, *Baker f. in Gard. Chron.* 1903, i. 161.—China.

LYCHNOPHORA, Mart. (Compos.).
Van-isschoti, *Heckel, in Rev. Cult. Colon.* xi. 161.—Am. trop.

LYCIUM, Linn. (Solan.).
confusum, *Dammer, ex R. Fries, in Arkiv Bot. Stockh.* i. 404.—Reg. Argent.
canestum, *Dammer, in Engl. Jahrb.* xxxvii. 169.—Bolivia.
decipiens, *Dammer, l. c.* 168.—Reg. Argent.
Friesii, *Dammer, l. c.* 169.—Reg. Argent.
halophilum, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 48.—Patag.
lasiopetalum, *Speg. l. c.* 50.—Patag.
longitubum, *Dammer, in Engl. Jahrb.* xxxvii. 169.—Reg. Argent.
pilifolium, *C. H. Wright, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 113.—Afr. austr.
schizocalyx, *C. H. Wright, l. c.* 114.—Afr. austr.
spathulifolium, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 451.—Ind. occ.

LYCOPUS, Tourn. (Labiat.).
communis, *E. P. Bickn. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 803.—Am. bor.
membranaceus, *E. P. Bickn. l. c.* 804.—Am. bor.
pubens, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1049.—Am. bor.
Sherardi, *Steele, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiv. 75.—Am. bor.
velutinus, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 1049.—Am. bor.

LYCOSERIS, Cass. (Compos.).
macrocephala, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 119.—Am. cent.

LYPERANTHUS, R. Br. (Orchid.).
Gigas, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1905, 68 (= *Caladenia Gigas*).—N. Caled.

LYRIONOTUS, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. (1901) 535, sphalm. = **Lysionotus**, D. Don (Gesner.).

LYSIAS, Salisb. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).
Hookeriana, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 295 = H. Hookeriana.

LYSIMACHIA, Tourn. (Primul.).
Brittenii, *Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 306.—China.
cephalantha, *Knuth, l. c.* 284.—China.
chilensis, *Knuth, l. c.* 308 (= *Theopyxis chilensis*).—Chili.
Engleri, *Knuth, l. c.* 265.—China.
febrifuga, Poepp. ex Knuth, l. c. 308 = chilensis.
Franchetii, *Knuth, l. c.* 288.—China.
glandulosa, *Knuth, l. c.* 264.—China.
grandiflora, Nutt. ex Knuth, l. c. 276 = ciliata.
grisea. Knuth, l. c. 263 = deltoidea.
humifusa, *Knuth, l. c.* 301.—China.
latronum, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 2.—Hab. ?
lineolata, Edgew. ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 275 = prolifera.
Loomisii, Torr. ex Knuth, l. c. 279 = longifolia.
marginata, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 652.—Patag.
melampyroides, *Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 254.—China.
Mellico, Poepp. ex Knuth, l. c. 308 = chilensis.
Metziana, Hohen. ex Knuth, l. c. 263 = deltoidea.
mexicana, *Knuth, l. c.* 308.—Mexic.
moupinensis, *Knuth, l. c.* 266.—China.
Nebeliana, *Gilg, ex Gilg & Loes. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxv. 57.—China.
nudiflora, Wall. ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 296 = decurrens.
Paxiana, *Knuth, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 85; *et in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 258.—China.
Piccolii, Hemsl. ex Knuth, l. c. 259 = barystachys.
plicata, *Franch. ex Knuth, l. c.* 265.—China!
pumila, Poepp. ex Knuth, l. c. 330 = Anagallis alternifolia.
rotundifolia, Knuth, l. c. 259 = Tanakae.
saganeitensis, *Schweinf. ex Knuth, l. c.* 292.—Afr. trop.
tonsa, *Wood, ex Knuth, l. c.* 277 (= *Steironema tonsum*).—Am. bor.
trientalioides, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2707.—China.

LYSIMACHIA:—
verruculosa, Klatt, ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 302 = pentapetala.
Woodii, *Schlechter, ex Knuth, l. c.* 292.—Afr. austr.
Zawadskii, *Wiesn. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liv. 161.—Eur.

LYTHRUM, Linn. (Lythrac.).
Curtissii, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 155.—Am. bor.
lineariifolium, *Small, Fl. S. E. U. S.* 828.—Am. bor.
rivulare, *Wood & Evans, ex Wood, in Natal Colon. Herb. Rep.* 1900 (1901) 12; *et in Journ. Bot.* 1901, 172.—Afr. austr.

M

MAACKIA, Rupr. (Legum.).
[CLADRASTIS, Rafin. 1. K.]
Tashiroi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 34.—Japon.

MABA, Forst. (Eben.).
olivacea, *King & Gamble, ex F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 227.—Penins. Mal.
virgata, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 327.—Afr. trop.
Zollingeri, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 33 (= *Rhipidostigma Zollingeri*).—Java.

MACADAMIA, F. Muell. (Proteac.).
praealta, *Bailey, Queensl. Fl.* 1330.—Austral.
Whelani, *Bailey, l. c.*—Austral.

MACAIREA, DC. (Melast.).
aspera, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 27.—Guian.
glabrescens, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 165.—Reg. Amaz.

MACARANGA, Thou. (Euphorb.).
carolinensis, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 466.—Ins. Carol.

MACFADYENA, A. DC. (Bignon.).
Hassleri, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 85.—Parag.

MACHAERANTHERA, Nees = **Aster**, Tourn. (Compos.).
attenuata, Howell, Fl. N. W. Am. i. 314.—Am. bor.
cichoriacea, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 148.—Am. bor.
coronopifolia, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 268 (= *Dieteria coronopifolia*).—Am. bor.
eradiata, Howell, Fl. N. W. Am. i. 314.—Am. bor.
Fremontii, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 123.—Am. bor.
pinosa, Elmer, in Coult. Bot. Gaz. xxxix. 49.—Calif.
ramosa, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 238.—Am. bor.
rubricaulis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 506.—Am. bor.
Selbyi, Rydb. l. c. 1905, 123.—Am. bor.
spectabilis, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 148.—Am. bor.
verna, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 267.—Am. bor.
viscosula, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 124.—Am. bor.

MACHAERIUM, Pers. (Legum.).
biovulatum, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève.* xxxiv. 265.—Mexic.
striatum, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 688.—Venez.
verapazense, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 2.—Am. cent.

MACLEAYIA, Montr. = **Cassia**, Tourn. (Legum.).
artensis, Montrouz. ex Beauvis. Gen. Montrouz. 19 = C. artensis.

MACLEAYA, R. Br. (Papav.).
[BOCCONIA, Linn. 1. K.]
microcarpa, *Fedde, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 45 (= *Bocconia microcarpa*).—China.

MACLUDRANIA, André, in Rev. Hortic. 1905, 362. Gen. hybr. *URTICACEARUM.*
hybrida, *André, l. c.*—Hybr.

MACOWANIA, Oliver (Compos.).
glandulosa, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 124.—Afr. austr.
pulvinaris, *N. E. Br. l. c.*—Afr. austr.

MACRADENIA, R. Br. (Orchid.).
multiflora, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 116 (= *Trichopilia multiflora*).—Am. austr.

MACROLOBIUM, Schreb. (Legum.).
Dewevrei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 129.—Afr. trop.
Dinklagei, *Harms. in Engl. Jahrb.* xxx. 84.—Afr. trop.
diphyllum, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
lamprophyllum, *Harms, l. c.* 85.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 99.—Afr. trop.
leptorrhachis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 157.—Afr. trop.
obliquum, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 96.—Afr. trop.

MACROMERIA, D. Don (Borag.).
Thurberi, *Mackenzie, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 496 (= *Onosmodium Thurberi*).—Am. bor.

MACRONEMA, Nutt. = **Chrysopsis**, Ell., vel **Aplopappus**, Cass. (Compos.).
Bolandri, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 81 (= *Linosyris Bolanderi*).—Calif.

MACROPETALUM, Burch. (Asclep.).
filifolium, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 36.—Afr. austr.

MACRORUNGIA, C. B. Clarke (Acanth.).
longistrobus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 89.—Afr. austr.

MACROSIPHONIA, Muell. Arg. (Apocyn.).
macrosiphon, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 2 (= *Echites macrosiphon*).—Mexic.
pinifolia, *Malme, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 257 (= *Echites pinifolia*).—Parag.

MADIA, Molina (Compos.).
chilensis, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 105 (= *Madariopsis chilensis*).—Chili.
ramosa, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 222.—Am. bor.
villosa, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 293.—Am. bor.

MAERUA, Forsk. (Capparid.).
angustifolia, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. Sér. I. v. App. iii. 97 = Gilgii.
arenicola, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 228.—Afr. austr.
calantha, *Gilg, l. c.* 225.—Afr. trop.
cerasicarpa, *Gilg, l. c.* 227.—Afr. trop.
Denhardtiorum, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
Descampsii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 180.—Afr. trop.
filiformis, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 87.—Madag.
Gilgiana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 180.—Afr. trop.
Gilgii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 668.—Afr. austr.
Goetzeana, *Gilg. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 234.—Afr. trop.
Kasaikalla, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 179.—Afr. trop.
macrantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 226.—Afr. trop.
mucronata, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 24 (= *Niebuhria mucronata*).—Siam.
pubescens, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 223 (= *Streblocarpus pubescens*).—Afr. trop.
pygmaea, *Gilg, l. c.* 228.—Afr. trop.
ramosissima, Gilg, l. c. 227 = Guerichii.
retusa, *Gilg, l. c.* 223.—Afr. trop.
scandens, *Gilg, l. c.* (= *Streblocarpus scandens*).—Afr. trop.
socotrana, *Gilg, l. c.* 229.—Socotra.
sphaerocarpa, *Gilg, l. c.* 226 (= *Boscia Holstii*).—Afr. trop.
trachycarpa, *Gilg, l. c.* 224.—Afr. trop.
trichophylla, *Gilg, l. c.* xxx. 311.—Afr. trop.
virgata, *Gilg, l. c.* xxxiii. 226.—Afr. trop.

MAESA, Forsk. (Myrsin.).
aneiteensis, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 52.—N. Hebrid.
Balansae, *Mez, l. c.* 41.—Cochinch.
bengalensis, *Mez, l. c.* 30.—Ind. or.
Bennettii, *Mez, l. c.* 53.—N. Hebrid.
camptobotrys, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 341.—N. Guin.
castaneifolia, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 44.—China.
coriacea, *Mez, l. c.* 40.—Ind. or.
Cumingii, *Mez, l. c.* 49.—Ins. Philipp.
denticulata, *Mez, l. c.* 48.—Ins. Philipp.
elongata, *Mez, l. c.* 31.—Ind. or.
eramangensis, *Mez, l. c.* 52.—N. Hebrid.
Forbesii, *Mez, l. c.* 47.—Java.
formosana, *Mez, l. c.* 23.—Formosa.
grandiflora, *Mez, l. c.* 44.—Ind. or.
Haenkeana, *Mez, l. c.* 32.—Ins. Philipp.
kamerunensis, *Mez, l. c.* 27.—Afr. trop.
Kurzii, *Mez, l. c.* 36.—Ind. or.
laxa, *Mez, l. c.* 32.—Ins. Philipp.
lineata, *Mez, l. c.* 42.—Sumatra.
manillensis, *Mez, l. c.* 34.—Ins. Philipp.
manipurensis, *Mez, l. c.* 30.—Ind. or.
Martiana, *Mez, l. c.* 29.—Ind. or.
maxima, *Mez, l. c.* 44.—Ind. or.
membranifolia, *Mez, l. c.* 45.—Arch. Mal.
Muelleri, *Mez, l. c.* 38.—Austral.
Naumanniana, *Mez, l. c.* 30.—Arch. Mal.
novo-caledonica, *Mez, l. c.* 33.—N. Caled.
pipericarpa, *Mez, l. c.* 46.—Celebes.
polybotrya, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 341.—N. Guin.
populifolia, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 47.—Ind. or.
Quintasii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 101.—Afr. trop.
racemosa, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 43.—N. Guin.
samoana, *Mez, l. c.* 53.—Ins. Samoa.
Sarasinii, *Mez, l. c.* 47.—Celebes.
Schweinfurthii, *Mez, l. c.* 25.—Afr. trop.
striata, *Mez, l. c.* 42.—Sumatra.
tabacifolia, *Mez, l. c.* 51.—Ins. Fiji.
tenera, *Mez, l. c.* 28.—China.
tenuifolia, *Mez, l. c.* 44.—Borneo.
tomentella, *Mez, l. c.* 35.—Tonkin.
tongensis, *Mez, l. c.* 54.—Ins. Fiji.
tonkinensis, *Mez, l. c.* 34.—Tonkin.
villosa, *Mez, l. c.* 35.—Sumatra.
Warburgii, *Mez, l. c.* 48.—Celebes.
Zenkeri, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 100.—Afr. trop.

MAESOBOTRYA, Benth. (Euphorb.).
pauciflora, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 281.—Afr. trop.

MAGNISTIPULA, Engl. in Engl. Jahrb. xxxvi. (1905) 226. *ROSACEAE.*
Conrauana, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.* 227.—Afr. trop.

MAGNOLIA, Linn. (Magnol.).
Balansae, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 294.—Tonkin.
Henryi, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 484.—China.
Martini, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 6.—China.

MAHONIA, Nutt. = **Berberis**, Linn. (Berberid.).
Andrieuxii, Fedde, in Engl. Jahrb. xxxi. 103 = B. Andrieuxii.
angustifolia, Fedde, l. c. 91 = B. angustifolia.
Chochoco, Fedde, l. c. 103 = B. Chochoco.
dictyota, Fedde, l. c. 89 = B. dictyota.
Ehrenbergii, Fedde, l. c. 106 = B. Ehrenbergii.
eurybracteata, Fedde, l. c. 127.—China.
eutriphylla, Fedde, l. c. 91.—Mexic.
Fortunei, Fedde, l. c. 130 = B. Fortunei.
Fremontii, Fedde, l. c. 98 = B. Fremontii.
gracilipes, Fedde, l. c. 128 = B. gracilipes.
gracilis, Fedde, l. c. 95 = B. gracilis.
haematocarpa, Fedde, l. c. 100 = B. haematocarpa.
Hartwegii, Fedde, l. c. 109 = B. Hartwegii.
incerta, Fedde, l. c. 93.—Mexic.
lanceolata, Fedde, l. c. 92 = B. lanceolata.
nana, Fedde, l. c. 83 = B. nana.
Nevinii, Fedde, l. c. 102 = B. Nevinii.

MAHONIA:—
pallida, Fedde, in Engl. Jahrb. xxxi. 109 = B. pallida.
Paxii, Fedde, l. c. 113.—Mexic.
pinnata, Fedde, l. c. 86 = B. pinnata.
polyodonta, Fedde, l. c. 126.—China.
pumila, Fedde, l. c. 82 = B. pumila.
Schiedeana, Fedde, l. c. 90 = B. Schiedeana.
subintegrifolia, Fedde, l. c. 94.—Mexic.
subtriplinervis, Fedde, l. c. 129 = B. subtriplinervis.
Swaseyi, Fedde, l. c. 102 = B. Swaseyi.
trifoliolata, Fedde, l. c. 96 = B. trifoliolata.
zimapana, Fedde, l. c. 111.—Mexic.

MAIETA, Aubl. (Melast.).
juruensis, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 178.—Reg. Amaz.

MAIHUENIA, Phil. (Cact.).
tehuelches, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 288.—Patag.
Valentini, *Speg. l. c.* 289.—Patag.

MALACANTHA, Pierre (Sapot.).
ferrugineo-tomentosa, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 48 (= *Chrysophyllum ferrugineo-tomentosum*).—Afr. trop.
Warneckeana, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

MALACOTHRIX, DC. (Compos.).
succulenta, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxix. 44.—Calif.

MALCOMIA, R. Br. (Crucif.).
hispida, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 37.—Turkestan.
hyrcanica, *Freyn & Sint, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 688.—As. cent.
Karelini, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 31.—As. cent.
turkestanica, *Litw. in Sched. Herb. Fl. Ross.* iv. 32.—Turkestan.

MALORTIEA, H. Wendl. (Palm.).
Tuerckheimii, *Damm. in Gard. Chron.* 1905, i. 19; *et in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 167.—Am. cent.

MALPIGHIA, Plum. (Malpigh.).
diversifolia, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 104 (1901).—Calif.
neriifolia, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 498, sphalm. = nummulariifolia.

MALTEBRUNIA, Kunth (Gramin.).
[POTAMOPHILA, R. Br. I. K.]
maroana, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 555.—Madag.
petiolata, *Aug. DC. l. c.*—Madag.

MALUS, Tourn. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).
Macounii, Greene, in Ottawa Naturalist, xviii. 215.—Am. bor.
Medwietzkyana, Dieck. Neuheiten Off. Nat. Arb. Zoeschen, 1891, 16 = *seq.*
Niedzwetzkyana, Dieck. l. c. 1892, 18 = P. Niedzwetzkyana.
Sargenti, Rehder, in Sargent, Trees & Shrubs, i. 71.—Japon.
Scheideckeri, Hort. ex Wittm. in Gartenfl. 1904, 418 = P. Scheideckeri.
Zumi, Rehder, in Sargent, Trees & Shrubs, i. 191 = P. Zumi.

MALVA, Tourn. (Malvac.).
Hornemanni, Bub. Fl. Pyren. iii. 301 = Tournefortiana.

MALVASTRUM, A. Gray (Malvac.).
Cockerelli, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 24.—Am. bor.
digitatum, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 154.—Am. bor.
dissectum, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 24 (= *Sida dissecta*).—Am. bor.
elatum, *A. Nelson, l. c.* 25.—Am. bor.
saltense, *Hieron. ex R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 127 (= *Malveopsis saltensis*).—Reg. Argent.

MALVAVISCUS, Dill. (Malvac.).
Cokeri, *Britton, in Shattuck, Bahama Is.* 259.—Ins. Baham.
rivularis, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 211 (1905).—Mexic.

MAMMILLARIA, Haw. (Cactac.).
Alversoni, *Hort. ex Orcutt, in W. Amer. Sci.* xiii. 42. —Hab.?
Fordii, *Orcutt, Seed Pl. Co. Cat. Cact.* 1903, 20; *et in W. Amer. Sci.* xiii. 49.—Calif.
lenta, *K. Brandegee, in Zoe*, v. 194 (1904).—Mexic.
Mundtii, *K. Schum, in Monatsschr. Kakt.* 1903, 141.—Hab.?
Olivine, *Orcutt, Seed Pl. Co. Cat. Cact.* 1903, 21; *et in W. Amer. Sci.* xiii. 50.—Am. bor.
petrophila, *K. Brandegee, in Zoe*, v. 193 (1904).—Calif.
Ruestii, *Quehl, in Monatsschr. Kakt.* xv. 178.—Am. cent.
Thornberi, *Orcutt, Seed Pl. Co. Cat. Cact.* 1903, 21; *et in W. Amer. Sci.* xiii. 51.—Am. bor.
trichacantha, *K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* i. 133.—Hab.?
uniseta, *Hort. Berol. ex Monatsschr. Kakt.* 1904, 128. —Hab.?

MANDEVILLA, Lindl. (Apocyn.).
glabra, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 47. —Guiana.
linearis, *N. E. Br. l. c.* 48.—Guiana.
scaberula, *N. E. Br. l. c.*—Guiana.

MANETTIA, Mutis (Rubiac.).
chrysoderma, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 264.—Bras.
domingensis, *Sprague, l. c.* 266.—Ind. occ.
evenia, *Sprague, l. c.* 835.—Ecuador.
inflata, *Sprague, in Gard. Chron.* 1904, II. 385.—Am. austr.
Lindenii, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 833. —Venez.
pectinata, *Sprague, l. c.* 836.—N. Granat.
quinquenervia, *Sprague, l. c.* 266.—Bras.
recurva, *Sprague, l. c.* 835.—Ecuador.
Rojasiana, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 91.—Parag.
Schumanniana, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 834.—Venez.
Smithii, *Sprague, l. c.* 267.—N. Granat.

MANFREDA, Salisb. = **Agave**, Linn. (Amaryll.).
Aliberti, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 23 = A. Allibertii.
brachystachys, Rose, l. c. 20 = A. brachystachys.
brunnea, Rose, l. c. 19 = A. brunnea.
conduplicata, Rose, l. c. 23 = A. conduplicata.
elongata, Rose, l. c. 21.—Mexic.
guttata, Rose. l. c. = A. guttata.
jaliscana, Rose, l. c. 22.—Mexic.
maculata, Rose, l. c. 16 = A. pubescens.
maculosa, Rose, l. c. 17 = A. maculosa.
Oliverana, Rose, l. c. 21.—Mexic.
planifolia, Rose, l. c. 22 = A. planifolia.
potosina, Rose, l. c. 16 = A. potosina.
Pringlei, Rose, l. c. 19.—Mexic.
revoluta, Rose, l. c. 21 = A. revoluta.
rubescens, Rose, l. c. 22.—Mexic.
singuliflora, Rose, l. c. 16 (= *Bravoa singuliflora*).—Mexic.
tigrina, Small, Fl. S. E. U. S. 287.—Am. bor.
undulata, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 22 = A. undulata.
variegata, Rose, l. c. 20 = A. variegata.

MANGIFERA, Linn. (Anacard.).
monandra, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 28.—Ins. Philipp.

MANIHOT, Tourn. (Euphorb.).
caudata, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 82.—Mexic.
graminifolia, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 671.—Parag.
guaranitica, *Chod. & Hassl. l. c.*—Parag.
Hassleriana, *Chod. l. c.* 672.—Parag.
Rusbyi, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 302. —Bras.

MANILTOA, Scheff. (Legum.).
browneoides, *Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 190.—Java.
Hollrungii, *Harms, l. c.* 189.—N. Guin.

MANISURIS, Sw. (Gramin.).
Chapmanii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 56.—Am. bor.

MANOTES, Soland. (Connar.).
Laurentii, *Wildem. Enum. Pl. Laurent*, 90.—Afr. trop.

MANSOA, DC. (Bignon.).
[CUSPIDARIA, DC. I. K.]
truncata, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 83. —Parag.

MANSONIA, J. R. Drumm. in Journ. Linn. Soc. xxxvii. (1905) 260. *STERCULIACEAE.*
Gagei, *J. R. Drumm. l. c.*—Burma.

MANULEA, Linn. (Scrophul.).
arabidea, *Schlechter, ex Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. II. 227.—Afr. austr.
Benthamiana, *Hiern, l. c.* 236.—Afr. austr.
Burchellii, *Hiern, l. c.* 228.—Afr. austr.
campestris, *Hiern, l. c.* 240.—Afr. austr.
incisiflora, *Hiern, l. c.* 228.—Afr. austr.
obtusa, *Hiern, l. c.* 235.—Afr. austr.

MAPANIA, Aubl. (Cyper.).
amplivaginata, *K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berl.* iii. 105.—Afr. trop.
Deistelii, *K. Schum. l. c.* 106.—Afr. trop.
dolichostachya, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
secans, *K. Schum. l. c.* 105.—Afr. trop.
subcomposita, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 490.—Afr. trop.
triquetra, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 51.—Penins. Mal.

MAPOURIA, Aubl. (Rubiac.).
[PSYCHOTRIA, Linn. I. K.]
Balansae, *Beauvis. Gen. Montrous.* 54 (= *Uragoga Balansae*).—N. Caled.
cearensis, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 326. —Bras.
Deplanchei, *Beauvis. Gen. Montrous.* 55 (= *Douarrea alba*).—N. Caled.
semperflorens, *Beauvis. l. c.* 54 (= *Psychotria semperflorens*).—N. Caled.

MARANTA, Plum. (Scitam.).
amplifolia, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 128.—Boliv.
Burchellii, *K. Schum. l. c.* 130.—Bras.
cyclophylla, *K. Schum. l. c.* 133.—Bras.
longipes, *K. Schum. l. c.* 134.—Bras.
orbiculata, *K. Schum. l. c.* 133 (= *Ischnosiphon orbiculatus*).—Bras.
pleiostachys, *K. Schum. l. c.* 134.—Bras.
pluriflora, *K. Schum. l. c.* 135 (= *Saranthe pluriflora*). —Bras.
pycnostachys, *K. Schum. l. c.* 134.—Bras.

MARATHRUM, Humb. & Bonpl. (Podostem.).
modestum, *Nash, in N. Am. Fl.* xxii. 4.—Am. cent.

MAREYA, Baill. (Euphorb.).
longifolia, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 283.—Afr. trop.

MARGARETTA, Oliver (Asclep.).
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 183.—Afr. trop.

MARICA, Ker-Gawl. (Irid.).
Helenae, *Worsley, in Journ. Hortic. Soc. Lond.* xxviii. 530.—Bras.

MARISCUS, Gaertn. (Cyperac.).
albopilosus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 394.—Afr. trop.
alpestris, *C. B. Clarke, l. c.* 401 (= *Cyperus alpestris*). —Afr. trop.
Balansai, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1011 (= *Cyperus Balansai*).—Am. austr.
chrysocephalus, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 178.—Afr. trop.
Conceptionis, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 16.—Chili.
firmipes, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 382.—Afr. trop.
Hassleri, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1011.—Parag.
inflatus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 384. —Afr. trop.
Kerstenii, *C. B. Clarke, l. c.* 392 (= *Cyperus Kerstenii*). —Afr. trop.
oblonginux, *C. B. Clarke, l. c.* 526.—Afr. trop.
Phillipsiae, *C. B. Clarke, l. c.* 391.—Afr. trop.
Rohlfsii, *C. B. Clarke, l. c.* 394 (= *Cyperus Rohlfsii*). —Afr. trop.

MARISCUS:—
Schweinfurthii, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. (1903) 78.—Afr. or. trop.
setiglumis, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1011.—Bras.

MARKEA, Rich. (Solan.).
formicarum, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxvii. 170.—Reg. Amaz.
leucantha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 116.—Am. cent.

MARKHAMIA, Seem. (Bignon.).
[DOLICHANDRONE, Fenzl. I. K.]
Hildebrandtii, *Sprague, in Hook. Ic. Pl.* t. 2800 (= *Dolichandrone Hildebrandtii*).—Afr. trop.
paucifoliata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 131.—Afr. trop.
platycalyx, *Sprague, in Hook. Ic. Pl.* t. 2800 (= *Dolichandrone platycalyx*).—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 132. —Afr. trop.

MARRUBIUM, Tourn. (Labiat.).
montenegrinum, *Sagorski, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 27.—Hybr.

MARSDENIA, R. Br. (Asclep.).
brachystephana, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 367.—N. Guin.
cynanchoides, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 53. —Afr. trop.
elephantina, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 367.—N. Guin.
guaranitica, *Malme, in Bih. Svenska Vet. Akad. Handl.* xxvii. no. 8, 35.—Parag.
Hassleriana, *Malme, ex Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. (1903) 241.—Parag.
Imthurnii, *Hemsl. in Bot. Mag.* t. 7953.—Guiana.
lanceolata, *Cooke, Fl. Bombay*, ii. 167.—Ind. or.
laxiflora, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 7.—Am. cent.
oculata, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 366.—N. Guin.
oligantha, *K. Schum. ex Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 189.—Peruv.
pergulariiformis, *Schlechter, in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 132.—Ins. Philipp.
philippinensis, *Schlechter, l. c.* 133.—Ins. Philipp.
rubicunda, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 421 (= *Dregea rubicunda*).—Afr. trop.
spissa, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 260.—Afr. trop.
stelostigma, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 330.—Afr. trop.
volubilis, *Cooke, Fl. Bombay*, ii. 166 (= *Dregea volubilis*).—Ind. or.; Java.
Warburgii, *Schlechter, in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 133.—Ins. Philipp.

MARSEA, Adans. = **Conyza**, Linn. (Compos.).
boranensis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 328.—Afr. trop.
capillipes, S. Moore, in Journ. Bot. 1904, 37 = C. capillipes.
celebris, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 320.—Afr. trop.
rumensoriensis, S. Moore, l. c. 327.—Afr. trop.
Volkensii, S. Moore, in Journ. Bot. 1903, 156 = C. Volkensii.

MARSHALLIA, Schreb. (Compos.).
grandiflora, *Beadle & Boynt. in Biltm. Bot. Stud.* i. 7.—Am. bor.
Mohri, *Beadle & Boynt. l. c.* 8.—Am. bor.
obovata, *Beadle & Boynt. l. c.* 5 (= *Athanasia obovata*). —Am. bor.
ramosa, *Beadle & Boynt. l. c.* 8.—Am. bor.
Williamsonii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1284.—Am. bor.

MARSIPPOSPERMUM, Desv. = **Rostkovia**, Desv. (Juncac.).
Reichei, Buchenau, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xix. 160. —Patag.

MARTHELLA, Urb. Symb. Antill. iii. 440 (1903). *BURMANNIACEAE.*
Trinitatis, *Urb. l. c.* 448 (= *Gymnosiphon Trinitatis*). —Ins. Trinit.

MARTINELLA, Léveillé, in Bull. Soc. Bot. Fr. li. (1904) 290 (non Baill.). *CRUCIFERAE.*
violaefolia, *Léveillé, l. c.*—China.

MARTINEZIA, Ruiz & Pav. (Palm.).
abrupta, *Ruiz & Pav. Prod.* 148.—Peruv.

MARTINIA, Vaniot, in Bull. Acad. Geogr. Bot. xii. (1903) 31. *COMPOSITAE.*
polymorpha, *Vaniot, l. c.* 32.—China.

MASCAGNIA, Bert. (Malpigh.).
[HIRAEA, Jacq. I. K.]
Buchii, *Urb. & Niedenzu, in Urb. Symb. Antill.* ii. 452.—Ind. occ.
parnahybensis, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 77, nomen.—Bras.

MASCARENHASIA, A. DC. (Apocyn.).
longifolia, *Jumelle, in Rev. Gen. Bot.* xiii. 360; *Pl. Caoutch. Gutta*, 374.—Madag.
maroana, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 550.—Madag.

MASDEVALLIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).
burfordiensis, *O'Brien, in Gard. Chron.* 1890, ii. 346.—Hab. ?
paulensis, *Barb. Rodr. in Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, i. 51.—Bras.
perpusilla, *Kraenzl. in Fedde, Repert Nov. Sp.* i. 179.—Peruv.
venosa, *Rolfe, in Kew Bull.* 1901, 146.—N. Granat.
zebrina, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 154.—Bras.

MASTIXIA, Blume (Cornac.).
Clarkeana, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 75.—Penins. Mal.
gracilis, *King, l. c.* 74.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King, l. c.* 73.—Penins. Mal.

MATAYBA, Aubl. (Sapind.).
[RATONIA, DC. I. K.]
clavelligera, *Radlk. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 250.—Am. cent.

MATISIA, Humb. & Bonpl. (Malv.).
Dowdingii, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 423.—N. Granat.
paraensis, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 430.—Bras.
Riedeliana, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 52, nomen.—Bras.

MATRICARIA, Tourn. (Compos.).
hirsutifolia, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1019.—Afr. trop.
sabulosa, *Dod, in Journ. Bot.* 1901, 399.—Afr. austr.

MATTHAEA, Blume (Monim.).
chartacea, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 14.—Ins. Philipp.

MATTHIOLA, R. Br. (Crucif.).
Erlangeriana, *Engl. Jahrb.* xxxii. 100.—Afr. trop.
Rivae, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, ix. 249.—Afr. trop.

MAXILLARIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).
Connellii, *Rolfe, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 63.—Guiana.
divaricata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 49 (= *Ornithidium divaricatum*).—Bras.
longifolia, *Cogn. l. c.* 33 (= *Dicrypta longifolia*).—Bras.
minuta, *Cogn. l. c.* 68.—Bras.
nardoides, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 90.—Peruv.
parahybunensis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 64.—Bras.
Quelchii, *Rolfe, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 64.—Guiana.
Regeliana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 47.—Bras.
Rodriguesii, *Cogn. l. c.* 24.—Bras.
Tuerckheimii, *Schlechter, in Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem.* vii. 43, nomen.—Am. cent.
villosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 34 (= *Dicrypta villosa*).—Bras.

MAYACA, Aubl. (Mayac.).
Baumii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxi. *Beibl.* lxix. 1.—Afr. trop.

MAYEPEA, Aubl. = **Linociera**, Sw. (Oleac.).
coriacea, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. vi. 11 = L. coriacea.
Cumingiana, Merrill, l. c. = L. Cumingiana.
Hassleriana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 914.—Parag.
pallida, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 58.—Ins. Philipp.
racemosa, Merrill, l. c.—Ins. Philipp.

MAYNA, Aubl. (Bixac.).
[ONCOBA, Forsk. I. K.]
micrantherа, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 159.—Reg. Amaz.

MAYTENUS, Molina (Celastr.).
boarioides, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 381.—Ecuador.
brachycarpa, *Urb. Symb. Antill.* v. 58.—Ind. occ.
cassinoides, *Urb. l. c.* 67 (= *Rhamnus cassinoides*).—Ind. occ.
disticha, *Urb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 58 (= *Myginda disticha*).—Am. austr.
domingensis, *Krug. & Urb. in Urb. Symb. Antill.* v. 56.—Ind. occ.
grenadensis, *Urb. l. c.* 63.—Ind. occ.
Loesneri, *Urb. l. c.* 56.—Ind. occ.
manabiensis, *Loes. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 161.—Ecuador.
multiflora, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 380 (= *Haenkea multiflora*).—Ecuador.
myrsinoides, *Urb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 58 (= *Myginda myrsinoides*).—Peruv.
reflexa, *Urb. Symb. Antill.* v. 64.—Ind. occ.
Reissekii, *Urb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 58.—Guiana.
robustoides, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 380.—Ecuador.
Sieberiana, *Krug. & Urb. in Urb. Symb. Antill.* v. 60.—Ind. occ.
theoides, *Urb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 58 (= *Myginda theoides*).—Peruv.
virens, *Urb. Symb. Antill.* v. 60.—Ind. occ.

MAZUS, Lour. (Scrophul.).
Miquelii, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 162.—Japon.
spicatus, *Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot.* xv. (1905) 85.—China.

MECARDONIA, Ruiz & Pav. = **Herpestis**, Gaertn. (Scrophul.).
acuminata, Small, Fl. S. E. U. S. 1065 = H. nigrescens.
peduncularis, Small, l. c. = H. peduncularis.
procumbens, Small, l. c. = H. chamaedryoides.
tenuis, Small, l. c.—Am. bor.
viridis, Small, l. c.—Am. bor.

MECOMISCHUS, Coss. (Compos.).
halimifolius, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 221 (= *Anthemis halimifolia*).—Alger.

MECONELLA, Nutt. = **Platystigma**, Benth. (Papav.).
collina, Greene, Pittonia, v. 143.—Calif.
octandra, Greene, l. c. 142.—Calif.

MEDICAGO, Tourn. (Legum.).
glandulosa, *Davidoff, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* lii. 493.—Eur.
lanigera, *Winkl. & B. Fedtsch. in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 41.—Turkestan.

MEDINILLA, Gaudich. (Melast.).
amplifolia, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull* xxix. 37.—Ins. Philipp.
auriculata, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 328.—N. Guin.
Copelandi, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 52.—Ins. Philipp.
cordata, *Merrill, l. c.* xxix. 37.—Ins. Philipp.
coriacea, *Merrill, l. c.* 35.—Ins. Philipp.
Elmeri, *Merrill, l. c.* 36.—Ins. Philipp.
Engleri, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 99.—Afr. trop.
involucrata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 51.—Ins. Philipp.
megacalyx, *Merrill, l. c.* xxix. 36.—Ins. Philipp.
mindanaensis, *Merrill, l. c.* 34.—Ins. Philipp.
multiflora, *Merrill, l. c.* 35.—Ins. Philipp.
pendula, *Merrill, l. c.* 34.—Ins. Philipp.
ramiflora, *Merrill, l. c.* 35.—Ins. Philipp.
verticillata, *Merrill, l. c.* 34.—Ins. Philipp.
Whitfordi, *Merrill, l. c.* 37.—Ins. Philipp.

MEDIOCALCAR, J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz. vii. (1900) 3. *ORCHIDACEAE.*
bicolor, *J. J. Sm. l. c.*—Arch. Mal.

MEGACLINIUM, Lindl. (Orchid.).
Arnoldianum, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 55.—Afr. trop.
Bequaertianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 115.—Afr. trop.
congolense, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 21.—Afr. trop.
Deistelianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 72.—Afr. trop.
djumaensis, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 124.—Afr. trop.
endotrachys, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 115.—Afr. trop.
Fuerstenbergianum, *Wildem. in Dict. Ic. Orch. Meg.* t. 1.—Hort.
Gentilii, *Wildem. in Belgique Coloniale*, viii. 426; *et in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 23.—Afr. trop.
Gillianum, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 22.—Afr. trop.
Laurentianum, *Wildem. l. c.* (= *Bulbophyllum Laurentianum*).—Afr. trop.
minor, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 125.—Afr. trop.
purpureorachis, *Wildem. l. c.* 126.—Afr. trop.

MEGALODONTA, Greene, Pittonia, iv. (1901) 271. *COMPOSITAE.*
Beckii, *Greene, l. c.* (= *Bidens Beckii*).—Am. bor.
nudata, *Greene, l. c.*—Am. bor.
remota, *Greene, l. c.* 272.—Am. bor.

MEIBOMIA, Moehr. = **Desmodium**, Desv. (Legum.).
bracteosa, Shafer, in Ann. Carneg. Mus. i. 40 = D. cuspidatum.
Metcalfii, Rose & Painter, in Coult. Bot. Gaz. xl. 144.—N. Mexic.
pallida, Rose & Painter, l. c. 145.—Mexic.
pinetorum, Rose & Painter, l. c. 144.—Mexic.
rubricaulis, Rose & Painter, l. c. 145.—Mexic.
xylopodia, Rose & Painter, l. c. = D. xylopodium.

MEIOGYNE, Miq. (Anonac.).
stipitata, *Koord. & Valet. in Meded.'S Lands Plantent.* lxi. 305 (= *Uvaria montana*).—Java.

MEIRACYLLIUM, Reichb. f. (Orchid.).
Wettsteinii, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 160.—Bras.

MELALEUCA, Linn. (Myrtac.).
cliffortioides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 427.—Austral.
depressa, *Diels, l. c.* 428.—Austral.
platycalyx, *Diels, l. c.* 426.—Austral.
psammophila, *Diels, l. c.* 429.—Austral.
sclerophylla, *Diels, l. c.* 428.—Austral.
Sheathiana, *Fitzg. in Journ. Muell. Soc. W. Austral.* Ser. 1. ix. 16.—Austral.
spicigera, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 25.—Austral.

MELAMPODIUM, Linn. (Compos.).
appendiculatum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 457.—Mexic.
arenicola, *Robinson, l. c.*—Mexic.
arvense, *Robinson, l. c.* 464.—Mexic.
canescens, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 222 (1905).—Mexic.
geminatum, *T. S. Brandegee, l. c.* 223.—Mexic.
longipes, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 459.—Mexic.
mimulifolium, *Robinson, l. c.* 462.—Mexic.
Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 260.—Mexic.
Pringlei, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 461.—Mexic.
Rosei, *Robinson, l. c.*—Mexic.

MELANDRIUM, Roehl. (Caryophyll.).
[LYCHNIS, Linn. I. K.]
chubutense, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 240 (= *Lychnis chubutensis*).—Patag.
patagonicum, *Speg. l. c.*—Patag.

MELANOSCIADUM, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. (1902) 803. *UMBELLIFERAE.*
pimpinelloideum, *Boissieu, l. c.* 804.—China.

MELANTHERA, Rohr (Compos.).
acuminata, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 344. —Afr. trop.
Baumii, O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 418.—Afr. trop.
Buchii, Urb. Symb. Antill. iii. 411.—Ind. occ.
Carpenteri, Small, Fl. S. E. U. S. 1251.—Am. bor.
ligulata, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 439. —Am. bor.
lobata, Small, Fl. S. E. U. S. 1251.—Am. bor.
nivea, Small, l. c. (= Bidens nivea).—Am. bor.
parvifolia, Small, l. c.—Am. bor.
Schinziana, S. Moore, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1018.—Afr. trop.

MELASMA, Berg (Scrophul.).
barbatum, Hiern, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 374.—Afr. austr.
brasiliense, Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 291 (= Alectra brasiliensis).—Parag.
capense, Hiern, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 378 (= Alectra capensis).—Afr. austr.
luridum, Hiern, l. c. 376 (= Alectra lurida).—Afr. austr.
nataleuse, Hiern, l. c. 377.—Afr. austr.

MELASTOMA, Burm. (Melast.).
fuscum, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 39.—Ins. Philipp.
Harmsianum, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 323.—N. Guin.
parvifolium, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 32.—Ins. Philipp.
Toppingii, Merrill, l. c. xvii. 38.—Ins. Philipp.

MELHANIA, Forsk. (Stercul.).
albicans, Baker f. in Journ. Bot. 1901, 123.—Afr. austr.
amboensis, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 1009.—Afr. trop.
apiculata, Baker f. in Journ. Bot. 1901, 123.—Madag.
Kelleri, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 1008. —Afr. trop.
rupestris, Schinz, l. c.—Afr. trop.
serrata, Schinz, l. c. 1007.—Afr. trop.
Taylori, Baker f. in Journ. Bot. 1901, 123.—Afr. trop.

MELICA, Linn. (Gramin.).
argyrea, Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 134.—Reg. Argent.
Benedictoi, Pau, ex Zapater, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. ii. 336, nomen.—Hispan.
cepacea, Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost. xxx. 8 (= Festuca cepacea).—Chili.
Montezumae, Piper, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 144.—Mexic.
nitens, Nutt. ex Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 387.—Am. bor.
pyrifera, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. lii. 307.—Peruv.
Stuckertii, Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 135.—Reg. Argent.

MELICOPE, Forst. (Rutac.).
luzonensis, Engl. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 161, descr.—Ins. Philipp.
obtusa, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 24.—Ins. Philipp.

MELILOTUS, Tourn. (Legum.).
cappadocius, O. E. Schulz, in Engl. Jahrb. xxix. 699. —Oriens.
Kotschyi, O. E. Schulz, l. c.—Oriens.
Urbanii, O. E. Schulz, l. c. 706.—Oriens.

MELINIA, Decne (Asclep.).
mexicana, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 216 (1905).—Mexic.

MELINIS, Beauv. (Gramin.).
ambigua, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1901, 462.—Afr. trop.
Monachme, Pilger, in Engl. Jahrb. xxxiii. 51 (= Panicum Monachme).—Afr. trop.

MELIOSMA, Blume (Sabiac.).
Diepenhorstii, Valet. in Ic. Bogor. t. 150.—Sumatra.
Donnellsmithii, Urb. in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 214. —Am. cent.
luzonensis, Merrill. in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 24.—Ins. Philipp.
multiflora, Merrill, l. c. 26.—Ins. Philipp.

MELIOSMA:—
nervosa, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. lxi. 129.—Java.
pedicellata, Koord. & Valet. l. c. 134.—Java.
pendula, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 25.—Ins. Philipp.

MELOCACTUS, Tourn. (Cact.).
appropinquatus, Suring. in Verh. Akad. Wet. Amst. viii. 20.—Am. trop.
Bargei, Suring. l. c. 9.—Am. trop.
Buysianus, Suring. l. c. 38.—Am. trop.
firmus, Suring. l. c. 17.—Am. trop.
gilvispinus, Suring. l. c. 28.—Am. trop.
inversus, Suring. l. c. 19.—Am. trop.
Negryi, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. xi. 168.—Bras.
pinguis, Suring. in Verh. Akad. Wet. Amst. viii. 11. —Am. trop.

MELOCHIA, Dill. (Stercul.).
arida, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 321.—Mexic.
Bernoulliana, Donn. Sm. in Bot. Gaz. xxxv. (1903) 2. —Am. cent.
Hassleriana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 403. —Parag.
lacinulata, K. Schum. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 69.—Parag.
radiata, Lignier & Bey, in Bull. Soc. Linn. Normandie, Sér. V. viii. 262, nomen.—Bourbon.

MELODORUM, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
Balansae, Aug. DC. in Bull. Herb Boiss. Sér. II. iv. 1070.—Tonkin.
polyanthoides, Aug. DC. l. c.—Tonkin.

MELOLOBIUM, Eckl. & Zeyh. (Legum.).
Burchellii, N. E. Br. in Kew Bull. 1901, 120.—Afr. trop.

MELOSMON, Rafin. = **Teucrium**, Tourn. (Labiat.).
cubense, Small, Fl. S. E. U. S. 1019 = T. cubense.
laciniatum, Small, l. c. = T. laciniatum.
• laevigatum, Small, l. c. = T. laevigatum.

MELOTHRIA, Linn. (Cucurb.).
Antunesii, Harms & Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 359.—Afr. trop.

MEMECYLON, Linn. (Melast.).
affine, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 52.—Ins. Philipp.
alatum, Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 575.—Madag.
cyanocarpum, Gilg, in Engl. Jahrb. xxx. 366.—Afr. trop.
eduliforme, Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 575.—Madag.
Engleri, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 100 (= Medinilla Engleri).—Afr. trop.
Gilletii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 172. —Afr. trop.
microphyllum, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 101.—Afr. trop.
Mocquerysii, Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 575.—Madag.
Simii, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 99.—Afr. trop.
ternifolium, Gilg, ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. III. i. 94.—Afr. trop.
torricellense, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 329.—N. Guin.

MEMORA, Miers (Bignon.).
[ADENOCALYMNA, Mart. I. K.]
campicola, Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 195.—Bras.

MENADENIUM, Rafin. (Orchid.).
[ZYGOPETALUM, Hook. I. K.]
Kegelii, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. v. 584 (= Zygopetalum Kegelii).—Guiana.
labiosum, Cogn. l. c. 582 (= Epidendrum labiosum). —Bras.
Lindeniae, Cogn. l. c. 584 (= Zygopetalum Lindeniae). —Venez.

MENDONCIA, Vell. (Acanth.)
tarapotana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 313.—Peruv.

MENODORA, Humb. & Bonpl. (Oleac.).
Hassleriana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 915.—Parag.

MENONVILLEA, R. Br. (Crucif.).
patagonica, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 229.—Patag.

MENTHA, Tourn. (Labiat.).
amphioxya, Borb. in Magyar Bot. Lap. iv. 51.—Hybr.
Braunaiana, Borb. l. c. 54.—Hybr.
bulgarica, Borb. l. c. 53.—Hybr.
liptoviensis, Borb. l. c. 54.—Hybr.
moesiaca, Borb. l. c.—Eur.
perarguta, Borb. l. c. 51.—Hybr.
subcordifrons, Borb. l. c. 53.—Hybr.
vagialis, Borb. l. c. 54.—Hybr.

MENTZELIA, Plum. (Loasac.).
ctenophora, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 83. —Am. bor.
fragilis, Huber, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 314. —Bras.
pinetorum, A. A. Heller, in Bull. S. Calif. Acad. ii. 69.—Calif.
speciosa, Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901. 689. —Am. bor.

MERENDERA, Ram. (Liliac.).
verna, Bub. Fl. Pyren. iv. 137 = Bulbocodium ruthenicum.

MERIANIA, Sw. (Melast.).
hexamera, Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. xxii. 431.—N. Granat.

MERIDIANA, Hill = **Gazania**, Gaertn. (Compos.).
namaensis, S. Moore, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1023.—Afr. trop.

MERIOLIX, Rafin. = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
capillifolia, Small, Fl. S. E. U. S. 846 = Oenothera capillifolia.
Drummondiana, Small, l. c. (= Calylophis Drummondiana).—Am. bor.
Hillii, Small, l. c.—Am. bor.
intermedia, Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S. 846.—Am. bor.
melanoglottis, Rydb. l. c.—Am. bor.

MERREMIA, Dennst. (Convolv.).
[CONVOLVULUS, Tourn. I. K.]
alata, Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. ii. 102.—Afr. trop.
Bowieana, Rendle, in Journ. Bot. 1901, 63.—Afr. austr.
crispatula, Prain, Bengal Pl. 730.—Ind. or.
kentrocaulos, Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. ii. 103 (= Operculina kentrocaulos).—Afr. trop.
malvaefolia, Rendle, in Journ. Bot. 1901, 63.—Afr. austr.
tuberosa, Rendle, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. ii. 104 (= Operculina tuberosa).—Afr. trop.
Turpethum, Rendle, l. c. 102 (= Ipomoea Turpethum). —Geront. trop.
verecunda, Rendle, l. c. 110.—Afr. trop. et austr.

MERTENSIA, Roth (Borag.).
alaskana, Britton, in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 181 (1901).—Am. bor.
alaskana, Eastw. in Coult. Bot. Gaz. xxxiii. (1902) 287. —Am. bor.
alba, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 638.—Am. bor.
caelestina, Nelson & Cockerell, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvi. 46.—Am. bor.
canescens, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 640. —Am. bor.
congesta, Greene, Pl. Baker. iii. 17.—Am. bor.
coriacea, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 403.—Am. bor.
coronata, A. Nelson, l. c.—Am. bor.
Cusickii, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1902, 643.—Am. bor.
cynoglossoides, Greene, Pl. Baker. iii. 19.—Am. bor.
lateriflora, Greene, l. c. 18.—Am. bor.
linearifolia, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 32. —Am. bor.
membranacea, Rydb. l. c. 33.—Am. bor.
muricalata, Greene, Pl. Baker. iii. 19.—Am. bor.

MERTENSIA:—
nevadensis, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 96.—Am. bor.
nutans, Howell, Fl. N. W. Am. i. 491.—Am. bor.
obtusiloba, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 32.—Am. bor.
ovata, Rydb. l. c.—Am. bor.
Parryi, Rydb. l. c. 1904, 639.—Am. bor.
perplexa, Rydb. l. c.—Am. bor.
picta, Rydb. l. c. 638.—Am. bor.
stenoloba, Greene, Pl. Baker. iii. 20.—Am. bor.
subpubescens, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 261.—Am. bor.
symphytoides, Greene, Pl. Baker. iii. 20.—Am. bor.
viridula, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 639.—Am. bor.

MERYTA, Forst. (Aral.).
pauciflora, Hemsl. ex Cheesem. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. vi. 282.—Ins. Cook.
Senfftiana, Volk. in Engl. Jahrb. xxxi. 471.—Ins. Carol.

MESADENIA, Rafin. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).
difformis, Small, Fl. S. E. U. S. 1301.—Am. bor.
Elliottii, Harper, in Torreya, v. 184.—Am. bor.
maxima, Harper, in Small, Fl. S. E. U. S. 1301.—Am. bor.
similis, Small, l. c.—Am. bor.
sulcata, Small, l. c. (= Cacalia sulcata).—Am. bor.
tuberosa, Britton, in Britton & Br. Fl. N. U. S. iii. 474 (= Cacalia tuberosa).—Am. bor.

MESEMBRYANTHEMUM, Dill. (Ficoid.).
Mahoni, N. E. Br. in Gard. Chron. 1902, ii. 190.—Afr. austr.
mirabile, N. E. Br. l. c. 1903, ii. 131.—Hab. ?
racemosum, N. E. Br. l. c. 1902, ii. 350.—Afr. austr.

MESOREANTHUS, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1904) 89. CRUCIFERAE.
barbiger, Greene, l. c. (= Streptanthus barbiger).—Calif.
fallax, Greene, l. c. 90.—Calif.
vimineus, Greene, l. c.—Calif.

MESOSPHAERUM, P. Br. = **Hyptis**, Jacq. (Labiat.).
Lindmanianum, Briq. in Arkiv Bot. Stockh. ii. no. 10, 4 = H. Lindmaniana.

MESPILUS, Tourn. (Rosac.).
[PYRUS, Tourn. I. K.]
chlorosarca, Matsum. Enum. Sci. Names (1895), 187 (= Crataegus chlorosarca).—Japon.
cuneata, Matsum. l. c. (= Crataegus cuneatus).—Japon.
sanguinea, Matsum. l. c. (= Crataegus sanguineus).—Japon.

METAPLEXIS, R. Br. (Asclep.).
japonica, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 87 (= Pergularia japonica).—Japon.

METASTELMA, R. Br. (Asclep.).
barbatum, Northrop, in Mem. Torr. Bot. Club, xii. 58.—Ins. Baham.
cuneatum, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 216 (1905).—Mexic.
longisepalum, Hua, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 97.—Bras.

METOPIUM, P. Br. = **Rhus**, Tourn. (Anacard.).
Metopium, Small, Fl. S. E. U. S. 726 = R. Metopium.

METRODOREA, A. St. Hil. (Rutac.).
[ESENBECKIA, Kunth. I. K.]
gracilis, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 30.—Bras.

METROSIDEROS, Banks (Myrtac.).
elegans, Beauvis. Gen. Montrous. 39 (= Ballardia elegans).—N. Caled.
tremuloides, Knuth, Handb. Blütenb. iii. 532 (= Nania tremuloides).—Ins. Sandw.

MEYERA, Adans. = **Holosteum**, Dill. (Caryophyll.).
umbellata, Bub. Fl. Pyren. iii. 32 = H. umbellatum.

MEZIELLA, Schindl. in Engl. Jahrb. xxxiv. Beibl. lxxvii. (1904) 14; et in Engl. Pflanzenreich, Halorrh. 60 (1905). HALORRHAGIDACEAE.
trifida, Schindl. in Engl. Pflanzenreich, Halorrh. 61 (= Goniocarpus trifidus).—Austral.

MEZONEURUM, Desf. (Legum.).
rubrum, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. vi. 7.—Ins. Philipp.

MICHELIA, Linn. (Magnol.).
parviflora, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 70.—Ins. Philipp.

MICONIA, Ruiz & Pav. (Melast.).
acutipetala, Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. xxii. 432.—N. Granat.
consimilis, Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 170.—Peruv.
hondurensis, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xl. 3.—Am. cent.
inamoena, Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 171.—Peruv.
involucrata, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 209.—Am. cent.
juruensis, Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 172.—Reg. Amaz.
loretensis, Pilg. l. c.—Peruv.
micrantha, Pilg. l. c. 173.—Reg. Amaz.
oinochrophylla, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xl. 4.—Am. cent.
paraguayensis, Cogn. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1278.—Parag.
perplexans, Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. xxii. 432.—N. Granat.
phanerostila, Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 173.—Reg. Amaz.
retusa, Pilg. l. c. 174.—Peruv.
Robinsoniana, Cogn. in Proc. Amer. Acad. xxxviii. 133.—Ins. Galap.
saxicola, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 215 (1905).—Mexic.
subsimplex, Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 174.—Reg. Amaz.
symplectocaulos, Pilg. l. c. 175.—Reg. Amaz.
Theresiae, Cogn. in Beih. Bot. Centralbl. xiii. 80.—Ecuador.

MICRANDRA, Benth. (Euphorb.).
heterophylla, Poisson, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 561.—Venez.

MICRANTHES, Haw. = **Saxifraga**, Tourn. (Saxifr.).
aequidentata, Small, in N. Am. Fl. xxii. 145.—Am. bor.
aestivalis, Small, l. c. 147 = S. aestivalis.
Allenii, Small, l. c. 144.—Am. bor.
apetala, Small, l. c. 135 = S. apetala.
aprica, Small, l. c. = S. aprica.
arguta, Small, l. c. 147 = S. arguta.
arnoglossa, Small, l. c. 138.—Am. bor.
bidens, Small, l. c. 137.—Am. bor.
brachypus, Small, l. c. 139.—Am. bor.
californica, Small, l. c. 140 = S. californica, Greene.
Careyana, Small, Fl. S. E. U. S. 501 = S. Careyana.
caroliniana, Small, in N. Am. Fl. xxii. 146 = S. caroliniana.
claytoniaefolia, Small, l. c. 141 = S. claytoniaefolia.
columbiana, Small, l. c. 135 = S. columbiana.
crenatifolia, Small, l. c. 134.—Am. bor.
davurica, Small, l. c. 143 = S. davurica.
eriophora, Small, l. c. 142 = S. eriophora.
fallax, Small, l. c. 141 = S. fallax.
flabellifolia, Small, l. c. 143 = S. flabellifolia.
fragosa, Small, l. c. 137 = S. fragosa.
franciscana, Small, l. c. 144.—Am. bor.
galacifolia, Small, l. c. 147 = S. galacifolia.
Geum, Small, l. c. 148 = S. Geum.
Grayana, Small, Fl. S. E. U. S. 501 = S. Grayana.
Greenei, Small, in N. Am. Fl. xxii. 137 = S. Greenei.
Howellii, Small, l. c. 140 = S. Howellii.
integrifolia, Small, l. c. 137 = S. integrifolia.
Kumlienii, Small, l. c. 144.—Am. arct.
lata, Small, l. c. 145.—Am. bor.
Lyallii, Small, l. c. 143 = S. Lyallii.
Marshallii, Small, l. c. 146 = S. Marshallii.
micranthidifolia, Small, Fl. S. E. U. S. 501 (= Robertsonia micranthidifolia).—Am. bor.
montana, Small, in N. Am. Fl. xxii. 138.—Calif.
montanensis, Small, l. c. 139 = S. montanensis.
napensis, Small, l. c. 140 = S. napensis.
Nelsoniana, Small, l. c. 147 = S. Nelsoniana.
nidifica, Small, l. c. 134 = S. nidifica.
nivalis, Small, l. c. 136 = S. nivalis.
occidentalis, Small, l. c. 144 = S. occidentalis.

MICRANTHES:—
oregana, Small, in N. Am. Fl. xxii. 138 = S. oregana.
parvifolia, Small, l. c. 141 = S. parvifolia.
plantaginea, Small, l. c. 135 = S. plantaginea.
reflexa, Small, l. c. 146 = S. reflexa.
rhomboidea, Small, l. c. 136 = S. rhomboidea.
rufidula, Small, l. c. 140.—Am. bor.
Rydbergii, Small, l. c. 134 = S. Rydbergii.
saximontana, Small, l. c. 145 = S. saximontana.
Sierrae, A. A. Heller, Muhlenbergia, ii. 52 = S. Sierrae.
spicata, Small, in N. Am. Fl. xxii. 146 = S. spicata.
subapetala, Small, l. c. 139 = S. subapetala.
tennesseensis, Small, Fl. S. E. U. S. 501 = S. tennesseensis.
tenuis, Small, in N. Am. Fl. xxii. 136.—Reg. arct.
texana, Small, Fl. S. E. U. S. 501 = S. texana.
virginiensis, Small, l. c. = S. virginiensis.
yukonensis, Small, in N. Am. Fl. xxii. 145.—Am. bor.

MICRECHITES, Miq. (Apocyn.).
Bailloni, Pierre, in Rev. Cult. Colon. xi. 229, nomen.—Cochinch.
napeensis, Quint. in Rev. Indo-Chin. 1902, 413; et in Compt. Rend. Acad. Sci. Par. cxxxiv. 438.—Cochinch.
novo-guineensis, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 350.—N. Guin.

MICROCORYS, R. Br. (Labiat.).
Dielsii, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2783.—Austral.

MICROGLOSSA, DC. (Compos.).
Elliotii, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 327.—Afr. trop.
salicifolia, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 612.—China.

MICROLICIA, D. Don (Melast.).
albida, Pilg. in Engl. Jahrb. xxxiii. Beibl. lxxii. 16.—Bras.
crebropunctata, Pilg. l. c. 17.—Bras.
goyazensis, Pilg. l. c.—Bras.
melanostagma, Pilg. l. c. 18.—Bras.
ramosa, Pilg. l. c.—Bras.

MICROMERIA, Benth. (Labiat.).
pilosa, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 1188; Hook. Ic. Pl. t. 1522.—Afr. austr.
pilosiuscula, Small, Fl. S. E. U. S. 1042.—Am. bor.

MICROMYRTUS, Benth. (Myrtac.).
Erichsenii, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2780.—Austral.
Hurstbousei, Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. ii. 22.—Austral.
sulphurea, Fitzger. l. c. i. 19.—Austral.

MICROPHACOS, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 663. LEGUMINOSAE.
gracilis, Rydb. l. c. (= Astragalus gracilis).—Am. bor.
microlobus, Rydb. l. c. (= Astragalus microlobus).—Am. bor.

MICROPHOLIS, Pierre (Sapot.).
[SIDEROXYLON, Dill. I. K. S. I.]
achradoformis, Pierre, in Urb. Symb. Antill. v. 118.—Ind. occ.
Balata, Pierre, l. c. 120.—Ind. occ.
chrysophylloides, Pierre, l. c. 122.—Ind. occ.
compta, Pierre, l. c. 125.—Bras.
crotonoides, Pierre, l. c. 114 (= Sprucella crotonoides).—N. Granat.
discolor, Pierre, l. c. 121.—Ind. occ.
dominicensis, Pierre, l. c. v. 122.—Ind. occ.
egensis, Pierre, l. c. 127 (= Sideroxylon egense).—Bras.
Eggersiana, Pierre, l. c. 118.—Ind. occ.
Glaziouiana, Pierre, l. c. 128.—Bras.
gnaphaloclados, Pierre, l. c. 130 (= Lucuma gnaphaloclados).—Bras.
Martiana, Pierre, l. c. 126.—Bras.
rigida, Pierre, l. c. 125.—Bras.
rufa, Pierre, l. c. 130 (= Sideroxylon rufum).—Guiana.
Schwackei, Pierre, l. c. 125 (= Sideroxylon Schwackei).—Bras.
truncata, Pierre, l. c. 119.—Ind. occ.

MICROSECHIUM, Naud. (Cucurb.).
compositum, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxxv. 2.—Am. cent.

MICROSEMIA, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1904) 89. *CRUCIFERAE.*
polygaloides, *Greene, l. c.* (=*Streptanthus polygaloides*).—Am. bor.

MICROSERIS, D. Don (Compos.).
Aliciae, *Greene, Pittonia*, v. 8.—Calif.
atrata, *Greene, l. c.* 14.—Calif.
breviseta, *Greene, l. c.* 8.—Calif.
callicarpha, *Greene, l. c.* 10.—Calif.
campestris, *Greene, l. c.* 15.—Calif.
cognata, *Greene, l. c.*—Calif.
conjugens, *Greene, l. c.* 7.—Calif.
furfuracea, *Greene, l. c.* 9.—Calif.
insignis, *Greene, l. c.* 13.—Calif.
leiosperma, *Greene, l. c.* 10.—Calif.
leucocarpha, *Greene, l. c.* 7.—Calif.
maritima, *Greene, l. c.* 16.—Calif.
melanocarpha, *Greene, l. c.* 6.—Calif.
obtusata, *Greene, l. c.* 16.—Calif.
oligantha, *Greene, l. c.* 9.—Am. bor.
parvula, *Greene, l. c.* 11.—Calif.
picta, *Greene, l. c.* 10.—Calif.
proxima, *Greene, l. c.* 8.—Calif.
pulchella, *Greene, l. c.* 14.—Calif.
stenocarpha, *Greene, l. c.*—Calif.
tenuisecta, *Greene, l. c.* 6.—Calif.

MICROSTYLIS, Nutt. (Orchid.).
amplectens, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 108 E.—Java.
arachnoidea, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 98.—N. Guin.
Blumei, *Boerl. & J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 108 B (=*Crepidium Rheedii*).—Java.
dryadum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 98.—N. Guin.
epiphytica, *Schlechter, l. c.* 99.—N. Guin.
flavescens, J. J. Sm. in Ic. Bogor. ii. t. 107 D = Koordersii.
horieleusis, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 29.—Ins. Ambon.
Junghuhnii, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 253.—Java.
katochilos, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 5.—Afr. trop.
Kohi, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 249.—Java.
Koordersii, *J. J. Sm. l. c.* 252.—Java.
latifolia, J. J. Sm. l. c. 248 = congesta.
Mackinnoni, *Duthie, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 37.—Ind. or.
macrophylla, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 99.—N. Guin.
moluccana, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 2.—Arch. Mal.
nigrescens, *J. J. Sm. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lviii. (1898) 359, descr.—Celebes.
obovata, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 108 D.—Java.
olivacea, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 100.—N. Guin.
ramosa, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 108 F.—Borneo.
sagittata, *J. J. Sm. l. c.* 107 C.—Java.
Schumanniana, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 101.—N. Guin.
termensis, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 91.—Peruv.
trigonopetala, *J. J. Sm. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lviii. (1898) 358, descr.—Celebes.
venosa, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 108 A.—Borneo.
Warapussae, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 101.—N. Guin.
xanthochila, *Schlechter, l. c.* 102.—N. Guin.

MICROTATORCHIS, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 224. *ORCHIDACEAE.*
fasciola, *Schlechter, l. c.* (=*Taeniophyllum fasciola*).—Ins. Fiji.
perpusilla, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.

MICROTEA, Sw. (Phytolacc.).
foliosa, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 418.—Parag.
sulcicaulis, *Chod. l. c.* 419.—Parag.

MICROTIS, R. Br. (Orchid.).
gymnadenioides, *Diels, in Journ. Muell. Soc. W. Austral.* i. no. 11, 79.—Austral.

MICROTROPIS, Wall. (Celastr.).
ophirensis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxv. 10.—Penins. Mal.

MICROURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 374 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
cassinifolia, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 281 = O. cassinifolia.
Glaziovi, Van Tiegh. l. c. 282.—Bras.
microdonta, Van Tiegh. l. c. 281 = O. microdonta.
pygmaea, Van Tiegh. l. c. 283.—Bras.
violacea, Van Tiegh. l. c. 282.—Bras.
Weddelliana, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 191.—Bras.

MIERSIA, Lindl. (Liliac.).
Rusbyi, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 702.—Bolivia.

MIERSIELLA, Urb. Symb. Antill. iii. 439 (1903). *BURMANNIACEAE.*
umbellata, *Urb. l. c.* (=*Dictyostegia umbellata*).—Bras.

MIKANIA, Willd. (Compos.).
ambigens, *Urb. & Niedenzu, in Urb. Symb. Antill.* ii. 460.—Ind. occ.
antioquiensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 580.—N. Granat.
Aschersonii, *Hieron. l. c.* 577.—N. Granat.
brachyphylla, *Hieron. l. c.* xxxvi. 472.—Peruv.
carvifolia, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* Ser. II. i. 9.—Urug.
crassifolia, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 471.—Peruv.
cuencana, *Hieron. l. c.* xxviii. 581.—Ecuador.
cutervensis, *Hieron. l. c.* xxxvi. 473.—Peruv.
Eggersii, *Hieron. l. c.* xxviii. 582.—Ecuador.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 713.—Parag.
Jelskii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 475.—Peruv.
nigropunctulata, *Hieron. l. c.* xxviii. 578.—N. Granat.
oopetala, *Urb. & Niedenzu, in Urb. Symb. Antill.* ii. 461.—Ind. occ.
pellucidivenia, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 474.—Peruv.
pichinchensis, *Hieron. l. c.* xxviii. 576.—Ecuador.
Pittieri, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 255.—Am. cent.
polycephala, *Urb. & Niedenzu, in Urb. Symb. Antill.* ii. 459.—Ind. occ.
popayanensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 579.—N. Granat.
riparia, *Greenm. in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 255.—Am. cent.
Szyszylowiczii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 475.—Peruv.
tambillensis, *Hieron. l. c.* 470.—Peruv.
Tonduzii, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 256.—Am. cent.
tripartita, *Urb. & Niedenzu, in Urb. Symb. Antill.* ii. 462.—Ind. occ.

MILLETTIA, Wight & Arn. (Legum.).
Autc, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 167.—Afr. trop.
Baroni, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 141.—Madag.
bipindensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 169.—Afr. trop.
breviflora, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 136.—Afr. trop.
brevistipellata, *Wildem. l. c.* 193.—Afr. trop.
Busseі, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 170.—Afr. trop.
Cabrae, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 136.—Afr. trop.
congolensis, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Ser. III. i. 61.—Afr. trop.
Conraui, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 168.—Afr. trop.
Demeusei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 137.—Afr. trop.
dubia, *Wildem. l. c.*—Afr. trop.
Duchesnei, *Wildem. l. c.* 138.—Afr. trop.
Gentilii, *Wildem. l. c.*—Afr. trop.
Harmsiana, *Wildem. l. c.* 139.—Afr. trop.
hypolampra, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 168.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. in Belg. Colon.* 1904, 378.—Afr. trop.
longipes, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 80.—Ins. Philipp.
makondensis, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 169.—Afr. trop.
Merrillii, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 81.—Ins. Philipp.
piscatoria, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxvii. 37 (=*Cylista piscatoria*).—Ins. Philipp.
Teusczii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 140 (=*Lonchocarpus Teuszii*).—Afr. trop.
Warneckei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 87.—Afr. trop.

MILLSPAUGHIA, Robinson, in Engl. Jahrb. xxxvi. (1905) Beibl. lxxx. 13. *POLYGONACEAE.*
antigonoides, *Robinson, l. c.* 14.—Am. cent.
ovatifolia, *Robinson, l. c.*—Am. cent.

MILTONIA, Lindl. (Orchid.).
laevis, *Rolfe, Orchid Rev.* 1904, 300 (=*Odontoglossum laeve*).—Am. cent.
leucomelas, *Rolfe, l. c.* (=*Odontoglossum leucomelas*).—Am. cent.
Reichenheimii, *Rolfe, l. c.* (=*Odontoglossum Reichenheimii*).—Am. cent.

MIMETES, Salisb. (Proteac.).
Boekii, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. xciii.—Afr. austr.
mixta, *Gand. l. c.*—Afr. austr.

MIMOPHYTUM, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xli. (1905) 242. *BORAGINACEAE.*
omphalodoides, *Greenm. l. c.*—Mexic.

MIMOSA, Linn. (Legum.).
argillotropha, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 257.—Mexic.
Bernieri, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 46.—Madag.
colimensis, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 258.—Mexic.
delicatula, *Baill. ex Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 42.—Madag.
eurycarpoides, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 472.—Mexic.
graminiformis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 555.—Parag.
guaranitica, *Chod. & Hassl. l. c.*—Parag.
Hassleriana, *Chod. l. c.* 557.—Parag.
hemiendyta, *Rose & Robinson, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 32.—Am. cent.
Herincquiana, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 276.—Mexic.
lonema, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 473.—Mexic.
Langlassei, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 277.—Mexic.
lignosa, *Micheli, l. c.* 278.—Mexic.
lupinoides, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 489.—Parag.
maracayuensis, *Chod. & Hassl. l. c.* 557.—Parag.
Micheliana, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 259.—Mexic.
monadelpha, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 553.—Parag.
paucifoliolata, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 275.—Mexic.
petraea, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 548.—Parag.
polyanthoides, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 260.—Mexic.
rhododactyla, *Robinson, l. c.*—Mexic.
sabulicola, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 548.—Parag.
serpens, *Chod. & Hassl. l. c.* 555.—Parag.
setifera, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 156.—Bras.
stipitata, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 261.—Mexic.
striata, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 281 (=*Prosopis striata*).—Patag.
Studartiana, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 303.—Bras.
suffruticosa, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 45 (=*Entada suffruticosa*).—Madag.
tandilensis, *Speg. Contrib. Fl. Tandil*, 13.—Reg. Argent.
texana, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 99.—Am. bor.
uliginosa, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 557.—Parag.
Watsoni, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 473.—Am. cent.

MIMULUS, Linn. (Scrophul.).
Bioletti, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 290.—Am. bor.
Bodinieri, *Vaniot, in Bull. Acad. Géog. Bot.* xv. (1905) 86.—China.
breviflorus, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 45.—Am. bor.
grandiflorus, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 520.—Am. bor.
grandis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 110.—Calif.

MIMULUS:—
gratioloides, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 27.—Am. bor.
hirsutus, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 520.—Am. bor.
inamoenus, *Greene, Pittonia*, v. 137.—Am. bor.
membranaceus, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 30.—Am. bor.
minor, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 178.—Am. bor.
modestus, *Eastw. in Zoe*, v. 84 (1900).—Calif.

MIMUSOPS, Linn. (Sapot.).
affinis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 221.—Afr. trop.
altissima, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 55.—Afr. trop.
amazonica, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iv. 438.—Bras.
Batesii, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 64.—Afr. trop.
blantyreana, *Engl. l. c.* 83.—Afr. trop.
Busseana, *Engl. l. c.* 79.—Afr. trop.
cearensis, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 320.—Bras.
Chevalieri, *Pierre, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1901, 139.—Afr. trop.
Commersonii, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 77 (=*Imbricaria Commersonii*).—Ins. Mascar.
comorensis, *Engl. l. c.* 68.—Ins. Comor.
dependens, *Engl. l. c.* 69.—Afr. trop.
djurensis, *Engl. l. c.* 75.—Afr. trop.
duplicata, *Urb. Symb. Antill.* v. 169 (=*Achras duplicata*).—Ind. occ.
Eickii, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 60.—Afr. trop.
Fischeri, *Engl. l. c.* 64 (=*Sideroxylon Fischeri*).—Afr. trop.
Grisebachii, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 173.—Ind. occ.
Henriquesiana, Engl. & Warb. in Bull. Soc. Études Colon. x. 516 nomen = seq.
Henriquesii, *Engl. & Warb. in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 80 (*errore Henriquesii*).—Afr. trop.
jamaicensis, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 174.—Ind. occ.
Kerstingii, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 78.—Afr. trop.
kilimandscharica, *Engl. l. c.* 68.—Afr. trop.
kilimanensis, *Engl. l. c.* 67.—Afr. trop.
Klaineana, *Pierre, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 82.—Afr. trop.
Langenburgiana, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 70.—Afr. trop.
Maparajuba, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iv. 434.—Bras.
Menyhartii, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 63.—Afr. trop.
natalensis, *Engl. l. c.* 65 (=*Mahea natalensis*).—Afr. austr.
nitida, *Urb. Symb. Antill.* v. 167 (=*Achras nitida*).—Ind. occ.
paraensis, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iv. 436.—Bras.
Pierreana, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 82.—Afr. trop.
Pierana, Pierre, ex Urb. Symb. Antill. v. 169 = duplicata.
Pohlii, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 76.—Afr. trop.
propinqua, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 177.—Afr. trop.
Riedleana, Pierre, ex Urb. Symb. Antill. v. 167 = nitida.
Schinzii, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 70.—Afr. austr.
usaramensis, *Engl. l. c.* 66.—Afr. trop.
useguhensis, *Engl. l. c.* 67.—Afr. trop.
Warneckei, *Engl. l. c.* 68.—Afr. trop.
Woodii, *Engl. l. c.* 65.—Afr. austr.
Wrightiana, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 171.—Ind. occ.

MINUARTIA, Linn. = **Arenaria**, Rupp. (Caryophyll.).
leptophylla, Groves, in Bab. Man. Brit. Bot. Ed. IX. 61 = A. mucronata.

MIRABILIS, Riv. (Nyctag.).
albida, *Heimerl, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, v. 182 (=*Oxybaphus albidus*).—Am. bor.
glutinosa, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 92.—Am. bor.
linearis, *Heimerl, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, v. 186 (=*Abronia linearis*).—Am. bor.
oblongifolia, *Heimerl, l. c.* 181.—Am. bor.
pseudaggregata, *Heimerl, l. c.* 183.—Am. bor.
Toscae, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 376 (=*Oxybaphus Toscae*).—Patag.

MIRBELIA, Sm. (Legum.).
depressa, *Pritz, in Engl. Jahrb.* xxxv. 280.—Austral.
Ringrosei, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xvi. 189.—Austral.

MIRTANA, Pierre, in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. (1905) 490. *MENISPERMACEAE.*
Loureiri, *Pierre, l. c.* (=*Anamirta Loureiri*).—Cochinch.

MISANTECA, Cham. & Schlecht. (Laurac.).
Pittieri, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. (1903) 230.—Am. cent.

MISCANTHUS, Anderss. (Gramin.).
coreensis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 531.—China.

MISCHOCARPUS, Blume (Sapind.).
[RATONIA, DC. I. K.]
salicifolius, *Radlk. in Perkins, Frag. Fl. Philip.* 64.—Ins. Philipp.
triqueter, *Radlk. l. c.* 65.—Ins. Philipp.

MITELLA, Tourn. (Saxifr.).
acerina, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 159.—Japon.
intermedia, *Bruhin, in N. Amer. Fl.* xxii. 92.—Am. bor.
oppositifolia, *Rydb. in N. Amer. Fl.* xxii. 91.—Am. bor.

MITOPHYLLUM, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1904) 88. *CRUCIFERAE.*
diversifolium, *Greene, l. c.* (=*Streptanthus diversifolius*).—Calif.

MITOSTIGMA, Decne. (Asclep.).
barbatum, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 1, 10.—Reg. Argent.
parviflorum, *Malme, l. c.* 15.—Reg. Argent.
speciosum, *Malme, l. c.* 13.—Reg. Argent.
subniveum, *Malme, l. c.* 9.—Reg. Argent.
tubatum, *Malme, l. c.* 14.—Reg. Argent.

MITRACARPUS, Zucc. (Rubiac.).
brevis, *K. Schum. & R. Fries, ex R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 100.—Reg. Argent.
Christii, *Urb. Symb. Antill.* iii. 388.—Ind. occ.
filipes, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 326.—Bras.
Hassleriauus, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 191.—Parag.
polycladus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 389.—Ind. occ.

MITRAGYNA, Korth. (Rubiac.).
javanica, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lix. (1902) 38 (=*Stephegyne parvifolia*).—Java.

MITRASACME, Labill. (Logan.).
palustris, *Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxvii. 241.—Austral.

MITRATHECA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. (1903) 335. *RUBIACEAE.*
Richardsonioides, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

MITREPHORA, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
ferruginea, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 16.—Ins. Philipp.
Lanotan, *Merrill, l. c.* xxxv. 71 (=*Uvaria Lanotan*).—Ins. Philipp.
reflexa, *Merrill, l. c.* 10.—Ins. Philipp.

MIYOSHIA, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. (1903) 144. *LILIACEAE.*
Sakuraii, *Makino, l. c.* 145.—Japon.

MOCINNA, La Llav. & Ram. in Conzatti, Gén. Veget. Mexic. 343 (1905). *PASSIFLORACEAE.*
heterophylla, *La Llav. l. c.* 344.—Mexic.

MODECCA, Lam. (Passifl.).
tenuispira, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 102.—Afr. trop.

MOEHRINGIA, Linn. (Caryophyll.).
[ARENARIA, Rupp. I. K.]
coronensis, *Behr. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1904, 65.—Hybr.
hybrida, *Kern. ex Mausetti, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1903, 362.—Hybr.
Malyi, *Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1903, 148.—Eur.
Pichleri, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 449.—Bulgar.

MOHRODENDRON, Britton = **Halesia**, Linn. (Styrac.).
Meehani, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xiv. 823 = H. Meehani.

MOLINIA, Schrank (Gramin.).
Fauriei, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 504.—Corea.

MOLLIA, Mart. (Tiliac.).
Burchellii, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 704.—Bras.

MOLLINEDIA, Ruiz & Pav. (Monim.).
chrysolaena, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxxi. 744.—Bras.
costaricensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 257.—Am. cent.
Pinchotiana, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxxi. 743.—Am. cent.
wikstroemioides, *Perkins, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 139.—Bras.

MOLLUGO, Linn. (Ficoid.).
Snodgrassii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 144.—Ins. Galap.

MOMORDICA, Tourn. (Cucurb.).
calantha, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 351.—Afr. trop.
Cogniauxiana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 160 (1903).—Afr. trop.
Cogniauxiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 350 (1904).—Afr. trop.
grandibracteata, *Gilg, l. c.* 349.—Afr. trop.
leiocarpa, *Gilg, l. c.* 351.—Afr. trop.
macrantha, *Gilg, l. c.* 348.—Afr. trop.
macrophylla, *Gage, in Rec. Bot. Surv. India*, iii. 61.—Burma.
runssorica, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 349.—Afr. trop.

MONACHNE, Beauv. = **Eriochloa**, H. B. & K. (Gramin.).
subglabra, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 374.—Ind. occ.

MONACTIS, H. B. & K. (Compos.).
Jelskii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 486.—Peruv.

MONADENIUM, Pax (Euphorb.).
Goetzei, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxx. 342.—Afr. trop.

MONANTHOCHLOË, Engelm. (Gramin.).
australis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 194.—Patag.

MONANTHOTAXIS, Baill. (Anonac.).
Poggei, *Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl.* vi. 58.—Afr. trop.

MONARDA, Linn. (Labiat.).
comata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 502.—Am. bor.
dispersa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1038.—Am. bor.
hirsutissima, *Small, l. c.* 1037.—Am. bor.
lasiodonta, *Small, l. c.* 1038.—Am. bor.
Nuttallii, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 397.—Am. bor.
Pringlei, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 501.—Mexic.
Ramaleyi, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 398.—Am. bor.
Stanfieldii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1038.—Am. bor.
tenuiaristata, *Small, l. c.*—Am. bor.

MONARDELLA, Benth. (Labiat.).
anemonoides, *Greene, Pittonia*, v. 86.—Calif.
coriacea, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 35.—Calif.
crispa, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxix. 46.—Calif.
dentata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 641.—Am. bor.
epilobioides, *Greene, Pittonia*, v. 85.—Calif.
exilis, *Greene, l. c.* 86.—Calif.
glauca, *Greene, l. c.* iv. 321.—Am. bor.
globosa, *Greene, l. c.* v. 82.—Calif.
ingrata, *Greene, l. c.* 83.—Am. bor.
involucrata, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 34.—Calif.
ledifolia, *Greene, Pittonia*, v. 81.—Calif.
mollis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 35.—Calif.
muriculata, *Greene, Pittonia*, v. 84.—Am. bor.
neglecta, *Greene, l. c.* 82.—Calif.
nervosa, *Greene, l. c.* iv. 322.—Am. bor.
oblonga, *Greene, l. c.* v. 83.—Calif.
ovata, *Greene, l. c.* 82.—Calif.
pallida, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 36.—Calif.

MONARDELLA:—
parviflora, *Greene, Pl. Baker.* iii. 22.—Am. bor.
peninsularis, *Greene, Pittonia*, v. 87.—Calif.
pinetorum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 36.—Calif.
purpurea, *Howell, Fl. N. W. Am.* i. 550.—Am. bor.
reflexa, *Howell, l. c.* 549.—Am. bor.
robusta, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxix. 46.—Calif.
rubella, *Greene, Pittonia*, v. 84.—Am. bor.
sanguinea, *Greene, l. c.* 86.—Calif.
subserrata, *Greene, l. c.* 81.—Calif.
tomentosa, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 496.—Calif.
viminea, *Greene, Pittonia*, v. 85.—Calif.

MONECHMA, Hochst. (Acanth.).
[Justicia, Linn. I. K.]
acutum, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 71.—Afr. austr.
angustissimum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 137.—Afr. austr.
Atherstonei, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 72.—Afr. austr.
divaricatum, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Justicia divaricata*).—Afr. austr.
fimbriatum, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. austr.
foliosum, *C. B. Clarke, l. c.* 73 (= *Justicia foliosa*).—Afr. austr.
incanum, *C. B. Clarke, l. c.* 69 (= *Justicia incana*).—Afr. austr.
leucoderme, *C. B. Clarke, l. c.* 70 (= *Justicia leucodermis*).—Afr. austr.
Linaria, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Justicia Linaria*).—Afr. austr.
loliaceum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxviii. i. 467, sphalm. = lolioides.
molle, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 69 (= *Justicia mollis*).—Afr. austr.
namaense, *C. B. Clarke, l. c.* 73 (= *Justicia namaensis*).—Afr. austr.
nepetoides, *C. B. Clarke, l. c.*—Afr. austr.
pseudopatulum, *C. B. Clarke, l. c.* 70 (= *Gendarussa patula*).—Afr. austr.
spartioides, *C. B. Clarke, l. c.* 72 (= *Justicia spartioides*).—Afr. austr.

MONELASMUM, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 216 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
acutum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 331.—Afr. trop.
Afzelii, Van Tiegh. l. c. xviii. 36 = O. Afzelii.
andongense, Van Tiegh. l. c. xvi. 328.—Afr. trop.
angustifolium, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
bolamense, Van Tiegh. l. c. 335.—Afr. trop.
brachybotrys, Van Tiegh. l. c. xviii. 36 = O. brachybotrys.
brunneo-purpureum, Van Tiegh. l. c. = O. brunneopurpurea.
Buechneri, Van Tiegh. l. c. = O. Buechneri.
bukobense, Van Tiegh. l. c. = O. bukobense.
Chevalieri, Van Tiegh. l. c. xvi. 333.—Afr. trop.
costatum, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
densiflorum, Van Tiegh. l. c. xviii. 35 = O. densiflora.
Deweorei, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
Dinklagei, Van Tiegh. l. c. 36 = O. Dinklagei.
discolor, Van Tiegh. l. c. xvi. 329.—Afr. trop.
Dupuisi, Van Tiegh. l. c. 326.—Afr. trop.
djallonense, Van Tiegh. l. c. 329.—Afr. trop.
Dybowskii, Van Tiegh. l. c. 330.—Afr. trop.
elegans, Van Tiegh. l. c. 329.—Afr. trop.
Engleri, Van Tiegh. l. c. 335.—Afr. trop.
flavum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 203 = O. reticulata.
flexuosum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 332.—Afr. trop.
fuscum, Van Tiegh. l. c. 330.—Afr. trop.
glaberrimum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 202 = O. glaberrima.
glaucum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 332.—Afr. trop.
glomeratum, Van Tiegh. l. c. 330.—Afr. trop.
Heudeloti, Van Tiegh. l. c. 329.—Afr. trop.
Henriquesi, Van Tiegh. l. c. 335 (*errore Heuriquesi*).—Afr. trop.
Hierni, Van Tiegh. l. c. 328.—Afr. trop.
interruptum, Van Tiegh. l. c. 329.—Afr. trop.
Klainei, Van Tiegh. l. c. 331.—Afr. trop.
konakrense, Van Tiegh. l. c. 332.—Afr. trop.
laeve, Van Tiegh. l. c. 137 = O. laevis.

MONELASMUM:—
laxiflorum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 137 = O. laxiflora.
Lecomtei, Van Tiegh. l. c. 331.—Afr. trop.
Leroyanum, Van Tiegh. l. c. 330.—Afr. trop.
Maclaudi, Van Tiegh. l. c. 332.—Afr. trop.
macrocarpum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 202 = O. reticulata.
macrophyllum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 334.—Afr. trop.
Marquesi, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
micranthum, Van Tiegh. l. c. 137 = O. reticulata.
Molleri, Van Tiegh. l. c. 335.—Afr. trop.
monticola, Van Tiegh. l. c. xviii. 36 = O. monticola.
nutans, Van Tiegh. l. c. xvi. 328.—Afr. trop.
Paroissei, Van Tiegh. l. c. 332.—Afr. trop.
pellucidum, Van Tiegh. l. c. xviii. 35 = O. pellucidum.
persistens, Van Tiegh. l. c. xvi. 331.—Afr. trop.
plicatum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 202; et in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 329.—Afr. trop.
Pobeguini, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 331.—Afr. trop.
Poggei, Van Tiegh. l. c. 328.—Afr. trop.
pungens, Van Tiegh. l. c. 333.—Afr. trop.
reticulatum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 202 = O. reticulata.
Schlechteri, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xviii. 36 = O. Schlechteri.
Schoenleinianum, Van Tiegh. l. c. 35.—Afr. trop.
Schweinfurthii, Van Tiegh. xvi. 328.—Afr. trop.
setigerum, Van Tiegh. l. c. 334.—Afr. trop.
sibangense, Van Tiegh. l. c. xviii. 36 = O. sibangensis.
Soyaux, Van Tiegh. l. c. xvi. 335.—Afr. trop.
spiciforme, Van Tiegh. l. c. 333.—Afr. trop.
spinuloso-serratum, Van Tiegh. l. c. xviii. 36 = O. spinuloso-serrata.
squamosum, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 203 = O. squamosa.
strictum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 330.—Afr. trop.
sulcatum, Van Tiegh. l. c. 334.—Afr. trop.
Thoirei, Van Tiegh. l. c. 332.—Afr. trop.
thomense, Van Tiegh. l. c. 335.—Afr. trop.
Turnerae, Van Tiegh. l. c. 327.—Afr. trop.
umbricola, Van Tiegh. l. c. xvi. 333, xviii. 36 = O. umbricola.
unilaterale, Van Tiegh. l. c. = O. unilateralis.
viride, Van Tiegh. l. c. xvi. 332.—Afr. trop.
Vogelii, Van Tiegh. l. c. 137 = O. Vogelii.
Zenkeri, Van Tiegh. l. c. 334.—Afr. trop.

MONNIERA, B. Juss. (Scrophul.).
[Herpestis, Gaertn. f. I. K.]
aquatica, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 720 (= *Bacopa aquatica*).—Patag.
floribunda, *T. Cooke, Fl. Bomb.* ii. 286 (= *Herpestis floribunda*).—As. et Afr. trop.; Austral.
Hamiltoniana, *T. Cooke, l. c.* (= *Herpestis Hamiltoniana*).—Ind. or.; Afr. trop.

MONNINA, Ruiz & Pav. (Polygal.).
cacumina, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 19.—Guiana.
equatoriensis, *Chod. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 379.—Ecuador.
intermedia, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iv. i. 10.—Urug.
oblongifolia, *Arech. l. c.* 8.—Urug.
obovata, *Chod. & Sodiro, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 379.—Ecuador.
Pilgeri, *Chod. l. c.* 376.—Ecuador.
ramosissima, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iv. i. 11.—Urug.
saprogena, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 109.—Am. cent.
Sodiroana, *Chod. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 379.—Ecuador.
virescens, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iv. i. 9.—Urug.
Wilczekiana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 531.—Reg. Argent.

MONOCHAETUM, Naud. (Melast.).
Pringlei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 327.—Mexic.

MONOCHORIA, Presl (Ponteder.).
africana, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 5.—Afr. trop.

MONOCOSTUS, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib. 427 (1904). *ZINGIBERACEAE.*
Ulei, *K. Schum. l. c.* 429.—Peruv.

MONODORA, Dun. (Anonac.).
Cabrae, *Wildem. in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg.* xl. 64.—Afr. trop.
Durieuxii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 122.—Afr. trop.
hexaloba, Pierre, ex Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. vi. 82 = Isolona hexaloba.
Klaineana, Pierre, l. c. 90 = crispata.
minor, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* vi. 88.—Afr. trop.

MONOLEPIS, Schrad. (Chenopod.).
Litwinowii, *Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 187.—As. cent.

MONOPHRYNIUM, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. (1901) 68. *SCITAMINEAE.*
fasciculatum, *K. Schum. l. c.* (= *Phrynium fasciculatum*).—Ins. Philipp.

MONOPHYLLANTHE, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. (1902) 165. *SCITAMINEAE.*
oligophylla, *K. Schum. l. c.* 166.—Guiana.

MONOPORIDIUM, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 434 = **Ochna**, Linn. (Ochnac.).
cornutum, Van Tiegh. l. c. 436.—Hort.

MONOPORUS, A. DC. (Myrsin.).
[Ardisia, Sw. I. K.]
Bakerianus, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 166 (= *Tinus Bakeriana*).—Madag.
bipinnatus, *Mez, l. c.* 162 (= *Ardisia bipinnata*).—Madag.
floribundus, *Mez, l. c.* 161 (= *Ardisia floribunda*).—Madag.
myrianthus, *Mez, l. c.* 162 (= *Ardisia myriantha*).—Madag.
spathulatus, *Mez, l. c.* 160.—Madag.

MONOTAGMA, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. (1901) 166. *SCITAMINEAE.*
contractum, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 412.—Bras.
densiflorum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 167 (= *Ischnosiphon densiflorum*).—Bras.
exannulatum, *K. Schum. l. c.* 168.—Bras.
guianense, *K. Schum. l. c.* 169 (= *Ischnosiphon guianense*).—Guiana.
laxum, *K. Schum. l. c.* 168 (= *Ischnosiphon laxum*).—Peruv.
Parkeri, *K. Schum. l. c.* (= *Ischnosiphon Parkeri*).—Guiana.
plurispicatum, *K. Schum. l. c.* 169 (= *Ischnosiphon plurispicatum*).—Bras.
secundum, *K. Schum. l. c.* 167 (= *Ischnosiphon secundum*).—Bras.
smaragdinum, *K. Schum. l. c.* 169 (= *Ischnosiphon smaragdinum*).—Ecuador.

MONOTES, A. DC. (Dipterocarp.).
dasyanthus, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 307.—Afr. trop.
macrophyllus, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 484, sphalm. = Manotes macrophyllus.

MONOTOCA, R. Br. (Epacrid.).
leucantha, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 450.—Austral.

MONOTROPA, Linn. (Monotrop.).
californica, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 75.—Am. bor.

MONOXALIS, Small, Fl. S. E. U. S. 665 (1903). *GERANIACEAE.*
dichondraefolia, *Small, l. c.* 666 (= *Oxalis dichondraefolia*).—Am. bor.

MONSONIA, Linn. (Geran.).
glandulosissima, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 822.—Afr. trop.
malvaeflora, *Schinz, l. c.* 821.—Afr. trop.

MONSTERA, Adans. (Arac.).
coriacea, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 118.—Reg. Amaz.
epipremnoides, *Engl. l. c.*—Am. cent.
falcifolia, *Engl. l. c.* 117.—Reg. Amaz.
Fendleri, *Engl. l. c.* 116.—Ind. occ.

MONSTERA :—
gigantea, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 18.—Am. cent.
peruviana, *Engl. l. c.* 117.—Peruv.
Pittieri, *Engl. l. c.* 116.—Am. cent.
Sagotiana, *Engl. l. c.* 117.—Guiana.
Uleana, *Engl. l. c.* 118.—Peruv.

MONTIA, Mich. (Portul.).
obtusata, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 32.—Calif.

MONTRAVELIA, Montrouz. ex Beauvis. Gen. Montrouz. 89 = **Diplanthera**, Banks & Soland. (Bignon.).
speciosa, Montrouz. l. c. = D. speciosa.

MOOREA, Lemaire, in Illustr. Hortic. 1855, Misc. 14. *GRAMINEAE.*
araucana, *Stapf, in Gard. Chron.* 1903, ii. 400.—Am. austr.
argentea, *Lemaire, in Illustr. Hortic.* 1855, *Misc.* 14.—Am. austr.
Quila, *Stapf, in Gard. Chron.* 1903, ii. 400.—Am. austr.
rudiuscula, *Stapf, l. c.*—Am. austr.
speciosa, *Stapf, l. c.*—Am. austr.

MOOREA, Rolfe, in Gard. Chron. 1890, ii. 7 = **Neomoorea**, Rolfe (Orchid.).
irrorata, Rolfe, l. c. = N. irrorata.

MORAEA, Mill. (Irid.).
Arnoldiana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 16.—Afr. trop.
malangensis, *Baker, in Rev. Cult. Colon.* viii. 362.—Afr. trop.
punctata, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1003.—Afr. austr.
stricta, *Baker, in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, xlix. 178.—Afr. austr.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 17.—Afr. trop.
violacea, *Baker, in Rev. Cult. Colon.* viii. 362.—Afr. austr.

MORELLA, Lour. = **Myrica**, Linn. (Myricac.).
caroliaensis, Small, Fl. S. E. U. S. 337 = Myrica cerifera.
cerifera, Small, l. c. = Myrica cerifera.
inodora, Small, l. c. = Myrica inodora.
pumila, Small, l. c.—Am. bor.

MORINDA, Linn. (Rubiac.).
asteroscepa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 340.—Afr. trop.
Candollei, *Beauvis. Gen. Montrouz.* 57 (= *Pogonanthus Candollei*).—N. Caled.
lacunosa, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 87.—Penins. Mal.

MORINGA, Burm. (Moring.).
Hildebrandtii, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, ix. 250.—Afr. trop.
longituba, *Engl. l. c.* 251.—Afr. trop.
Moringa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 491 (= *Gailandina Moringa*).—Am. bor.
Ruspoliana, *Engl. in Ann. Ist. Bot. Roma*, ix. 250.—Afr. trop.

MORONGIA, Britton = **Schrankia**, Willd. (Legum.).
latidens, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 98.—Am. bor.

MORRENIA, Lindl. (Asclep.).
connectens, *Malme, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 65.—Parag.

MOSTUEA, Didr. (Logan.).
Batesii, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 506.—Afr. trop.
congolana, *Baker, l. c.* 509 (= *Coinochlamys congolana*).—Afr. trop.
Duchesnei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 173.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. l. c.* 174.—Afr. trop.
Poggeana, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 510 (= *Coinochlamys Poggeana*).—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Baker, l. c.* (= *Coinochlamys Schweinfurthii*).—Afr. trop.
Taymansiana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 174.—Afr. trop.

MOTANDRA, A. DC. (Apocyn.).
Erlangeri, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 318.—Afr. trop.
Lujaei, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 28.—Afr. trop.

MOTANDRA :—
pyramidalis, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. 235.—Afr. trop.
rostrata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 318, descr.—Afr. trop.
viridiflora, *K. Schum. l. c.* 319.—Afr. trop.

MOURIRIA, Juss. (Melast.).
angustifolia, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 427.—Bras.
cearensis, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 318.—Bras.
Chodatiana, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 426.—Bras.
Helleri, *Britton, in Torreya*, ii. 10.—Am. bor.
nervosa, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 183.—Reg. Amaz.
oligantha, *Pilg. l. c.* 184.—Reg. Amaz.
Ulei, *Pilg. l. c.*—Reg. Amaz.

MOZINNA, Orteg. = **Jatropha**, Linn. (Euphorb.).
sessiliflora, Small, Fl. S. E. U. S. 706.—Am. bor.

MUCRONEA, Benth. = **Chorizanthe**, R. Br. (Polygon.).
perfoliata, A. A. Heller, Muhlenbergia, ii. 23 = C. perfoliata.

MUCUNA, Adans. (Legum.).
Birdwoodiana, *Tutcher, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 65.—China.
Grevei, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 111.—Madag.
Humbloti, *Drake, l. c.* 112.—Madag.
longipedunculata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 18.—Ins. Philipp.
sericophylla, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 86.—Ins. Philipp.
tomentosa, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 277.—N. Guin.

MUEHLENBERGIA, Schreb. (Gramin.).
aristulata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 600 (= *Sporobolus aristatus*).—Am. bor.
californica, *Abrams, Fl. Los Angeles*, 32.—Calif.
cuspidata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 599 (= *Vilfa cuspidata*).—Am. bor.
filiformis, *Rydb. l. c.* 600 (= *Sporobolus filiformis*).—Am. bor.
polypogonoides, *Hack. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xvii. 255.—Mexic.
polystachya, *Mackenzie & Bush, in Mackenzie, Fl. Jacks. County*, 23; *et in Trans. Acad. St. Louis*, xii. 79.—Am. bor.
Richardsonis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 600 (= *Vilfa Richardsonis*).—Am. bor.
Schmitzii, *Hack. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xvii. 255.—Mexic.
simplex, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 600 (= *Sporobolus simplex*).—Am. bor.
Thurberi, *Rydb. l. c.* 601 (= *Vilfa filiculmis*).—Am. bor.
Wolfii, *Rydb. l. c.* 600 (= *Sporobolus Wolfii*).—Am. bor.

MUELLERA, Linn. f. (Legum.).
Glaziovii, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 893 (= *Lonchocarpus Glaziovii*).—Parag.

MUILLA, S. Wats. (Liliac.).
tenuis, *Congd. in Zoe*, v. 135 (1901).—Calif.

MULGEDIUM, Cass. (Compos.).
[LACTUCA, Tourn. I. K.]
orbelicum, *Velen. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 44.—Turcia.
uralense, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 390.—Eur.

MULINUM, Pers. (Umbell.).
lycopodiopsis, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901) repr. 62.—Patag.
Morenonis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 295 (= *Huanaca Morenonis*).—Patag.
patagonicum, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901) repr. 63.—Patag.
pauciflorum, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 82.—Chili.
Valentini, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901) repr. 64.—Patag.

MURALTIA, Neck. (Polygal.).
brachypetala, *Dod, in Journ. Bot.* 1901, 307.—Afr. austr.
demissa, *Dod, l. c.*—Afr. austr.
recurva, *Dod, l. c.*—Afr. austr.
spicata, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 135.—Afr. austr.

MURICARIA, Desv. (Crucif.).
Battandieri, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii-viii. 154.—Alger.

MURICAUDA, Small, Fl. S. E. U. S. 227 (1903). *ARACEAE.*
Dracontium, *Small, l. c.* (= *Arum Dracontium*).—Am. bor.

MUSA, Linn. (Scitamin.).
Arnoldiana, *Wildem. in Bull. Soc. Étud. Col. Brux.* viii. 339, *ex Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 842.—Afr. trop.
borneensis, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 622.—Borneo.
campestris, *Becc. l. c.*—Borneo.
Gilletii, *Wildem. in Rev. Cult. Colon.* viii. 102.—Afr. trop.
hirta, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 624.—Borneo.
Holstii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 121.—Afr. trop.
microcarpa, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 623.—Borneo.
Nagensium, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 21.—Assam.
Perrieri, *Bonnier, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxl. 1612.—Madag.
Tikap, *Warb. in Tropenpfl.* 1903, 34.—Ins. Carolin.
Wilsoni, *Tutcher, in Gard. Chron.* 1902, ii. 450.—China.

MUSCADINIA, Small, Fl. S. E. U. S. 756 (1903). *AMPELIDACEAE.*
Munsoniana, *Small, l. c.* 757 (= *Vitis Munsoniana*).—Am. bor.
rotundifolia, *Small, l. c.* (= *Vitis rotundifolia*).—Am. bor.

MUSCARI, Tourn. (Liliac.).
longifolium, *Rigo, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. xii. 152.—Ital.

MUSCARIA, Haw. = **Saxifraga**, Tourn. (Saxifr.).
adscendens, Small, in N. Am. Fl. xxii. 122 = S. adscendens.
delicatula, Small, l. c.—Am. bor.
emarginata, Small, l. c. 130.—Am. bor.
micropetala, Small, l. c. 129.—Am. bor.
monticola, Small, l. c. 130.—Am. bor.
sileniflora, Small, l. c. = S. sileniflora.

MUSENIOPSIS, Coult. & Rose (Umbell.).
arguta, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 337.—Mexic.
fusiformis, *Rose, l. c.*—Mexic.

MUSENIUM, Nutt. (Umbell.).
pedunculatum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 225.—Am. bor.

MUSSAENDA, Burm. (Rubiac.).
aestuarii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 394.—N. Guin.
breviloba, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 137.—Burma.
conopharyngiifolia, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 104.—Afr. trop.
cylindrocarpa, *Arech. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxix. no. 2, 43, nomen.—Hab. ?
lanceolata, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 334.—Malaya.
macrosepala, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 105.—Afr. trop.
membranacea, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 187.—Penins. Mal.
oblonga, *King, l. c.* 186.—Penins. Mal.
polyneura, *King, l. c.* 185.—Penins. Mal.
shikokiana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1904, 44.—Japon.
Wrayi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 182.—Penins. Mal.

MUTISIA, Linn. f. (Compos.).
hamata, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 314.—Chili.
Hayenbekii, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* Sér. II. i. 13.—Urug.
buacensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 652.—Ecuad.
Kurtzii, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 94.—Reg. Argent.
Philippii, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 92.—Reg. Argent.

MYAGRUM, Tourn. (Crucif.).
perenne, *R. Br. ex Britten, in Journ. Bot.* 1904, 5.—Ins. Mader.

MYODOCARPUS, Brong. & Gris (Aral.).
Brongniarti, *Dubard & Viguier, in Agric. Prat. Pays Chauds*, iii. 714.—N. Caled.
coronatus, *Dubard & Viguier, l. c.* 710.—N. Caled.
crassifolius, *Dubard & Viguier, l. c.* 711.—N. Caled.
elegans, *Dubard & Viguier, l. c.* 716.—N. Caled.
floribundus, *Dubard & Viguier, l. c.* 712.—N. Caled.
involucratus, *Dubard & Viguier, l. c.* 714.—N. Caled.

MYOSOTIS, Tourn. (Borag.).
afropalustris, *C. H. Wright, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 20.—Afr. austr.
Galpinii, *C. H. Wright, l. c.* 19.—Afr. austr.
globularis, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto*, vii. 115.—Lusitan.
Marcillyana, *Béguin. in Ann. di Bot. Roma*, i. 284.—Ital.
ruscinonensis, *Rouy, in Coste, Fl. Fr.* ii. 600.—Eur.
tubuliflora, *Murb. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 400.—Afr. bor.

MYOSURUS, Linn. (Ranunc.).
gracilis, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 403.—Patag.
Heldreichii, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 296.—Eur.
nitidus, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 194.—Am. bor.

MYRCEUGENIA, Berg (Myrtac.).
[MYRTUS, Linn. I. K.]
longipedicellata, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 2.—Parag.

MYRCIA, DC. (Myrtac.).
Hassleriana, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 2.—Parag.
Sellowiana, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 45 (= *Gomidesia Sellowiana*).—Urug.
sparsifolia, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 1.—Parag.

MYRICA, Linn. (Myricac.).
australasica, Ind. Kew. iii. 281, sphalm. = Myrcia australasica.
comorensis, *Cheval. in Mém. Soc. Nat. Cherbourg.* xxxii. 254.—Ins. Comor.
Curtissi, *Cheval. l. c.* 269.—Am. bor.
Dregeana, *Cheval. l. c.* 239.—Afr. austr.
elliptica, *Cheval. l. c.* 250.—Afr. austr.
Funckii, *Cheval. l. c.* 286.—Venez.
glabrissima, *Cheval. l. c.* 240.—Afr. austr.
Goetzei, *Engl. Jahrb.* xxx. 290.—Afr. trop.
incisa, *Cheval. in Mém. Soc. Nat. Cherbourg.* xxxii. 234.—Afr. austr.
myrtifolia, *Cheval. l. c.* 239.—Afr. austr.
nana, *Cheval. l. c.* 202.—China.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 236.—Mexic.

MYRIOCEPHALUS, Benth. (Compos.).
Isoetes, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 609.—Austral.
Morrisonianus, *Diels, l. c.* 610.—Austral.

MYRIOPHYLLUM, Ponted. (Halorrh.).
glomeratum, *Schindl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxvii. 10; *et in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 103.—Austral.
longibracteolatum, *Schindl. l. c. Beibl.* lxxix. 47; *et l. c.* 84.—Austral.
Mezianum, *Schindl. l. c.*; *et l. c.* 104.—Madag.
ovatum, Schindl. l. c. Beibl. lxxvii. 13; et l. c. 91 = verrucosum.
tillaeoides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 448.—Austral.
Votschii, *Schindl. in Engl. Pflanzenreich, Halorrh.* 85.—N. Zel.

MYRISTICA, Linn. (Myristic.).
Warburgii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 267.—N. Guin.

MYRMECHIS, Blume (Orchid.).
chinensis, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 44.—China.
japonica, *Rolfe, l. c.*—Japon.

MYROSMA, Linn. f. (Scitamin.).
australis, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 142.—Bras.
cuyabensis, *K. Schum. l. c.* (= *Maranta cuyabensis*).—Bras.

MYROSMA:—
hexantha, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 144 (= *Maranta hexantha*).—Peruv.
Hoffmannii, *K. Schum. l. c.*—Am. cent.
membranacea, *K. Schum. l. c.* 143 (= *Saranthe membranacea*).—Bras.
tenuifolia, *K. Schum. l. c.* 144 (= *Saranthe tenuifolia*).—Bras.
unilateralis, *K. Schum. l. c.* (= *Maranta unilateralis*).—Peruv.

MYROXYLON, Linn. f. (Legum.).
japonicum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1904, 58 (= *Apactis japonica*).—Japon.

MYRSINE, Linn. (Myrsin.).
caballeria, Miq. in Mart. Fl. Bras. x. 316 = latifolia.
Cheesemanii, *Hemsl. ex Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 371 (= *Rapanea Cheesemanii*).—N. Zel.
Coxii, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxiv. 318.—Ins. Chatham.
Howittiana, *F. Muell. ex Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 354 (= *Rapanea Howittiana*).—Austral.
macrophylla, *Panch. & Seb. ex Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 369.—N. Caled.
marginata, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 339.—China.
Mocquerysi, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 576.—Madag.
ulugurensis, *Gilg, ex Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 374 (= *Rapanea ulugurensis*).—Afr. trop.
virgata, *Vieill. ex Mez, l. c.* 369.—N. Caled.

MYRSTIPHYLLUM, P. Br. = **Psychotria**, Linn. (Rubiac.).
ligustrifolium, Northr. in Mem. Torr. Bot. Club, xii. 68.—Ind. occ.
loniceroides, J. Britten, Bot. Cook Voy. 47 = P. loniceroides.
nesophilum, J. Britten, l. c. 46 = P. nesophila.

MYRTUS, Tourn. (Myrtac.).
amara, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 36 (= *Blepharocalyx amarus*).—Urug.
angustifolia, *Arech. l. c.* 37 (= *Blepharocalyx angustifolius*).—Urug.
angustissima, *Arech. l. c.* (= *Blepharocalyx angustissimus*).—Urug.
elliptica, *Arech. l. c.* 35 (= *Blepharocalyx ellipticus*).—Urug.
formosa, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 16.—Parag.
Hassleriana, *Barb. Rodr. l. c.*—Parag.
lanceolata, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 39 (= *Blepharocalyx lanceolatus*).—Urug.
montevidensis, *Arech. l. c.* 37 (= *Myrceugenia montevidensis*).—Urug.
myrtoides, *Arech. l. c.* 35 (= *Myrceugenia myrtoides*).—Urug.
roraimensis, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 26.—Guian.
stricta, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 38 (= *Blepharocalyx strictus*).—Urug.

MYSTACIDIUM, Lindl. (Orchid.).
appendiculatum, *Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* t. 21.—Afr. trop.
caffrum, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 145 (= *Angraecum caffrum*).—Afr. austr.
congolense, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 151.—Afr. trop.
Curnowianus, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1904, 47 (= *Aeranthus Curnowianus*).—Madag.
Flanaganii, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 145 (= *Angraecum Flanaganii*).—Afr. austr.
Germinyanum, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1904, 47 (= *Angraecum Germinyanum*).—Madag.
gladiifolium, *Rolfe, l. c.* (= *Angraecum gladiifolium*).—Madag.
Laurentii, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 152.—Afr. trop.
Leonis, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1904, 47 (= *Aeranthus Leonis*).—Ins. Comor.
Millari, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 147.—Afr. austr.
Peglerae, *Bolus, l. c.* 146.—Afr. austr.
sesquipedale, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1904, 47 (= *Angraecum sesquipedale*).—Madag.
ugandense, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 220.—Afr. trop.

MYSTROXYLON, Eckl. & Zeyh. (Tiliac.).
[ELAEODENDRON, Jacq. I. K.]
usanguense, *Loes. in Engl. Jahrb.* xxx. 345.—Afr. trop.

MYZODENDRON, Banks (Santal.).
antarcticum, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 141.—Patag.
patagonicum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 161.—Patag.

MYZORRHIZA, Phil. = **Aphyllon**, Mitch. (Orobanch.).
ludoviciana, Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S. 1093 = A. ludovicianum.

N

NABALUS, Cass. = **Prenanthes**, Vaill. (Compos.).
barbatus, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 8.—Am. bor.
cylindricus, Small, Fl. S. E. U. S. 1312.—Am. bor.
hastatus, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 8 = P. alata.
mainensis, A. A. Heller, l. c. = P. mainensis.

NABIASODENDRON, Pitard, in Actes Soc. Linn. Bordeaux, lvii. (1902) p. liv. *TERNSTROEMIACEAE.*
acuminatum, *Pitard, l. c.* (= *Gordonia acuminata*).—Ins. Philipp.
axillare, *Pitard, l. c.* (= *Gordonia axillaris*).—As. austr. or.
ellipticum, *Pitard, l. c.* (= *Gordonia elliptica*).—Zeylan.
excelsum, *Pitard, l. c.* (= *Gordonia excelsa*).—Malaya.
grande, *Pitard, l. c.* (= *Gordonia grandis*).—Malaya.
Maingayi, *Pitard, l. c.* (= *Gordonia Maingayi*).—Penins. Mal.
obtusum, *Pitard, l. c.* (= *Gordonia obtusa*).—Ind. or.
speciosum, *Pitard, l. c.* (= *Gordonia speciosa*).—Zeylan.
zeylanicum, *Pitard, l. c.* (= *Gordonia zeylanica*).—Zeylan.

NAIAS, Linn. (Naiad.).
gracilis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 40.—Am. bor.

NAMA, Linn. (Hydrophyll.).
parvifolium, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 85.—Mexic.
torynophyllum, *Greenm. in Zoe*, v. 185 (1904).—Mexic.

NANOCHILUS, K. Schum. (Zingib.).
arrovicus, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. lxxxi.—N. Guin.

NAPEANTHUS, Gardn. (Gesner.).
repens, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 118.—Am. cent.

NARCISSUS, Tourn. (Amaryll.).
luteus, Bub. Fl. Pyren. iv. 156 = Pseudo-narcissus.
Rogendorfii, *Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 327.—Hybr.
Sardous, *Martelli, Monocot. Sard.* 122.—Sardoa.

NARDOPHYLLUM, Hook. & Arn. (Compos.).
armatum, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 279 (= *Dolichogyne armata*).—Chili.
Nardophyllum, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 784 (= *Aster Nardophyllum*).—Patag.
staehelinoides, *Macl. l. c.* (= *Aster staehelinoides*).—Am. austr.

NARTHECIUM, Moehr. (Liliac.).
palustre, Bub. Fl. Pyren. iv. 169 = ossifragum.

NASSAUVIA, Comm. (Compos.).
abbreviata, *Dusén, in Oefvers. Vet. Akad. Forhandl. Stockh.* lviii. (1901) 234 (= *Panargyrum abbreviatum*).—Patag.
Diasi, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 387 (= *Panargyrum Diasi*).—Chili.
Dusenii, *O. Hoffm. ex P. Dusén, in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 21.—Patag.
heterophylla, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 387 (= *Panargyrum heterophyllum*).—Chili.
lanata, *Reiche, l. c.* 388 (= *Sphaerocephalus lanatus*).—Chili.

NASSAUVIA:—
laxa, *Wildem. Rés. Voy. Belgica, Bot.* 176 (= *Panargyrum laxum*).—Chili.
pentacaenoides, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 24.—Patag.
purpurascens, *S. Moore, ex Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 377.—Patag.
spinosa, *Reiche, Fl. Chile,* iv. 386 (= *Panargyrum spinosum*).—Chili.
Struthionum, *Wildem. Rés. Voy. Belgica, Bot.* 177 (= *Strongyloma Struthionum*).—Reg. Magell.
subspinosa, *Wildem. l. c.* (= *Panargyrum subspinosum*).—Reg. Magell.

NASTANTHUS, Miers = **Boopis**, Juss. (Compos.).
acaulis, Reiche, Fl. Chile, iii. 193.—Chili.
araucanus, Reiche, l. c.—Chili.
chubutensis, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 306.—Patag.
patagonicus, Speg. l. c. 307.—Patag.

NASTURTIUM, Linn. (Crucif.).
kouytchense, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1904, repr. 6.—China.
microcapsum, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 238.—Afr. trop.
pamparum, *Speg. in Com. Mus. Buenos Aires,* i. 312; *et in Bol. Agric. Buenos Aires,* i. 198.—Reg. Argent.
Philippianum, *Speg. in Bol. Agric. Buenos Aires,* i. 200.—Reg. Argent.
platense, *Speg. l. c.* 199.—Reg. Argent.

NATSCHIA, Bub. Fl. Pyren. iv. (1901) 405 = **Nardus**, Linn. (Gramin.).
stricta, Bub. l. c. = Nardus stricta.

NAUCLEA, Linn. (Rubiac.).
Gageana, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 123.—Ins. Andaman.

NAVARRETIA, Ruiz & Pav. = **Gilia**, Ruiz & Pav. (Polemon.).
Bowmanae, Eastw. in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 444.—Calif.
Jaredi, Eastw. in Zoe, v. 86 (1900).—Calif.
ocellata, Eastw. l. c. 88.—Calif.
pterosperma, Eastw. in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 445.—Calif.
stricta, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 456.—Am. bor.
Suksdorfii, Howell, l. c. 457.—Am. bor.

NEBASIODENDRON, Pitard, in Actes Soc. Linn. Bordeaux, lvii. (1902) p. liv, sphalm. = **Nabiasodendron**, Pitard (Ternstroem.).

NECTANDRA, Roland. (Laurac.).
cuneato-cordata, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 242.—Bras.
Loeseneri, *Mez, l. c.* 243.—Mexic.
megapotamica, *Mez, l. c.* iii. 794.—Parag.
nervosa, *Mez & Pittier, ex Mez, l. c.* 235.—Am. cent.

NECTAROPETALUM, Engl. Jahrb. xxxii. 109 (1902). *LINACEAE.*
Carvalhoi, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Kaessneri, *Engl. l. c.* xxxiv. 151.—Afr. trop.

NEERAGROSTIS, Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, xiii. (1903) 178. *GRAMINEAE.*
hypnoides, *Bush, l. c.* 186 (= *Poa hypnoides*).—Amer.
Weigeltiana, *Bush, l. c.* 178 (= *Poa Weigeltiana*).—Amer.

NELITRIS, Gaertn. = **Timonius**, Rumph. (Rubiac.).
Timon, Britten, in Journ. Bot. 1901, 68 = T. Rumphii.

NEMACLADUS, Nutt. (Campan.).
adenophorus, *Parish, in Bull. S. Calif. Acad.* ii. 28.—Calif.
gracilis, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1903, 500.—Calif.

NEMESIA, Vent. (Scrophul.).
anfracta, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 191.—Afr. austr.
caerulea, *Hiern, l. c.*—Afr. austr.
Flanagani, *Hiern, l. c.* 199.—Afr. austr.
glaucescens, *Hiern, l. c.* 182.—Afr. austr.
Guthriei, *Hiern, l. c.* 173.—Afr. austr.
hanoverica, *Hiern, l. c.* 167.—Afr. austr.
lanceolata, *Hiern, l. c.* 198.—Afr. austr.
Leipoldtii, *Hiern, l. c.* 175.—Afr. austr.

NEMESIA:—
Maxii, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 185.—Afr. austr.
micrantha, *Hiern, l. c.* 179.—Afr. austr.
pallida, *Hiern, l. c.* 172.—Afr. austr.
petiolina, *Hiern, l. c.* 189.—Afr. austr.
pulchella, *Schlechter, ex Hiern, l. c.* 180.—Afr. austr.

NEMEXIA, Rafin. = **Smilax**, Tourn. (Liliac.).
biltmoreana, Small, Fl. S. E. U. S. 281.—Am. bor.
diversifolia, Small, l. c. = S. diversifolia.
ecirrhata, Small, l. c. 280.—Am. bor.
herbacea, Small, l. c. 281 = S. herbacea.
Hugeri, Small, l. c. 280.—Am. bor.
lasioneuron, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 610 = S. lasioneuron.
melica, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 175.—Am. bor.
pulverulenta, Small, Fl. S. E. U. S. 281 = S. pulverulenta.
tamnifolia, Small, l. c. = S. tamnifolia.
• *tenuis*, Small, l. c. = S. tenuis.

NEMOPHILA, Nutt. (Hydrophyll.).
alata, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 158.—Am. bor.
Austinae, *Eastw. l. c.* 143.—Am. bor.
Brandegei, *Eastw. l. c.* 1902, 471.—Am. bor.
Congdoni, *Eastw. l. c.* 1901, 151.—Am. bor.
decumbens, *Eastw. l. c.* 1902, 473.—Am. bor.
densa, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 466.—Am. bor.
divaricata, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 153.—Am. bor.
diversifolia, *Eastw. l. c.* 1902, 473.—Am. bor.
erosa, *Suksd. in W. Amer. Scient.* xiv. 34.—Am. bor.
exigua, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 157.—Am. bor.
exilis, *Eastw. l. c.* 148.—Am. bor.
fallax, *Eastw. l. c.* 156.—Am. bor.
flaccida, *Eastw. l. c.* 146.—Am. bor.
glauca, *Eastw. l. c.* 156.—Am. bor.
gracilis, *Eastw. l. c.* 154.—Am. bor.
hispida, *Eastw. l. c.* 152.—Am. bor.
humifusa, *Kellogg, ex Eastw. l. c.* 141.—Am. bor.
humilis, *Eastw. l. c.* 150.—Am. bor.
inaequalis, *Eastw. l. c.* 149.—Am. bor.
integrifolia, *Abrams, Fl. Los Angeles,* 321.—Calif.
Johnsoni, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1902, 472.—Am. bor.
Kelloggii, *Eastw. l. c.* 1901, 147.—Am. bor.
macrocarpa, *Eastw. l. c.* 1902, 471.—Am. bor.
macrophylla, *Eastw. l. c.* 1901, 144.—Am. bor.
micrantha, *Eastw. l. c.* 146.—Am. bor.
minutiflora, *Suksd. in W. Amer. Scient.* xiv. 32.—Hab.?
mucronata, *Eastw. ex Sheldon, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1903, 309.—Am. bor.
nana, *Eastw. l. c.* 1901, 151.—Am. bor.
nemorensis, *Eastw. l. c.* 155.—Am. bor.
Plaskettii, *Eastw. l. c.* 147.—Am. bor.
pratensis, *Eastw. l. c.* 1902, 474.—Am. bor.
pulchella, *Eastw. l. c.* 1901, 157.—Am. bor.
pustulata, *Eastw. l. c.* 145.—Am. bor.
quercifolia, *Eastw. l. c.* 142.—Am. bor.
reticulata, *Suksd. in W. Amer. Scient.* xiv. 33.—Hab.?
rotata, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 159.—Am. bor.
tenera, *Eastw. l. c.* 153.—Am. bor.
venosa, *Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 434.—Am. bor.

NEOBOUTONIA, Muell. Arg. (Euphorb.).
macrocalyx, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxx. 336.—Afr. trop.

NEOBRITTONIA, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, ix. (1905) 184. *MALVACEAE.*
acerifolia, *Hochr. l. c.* (= *Sida acerifolia*).—Mexic.

NEOBUCHIA, Urb. Symb. Antill. iii. (1902) 319. *MALVACEAE.*
Paulinae, *Urb. l. c.*—Ind. occ.

NEODEUTZIA, Small, in N. Am. Fl. xxii. 161 (1905). *SAXIFRAGACEAE.*
mexicana, *Small, l. c.* 162 (= *Deutzia mexicana*).—Mexic.
ovalis, *Small, l. c.*—Mexic.

NEODIELSIA, Harms, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. (1905) 68. *LEGUMINOSAE.*
polyantha, *Harms, l. c.* 69.—China.

NEOLEHMANNIA, Kraenzl. (Orchid.).
Micro-Cattleya, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 180.—Peruv.

NEOMEZIA, Votsch, in Engl. Jahrb. xxxiii. 506, 541 (1904). *THEOPHRASTACEAE.*
cubensis, *Votsch, ll. cc.* (= *Deherainia cubensis*).—Ind. occ.

NEOMOOREA, Rolfe, Orch. Rev. xii. (1904) 30. *ORCHIDACEAE.*
irrorata, *Rolfe, l. c.* (= *Moorea irrorata*).—Reg. Andin.

NEOMUELLERA, Briq. (Labiat.).
damarensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 265.—Afr. trop.

NEONICHOLSONIA, Damm. in Gard. Chron. 1901, ii. 178. *PALMAE.*
Georgei, *Damm. l. c.*—Am. cent.
Watsoni, *Damm. l. c.* 179.—Am. cent.

NEOSCHUMANNIA, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxviii. 38 (1905), descr. *ASCLEPIADACEAE.*
kamerunensis, *Schlechter, l. c.*—Afr. trop.

NEOTRELEASEA, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. (1903) 5. *COMMELINACEAE.*
brevifolia, *Rose, l. c.* 6.—Am. bor.
leiandra, *Rose, l. c.* 7.—Am. bor.
tumida, *Rose, l. c.*—Mexic.

NEOWASHINGTONIA, Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest. xiv. (1897) 105. *PALMAE.*
filamentosa, *Sudw. l. c.* (= *Washingtonia filamentosa*).—Calif.

NEPENTHANDRA, S. Moore, in Journ. Bot. (1905) 149. *EUPHORBIACEAE.*
lanceolata, *S. Moore, l. c.*—Burma.

NEPENTHES, Linn. (Nepenth.).
Armbrustae, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xvi. 161.—Austral.
Balfouriana, *Hort. ex Gard. Chron.* 1904, ii. 97.—Hort.
Deslogesii, *Hort. ex Le Jardin,* 1905, 136.—Hybr.
Garrawayae, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xvi. 191.—Austral.
Macfarlanei, *Hemsl. in Proc. Linn. Soc.* 1905, 12; *et in Gard. Chron.* 1905, i. 241.—Penins. Mal.
pascoensis, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xvi. 190.—Austral.
Tiveyi, *Hort. ex Rev. Hortic. Belge,* 1905, 108.—Hybr.
Vallierae, *Hort. ex Le Jardin,* 1905, 136.—Hybr.

NEPETA, Riv. (Labiat.).
alatavica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 214.—As. cent.
Alicae, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 536, sphalm. = Nepenthes Aliceae.
Bodinieri, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 172.—China.
bucharica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 217.—As. cent.
elegans, *Lipsky, l. c.* 224.—As. cent.
huillensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 121.—Afr. trop.
Jacubi, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 237.—As. cent.
Korshinskyi, *Lipsky, l. c.* 222.—As. cent.
Kronenburgi, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 280.—Oriens.
ladanolens, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 235.—As. cent.
Maussarifi, *Lipsky, l. c.* 216.—As. cent.
Moorei, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 536, sphalm. = Nepenthes Moorei.
Nadinae, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 239.—As. cent.
Newesskyi, *Lipsky, l. c.* 226.—As. cent.
odorifera, *Lipsky, l. c.* 228.—As. cent.
pamiro-alaica, *Lipsky, l. c.* 236.—As. cent.
Prainii, *Duthie, in Ann. Bot. Gard. Calc.* ix. 63.—Ind. or.
schugnanica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 220.—As. cent.
usafuensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxx. 394.—Afr. trop.

NEPHELAPHYLLUM, Blume (Orchid.).
papuanum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 96.—Ins. Bismarck.

NEPHELIUM, Linn. (Sapind.).
Forsythii, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxvi. 81.—Austral.
intermedium, *Radlk. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 61.—Ins. Philipp.

NEPHTHYTIS, Schott (Arac.).
Poissoni, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 171 (= *Oligogynium Poissoni*).—Afr. trop.

NEPTUNIA, Lour. (Legum.).
microcarpa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 300.—Mexic.

NERINE, Herb. (Amaryll.).
Bowdeni, *W. Watson, in Gard. Chron.* 1904, ii. 365.—Afr. austr.
Huttonii, *Schoenl. in Rec. Albany Mus.* i. 49.—Afr. austr.
pancratioides, *O'Brien, in Flora & Sylva*, iii. 122.—Afr. austr.
Plantii, *Hort. ex Flora & Sylva*, iii. 122.—Hab. ?
Schlechteri, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 665.—Afr. austr.

NERVILIA, Comm. (Orchid.).
[POGONIA, Juss. I. K.]
fimbriata, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 82.—N. Guin.
punctata, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 199 (= *Pogonia punctata*).—Japon.

NESAEA, Comm. (Lythrac.).
Baumii, *Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac.* 234; *et in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 312.—Afr. trop.
Pringlei, *Rose, in Conzatti, Gén. Veget. Mexic.* 324, nomen.—Mexic.
rivularis, *Koehne, in Journ. Bot.* 1902, 69 (= *Lythrum rivulare*).—Afr. austr.
Woodii, *Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac.* 236.—Afr. trop.

NEURACANTHUS, Nees (Acanth.).
gracilior, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 302.—Afr. trop.

NEURACHNE, R. Br. (Gramin.).
multiculmis, *Pilg. ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 68.—Austral.

NEURADA, Linn. (Rosac.).
austroafricana, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 874.—Afr. trop.

NEUROCARPAEA, R. Br. = **Pentas**, Benth. (Rubiac.).
longiflora, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 157 = P. longiflora.
Thomsonii, S. Moore, l. c. = P. Thomsonii.

NEUROLAENA, R. Br. (Compos.).
cobanensis, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 418.—Am. cent.
macrophylla, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 118.—Mexic.

NEUROTHECA, Salisb. (Gentian.).
Baumii, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 333.—Afr. trop.
corymbosa, *Hua, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 267.—Afr. trop.
longidens, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. 1. 560.—Afr. trop.
robusta, *Hua, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 265.—Afr. trop.
rupicola, *Hua, l. c.* 266.—Afr. trop.
Schlechteri, *Gilg, ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. 1. 561.—Afr. trop.

NEWCASTLIA, F. Muell. (Verben.).
insignis, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 506.—Austral.
viscida, *E. Pritz. l. c.* 505.—Austral.

NICOLAIA, Horan. = **Amomum**, Linn. (Scitam.).
atropurpurea, Valet. in Bull. Inst. Buitenz. xx. 36, 94 (= *Elettaria atropurpurea*).—Sumatra.

NICOLAIA :—
magnifica, K. Schum. ex Valet. in Bull. Inst. Buitenz. xx. 35 = A. magnificum.
sanguinea, Valet. l. c. 36; et in Ic. Bogor. t. 155.—Java.

NICOLASIA, S. Moore (Compos.).
affinis, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1014.—Afr. trop.
Lugardi, *N. E. Br. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1015.—Afr. trop.

NICOTIANA, Linn. (Solan.).
acaulis, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 56.—Patag.
Ameghinoi, *Speg. l. c.* 57.—Patag.
deserticola, *Speg. l. c.* 59.—Patag.
Forgetiana, *Hort. Sand. ex Hemsl. in Bot. Mag.* t. 8006.—Bras.
Friesii, *Damm. ex R. Fries, in Arkiv Bot. Stockh.* i. 409.—Am. austr.

NIDORELLA, Cass. (Compos.).
angustifolia, *O. Hoffm. ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 53.—Afr. austr.
densifolia, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 407.—Afr. trop.
Krookii, *O. Hoffm. ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 54.—Afr. austr.
linearifolia, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 406.—Afr. trop.
stricta, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 427.—Afr. trop.
Welwitschii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 326.—Afr. trop.

NIDULARIUM, Lem. (Bromel.).
[KARATAS, Adans. I. K.]
amazonicum, *Ule, in Karst. & Schenck, Vegetationsbilder*, ii. (1904) sub tt. 1-2 (= *Canistrum amazonicum*).—Reg. Amaz.
eleutheropetalum, *Ule, l. c.* 1.—Reg. Amaz.
myrmecophilum, *Ule, l. c.* iii. (1905) sub tt. 3-4.—Reg. Amaz.

NIEBUHRIA, Neck. = **Wedelia**, Jacq. (Compos.).
biflora, Britten, in Journ. Bot. 1901, 69 = Wedelia biflora.
spilanthoides, Britten, l. c. = Wedelia spilanthoides.

NIGELLA, Tourn. (Ranunc.).
glandulifera, *Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 559.—As. cent.

NISSOLIA, Jacq. (Legum.).
montana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 48.—Mexic.

NITROPHILA, S. Wats. (Chenopod.).
australis, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 535.—Reg. Argent.

NIVENIA, R. Br. (Proteac.).
Bolusii, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. xcvi.—Afr. austr.

NOCCA, Cav. = **Lagascea**, Cav. (Compos.).
glandulosa, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 470 = L. glandulosa.
Liebmannii, Robinson, l. c. = L. Liebmannii.
Palmeri, Robinson, l. c. 471.—Mexic.
Pringlei, Robinson, l. c. 469.—Mexic.
tomentosa, Robinson, l. c. 470 = L. tomentosa.

NOLINA, Michx. (Liliac.)
altamiranoana, *Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xxix. (1905) 438.—Mexic.

NOLINIA, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. 1. (1901) 463, sphalm. = **Molinia**, Schrank (Gramin.).

NOMAPHILA, Blume (Acanth.).
siamensis, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 716.—Siam.

NORANTEA, Aubl. (Ternstroem.).
giganthophylla, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxviii. 14.—Ecuador.
Sodiroi, *Gilg, l. c.*—Ecuador.
Uleana, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 155.—Peruv.

NOSEMA, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. (1904) 20. *LABIATAE.*
capitatum, *Prain, l. c.*—Siam.
prunelloides, *C. B. Clarke, ex Prain, l. c.* 21.—China.
tonkinense, *C. B. Clarke, ex Prain, l. c.*—Tonkin.

NOTHOCALAIS, Greene = **Microseris**, D. Don (Compos.).
nigrescens, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 8 = M. nigrescens.

NOTHOFAGUS, Blume = **Fagus**, Tourn. (Cupul.).
Montagnei, Reiche, Beitr. Kenntn. Chil. Buchen, 12 = F. antarctica.
nitida, Reiche, l. c. 16 = F. nitida.
pumilio, Reiche, l. c. 12 = F. pumilio.

NOTHOSPONDIAS, Engl. in Engl. Jahrb. xxxvi. (1905) 216. *ANACARDIACEAE.*
Staudtii, *Engl. l. c.* 217.—Afr. trop.

NOTOCAMPYLUM, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 216 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
Chevalieri, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 312.—Afr. trop.
decrescens, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
Mannii, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 199 = O. Mannii.
nigricans, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 312.—Afr. trop.
Oliveri, Van Tiegh. l. c. 311.—Afr. trop.

NOTOCHNELLA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 549 = **Brackenridgea**, A. Gray (Ochnac.).
fascicularis, Van Tiegh. l. c. = B. fascicularis.

NOTONIA, DC. (Compos.).
amaniensis, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 182.—Afr. trop.
Gregorii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 353.—Afr. trop.
pendula, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 188 (= *Cacalia pendula*).—Afr. trop.

NOTOPTERA, Urb. Symb. Antill. ii. (1901) 465. *COMPOSITAE.*
guatemalensis, *Urb. l. c.*—Am. cent.
hirsuta, *Urb. l. c.* 466 (= *Salmea hirsuta*).—Ind. occ.

NOTOPTERYGIUM, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. (1903) 838. *UMBELLIFERAE.*
Forbesii, *Boissieu, l. c.* 840.—China.
Francheti, *Boissieu, l. c.* 839.—China.

NOTOSCEPTRUM, Benth. (Liliac.).
brachystachyum, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xv. 15.—Afr. austr.

NOTOTHIXOS, Oliver (Loranth.).
leiophyllus, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 260.—Ins. Bismarck.

NOTOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 215 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
inundata, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 184, 191 = O. inundata.
recurva, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 220.—Mexic.

NOTYLIA, Lindl. (Orchid.).
Durandiana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 124.—Guiana.
Glaziovii, *Cogn. l. c.* 129.—Bras.
microchila, *Cogn. l. c.* 123.—Bras.
rosea, *Cogn. l. c.* 136 (= *Macroclinium roseum*).—Bras.

NUCULARIA, Battand. in Bull. Soc. Bot. Fr. l (1903) 469. *SALSOLACEAE.*
Perrini, *Battand. l. c.* l. 469; li. 434.—Afr. bor.

NUPHAR, Sibth. & Sm. (Nymphaeac.).
centricavatum, *Schuster, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 145.—Germania.

NUXIA, Comm. (Logan.).
breviflora, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 403.—Afr. austr.
Dekindtiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxii. (1902) 141.—Afr. trop.

NUXIA:—
Goetzeana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxx. 375.—Afr. trop.
involucrata, Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 577.—Madag.
Mannii, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxii. (1902) 140.—Afr. trop.
odorata, Gilg, l. c. xxx. 376.—Afr. trop.
platyphylla, Gilg, l. c. xxxii. (1902) 141.—Afr. trop.
polyantha, Gilg, l. c. xxx. 376.—Afr. trop.
rupicola, Gilg, l. c. xxxii. (1902) 142.—Afr. trop.
Schlechteri, Gilg, l. c. 140.—Afr. trop.

NYCTAGINIA, Choisy (Nyctag.).
Cockerellae, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvi. 29.—Am. bor.

NYMANIA, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 291. EUPHORBIACEAE.
insignis, K. Schum. l. c. 292.—N. Guin.

NYMPHAEA, Tourn. (Nymphaeac.).
calliantha, Conard, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, vii-viii 19.—Afr. trop.
Gibertii, Conard, Monog. Nymphaea, 210 (=Castalia Gibertii).—Parag.
ovalifolia, Conard, l. c. 150.—Afr. trop.
Planchonii, Casp. ex Conard, l. c. 164 = mexicana.
Stuhlmannii, Schweinf. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi, Exped. 236.—Afr. trop.
sulphurea, Gilg, l. c. 235.—Afr. trop.
variegata, G. Mill. in Proc. Biol. Soc. Washington, xv. 13.—Am. bor.
Zenkeri, Gilg, in Conard, Monog. Nymphaea, 197.—Afr. trop.

NYMPHONA, Bub. Fl. Pyren. iii. (1901) 260 = **Nuphar**, Sibth. & Sm. (Nymphaeac.).
lutea, Bub. l. c. = Nuphar lutea.

NYSSA, Gronov. (Cornac.).
acuminata, Small, Fl. S. E. U. S. 852.—Am. bor.
Hollrungii, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 384.—N. Guin.

O

OAKESIELLA, Small, Fl. S. E. U. S. 271 (1903). LILIACEAE.
floridana, Small, l. c. 272 (=Uvularia floridana).—Am. bor.
puberula, Small, l. c. (=Uvularia puberula).—Am. bor.
sessilifolia, Small, l. c. (=Uvularia sessilifolia).—Am. bor.

OAXACANA, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 337 (1905), sphalm. = **Coaxana**, Coult. & Rose (Umbell.).
ebracteata, Rose, l. c. sphalm. = C. ebracteata (1906).

OBERONIA, Lindl. (Orchid.).
aurea, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 109.—Ins. Bismarck.
bifida, Schlechter, l. c.—N. Guin.
bilobata, Schlechter, l. c. 110.—N. Guin.
Boerlageana, J. J. Sm. Orchid. Java, 243.—Java.
brunnea, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 110.—N. Guin.
cardiochila, Schlechter, l. c. 111.—N. Guin.
Costeriana, J. J. Sm. Orchid. Java, 244.—Java; Sumatra.
diura, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 111.—N. Guin.
dolichophylla, Schlechter, l. c. 114.—N. Guin.
dubia, J. J. Sm. Orchid. Java, 245.—Java.
Hosei, Rendle, in Journ. Bot. 1901, 173.—Borneo.
irrorata, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 112.—N. Guin.
longicaulis, Schlechter, l. c.—Ins. Bismarck.
Lotsyana, J. J. Sm. Orchid. Java, 241.—Java.
lucida, J. J. Sm. Orchid. Ambon, 26.—Amboina.

OBERONIA:—
oligotricha, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 115.—N. Guin.
Oxystophyllum, J. J. Sm. Orchid. Java, 237.—Java.
platychila, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 113.—Ins. Bismarck.
punamensis, Schlechter, l. c. 115.—Ins. Bismarck.
radicans, Schlechter, l. c. 113.—N. Guin.
rivularis, Schlechter, l. c. 115.—N. Guin.
stenophylla, Schlechter, l. c. 113.—N. Guin.
Valetoniana, J. J. Sm. Orchid. Java, 243.—Java.
yunnanensis, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 6.—China.
Zimmermanniana, J. J. Sm. Orchid. Java, 245.—Java.

OCHANORUS, Small, Fl. S. E. U. S. 252 (1903). LILIACEAE.
leimanthoides, Small, l. c. (=Amianthium leimanthoides).—Am. bor.

OCHNA, Linn. (Ochnac.).
angustifolia, Engl. & Gilg, in Engl. Jahrb. xxxii. 135.—Afr. trop.
Antunesii, Engl. ex Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 387, nomen; Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 304.—Afr. trop.
brunnescens, Gilg, ex Van Tiegh. l. c. 368, nomen; Engl. & Gilg, l. c. 302.—Afr. trop.
Buettneri, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 242.—Afr. trop.
cinnabarina, Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 305.—Afr. trop.
citrina, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 246.—Afr. trop.
congoensis, Gilg, l. c. 239.—Afr. trop.
davilliflora, Gilg, ex Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 388.—Afr. trop.
Debeerstii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 88.—Afr. trop.
Decaisnei, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 49.—Timor.
Dekindtiana, Engl. & Gilg, in Engl. Jahrb. xxxii. 135.—Afr. trop.
densicoma, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 241.—Afr. trop.
fruticulosa, Gilg, l. c. 236.—Afr. trop.
Gilgiana, Engl. ex Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 243.—Afr. trop.
Gilgii, Engl. ex Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 391 = Gilgiana.
Gilletiana, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 239.—Afr. trop.
Hoepfneri, Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 303.—Afr. trop.
Holtzii, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 244.—Afr. trop.
huillensis, Engl. ex Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 387.—Afr. trop.
humilis, Engl. Jahrb. xxx. 354.—Afr. trop.
hylophila, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 242.—Afr. trop.
katangensis, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 89.—Afr. trop.
Mannii, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 385.—Afr. trop.
Merkeri, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, iii. 196, nomen.—Afr. trop.
micrantha, Schweinf. & Gilg, ex Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 238.—Afr. trop.
monantha, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 247.—Afr. trop.
pudiflora, Gilg, l. c. 243.—Afr. trop.
polyneura, Gilg, l. c. 240.—Afr. trop.
roseiflora, Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 304.—Afr. trop.
rovumensis, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 246.—Afr. trop.
Staudtii, Gilg, l. c.—Afr. trop.
tenuipes, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 386.—Afr. trop.
Thomasiana, Engl. & Gilg, ex Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 245.—Afr. trop.
Wildemaniana, Gilg, ex Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 90.—Afr. trop.

OCHNELLA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 214 = **Ochna**, Linn. (Ochnac.).
Afzelii, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 345 = Ochna Afzelii.
alba, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 123.—Afr. trop.
Barteri, Van Tiegh. l. c. 122.—Afr. trop.
Boiviniana, Van Tiegh. l. c. = Ochna Boiviniana.
brachypoda, Van Tiegh. l. c. = Ochna brachypoda.

OCHNELLA:—
Buechneri, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 122.—Afr. trop.
Debeerstii, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xviii. 40 = Ochna Debeerstii.
Dekindtiana, Van Tiegh. l. c. xvi. 345 = Ochna Dekindtiana.
densicoma, Van Tiegh. l. c. xviii. 40 = Ochna densicoma.
gracilipes, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 122 = Ochna gracilipes.
humilis, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 344 = Ochna humilis.
leptoclada, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 122 = Ochna leptoclada.
mauritiana, Van Tiegh. l. c. = Ochna mauritiana.
Mechowiana, Van Tiegh. l. c. = Ochna Mechowiana.
ovata, Van Tiegh. l. c. = Ochna ovata.
punctulata, Van Tiegh. l. c. 123.—Afr. trop.
pygmaea, Van Tiegh. l. c. 122 = Ochna pygmaea.
rhizomatosa, Van Tiegh. l. c. 123.—Afr. trop.
Schweinfurthiana, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xviii. 39 = Ochna Schweinfurthiana.
tenuis, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 122.—Afr. trop.
Welwitschii, Van Tiegh. l. c. = Ochna Welwitschii.

OCHROCARPOS, Thou. (Guttif.).
congregatus, Boerl. Cat. Hort. Bogor. 88.—Arch. Mal.
obovalis, Safford, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. 335 (=Calysaccion obovale).—Arch. Mal.

OCHTHOCOSMUS, Benth. (Linac.).
Lemaireanus, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg. xl. 16.—Afr. trop.

OCIMUM, Linn. (Labiat.).
aureoglandulosum, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xiv. (1904) 171.—China.
decumbens, Guerke, in Engl. Jahrb. xxx. 400.—Afr. trop.
Dinteri, Briq. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 980.—Afr. austr.
fissilabrum, Briq. l. c. 984.—Afr. trop.
Kelleri, Briq. l. c. 986.—Afr. trop.
piliferum, Briq. l. c.—Afr. trop.
polycladum, Briq. l. c. 982.—Afr. austr.
Rautanenii, Briq. l. c.—Afr. trop.
somaliense, Briq. l. c. 985.—Afr. trop.
stenoglossum, Briq. l. c. 981.—Afr. austr.

OCLEMENA, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1903) 4. COMPOSITAE.
acuminata, Greene, l. c. (=Aster acuminatus).—Am. bor.
nemoralis, Greene, l. c. 5 (=Aster nemoralis).—Am. bor.

OCOTEA, Aubl. (Laurac.).
atirrensis, Mez & Donn. Sm. ex Mez, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 18.—Am. cent.
catharinensis, Mez, l. c. 19.—Bras.
cuneata, Mez, l. c. 17 (1901).—Am. cent.
cuneata, Urb. Symb. Antill. iv. 246 (1905) (=Nectandra cuneata).—Ind. occ.
Dussii, Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 241.—Ind. occ.
floccifera, Mez & Sod. ex Mez, l. c. 237.—Ecuador.
glauca, Mez, ex Urb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers. 57 (=Myginda brasiliensis).—Bras.
heterochroma, Mez & Sod. ex Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 239.—Ecuador.
inconspicua, Mez, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 20.—Bras.
ira, Mez & Pittier, ex Mez, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. (1903) 232.—Am. cent.
jamaicensis, Mez, l. c. v. 241.—Ind. occ.
marmellensis, Mez, l. c. 239.—Bras.
mollifolia, Mez & Pittier, ex Mez, l. c. iii. 233.—Am. cent.
oocarpa, Mez & Sod. ex Mez, l. c. v. 238.—Ecuador.
pachypoda, Mez & Sod. ex Mez, l. c. 240.—Ecuador.
palmana, Mez & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxxiii. 258.—Am. cent.
paradoxa, Mez, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 16.—Am. cent.
pedalifolia, Mez, l. c. 19.—Am. cent.
pentagona, Mez, l. c. 17.—Am. cent.
Quisara, Mez & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxxiii. 259.—Am. cent.

OCOTEA :—
rubiginosa, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 20. —Bras.
Sodiroana, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 240. —Ecuador.
stenoneura, *Mez & Pittier, ex Mez, l. c.* iii. 233.—Am. cent.
tenera, *Mez & Donn. Sm. ex Mez, l. c.* 234; *et in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. (1903) 6.—Am. cent.
Weberbaueri, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 236.—Peruv.

OCREARIA, Small, in N. Am. Fl. xxii. 155 (1905). *SAXIFRAGACEAE.*
nudicaulis, *Small, l. c.* (= *Saxifraga nudicaulis*).—Am. bor. occ.

OCTOCNEMA, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xix. 46 = **Octoknema**, Pierre (Olac.).

OCTOKNEMA, Pierre (Olac.).
affinis, *Pierre, in Journ. de Bot.* xix. 46.—Afr. trop.

OCTOMERIA, R. Br. (Orchid.).
Connellii, *Rolfe, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 60. —Guiana.
parvifolia, *Rolfe, l. c.*—Guiana.

ODINA, Roxb. (Anacard.).
ambacensis, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 476 (= *Calesiam ambacensis*).—Afr. trop.
antiscorbutica, *K. Schum. l. c.* (= *Calesiam antiscorbutica*).—Afr. trop.
rubra, *K. Schum. l. c.* (= *Calesiam rubra*).—Afr. trop.
Welwitschii, *K. Schum. l. c.* (= *Calesiam Welwitschii*). —Afr. trop.

ODONTITES, Riv. = **Bartsia**, Linn. (Scrophul.).
foliosa, Lara, in Act. Soc. Esp. Hist. Nat. xxiii. ttt. 261; Mém. Soc. Esp. Hist. Nat. ii. 54.—Hispan.

ODONTOCHILUS, Blume (Orchid.).
Tashiroi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xiv. (1900) 141 (= *Anoectochilus Tashiroi*).—Japon.
yunnanensis, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 43.—China.

ODONTOGLOSSUM, H. B. & K. (Orchid.).
amabile, *Hort. ex Gard. Chron.* 1905, i. 197.—Hybr.
Lawrenceanum, *Hort. l. c.*—Hybr.

ODONTONEMA, Nees (Acanth.).
[THYRSACANTHUS, Nees. I. K.]
adenostachyum, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 404.—Peruv.

ODONTONIA, Rolfe, in Gard. Chron. 1905, II. 2. *ORCHIDACEAE.*
Lairesseae, *Rolfe, l. c.*—Hybr.

ODONTONYCHIA, Small, Fl. S. E. U. S. 401 (1903). *ILLECEBRACEAE.*
corymbosa, *Small, l. c.* 402 (= *Siphonychia corymbosa*). —Am. bor.
erecta, *Small, l. c.* 401 (= *Siphonychia erecta*).—Am. bor.

ODONTYCHIUM, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib. 59 (1904). *ZINGIBERACEAE.*
denticulatum, *K. Schum. l. c.* 60 (= *Hedychium denticulatum*).—Penins. Mal.

OENANTHE, Tourn. (Umbell.).
Biebersteinii, *Simon, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* i. 93.—Eur.
caucasica, *Simon, l. c.* 99.—Reg. Caucas.
chalcidica, *Simon, l. c.* 161.—Graecia.
gallaecica, *Pau & Merino, ex Merino, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 493.—Hispan.
media, *Simon, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* i. 72. —Eur.
rivularis, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 496.—China.
Schlechteri, *Wolff, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 333.—N. Guin.
sinensis, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 496.—China.

OENONE, Tul. = **Ligea**, Tul. (Podost.).
batrachifolia, Mildb. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 147.—Reg. Amaz.

OENOTHERA, Linn. (Onagr.).
albida, *De Vries, in Rev. Gén. de Bot.* xiii. 11.—Hort.
argillicola, *Mackenzie, in Torreya*, iv. 56.—Am. bor.
Autrani, *Léveillé, Monogr. Onoth.* 208 A.—Calif.
Barbeyana, *Léveillé, l. c.* 43.—Boliv.
communis, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiii. (1904) 286, nomen.—Gallia.
eulobus, *Léveillé, Monogr. Onoth.* 231 (= *Eulobus californicus*).—Calif.
Gayophytum, *Léveillé, l. c.* 166 (= *Gayophytum spp. plur.*).—Am. bor. et austr.
genistifolia, Léveillé, l. c. 208 = crassifolia.
gigas, *De Vries, in Rev. Gén. de Bot.* xiii. 11.—Hort.
gracilis, *Léveillé, Monogr. Onoth.* 167 (= *Gayophytum gracile*).—Chili.
graminifolia, *Léveillé, l. c.* 42.—Mexic.
Howardi, *Jones, in Zoe*, iii. 301 (1893).—Am. bor.
Jonesi, *Léveillé, Monogr. Onoth.* 208 A.—Calif.
Kuntziana, *Léveillé, l. c.* 43.—Boliv.
lata, *De Vries, in Rev. Gén. de Bot.* xiii. 11.—Hort.
nanella, *De Vries, l. c.* 12.—Hort.
oblonga, *De Vries, l. c.* 11.—Hort.
primaloides, *Léveillé, Monogr. Onoth.* 65.—Am. bor.
punctata, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 316.—As. bor.
pygmaea, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901) repr. 53.—Patag.
rubrinervis, *De Vries, in Rev. Gén. de Bot.* xiii. 11.—Hort.
scabra, *Krause, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 166.—Boliv.
scintillans, *De Vries, in Rev. Gén. de Bot.* xiii. 12.—Hort.
serratifolia, *Krause, in Fedde Repert. Nov. Sp.* i. 166. —Boliv.
Shimeki, *Léveillé & Guffe. Monogr. Onoth.* 119.—Am. bor.
strigosa, *Mackenzie & Bush, Fl. Jacks. County*, 139. —Am. bor.
taraxacifolia, *Léveillé & Guffe. Monogr. Onoth.* 73.—Am. bor.
torulosa, *Léveillé, l. c.* 176 (= *Sphaerostigma spp. plur.*). —Am. bor. et austr.
Weberbaueri, *Krause, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 169.—Peruv.

OLAX, Linn. (Olac.).
major, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 86.—Afr. trop.
obtusifolia, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 177.—Afr. trop.

OLDENLANDIA, Linn. (Rubiac.).
cicendioides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 333.—Afr. trop.
congensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 764.—Afr. trop.
coronata, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 950 (= *Hedyotis connata*).—Siam.
costata, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 330 (= *Hedyotis vestita*).—Malaya; Ind. or.
fasciculata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1106 (= *Hedyotis fasciculata*).—Am. bor.
fruticulosa, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 475.—Ins. Carol.
inconspicua, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 129 (= *Hedyotis inconspicua*).—Chili.
Kaessneri, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 249.—Afr. trop.
Kimuenzae, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 75.—Afr. trop.
luzuloides, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 411.—Afr. trop.
malacophyton, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 333.—Afr. trop.
microcoryne, *K. Schum. l. c.* xxxii. 144.—Afr. trop.
peduncularis, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 951 (= *Hedyotis peduncularis*).—Penins. Mal.
platyphylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 334.—Afr. trop.
procurrens, *K. Schum. l. c.* xxxiv. 329.—Afr. trop.
prolixipes, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 351.—Afr. trop.
Proschii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vi. 8.—Afr. trop.
rhodesiana, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 250.—Afr. trop.

OLDENLANDIA :—
rhynchotheca, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 334. —Afr. trop.
subtilis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1906, 249.—Afr. trop.
trichotoma, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 880. —Afr. austr.

OLEA, Tourn. (Oleac.).
graciliflora, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lix. (1902) 254.—Java.
Hochstetteri, *Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 17. —Afr. trop.
somaliensis, *Baker, l. c.* 18.—Afr. trop.

OLEOXYLON, Roxb. in Trans. Soc. Arts Lond. xxiii. (1805) 413. *DIPTEROCARPACEAE.*
balsamifera, *Roxb. l. c.*—Burma.

OLFA, Adans. = **Isopyrum**, Linn. (Ranunc.).
thalictrifolia, Bub. Fl. Pyren. iii. 376 = I. thalictrifolium.

OLIGANTHES, Cass. (Compos.).
Jelskii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 461.—Peruv.

OLIGOCLADUS, Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 527 (1902). *UMBELLIFERAE.*
andinus, *Chod. & Wilcz. l. c.* 528.—Reg. Argent.

OLIGOMERIS, Cambess. (Resed.).
lycopodioides, *Schinz & Dinter, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 812.—Afr. trop.

OLIGONEURON, Small, Fl. S. E. U. S. 1188 (1903). *COMPOSITAE.*
canescens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 652.—Am. bor.
corymbosum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1188 (= *Solidago corymbosa*).—Am. bor.
nitidum, *Small, l. c.* (= *Solidago nitida*).—Am. bor.
rigidum, *Small, l. c.* (= *Solidago rigida*).—Am. bor.

OLIGOSPORUS, Cass. = **Artemisia**, Linn. (Compos.).
brachylobus, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 25 = A. campestris.

OLIVERANTHUS, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 27 (1905). *CRASSULACEAE.*
elegans, *Rose, l. c.*—Mexic.

OLIVERELLA, Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1903) 2 = **Oliveranthus**, Rose (Crassul.).
elegans, Rose, l. c. = Oliveranthus elegans.

OLMEDIELLA, Baill. (Urtic.).
Betschleriana, *Loesen. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 181 (= *Ilex Betschleriana*).—Mexic.

OLYRA, Linn. (Gramin.).
Pittieri, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 461.—Am. cent.

OMANIA, S. Moore, in Journ. Bot. 1901, 258. *SCROPHULARIACEAE.*
arabica, *S. Moore, l. c.*—Arab.

OMPHALOCARPUM, Beauv. (Sapot.).
anocentrum, *Pierre, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 16.—Afr. trop.
congolense, *Pierre, in Engl. l. c.* 14.—Afr. trop.
Lecomteanum, *Pierre, in Engl. l. c.* 15.—Afr. trop.
ogouense, *Pierre, in Engl. l. c.* 17.—Afr. trop.
Pierreanum, *Engl. l. c.* 14.—Afr. trop.
Trillesianum, *Pierre, in Engl. l. c.* 13.—Afr. trop.

ONAGRA, Tourn. = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).
fusca, Krause, in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 167.—Peruv.
grandiflora, Vail, in Torreya, v. 9 (= *Oenothera grandiflora*).—Am. bor.

ONCIDIUM, Sw. (Orchid.).
echinatum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 339 (= *Baptistonia echinata*).—Bras.
Edwallii, *Cogn. l. c.* 383.—Bras.
Kraenzlinianum, *Cogn. l. c.* 371 (= *Cyrtochilum micranthum*).—Bras.
Loefgrenii, *Cogn. l. c.* 381.—Bras.
platybulbon, *Regel, in Gartenfl.* 1903, 449.—Bras.

ONCIDIUM:—
Rivtereanum, *Hort. ex Wibier, in Rev. Hortic. Belge*, xxx. 144; *et in Le Jardin*, 1904, 237.—Bras.
verrucosissimum, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 341.—Bras.
volubile, *Cogn. l. c.* 289 (=*Cyrtochilum volubile*).—Bras.; Peruv.
Waluewa, *Rolfe, in Kew Hand-List Orch.* ed. II. 167 (=*Waluewa pulchella*).—Bras.

ONCINOTIS, Benth. (Apocyn.).
Batesii, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 221.—Afr. trop.
chlorogena, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 320.—Afr. trop.
glandulosa, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 221.—Afr. trop.
subsessilis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 321.—Afr. trop.
thyrsiflora, *K. Schum. ex Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 612.—Afr. trop.

ONCOBA, Forsk. (Bixac.).
angustipetala, *Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* i. 13.—Afr. trop.
brevipes, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 84.—Afr. trop.
fragrans, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 357.—Afr. trop.
Gilgiana, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. v. 1164.—Afr. trop.
longipes, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 309.—Afr. trop.

ONCOSTEMUM, A. Juss. (Myrsin.).
acuminatum, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 201.—Madag.
ankifiense, *Mez, l. c.* 197.—Madag.
balanocarpum, *Mez, l. c.* 195.—Madag.
Barbeyanum, *Mez, l. c.* 206.—Madag.
brevipedatum, *Mez, l. c.* 197.—Madag.
crenatum, *Mez, l. c.* 203.—Madag.
dissitiflorum, *Mez, l. c.* 204 (=*Ardisia dissitiflora*).—Madag.
evonymoides, *Mez, l. c.* 206.—Madag.
falcifolium, *Mez, l. c.* 201.—Madag.
filicinum, *Mez, l. c.* 208.—Madag.
Forsythii, *Mez, l. c.* 198.—Madag.
fuscopilosum, *Mez, l. c.* 202 (=*Ardisia fuscopilosa*).—Madag.
gracile, *Mez, l. c.* 203.—Madag.
Hildebrandtii, *Mez, l. c.* 198.—Madag.
Humblotii, *Mez, l. c.* 194.—Ins. Comor.
laevigatum, *Mez, l. c.* 198.—Madag.
latifolium, *Mez, l. c.* 200 (=*Ardisia Sieberi*).—Ins. Maurit.
laurifolium, *Mez, l. c.* 193 (=*Badula laurifolia*).—Madag.
laxiflorum, *Mez, l. c.* 196.—Madag.
leprosum, *Mez, l. c.* 199.—Madag.
leptocladum, *Mez, l. c.* 207 (=*Ardisia leptoclada*).—Madag.
longipes, *Mez, l. c.* 196 (=*Ardisia longipes*).—Madag.
macrophyllum, *Mez, l. c.*—Madag.
macroscyphon, *Mez, l. c.* 208 (=*Ardisia macroscyphon*).—Madag.
macrostachyum, *Mez, l. c.* 195.—Madag.
microphyllum, *Mez, l. c.* 203 (=*Ardisia microphylla*).—Madag.
nitidulum, *Mez, l. c.* 197 (=*Ardisia nitidula*).—Madag.
oliganthum, *Mez, l. c.* 206 (=*Ardisia oligantha*).—Madag.
pachybotrys, *Mez, l. c.* 196.—Madag.
pendulum, *Mez, l. c.* 195.—Ins. Comor.
platyphyllum, *Mez, l. c.* 193.—Ins. Maurit.
pterocaule, *Mez, l. c.* 200.—Madag.
racemiferum, *Mez, l. c.* 194.—Ins. Comor.
Radlkoferi, *Mez, l. c.* 196.—Madag.
reflexum, *Mez, l. c.* 197.—Madag.
reticulatum, *Mez, l. c.* 193 (=*Badula reticulata*).—Ins. Maurit.
roseum, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 576.—Madag.
scabridum, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 205.—Madag.
tenerum, *Mez, l. c.* 201.—Madag.
umbellatum, *Mez, l. c.* 205 (=*Ardisia umbellata*).—Madag.

ONOBRYCHIS, Linn. (Legum.).
Echidna, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 94.—As. cent.
picta, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 847.—Persia.
psammophila, *Bornm. l. c.* 846.—Persia.
schugnanica, *Fedtsch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 129.—As. cent.

ONONIS, Linn. (Legum.).
decipiens, *Aznav. in Magyar Bot. Lap.* ii. 138.—Eur.
glabrescens, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 165.—Alger.
leptocarpa, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* i. 29.—Hispan.

ONOPORDON, Linn. (Compos.).
longissimum, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 69.—Hispan.
Mandraliscae, *Lojac. Fl. Sic.* ii. i. 162.—Sicil.
messeniacum, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* ii. 122.—Eur.

ONOSERIS, DC. (Compos.).
conspicua, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 268 (=*Rhodoseris conspicua*).—Mexic.
rupestris, *Greenm. l. c.* (=*Caloseris rupestris*).—Mexic.
silvatica, *Greenm. l. c.* 51.—Am. cent.

ONOSMA, Linn. (Borag.).
amplitatum, *Velen. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 45.—Tauria.
subsericeum, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 274.—Oriens.

ONOSMODIUM, Michx. (Borag.).
Helleri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1000.—Am. bor.
hispidissimum, *Mackenzie, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 500.—Am. bor.
occidentale, *Mackenzie, l. c.* 502.—Am. bor.

OONOPSIS, Greene (Compos.).
monocephala, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 399.—Am. bor.

OPERCULARIA, Gaertn. (Rubiac.).
acolytantha, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 547.—Austral.

OPERCULINA, Silva (Convolv.).
[Ipomoea, Linn. I. K.]
leptoptera, *Urb. Symb. Antill.* iii. 342.—Ind. occ.
macrocarpa, *Urb. l. c.* 343 (=*Convolvulus macrocarpus*).—Ind. occ.

OPHIOCAULON, Hook. f. (Passifl.).
firingalavense, *Drake, ex Jumelle, in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxxvii. 206.—Madag.

OPHIOPOGON, Ker-Gawl. (Haemodor.).
malayanus, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 34.—Penins. Mal.

OPHIORRHIZA, Linn. (Rubiac.).
amnicola, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 391.—N. Guin.
brachycarpa, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 331.—Malaya.
crispa, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 392.—N. Guin.
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 176.—Penins. Mal.
tenella, *King, l. c.* 175.—Penins. Mal.
torricellensis, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 392.—N. Guin.

OPHRYOSPORUS, Meyen (Compos.).
venosissimus, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xli. 271 (=*Eupatorium venosissimum*).—Boliv.

OPHRYS, Linn. (Orchid.).
ambusta, *Picard, in Zeitschr. Naturw.* lxxvii. (1905) 363, *ex Fedde, Repert. Nov. Sp.* iii. (1906) 31.—Hab.?
auriculata, *House, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 379 (=*Listera auriculata*).—Am. bor.
australis, *House, l. c.* (=*Listera australis*).—Am. bor.
borealis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 610 (=*Listera borealis*).—Am. bor.
caurina, *Rydb. l. c.* (=*Listera caurina*).—Am. bor.
convallarioides, *W. F. Wight, ex House, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 380 (=*Listera convallarioides*).—Am. bor.
Grampini, *Cortesi, in Ann. di Bot. Roma*, i. 359.—Hybr.

OPHRYS:—
lyrata, *Fleischm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1904, 474.—Hybr.
Muellneri, *Fleischm. l. c.* 471.—Eur.
nephrophylla, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 610 (=*Listera nephrophylla*).—Am. bor.
Smallii, *House, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 379 (=*Listera Smallii*).—Am. bor.

OPLISMENUS, Beauv. (Gramin.).
minus, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 9.—Ins. Philipp.
oplismenoides, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, ix. 7 (=*Lappago oplismenoides*).—Reg. Argent.

OPOPONAX, Koch (Umbell.).
bulgaricum, *Velen. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 51.—Eur.

OPULASTER, Medic. (Rosac.).
[Neillia, D. Don. I. K.]
bracteatus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 558.—Am. bor.
glabratus, *Rydb. l. c.* 559.—Am. bor.
intermedius, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 492.—Am. bor.
Ramaleyi, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 367.—Am. bor.

OPUNTIA, Tourn. (Cact.).
albiflora, *K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* t. 152.—Parag.
anacantha, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 513.—Reg. Argent.
Arechavaletai, *Speg. l. c.* 520.—Reg. Argent.
aulacothele, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 392.—Reg. Argent.
austrina, *Small, Fl. S. E. U. S.* 816.—Am. bor.
Bergeriana, *A. Weber, ex A. Berger, in Gard. Chron.* 1904, i. 34.—Hab.!
bonaerensis, *Speg. Contrib. Fl. Tandil*, 15.—Reg. Argent.
canina, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 518.—Reg. Argent.
cantabrigiensis, *Lynch, in Gard. Chron.* 1903, i. 98.—Hab.?
Canterai, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 275.—Urug.
chakensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 519.—Reg. Argent.
Chapistle, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 388.—Mexic.
cordobensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 513.—Reg. Argent.
Darrahiana, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 388.—Ind. occ.
Gosseliniana, *A. Weber, in Bull. Soc. Acclim. Fr.* 1902, 83; *et ex K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* t. 154.—Mexic.
grandiflora, *Small, Fl. S. E. U. S.* 816.—Am. bor.
Grosseiana, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 391.—Parag.
haematocarpa, *A. Berger, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 456.—Hab.!
Hanburyana, *A. Weber, ex A. Berger, in Gard. Chron.* 1904, i. 34.—Hab.!
Helleri, *K. Schum. ex Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 180.—Ins. Galap.
hypsophila, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 509.—Reg. Argent.
inaequilateralis, *A. Berger, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 453.—Hab.?
Kiska-loro, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 516.—Reg. Argent.
lagopus, *K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* t. 151.—Boliv.
leptarthra, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 393.—Mexic.?
Maihuen, *C. Gay, Fl. Chil.* iii. 29.—Chili.
maldonadensis, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 286.—Urug.
Mieckleyi, *K. Schum. Blühende Kakteen*, t. 44.—Parag.
montevideensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 515; *et ex Arech. in Anal. Mus. Montevid.* v. 282.—Reg. Argent.
Nashii, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 446.—Ind. occ.
pachypus, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* 1904, 26.—Peruv.

OPUNTIA:—
penicilligera, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 291.—Patag.
purpurea, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 128.—Reg. Argent.
retrorsa, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 517.—Reg. Argent.
Schumanni, *A. Weber, ex A. Berger, in Gard. Chron.* 1904, i. 34.—Hab.?
Schumanni, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 511 (1905).—Reg. Argent.
subterranea, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 122.—Reg. Argent.
Utkilio, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 516.—Reg. Argent.
velutina, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 389.—Mexic.
Wagneri, *A. Weber, l. c.* 393.—Reg. Argent.
Weberi, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 509.—Reg. Argent.
Winteriana, *A. Berger, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 455.—Hab.?

ORANIA, Zipp. (Palm.).
Palindan, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxvii. 88 (= *Caryota Palindan*).—Ins. Philipp.
paraguanensis, *Becc. in Martelli, Webbia*, 335.—Ins. Philipp.

ORBIGNYA, Mart. (Palm.).
Dammeriana, *Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras.* i. 63.—Bras.
speciosa, *Barb. Rodr. l. c.* 60 (= *Attalea speciosa*).—Bras.
Urbaniana, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxi. *Beibl.* lxx. 23.—Bras.

ORCHIS, Tourn. (Orchid.).
Chondradenia, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 89.—Japon.
cochleata, *Fleischm. & M. Schulze, in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xvii. 46.—Eur.
genevensis, *Chenev. in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève*, ix. 119.—Hybr.
geniculata, *Finet, in Rev. Gén. Bot.* xiii. 505.—China.
Giraldiana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 25.—China.
Hoteri, *M. Schulze, in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xvii. 39.—Hybr.
imberilla, Soland. ex Britten, in Journ. Bot. 1904, 181 = Habenaria intacta.
Jaccardi, *Chenev. in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève*, ix. 127.—Hybr.
Joo iokiana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 57.—Japon.
Kromayeri, *M. Schulze, in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xix. 112.—Hybr.
Ladurneri, *Murr, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 105.—Hybr.
linearis, *Tourl. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 312.—Hybr.?
Mauri, Jord. ex Cortesi, in Ann. di Bot. Roma, i. 173 = tridentata.

OREOBATUS, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 274. *ROSACEAE.*
deliciosus, *Rydb. l. c.* 275 (= *Rubus deliciosus*).—Am. bor.
neo-mexicanus, *Rydb. l. c.* (= *Rubus neo-mexicanus*).—Am. bor.

OREOCARYA, Greene (Borag.).
aperta, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 241.—Am. bor.
argentea, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 637.—Am. bor.
cana, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 30.—Am. bor.
celosioides, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 240.—Am. bor.
cristata, *Eastw. l. c.* 244.—Am. bor.
disticha, *Eastw. l. c.* 238.—Am. bor.
elata, *Eastw. l. c.* 241.—Am. bor.
eulophus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 637.—Am. bor.
horridula, *Greene, Pl. Baker.* iii. 20.—Am. bor.
Lemmoni, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 239.—Am. bor.
nana, *Eastw. l. c.* 243.—Am. bor.
nitida, *Greene, Pl. Baker.* iii. 21.—Am. bor.
pulvinata, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 63.—Am. bor.

OREOCARYA:—
Shockleyi, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 245.—Am. bor.
tenuis, *Eastw. l. c.* 244.—Am. bor.
Wetherillii, *Eastw. l. c.* 242.—Am. bor.

OREODOXA, Willd. (Palm.).
caribaea, *Damm. & Urb. in Urb. Symb. Antill.* iv. 129 (= *Euterpe caribaea*).—Ind. occ.

OREOLIRION, E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 571. *IRIDACEAE.*
arizonicum, *E. P. Bickn. l. c.* (= *Sisyrinchium arizonicum*).—Am. bor.
platyphyllum, *E. P. Bickn. l. c.* (= *Sisyrinchium platyphyllum*).—Mexic.

OREOPANAX, Decne. & Planch. (Aral.).
chinense, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 500.—China.
meiocephalum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 210.—Am. cent.
pycnocarpum, *Donn. Sm. l. c.* xxxi. 113.—Am. cent.

OREORCHIS, Lindl. (Orchid.).
Rolfei, *Duthie, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 38.—Ind. or.

OREOTHYRSUS, Lindau, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 388. *ACANTHACEAE.*
glabrisepalus, *Lindau, l. c.* 389.—N. Guin.
pubisepalus, *Lindau, l. c.*—N. Guin.

ORIASTRUM, Poepp. & Endl. = **Chaetanthera**, Ruiz & Pav. (Compos.).
albiflorum, Reiche, Fl. Chile, iv. 354 (= *Tylloma albiflorum*).—Chili.
sphaeroidale, Reiche, l. c. 358.—Chili.

ORICIA, Pierre (Rutac.).
leonensis, *Engl. Jahrb.* xxxii. 120.—Afr. trop.

ORLAYA, Hoffm. = **Daucus**, Tourn. (Umbell.).
media, Calest. in Martelli, Webbia, 206.—Graecia.
pumila, Halacsy, Consp. Fl. Graec. i. 622 = D. pumilus.

ORMOCARPUM, Beauv. (Legum.).
affinis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 197.—Afr. trop.
scandens, Teysm. ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxx. 64 = Dalbergia Beccarii.

ORMOSIA, Jacks. (Legum.).
Brasseuriana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 188.—Afr. trop.
paniculata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 21.—Ins. Philipp.
striata, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 492.—China.
tavoyana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 46.—Burma.

ORNITHIDIUM, Salisb. (Orchid.).
Loefgrenii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 92.—Bras.
pendulum, *Cogn. l. c.* (= *Scaphyglottis pendula*).—Bras.; Peruv.
Weberbauerianum, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 91.—Peruv.

ORNITHOCARPA, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. (1905) 293. *CRUCIFERAE.*
fimbriata, *Rose, l. c.*—Mexic.

ORNITHOCEPHALUS, Hook. (Orchid.).
multiflorus, *Rolfe, in Kew Bull.* 1901, 149.—Bras.

ORNITHOGALUM, Tourn. (Liliac.).
Dinteri, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 854.—Afr. trop.
Dioscoridis, Bub. Fl. Pyren. iv. 82 = umbellatum.
dipcadioides, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 999.—Afr. trop.
longiscapum, *Baker, l. c.* i. 854.—Afr. austr.
macedonicum, *Velen. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 45.—Turcia.
minimum, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 999.—Afr. austr.
Pentheri, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xv. 23.—Afr. austr.
pretoriense, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 855.—Afr. austr.
Rautanenii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 937.—Afr. austr. oc.

ORNITHOGALUM:—
Sintenisi, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 911.—Oriens.
stenophyllum, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 855.—Afr. austr.
stenostachyum, *Baker, l. c.*—Afr. austr.
tenuipes, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1901, 136.—Afr. austr.
umgenense, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 856.—Afr. austr.

ORNITHOPUS, Linn. (Legum.).
micranthus, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 343 (= *Arthrolobium micranthum*).—Urug.

OROBANCHE, Tourn. (Orobanch.).
insolita, *Guim. in Broteria*, iii. (1904) 91.—Lusit.
Sintenisii, *Beck, ex Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 680.—Armenia.
xanthochroa, *A. Nelson & Cockerell, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 278.—Am. bor.

OROBUS, Tourn. = **Lathyrus**, Tourn. (Legum.).
Nicolai, *Rohl. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 17, 26.—Montenegr.

OROPETIUM, Trin. (Gramin.).
erythraeum, *Chiov. in Ann. di Bot. Roma*, ii. 386.—Afr. trop.

OROPHACA, Britton (Legum.).
aretioides, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 668.—Am. bor.
tridactylica, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus tridactylicus*).—Am. bor.

OROPHEA, Blume (Anonac.).
glabra, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 14.—Ins. Philipp.
maculata, *Merrill, l. c.* xxxv. 11.—Ins. Philipp.

OROXYLON, Vent. (Bignon.).
flavum, *Rehd. in Sarg. Trees & Shrubs*, 193, t. 92.—China.

ORTACHNE, Nees = **Aristida**, Linn. (Gramin.).
floridana, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 119 = A. floridana.

ORTHOCARPUS, Nutt. (Scrophul.).
barbatus, *J. S. Cotton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 574.—Am. bor.
bicolor, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 59.—Calif.
Brownii, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 210.—Calif.
exsertus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 109.—Calif.
falcatus, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 212.—Calif.
maculatus, *Eastw. l. c.* 210.—Calif.
noctuinus, *Eastw. l. c.* 211.—Calif.
olympicus, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvi. 60.—Am. bor.
psittacinus, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 78.—Am. bor.
tenuis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 45.—Calif.

ORTHOSIPHON, Benth. (Labiat.).
Bodinieri, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 170.—China.
glabrescens, *Vaniot, l. c.* 169.—China.
gofensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 263.—Afr. trop.
inconcinnus, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 991.—Afr. austr.
Kelleri, *Briq. l. c.* 988.—Afr. trop.
lanceolatus, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 360.—Afr. trop.
Merkeri, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 208.—Afr. trop.
neglectus, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 988.—Afr. austr.
Newtonii, *Briq. l. c.* 990.—Afr. trop.
obscurus, *Briq. l. c.* 989.—Afr. trop.
rhodesianus, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 50.—Afr. trop.
unyikensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxx. 400.—Afr. trop.
viatorum, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 199.—Afr. trop.

ORTHOSTEMON, R. Br. (Gentian.).
[CANSCORA, Lam. I. K.]
Kirkii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 558 (= *Canscora Kirkii*).—Afr. trop.

ORYZA, Linn. (Gramin.).
oryzoides, Brand, in Koch, Syn. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. III. iii. 2704 (= Phalaris oryzoides).—Eur.; As.; Am. bor.
stenothyrsus, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 57.—N. Guin.

ORYZOPSIS, Michx. (Gramin.).
bicolor, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 6 (= Stipa bicolor).—Reg. Argent.
fasciculata, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 10. —Ind. or.
Grisebachi, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 4.—Reg. Argent.
Hackeli, Speg. l. c. 10 (= Stipa Hackeli).—Reg. Argent.
lasiantha, Speg. l. c. 1 (= Piptochaetium lasianthum). —Reg. Argent.
leiocarpa, Speg. l. c.—Reg. Argent.
leiopoda, Speg. l. c. 19.—Reg. Argent.
molinioides, Hack. ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1903, 165 (= Piptatherum molinioides).—As. cent.
napostaensis, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 15. —Reg. Argent.
ovata, Speg. l. c. 21 (= Stipa ovata).—Reg. Argent.
panicoides, Speg. l. c. 31 (= Piptochaetium panicoides). —Reg. Argent.
purpurascens, Hack. ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1903, 164.—As. cent.
Ruprechtiana, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 12 (= Piptochaetium Ruprechtianum).—Reg. Argent.
stipoides, Speg. l. c. 23 (= Piptochaetium stipoides).—Reg. Argent.
tuberculata, Speg. l. c. 26 (= Piptochaetium tuberculatum).—Reg. Argent.
uruguayensis, Speg. l. c. 29 (= Piptochaetium uruguayense).—Reg. Argent.
verruculosa, Speg. l. c. 28 (= Piptochaetium verruculosum).—Am. austr.

OSBECKIA, Linn. (Melast.).
liberica, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 98.—Afr. trop.

OSMARONIA, Greene = **Nuttallia**, Torr. & Gray (Rosac.).
bracteosa, Greene, Pittonia, v. 310.—Calif.
demissa, Greene, l. c.—Calif.
laurina, Greene, l. c. 311.—Calif.
obtusa, Greene, l. c. 310.—Calif.
padiformis, Greene, l. c. 311.—Calif.

OSMIA, Sch. Bip. (Compos.).
[EUPATORIUM, Tourn. I. K.]
conyzoides, Small, Fl. S. E. U. S. 1164 (= Eupatorium conyzoides).—Am. bor.
heteroclinia, Small, l. c. (= Eupatorium heteroclinium). —Am. bor.
ivaefolia, Small, l. c. 1163 (= Eupatorium ivaefolium). —Am. bor.

OSMORHIZA, Rafin. (Umbell.).
aristata, Makino & Yabe, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 14 (= Chaerophyllum aristatum).—Japon.
Claytoni, Mack. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. iii. 638 (= Myrrhis Claytoni).—As.; Am. bor. et austr.
divaricata, Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot. i. 91 (= Washingtonia divaricata).—Am. bor.
intermedia, Blank. l. c. 93 (= Washingtonia intermedia). —Am. bor.
Leibergii, Blank. l. c. (= Washingtonia Leibergi).—Am. bor.
obtusa, Fernald, in Rhodora, iv. 154 (= Washingtonia obtusa).—Am. bor.

OSTEOSPERMUM, Linn. (Compos.).
glabrum, N. E. Br. in Kew Bull. 1901, 125.—Afr. austr.
Hamiltoni, S. Moore, in Journ. Bot. 1903, 136.—Afr. austr.
tripinnatum, Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc. xvi. 140.—Afr. austr.

OSTRYA, Michx. (Cupul.).
Baileyi, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 293.—Am. bor.
guatemalensis, Rose, l. c. 292.—Am. cent.
mexicana, Rose, l. c.—Am. cent.

OSTRYOCARPUS, Hook. f. (Legum.).
major, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 96.—Afr. trop.

OTANTHERA, Blume (Melast.).
montana, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 327.—N. Guin.
setulosa, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. l. c.—N. Guin.

OTHAKE, Rafin. = **Polypteris**, Nutt. (Compos.).
callosum, Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, xiv. 174 = P. callosa.
Hookerianum, Bush, l. c. 177 = P. Hookeriana.
Lindenii, Bush, l. c. 178 = P. Lindenii.
maximum, Bush, l. c. 179 = P. maxima.
Reverchoni, Bush, l. c. 180.—Am. bor.
roseum, Bush, l. c. 175.—Am. bor.
texanum, Bush, l. c. 176 = P. texana.

OTIOPHORA, Zucc. (Rubiac.).
pulchella, K. Schum. ex Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 230.—Afr. trop.
• pycnoclada, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxx. 415.—Afr. trop.

OTOMERIA, Benth. (Rubiac.).
heterophylla, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. 336. —Afr. trop.

OTOPAPPUS, Benth. (Compos.).
syncephalus, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xl. 6.—Am. cent.

OTOPHORA. Blume (Sapind.).
pinnata, Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull. i. 35 (= Capura pinnata).—Ins. Philipp.

OTOPHYLLA, Benth. = **Gerardia**, Linn. (Scrophul.).
auriculata, Small, Fl. S. E. U. S. 1075 = G. auriculata.
densiflora, Small, l. c. = G. densiflora.

OTOSTEGIA, Benth. (Labiat.).
Ellenbeckii, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxvi. 126.—Afr. trop.
Erlangeri, Guerke, l. c. 125.—Afr. trop.

OTTELIA, Pers. (Hydrocharid.).
abyssinica, Guerke, in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers. 540 (= Boottia abyssinica).—Afr. trop.
Baumii, Guerke, in Warb. Kunene Sambesi Exped. 171.—Afr. trop.
benguellensis, Guerke, l. c. 172.—Afr. trop.
bongoensis, Guerke, in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers. 543.—Afr. trop.
brevifolia, Guerke, in Urb. & Graebn. l. c.—Afr. trop.
Buchneri, Guerke, in Urb. & Graebn. l. c. 545.—Afr. trop.
latifolia, Wildem. Pl. Nov. Hort. Then. t. 33.—Afr. trop.
massaiensis, Guerke, in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers. 544.—Afr. trop.
Rohrbachiana, Guerke, in Urb. & Graebn. l. c. 541 (= Boottia Rohrbachiana).—Afr. trop.
Schweinfurthii, Guerke, in Urb. & Graebn. l. c. 543.—Afr. trop.
Verdickii, Gürke, ex Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 171.—Afr. trop.

OUBANGUIA, Baill. (Olac.).
denticulata, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. IX. i. 328.—Afr. trop.
Duchesnei, Van Tiegh. l. c. 328 (= Scytopetalum Duchesnei).—Afr. trop.
Klainei, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
laurifolia, Pierre, in Wildem. Enum. Pl. Laurent, 150 (= Egassea laurifolia).—Afr. trop.
Pierreana, Wildem. l. c. (= Egassea Pierreana).—Afr. trop.
Tholloni, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. IX. i. (1905) 327.—Afr. trop.

OURATEA, Aubl. (Ochnac.).
[GOMPHIA, Schreb. I. K.]
acutissima, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 255.—Afr. trop.
Afzelii, Gilg, l. c. 267.—Afr. trop.
angulata, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 259.—Bras.
angusta, Van Tiegh. l. c. 261.—Bras.
angustifolia, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 269, descr. ampl.—Afr. trop.

OURATEA:—
attenuata, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 259.—Bras.
Beccariana, Bartell. in Malpighia, xv. 159.—Borneo.
boliviana, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 263.—Boliv.
borneensis, Bartell. in Malpighia, xv. 156.—Borneo.
brachybotrys, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 270.—Afr. trop.
bracteata, Gilg, l. c. 264.—Afr. trop.
brunneo-purpurea, Gilg, l. c. 266.—Afr. trop.
Buchholzii, Gilg, l. c. 254.—Afr. trop.
Buchneri, Gilg, l. c. 270.—Afr. trop.
bukobensis, Gilg, l. c. 271.—Afr. trop.
Cabrae, Gilg, l. c. 262.—Afr. trop.
calantha, Gilg, l. c. 259.—Afr. trop.
Candollei, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 186 (= Gomphia Candollei).—Am. trop.
Claussenii, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 293 (= Gomphia Claussenii).—Bras.
Conrauana, Engl. & Gilg, ex Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 260.—Afr. trop.
cordata, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 262.—Bras.
coriacea, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. III. i. 36.—Afr. trop.
cornata, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 260.—Bras.
crassa, Van Tiegh. l. c. 262.—Bras.
crenata, Van Tiegh. l. c. 259 (= Gomphia crenata).—Bras.
crispa, Van Tiegh. l. c. 262.—Bras.
decipiens, Van Tiegh. l. c. 258.—Bras.
decorans, Van Tiegh. l. c. 256 (= Gomphia decorans). —Bras.
densiflora, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. III. i. 37 (Maii 1901).—Afr. trop.
densiflora, Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 174 (Jul. 1901). —Bras.
densiflora, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. (1902) 259 (= Gomphia densiflora).—Bras.
denudata, Van Tiegh. l. c. 263.—Boliv.
Dewevrei, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. III. i. 37.—Afr. trop.
digitata, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 259.—Bras.
Dinklagei, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 265.—Afr. trop.
disticha, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 260.—Bras.
Dusenii, Engl. & Gilg, ex Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 260.—Afr. trop.
Engleri, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 259.—Bras.
erythrocalyx, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 187 (= Gomphia erythrocalyx).—Bras.
febrifuga, Engl. & Gilg, ex Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 257.—Afr. trop.
Glaziovi, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 261.—Bras.
Hassleriana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 740.—Parag.
heterodonta, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 262.—Bras.
Hilaireana, Van Tiegh. l. c. 258.—Bras.
insculpta, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 268.—Afr. trop.
integrifolia, Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 670.—Madag.
isophylla, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 293 (= Gomphia isophylla).—Guiana.
itineraria, Van Tiegh. l. c. 293 (= Ochna itineraria).—Bras.
jamaicensis, Van Tiegh. l. c. 257 (= Gomphia jamaicensis).—Ind. occ.
latifolia, Van Tiegh. l. c. 255 (= Gomphia latifolia).—Bras.
Lecomtei, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 51.—Afr. trop.
Leprieuri, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 263.—Guiana.
leptoneura, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 255.—Afr. trop.
Lessoni, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 614.—Ins. Ascension.
macranthos, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 293 (= Gomphia macranthos).—Bras.
macrobotrys, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 268.—Afr. trop.
macrophylla, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 262.—Bras.

OURATEA :—
macrostachys, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 293 (= *Gomphia macrostachys*).—Bras.
marginata, *Van Tiegh. l. c.* 261.—Bras.
monticola, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 272.—Afr. trop.
myrioneura, *Gilg, l. c.* 256.—Afr. trop.
neriifolia, *Bartell. in Malpighia*, xv. 158.—Borneo.
Oliveriana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 261.—Afr. trop.
palmata, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 260.—Bras.
panamica, *Van Tiegh. l. c.* 263.—Am. cent.
pauciflora, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 256.—Afr. trop.
Pilgeri, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 293.—Bras.
pinetorum, *Van Tiegh. l. c.* 257 (= *Gomphia pinetorum*).—Ind. occ.
plana, *Van Tiegh. l. c.* 258.—Bras.
Poeppigi, *Van Tiegh. l. c.* 257.—Bras.
Poggei, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 272.—Afr. trop.
pseudospicata, *Gilg, l. c.* 263.—Afr. trop.
Purdieana, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 263.—Ind. occ.
ramifera, *Van Tiegh. l. c.* 261.—Bras.
rhombica, *Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 35.—Bras.
Scheffleri, *Engl. & Gilg, ex Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 262.—Afr. trop.
Schlechteri, *Gilg, l. c.* 269.—Afr. trop.
sibangensis, *Gilg, l. c.* 267.—Afr. trop.
spinuloso-serrata, *Gilg, l. c.* 265.—Afr. trop.
stenorrhachis, *Gilg, l. c.* 254.—Afr. trop.
stipulata, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* 1902, 37 (= *Ochna stipulata*).—Bras.
subumbellata, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 254.—Afr. trop.
terminalis, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 293 (= *Ochna terminalis*).—Bras.
Tuerckheimii, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 249.—Am. cent.
umbricola, *Engl. ex Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 333; *Engl. & Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 259.—Afr. trop.
undulata, *Van Tiegh. l. c.* 260.—Bras.
unilateralis, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 268.—Afr. trop.
Vogelii, *Engl. ex Gilg, l. c.* 271 (= *Gomphia Vogelii*).—Afr. trop.
vulgaris, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 293 (= *Ochna vulgaris*).—Bras.
Weddelliana, *Van Tiegh. l. c.* 260.—Bras.
Zenkeri, *Engl. & Gilg, ex Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 258.—Afr. trop.

OURATELLA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 375 = **Ouratea**, Aubl. (Ochnac.).
Finlayi, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 193.—Ind. occ.
Lherminieri, Van Tiegh. l. c.—Ind. occ.
mexicana, Van Tiegh. l. c. = Ouratea mexicana.

OVIDIA, Meisn. (Thymel.).
tenera, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 598 (= *Daphne tenera*).—Patag.

OXALIS, Linn. (Geran.).
Brittoniae, *Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 577.—Am. bor.
coloradensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 243.—Am. bor.
Damazii, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 231.—Bras.
dispar, *N. E. Br. ex Hook. f. Bot. Mag.* t. 7794; *et in Kew Bull.* 1901, 138.—Guiana.
Gayi, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 539.—Am. austr.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 69.—Parag.
insignis, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 429.—N. Granat.
katangensis, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 18.—Afr. trop.
loricata, *Dusén, in Ofvers. Vet. Akad. Forhandl. Stockh.* lviii. (1901) 247; *et ex Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 540.—Patag.
morrumbalaensis, *Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* t. 36.—Afr. trop.
nahuelhuapiensis, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 22.—Patag.

OXALIS :—
paraguayensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 738.—Parag.
Pentheri, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xv. 46.—Afr. austr.
Prichardi, *Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 334.—Patag.
rufa, *Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 577.—Am. bor.
stenophylla, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 23.—Patag.

OXANDRA, A. Rich. (Anonac.).
[BOCAGEA, A. St. Hil. I. K.]
mediocris, *Diels, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 125.—Reg. Amaz.

OXERA, Labill. (Verben.).
neriifolia, Beauvis. Gen. Montrouz. 72 = oblongifolia.

OXYANTHERA, Brongn. (Orchid.).
[THELASIS, Blume. I. K.]
papuana, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 126.—N. Guin.

OXYANTHUS, DC. (Rubiac.).
lepidus, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 160.—Afr. trop.
litoreus, *S. Moore, l. c.* 159.—Afr. trop.
oliganthus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 345.—Afr. trop.
Schumannianus, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 119.—Afr. trop.
stenocarpa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 345.—Afr. trop.
tenuis, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 107.—Afr. trop.

OXYBAPHUS, L'Herit. (Nyctag.).
cretaceus, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 538.—Reg. Argent.

OXYCOCCUS, Tourn. ex Adans. (Vaccin.).
japonicus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 18 (= *Vaccinium japonicum*).—Japon.

OXYGONUM, Burch. (Polygon.).
Baumii, *Damm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 231, nomen.—Afr. trop.
fruticosum, *Damm. l. c.*, nomen.—Afr. trop.

OXYLOBIUM, Andr. (Legum.).
Kelsoi, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 4.—Austral.
melinocaule, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 224.—Austral.
tetragonophyllum, *E. Pritz. l. c.* 226.—Austral.

OXYLOBUS, Moc. (Compos.).
[AGERATUM, Linn. I. K.]
adscendens, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xli. 272 (= *Ageratum adscendens*).—Mexic.
arbutifolius, *A. Gr. in Proc. Amer. Acad.* xv. 26 (= *Ageratum arbutifolium*).—Mexic.
glanduliferus, *A. Gr. l. c.* (= *Ageratum glanduliferum*).—Mexic.

OXYMYRSINE, Bub. Fl. Pyren. iv. 121 = **Ruscus**, Tourn. (Liliac.).
pungens, Bub. l. c. = R. aculeatus.

OXYOSMYLES, Speg. in Com. Mus. Buenos Aires, i. 316 (1901). *BORAGINACEAE.*
viscosissima, *Speg. l. c.* 317.—Reg. Argent.

OXYPETALUM, R. Br. (Asclep.).
argentinum, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 8, 15.—Am. austr.
aurantiacum, *Malme, ex Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. (1903) 240.—Parag.
brachystemma, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 8, 2.—Am. austr.
brachystephanum, *Malme, l. c.* 7.—Parag.
Chodatianum, *Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* Ser. II. xxvii. no. 18, 29.—Parag.
clavatum, *Malme, l. c.* 27.—Parag.
confusum, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 8, 10.—Bras.
curtiflorum, *Malme, l. c.* 13.—Bras.
Dusenii, *Malme, l. c.* iv. no. 3, 4.—Bras.
hirsutulum, *K. Schum. in Urb. in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 31.—Bras.

OXYPETALUM :—
longipes, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iii. no. 8, 3.—Bras.
marginatum, *Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* Ser. II. xxvii. no. 18, 25.—Parag.
obtusifolium, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iv. no. 3, 7.—Bras.
ophiuroideum, *Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* Ser. II. xxvii. no. 18, 24.—Parag.
subcapitatum, *Malme, l. c.* 20.—Parag.
sublanatum, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iv. no. 3, 6.—Bras.
tridens, *Malme, l. c.* iii. no. 8, 2.—Bras.
tubatum, *Malme, l. c.* iv. no. 3, 3.—Bras.
uruguayense, *Malme, l. c.* iii. no. 8, 7.—Urug.
vestitum, *Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* Ser. II. xxvii. no. 18, 18.—Parag.

OXYPOLIS, Rafin. (Umbell.).
[PEUCEDANUM, Tourn. I. K.]
longifolia, *Small, Fl. S. E. U. S.* 875 (= *Sium longifolium*).—Am. bor.

OXYS, Tourn. = **Oxalis**, Linn. (Geran.)
Pliniana, Bub. Fl. Pyren. iii. 331 = Oxalis Acetosella.
lutea, Bub. l. c. 332 = O. corniculata.

OXYTENANTHERA, Munro (Gramin.).
auriculata, *Prain, Bengal Pl.* 1234 (= *Bambusa auriculata*).—Ind. or.

OXYTHECA, Nutt. (Polygon.).
emarginata, *Hall, in Univ. Calif. Publ. Bot.* i. 75.—Am. bor.

OXYTHECE, Miq. (Sapot.).
[LUCUMA, Juss. I. K.]
fabrilis, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 160.—Ind. occ.

OXYTROPIS, DC. (Legum.).
acutirostrata, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 68.—China.
Alberti, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 184.—Turkestan.
albiflora, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Aragallus albiflorus*).—Am. bor.
albovillosa, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 182.—Turkestan.
angustifolia, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 67.—China.
Arnaudii, *Petitm. in Monde des Plantes*, Sér. II. vii. 16.—Hybr.
bella, *B. Fedtsch. ex O. Fedtsch. Pl. Pamir*, 21.—As. cent.
Besseyi, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 80 (= *Aragallus Besseyi*).—Am. bor.
Blankinshipii, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Aragallus Blankinshipii*).—Am. bor.
Bushii, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. xvii.—Am. bor.
carinthiaca, Huter & Porta, ex Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 79 = Huteri.
caudatus, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Aragallus caudatus*).—Am. bor.
collina, *K. Schum. l. c.* (= *Aragallus collinus*).—Am. bor.
dispar, *K. Schum. l. c.* (= *Aragallus dispar*).—Am. bor.
Giraldii, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 66.—China.
gracilis, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Aragallus gracilis*).—Am. bor.
gueldenstaedtioides, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 65.—China.
Hedinii, *Ulbr. l. c.* xxxv. 680.—Tibet.
hirsutiuscula, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1021.—As. cent.
Holdereri, *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 193.—As. cent.
Huteri, *Reichb. f. ex Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 79.—Eur.
involuta, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Aragallus involutus*).—Am. bor.
kuurgenturensis, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 192.—Turkestan.
Ladygini, *Krylov, in Act. Hort. Petrop.* xxi. 5.—As. cent.
leucocephala, *Ulbr. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iii. 193.—As. cent.
Litwinowi, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 185.—Turkestan.

OXYTROPIS:—
Martjanovi, *Krylov, in Act. Hort. Petrop.* xxi. 6.—As. cent.
pannosa, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. xvii.—Am. bor.
pinetorum, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. I. 496 (=*Aragallus pinetorum*).—Am. bor.
retusa, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* xv. 116.—Ins. Kurile.
Richardsonii, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. I. 496 (=*Aragallus Richardsonii*).—Am. bor.
rishiriensis, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* xv. 116.—Japon.
Ruebsaameni, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 186.—Turkestan.
Saposhnikovi, *Krylov, in Act. Hort. Petrop.* xxi. 4.—As. cent.
shensiana, *Ulbr. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 66.—China.
susamyrensis, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 188.—Turkestan.
terekensis, *B. Fedtsch. l. c.* 192.—Turkestan.
trajectorum, *B. Fedtsch. l. c.* 162.—Turkestan.
vermicularis, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1025.—As. cent.
villosa, *Blank, in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 80 (=*Aragallus villosus*).—Am. bor.

OZOMELIS, Rafin. (Saxifr.).
[MITELLA, Tourn. I. K.]
anomala, *Rydb. in N. Amer. Fl.* xxii. 96 (=*Mitella anomala*).—Calif.
diversifolia, *Rydb. l. c.* 94 (=*Mitella diversifolia*).—Calif.
micrantha, *Rydb. l. c.* 96 (=*Mitella micrantha*).—Am. bor.
pacifica, *Rydb. l. c.* 95.—Am. bor.
Parryi, *Rydb. l. c.* 96.—Am. bor.
stauropetala, *Rydb. l. c.* 95 (=*Mitella stauropetala*).—Am. bor.
stenopetala, *Rydb. l. c.* 96 (=*Mitella stenopetala*).—Am. bor.
trifida, *Rydb. l. c.* 95 (=*Mitella trifida*).—Am. bor.
violacea, *Rydb. l. c.* (=*Mitella violacea*).—Am. bor.

P

PACHIRA, Aubl. (Malvac.).
petropolitana, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 50, nomen.—Bras.

PACHYCARPUS, E. Mey. (Asclep.).
[GOMPHOCARPUS, R. Br. I. K.]
Galpinii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 377 (=*Asclepias Galpinii*).—Afr. austr.
Mackenii, *N. E. Br. l. c.* (=*Gomphocarpus Mackenii*).—Afr. austr.
macrochilus, *N. E. Br. l. c.* 376 (=*Asclepias macrochila*).—Afr. austr.
rhinophyllus, *N. E. Br. l. c.* 377 (=*Gomphocarpus rhinophyllus*).—Afr. trop.
scaber, *N. E. Br. l. c.* (=*Gomphocarpus scaber*).—Afr. austr.
Schinzianus, *N. E. Br. l. c.* 376 (=*Asclepias Schinziana*).—Afr. austr.
transvaalensis, *N. E. Br. l. c.* (=*Asclepias transvaalensis*).—Afr. austr.
validus, *N. E. Br. l. c.* 377 (=*Asclepias valida*).—Afr. austr.

PACHYLOPHUS, Spach (Onagr.).
[OENOTHERA, Linn. I. K.]
caulescens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1904, 571.—Am. bor.
exiguus, *Rydb. l. c.* 1903, 260 (=*Oenothera exigua*).—Am. bor.
glaber, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1904, 242.—Am. bor.
hirsutus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1904, 571.—Am. bor.
macroglottis, *Rydb. l. c.* 1903, 259.—Am. bor.

PACHYPHYTUM, Link, Klotzsch & Otto (Crassul.).
[COTYLEDON, Linn. I. K.]
aduncum, *Rose, in N. Amer. Fl.* xxii. 13 (=*Cotyledon adunca*).—Mexic.
amethystinum, *Rose, l. c.* 11.—Mexic.
brevifolium, *Rose, l. c.* 12.—Mexic.
longifolium, *Rose, l. c.*—Mexic.
sodale, *Rose, l. c.* 11 (=*Echeveria sodalis*).—Hab.?
uniflorum, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 11.—Mexic.

PACHYPODANTHIUM, Engl. & Diels (Anonac.).
Staudtii, *Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl.* vi. 32 (=*Uvaria Staudtii*).—Afr. trop.

PACHYRRHIZUS, Rich. (Legum.).
erosus, Urb. Symb. Antill. iv. 311=angulatus.

PACHYSTELA, Pierre, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. viii. 35 (1904). *SAPOTACEAE.*
brevipes, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 37 (=*Sideroxylon brevipes*).—Afr. trop.
cinerea, Pierre, in Engl. l. c. 36=conferta.
longistyla, *Engl. l. c.* 38 (=*Sideroxylon longistylum*).—Afr. trop.
Msolo, *Engl. l. c.* (=*Chrysophyllum Msolo*).—Afr. trop.

PACHYSTIMA, Rafin. (Celastr.).
macrophylla, *Farr, in Trans. Proc. Bot. Soc. Pennsyl.* i. 421.—Am. bor.

PACOURIA, Aubl. (Apocyn.).
[LANDOLPHIA, Beauv. I. K.]
capensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 403 (=*Landolphia capensis*).—Afr. austr.
Petersiana, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 180 (=*Landolphia Petersiana*).—Afr. trop.

PADUS, Linn. (Rosac.).
[PRUNUS, Tourn. I. K.]
acrophylla, *Schneider, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 70.—China.
alabamensis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 574 (=*Prunus alabamensis*).—Am. bor.
australis, *Small, l. c.* (=*Prunus australis*).—Am. bor.
brachypoda, *Schneider, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 69.—China.
Cuthbertii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 574 (=*Prunus Cuthbertii*).—Am. bor.
eximia, *Small, l. c.* 573 (=*Prunus eximia*).—Am. bor.
Wilsonl, *Schneider, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 69.—China.

PAEDERIA, Linn. (Rubiac.).
Bojeriana, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas,* t. 412 A.—Madag.
petrophila, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 373.—Afr. trop.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 92.—Mexic.

PAEONIA, Tourn. (Ranuncul.).
glabrescens, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 38.—Corsica.
leiocarpa, *Jord. l. c.*—Gallia.
modesta, *Jord. l. c.*—Gallia.
monticola, *Jord. l. c.* 37.—Eur.
Revelieri, *Jord. l. c.* 38.—Corsica.
Villarsii, *Jord. l. c.* 37.—Eur.

PAEPALANTHUS, Mart. (Eriocaul.).
acantholimon, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 163.—Bras.
acanthophyllus, *Ruhl. l. c.* 186.—Bras.
acuminatus, *Ruhl. l. c.* 217.—Bras.
applanatus, *Ruhl. l. c.* 169.—Bras.
aquatilis, Mart. ex Ruhl. l. c. 49=Eriocaulon aquatile.
arachnoides, Ruhl. l. c. 158=manicatus.
Arechavaletae, *Koernicke, ex Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iv. t. 24 (1902).—Urug.
aretioides, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 164.—Bras.
atrovaginatus, *Ruhl. l. c.* 156.—Bras.
Balansae, *Ruhl. l. c.* 151.—Parag.
batocephalus, *Ruhl. l. c.* 212.—Bras.
biformis, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 71.—Guiana.
brachyphyllus, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 75.—Bras.

PAEPALANTHUS:—
brunnescens, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 136.—Bras.
cacuminis, *Ruhl. l. c.* 205.—Bras.
caldensis, *Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvii. no. 11, 29.—Bras.
calvoides, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 146.—Bras.
camptophyllus, *Ruhl. l. c.* 174.—Bras.
caparoensis, *Ruhl. l. c.* 145.—Bras.
Catharinae, *Ruhl. l. c.* 147.—Bras.
cearaensis, *Ruhl. l. c.* 161.—Bras.
cephalopus, *Silv. & Ruhl. ex Ruhl. l. c.* 165.—Bras.
chloroblepharus, *Ruhl. l. c.* 139.—Bras.
ciliolatus, *Ruhl. l. c.* 147.—Bras.
coloides, *Ruhl. l. c.* 176.—Bras.
columbiensis, *Ruhl. l. c.* 207.—N. Granat.
cordatus, *Ruhl. l. c.* 189.—Bras.
corymboides, *Ruhl. l. c.* 204.—Bras.
dasynema, *Ruhl. l. c.* 178.—Bras.
decipiens, *Ruhl. l. c.* 135.—Bras.
desperado, *Ruhl. l. c.* 138.—Bras.
dictyophyllus, Mart. ex Ruhl. l. c. 59=Eriocaulon dictyophyllum.
diplobetor, *Ruhl. l. c.* 134.—Bras.
elongatulus, *Ruhl. l. c.* 140.—Bras.
eriocauloides, *Ruhl. l. c.* 182.—Bras.
eriophaeus, *Ruhl. l. c.* 130.—Bras.
euryphyllus, *Ruhl. l. c.*—Bras.
filosus, *Ruhl. l. c.* 164.—Bras.
flavorutilus, *Ruhl. l. c.* 144.—Bras.
fraternus, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 69.—Guiana.
glabrifolius, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 139.—Bras.
Glaziovii, *Ruhl. l. c.* 181.—Bras.
globosus, *Ruhl. l. c.* 143.—Bras.
gyrotrichus, *Ruhl. l. c.* 182.—Bras.
Harmsii, *Ruhl. l. c.* 216.—Bras.
Henriquei, *Silv. & Ruhl. ex Ruhl. l. c.* 129.—Bras.
Hydra, *Ruhl. l. c.* 202.—Bras.
itatiaiensis, *Ruhl. l. c.* 211.—Bras.
Jahnii, *Ruhl. l. c.* 161.—Bras.
Karstenii, *Ruhl. l. c.* 155.—N. Granat.
Leiseringii, *Ruhl. l. c.* 216.—Bras.
leucocephalus, *Ruhl. l. c.* 200.—Bras.
Lindenii, *Ruhl. l. c.* 206.—N. Granat.
Loefgrenianus, *Ruhl. l. c.* 142.—Bras.
macropodus, *Ruhl. l. c.* 212.—Bras.
manicatus, *Pouls. ex Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvii. no. 11, 28.—Bras.
Mendoncianus, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 129.—Bras.
microcaulon, *Ruhl. l. c.* 159.—Bras.
miser, *Ruhl. l. c.* 133.—Bras.
multicostatus, *Ruhl. l. c.* 148.—Bras.
Oliveirae, *Ruhl. l. c.* 196.—Bras.
parvus, *Ruhl. l. c.* 154.—Bras.
paulensis, *Ruhl. l. c.* 211.—Bras.
Paulinus, *Ruhl. l. c.* 215.—Bras.
pedunculatus, *Ruhl. l. c.* 146 (=*Eriocaulon pedunculatum*).—Bras.
phaeocephalus, *Ruhl. l. c.* 160.—Bras.
praemorsus, *Ruhl. l. c.* 172.—Bras.
pruinosus, *Ruhl. l. c.* 210.—Bras.
pseudoelongatus, *Ruhl. l. c.* 141.—Bras.
pseudotortilis, *Ruhl. l. c.* 155.—Bras.
pulvinatus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 263.—Afr. trop.
ruficeps, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 144.—Bras.
Ruhlandii, *Silv. ex Ruhl. l. c.* 159.—Bras.
scandens, *Ruhl. l. c.* 175.—Bras.
scholiophyllus, *Ruhl. l. c.* 172.—Bras.
Schwackeanus, *Ruhl. l. c.* 193.—Bras.
scleranthus, *Ruhl. l. c.* 199.—Bras.
scytophyllus, *Ruhl. l. c.* 171.—Bras.
senaeanus, *Ruhl. l. c.* 219.—Bras.
Silveirae, *Ruhl. l. c.* 131.—Bras.
sphaerocephalus, *Ruhl. l. c.* 182.—Bras.
stereophyllus, *Ruhl. l. c.* 193.—Bras.
striatus, *Ruhl. l. c.* 149.—Bras.
Stuebelianus, *Ruhl. l. c.* 174.—Peruv.
subcaulescens, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 71.—Guiana.
subfalcatus, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 151.—Bras.
suffruticans, *Ruhl. l. c.* 138.—Bras.

PAEPALANTHUS:—
superbus, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 218. —Bras.
sychnophyllus, *Ruhl. l. c.* 197.—Bras.
Uleanus, *Ruhl. l. c.* 146.—Bras.
undulatus, *Ruhl. l. c.* 150.—Bras.
Urbanianus, *Ruhl. l. c.* 188.—Bras.
vestitus, *Ruhl. l. c.* 160.—Bras.
viridulus, *Ruhl. l. c.* 165.—Bras.
xiphophyllus, *Ruhl. l. c.* 219.—Bras.

PAHUDIA, Miq. (Legum.).
africana, *Prain, in Sci. Mem. Med. Off. Ind.* xii. 16 (= *Afzelia africana*).—Afr. trop.
attenuata, *Prain, l. c.* (= *Afzelia attenuata*).—Afr. trop.
bracteata, *Prain, l. c.* (= *Afzelia bracteata*).—Afr. trop.
quanzensis, *Prain, l. c.* (= *Afzelia quanzensis*).—Afr. trop.
rhomboidea, *Prain, l. c.* 14 (= *Afzelia rhomboidea*).—Ins. Philipp.

PALAQUIUM, Blanco (Sapot.).
[DICHOPSIS, Thw. I. K.]
Ahernianum, *Merrill, in Philipp. Forest. Bur. Bull.* i. 46.—Ins. Philipp.
angustifolium, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 43.—Ins. Philipp.
Barnesii, *Merrill, l. c.* vi. 13.—Ins. Philipp.
bataanense, *Merrill, l. c.* xvii. 44.—Ins. Philipp.
gigantifolium, *Merrill, l. c.* vi. 14.—Ins. Philipp.
mindanaense, *Merrill, l. c.* 15.—Ins. Philipp.
optimum, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 154, 558.—Borneo.
polyanthum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* vi. 16 (= *Dichopsis polyantha*).—Burma.
Supfianum, *Schlechter, in Tropenpfl.* vii. 469.—N. Guin.
tenuipetiolatum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 45.—Ins. Philipp.
Whitfordii, *Merrill, l. c.* xxxv. 55.—Ins. Philipp.

PALAUA, Cav. (Malvac.).
parviflora, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, v. 173 (= *Malope parviflora*).—Peruv.
tomentosa, *Hochr. l. c.* 171.—Mexic.

PALICOUREA, Aubl. (Rubiac.).
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 178.—Parag.

PALISOTA, Reichb. (Commelin.).
hirsuta, K. Schum. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 32 = thyrsiflora.
laxiflora, *C. B. Clarke, l. c.* 30.—Afr. trop.
ombrophila, *K. Schum. ex C. B. Clarke, l. c.* 29.—Afr. trop.
orientalis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 209.—Afr. trop.
Preussiana, *K. Schum. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 30.—Afr. trop.
Pynaertii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 100.—Afr. trop.
Thollonii, Hua, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 61 = thyrsiflora.

PALMERIA, F. Muell. (Monim.).
gracilis, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxxi. 745; *et in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 209.—N. Guin.

PANAX, Linn. (Aral.).
decorans, H. Baill. ex Viguier, in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. 312 = Tieghemopanax decorans.
nigrescens, Panch. ex Viguier, l. c. 311 = Tieghemopanax nigrescens.
simabaefolia, H. Baill. ex Viguier, l. c. 312 = Tieghemopanax simabaefolius.
subincisa, H. Baill. ex Viguier, l. c. 307 = Tieghemopanax subincisus.

PANCHERIA, Brongn. & Gris (Saxifrag.).
Beauverdiana, *Pampan. in Ann. di Bot. Roma*, ii. 100. —N. Caled.
Billardieri, *Pampan. l. c.* 99 (= *Callicoma Billardieri*). —N. Caled.
Brunhesi, *Pampan. l. c.* 98.—N. Caled.
elliptica, *Pampan. l. c.* 97.—N. Caled.
hirsuta, *Vieill. ex Pampan. l. c.* 101.—N. Caled.
pinnata, *Pampan. l. c.* 100.—N. Caled.
pulchella, *Pampan. l. c.* 96.—N. Caled.

PANDANUS, Rumph. (Pandan.).
Ananas, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 299. —Amboina.
arayatensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 7.—Ins. Philipp.
aurantiacus, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 49.—Penins. Mal.
Balfourii, *Martelli, Webbia*, 361.—Ins. Seychell.
basilocularis, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 299.—Borneo.
bicornis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 49.—Penins. Mal.
brevifolius, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 302.—Borneo.
Butayei, *Wildem. in Rev. Cult. Colon.* x. 15.—Afr. trop.
calicarpus, *Martelli, Webbia*, 365.—Hab.?
Capusii, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 302.—Cochinch.
caudatus, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 6.—Ins. Philipp.
christmatensis, *Martelli, Webbia*, 362.—Ins. Christmas.
compressus, *Martelli, l. c.* 363.—Ins. Solomon.
Copelandi, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 7.—Ins. Philipp.
crinifolium, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 301.—Penins. Mal.
dipsaceus, *Martelli, l. c.* 304.—Celebes.
dorystigma, *Martelli, l. c.* 301.—Borneo.
elostigma, *Martelli, l. c.* 303.—Penins. Mal.
Engleri, *Warb. ex Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 151. —Afr. trop.
epiphyticus, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 304.—Borneo.
flabellistigma, *Martelli, Webbia*, 366.—Hab.?
forceps, *Martelli, l. c.* 363.—China.
furcatellus, *Martelli, l. c.* 368.—Tonkin.
gladiifolius, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 301.—Sumatra.
glaucophyllus, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 50.—Penins. Mal.
herbaceus, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 303.—Penins. Mal.
Hystrix, *Martelli, l. c.* 300.—N. Guin.
immersus, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 48. —Penins. Mal.
johorensis, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 302. —Penins. Mal.
luzonensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 6.—Ins. Philipp.
Merrillii, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 50.—Ins. Philipp.
monotheca, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 303.—Penins. Mal.
nanus, *Martelli, Webbia*, 370.—Penins. Mal.
Odoardi, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 304. —N. Guin.
pallidus, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 5.—Ins. Philipp.
pectinatus, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 304.—Borneo.
penangensis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 50.—Penins. Mal.
penicillus, *Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1904, 300. —N. Guin.
Pierrei, *Martelli, l. c.* 303.—Cochinch.
platystigma, *Martelli, l. c.* 300.—Borneo.
Porritilanus, *Martelli, l. c.* 301.—Hab.?
Prainii, *Martelli, l. c.*—Penins. Mal.
pseudofoetidus, *Martelli, l. c.* 303.—Ind. or.
Ridleyi, *Martelli, l. c.*—Penins. Mal.
rostratus, *Martelli, l. c.* 300.—Borneo.
sarawakensis, *Martelli, l. c.* 303.—Borneo.
Scortechinii, *Martelli, l. c.* 303.—Penins. Mal.
siamensis, F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 220 = P. Kaida.
simplex, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 6.—Ins. Philipp.
spathulatus, *Martelli, Webbia*, 365.—Bourbon.
stelliger, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 49.—Penins. Mal.
sumatranus, *Martelli, Webbia*, 367.—Sumatra.
Thwaitesii, *Martelli, l. c.* 369.—Zeylan.
Wavrinianus, *Hort. Sand. in Gard. Chron.* 1903, i. 245. —Hab.?
Whitfordii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 7.—Ins. Philipp.
Whitmeeanus, *Martelli, Webbia*, 364.—Ins. Samoa.

PANICULARIA, Fabr. (Gramin.).
[GLYCERIA, R. Br. I. K. S. I, II.]
americana, *Shafer, in Ann. Carneg. Mus.* i. 121 (= *Glyceria grandis*).—Am. bor.
antarctica, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 219.—Patag.
flaccida, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvi. 55.—Am. bor.
fuegiana, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 219.—Patag.
Holmii, *Beal, in Torreya*, i. 43.—Am. bor.
leptostachys, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 220.—Patag.
multifolia, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvi. 54.—Am. bor.
pulchella, *Nash, in Britton & Rydb. in Bull. N. Y. Bot. Gard.* ii. vi. 157.—Am. bor.
Torreyana, *Merrill, in Rhodora*, iv. 146 (= *Poa Torreyana*).—Am. bor.

PANICUM, Linn. (Gramin.).
alabamense, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 116.—Am. bor.
amaroides, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xxix. 5.—Am. bor.
angolense, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 457 (= *Digitaria angolensis*).—Afr. trop.
aridum, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 139.—Afr. trop.
Aubertii, *Mez, l. c.* 134.—Madag.
Auburne, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 115. —Am. bor.
bongaense, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 44.—Afr. trop.
bulbodes, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. (1908) 35 (= *Helopus bulbodes*).—Afr. trop.
Burgu, *A. Chevalier, in Compt. Rend. Ass. Fr.* xxviii. 642.—Afr. trop.
Busseanum, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 131.—Afr. trop.
callopus, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 46.—Afr. trop.
campylostachyum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* li. 367.—Am. cent.
cauliglume, *Hack. l. c.* 1901, 428.—Java.
chromatostigma, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 48.—Afr. trop.
chrysopsidifolium, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 100. —Am. bor.
ciliocinctum, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 48.—Afr. trop.
cinctum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 429.—Madag.
comophyllum, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 380.—Ind. occ.
condensum, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 93.—Am. bor.
corynotrichum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 335.—Bras.
costaricense, *Hack. l. c.* 428.—Am. cent.
cryptanthum, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 115.—Am. bor.
curvinerve, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 335. —Ind. occ.
delawarense, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 116.—Am. bor.
distichophylloides, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 137.—Afr. trop.
drumocarpum, *Stapf, in Journ. de Bot.* 1905, 104.—Afr. trop.
Eggersii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 292.—Ind. occ.
eligulatum, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 74.—Guiana.
elongatum, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 132.—Afr. trop.
Eminii, *Mez, l. c.* 135.—Afr. trop.
fasciculiforme, *Mez, l. c.* 141.—Ins. Comor.
fluminense, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 457. —Bras.
Friesii, *Hack. ex R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 170.—Reg. Argent.
Gattingeri, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 92.—Am. bor.
Gerdesii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 333.—Bras.
giganteum, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 143.—Afr. trop.
Glaziovii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 373. —Bras.
gracilicaule, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 98.—Am. bor.

PANICUM:—
gracillimum, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 131.—Afr. trop.
Hackelii, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 118.—Afr. trop.
halophilum, *Nash, in Lloyd & Tracy, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 86.—Am. bor.
haplocaulos, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 49.—Afr. trop.
heterostachyum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 430.—Abyss.
inaequale, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 133.—Bras.
iowense, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 115.—Am. bor.
Kerstingii, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 145.—Afr. trop.
lasiopodum, *Stapf, in Journ. de Bot.* 1906, 105.—Afr. trop.
Lelievrei, *A. Chevalier, in Compt. Rend. Ass. Fr. Sci.* 1900, 651.—Afr. trop.
leptorhachis, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 119.—Afr. trop.
longepetiolatum, *Pilg. l. c.* xxxiii. 45.—Afr. trop.
longicauda, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 133.—Afr. trop.
Mannii, *Mez, l. c.* 143.—Afr. trop.
massaiense, *Mez, l. c.* 144.—Afr. trop.
Menyharthii, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 766.—Afr. trop.
Merkeri, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 144.—Afr. trop.
mixtum, *Mez, l. c.* 147.—Afr. trop.
moninense, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 457 (= *Digitaria moninensis*).—Afr. trop.
mutabile, *Scribn. & J. G. Sm. in Small, Fl. S. E. U. S.* 103.—Am. bor.
myriostachyum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 294.—Bras.
nematostachyum, *F. M. Bailey, in Bull. Dept. Agric. Queensl.* xvi. 2.—Austral.
nidulans, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 136.—Afr. trop.
nigritianum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 298.—Afr. trop.
nitens, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 457 (1901) (= *Digitaria nitens*).—Afr. trop.
nitens, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. (1904) 8.—Ins. Philipp.
nitophyllum, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 50.—Afr. trop.
oligobrachiatum, *Pilg. l. c.*—Afr. trop.
oplismenoides, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 381.—Ind. occ.
oryzetorum, *A. Chevalier, in Compt. Rend. Ass. Fr. Sci.* 1900, 651.—Afr. trop.
Pammeli, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 116.—Am. bor.
paniculatum, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 381 = fasciculatum.
parviglume, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 429.—Am. cent.
penicilligerum, *Hack. ex Kneuck. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1902, 93 (= *Leptocoryphium penicilligerum*).—Reg. Argent.
phyllopogon, *Stapf, in Hook. Ic. Pl.* t. 2698.—Eur.
Pilgeri, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 146.—Afr. trop.
Pittieri, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* li. 367.—Am. cent.
procerrimum, *Hack. l. c.* 1901, 431.—Am. cent.
pubifolium, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 137.—Afr. trop.
Rautanenii, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 935.—Afr. austr. or.
rigens, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 141.—Afr. trop.
rovumense, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 47.—Afr. trop.
scalare, *Mez. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 138.—Afr. trop.
Schenckii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 426.—Bras.
Schlechteri, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 139.—Afr. trop.
Schmitzii, *Hack. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xvii. 254.—Mexic.
Schneckii, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 116.—Am. bor.
Schumannii, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 134.—Bras.
Schweinfurthii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 366.—Afr. trop.
setinsigne, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 153.—Afr. austr.
Sintenisii, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 382.—Ind. occ.
stenophyllum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 371.—Bras.
stigmatisatum, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 140.—Afr. trop.

PANICUM:—
stipitatum, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 83.—Am. bor.
subbarbulatum, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xxix. 9.—Am. bor.
subglobosum, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 274.—Parag.
subsimplex, *Ashe, in N. Carolina Coll. Bull.* clxxv. 115.—Am. bor.
subulifolium, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 135.—Afr. austr.
superatum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 427.—Bras.
tephrosanthum, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 766—Afr. trop.
teretifolium, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 372.—Bras.
Thwaitesii, *Hack. l. c.* 334.—Ind. or.
tricolor, *Hack. l. c.* 370.—Ind. occ.
tristachyum, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 525.—Ins. Bonin.
umbratile, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 142.—Afr. trop.
Venezuelae, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* li. 368.—Venez.
virgultorum, *Hack. l. c.* 1901, 369.—Am. cent.
Warburgii, *Mez, in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 143.—Ins. Philipp.
watense, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 146.—Afr. trop.
xanthospermum, *Scribner & Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 348.—Am. bor.
xanthotrichum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 333.—Afr. trop.
yadkinense, *Ashe, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1040.—Am. bor.

PANISEA, Lindl. (Orchid.).
tricallosa, *Rolfe, in Kew Bull.* 1901, 148.—Ind. or.

PANTACANTHA, Speg. Nov. Add. Fl. Patag. ii. (1902), repr. 51. *SOLANACEAE.*
Ameghinoi, *Speg. l. c.* 52.—Patag.

PAPAVER, Linn. (Papav.).
apicigemmatum, *Fedde, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 448.—Lycia.
humifusum, *Fedde, l. c.* 447.—Syria.
humile, *Fedde, l. c.* 446.—Afr. bor.
nigrum, Bub. Fl. Pyren. iii. 267 = somniferum.
Postii, *Fedde, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 447.—Syria.
pygmaeum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 159.—Am. bor.
rapiferum, *Fedde, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 170.—Syria.
subadpressiusculo-setosum, *Fedde, l. c.* 171.—Afr. bor.
subpiriforme, *Fedde, l. c.* 169.—Syria.
Teneriffae, *Fedde, l. c.* 170.—Ins. Teneriff.
tenuissimum, *Fedde, l. c.* 446.—Graecia.
Tinei, *Lanza, in Boll. Ort. Bot. Palermo*, iv. 24.—Sicilia.

PAPHIOPEDILUM, Pfitzer, Morph. Stud. Orchideenbl. (1886) 11. *ORCHIDACEAE.*
amabile, *Hallier f. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* liv. 450.—Borneo.
Appletonianum, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1896, 364 (= *Cypripedium Appletonianum*).—Siam.
Argus, *Pfitz. in Engl. Jahrb.* xix. 40 (= *Cypripedium Argus*).—Luzon.
bellatulum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium bellatulum*).—Burma.
Boissierianum, Pfitz. l. c. 41 = Phragmopedilum Boissierianum.
Bullenianum, *Pfitz. l. c.* 40 (= *Cypripedium Bullenianum*).—Borneo.
Burbidgei, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium Burbidgei*).—Borneo.
callosum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium callosum*).—Siam.
caricinum, Pfitz. l. c. 41 = Phragmopedilum caricinum.
Chamberlainianum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium Chamberlainianum*).—Sumatra.
Charlesworthii, *Pfitz. l. c.* 40 (= *Cypripedium Charlesworthii*).—Burma.
ciliolare, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium ciliolare*).—Mindanao.
cothurnum, *Pfitz. l. c.* 42 (= *Cypripedium cothurnum*).—Bras.

PAPHIOPEDILUM:—
Curtisii, *Pfitz. in Engl. Jahrb.* xix. 40 (= *Cypripedium Curtisii*).—Sumatra.
Czerwiakowianum, Pfitz. l. c. 41 = Phragmopedilum Czerwiakowianum.
Dayanum, *Pfitz. l. c.* 40 (= *Cypripedium Dayanum*).—Borneo.
dilectum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium dilectum*).—Hab.?
Druryi, *Pfitz. l. c.* 41 (= *Cypripedium Druryi*).—Ind. or.
Elliottianum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium Elliottianum*).—Ins. Philipp.
epidendricum, *Pfitz. l. c.* 42 (= *Cypripedium epidendricum*).—Bras.
exul, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1896, 364 (= *Cypripedium exul*).—Siam.
Fairrieanum, *Pfitz. in Engl. Jahrb.* xix. 41 (= *Cypripedium Fairrieanum*).—Bhotan.
Gardineri, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium Gardineri*).—N. Guin.
glanduliferum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium glanduliferum*).—N. Guin.
Godefroyae, *Pfitz. l. c.* 40 (= *Cypripedium Godefroyae*).—Cochinch.
Gratrixianum, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1905, 63 (= *Cypripedium Gratrixianum*).—Annam.
Hartwegii, Pfitz. in Engl. Jahrb. xix. 41 = Phragmopedilum Hartwegii.
Haynaldianum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium Haynaldianum*).—Luzon.
Hincksianum, Pfitz. l. c. = Phragmopedilum longifolium.
hirsutissimum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium hirsutissimum*).—Assam.
Hookerae, *Pfitz. l. c.* 40 (= *Cypripedium Hookerae*).—Borneo.
Kimballianum, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1896, 366 (= *Cypripedium Kimballianum*).—Borneo.
Klotzschianum, Pfitz. in Engl. Jahrb. xix. 41 = Phragmopedilum Klotzschianum.
Lindleyanum, Pfitz. l. c. = Phragmopedilum Lindleyanum.
Littleanum, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1896, 366 (= *Cypripedium Littleanum*).—Borneo.
Lowii, *Pfitz. in Engl. Jahrb.* xix. 41 (= *Cypripedium Lowii*).—Arch. Mal.
Mastersianum, *Pfitz. l. c.* 40 (= *Cypripedium Mastersianum*).—Amboina.
nigritum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium nigritum*).—Borneo.
niveum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium niveum*).—Burma; Malaya.
pardinum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium pardinum*).—Reg. Himal.
Parishii, *Pfitz. l. c.* 41 (= *Cypripedium Parishii*).—Burma; Yunnan.
paulistanum, Pfitz. l. c. 42 = Phragmopedilum vittatum.
Petri, *Pfitz. l. c.* 40 (= *Cypripedium Petri*).—Borneo.
philippinense, *Pfitz. l. c.* 41 (= *Cypripedium philippinense*).—Ins. Philipp.
praestans, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium praestans*).—N. Guin.
purpuratum, *Pfitz. l. c.* 40 (= *Cypripedium purpuratum*).—Hong Kong.
reticulatum, Pfitz. l. c. 41 = Phragmopedilum Boissierianum.
Roebbelenii, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium Roebbelenii*).—Ins. Philipp.
Roezlii, Pfitz. l. c. 42 = Phragmopedilum longifolium.
Rothschildianum, *Pfitz. l. c.* 41 (= *Cypripedium Rothschildianum*).—Sumatra.
Sanderianum, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium Sanderianum*).—Borneo.
Schlimii, Pfitz. l. c. 42 = Phragmopedilum Schlimii.
Shipwayae, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1898, 338.—Borneo.
siamense, *Rolfe, l. c.* 1896, 366 (= *Cypripedium siamense*).—Siam.
Socco, *Pfitz. in Engl. Jahrb.* xix. 42 (= *Cypripedium Socco*).—Bras.
Stonei, *Pfitz. l. c.* 41 (= *Cypripedium Stonei*).—Borneo.
superbiens, *Pfitz. l. c.* 40 (= *Cypripedium superbiens*).—Malaya.
tonsum, *Pfitz. l. c.* 41 (= *Cypripedium tonsum*).—Sumatra.
Victoria-Mariae, *Rolfe, in Orch. Rev.* 1898, 364 (= *Cypripedium Victoria-Mariae*).—Sumatra.
villosum, *Pfitz. in Engl. Jahrb.* xix. 41 (= *Cypripedium villosum*).—Burma.
virens, *Pfitz. l. c.* (= *Cypripedium virens*).—Borneo.

PAPHIOPEDILUM :—
vittatum, Pfitz. in Engl. Jahrb. xix. 42 = Phragmopedilum vittatum.
Volonteanum, *Pfitz. in Engl. Pflanzenreich, Orchid.-Pleon.* 80 (= *Cypripedium Volonteanum*).—Borneo.
Wallisii, Pfitz. in Engl. Jahrb. xix. 42 = Phragmopedilum caudatum.
Warscewiczii, Pfitz. l. c. = Phragmopedilum caudatum.
Wolterianum, *Pfitz. in Engl. Pflanzenreich, Orchid.-Pleon.* 79 (= *Cypripedium Wolterianum*).—Ins. Sunda.

PAPPEA, Eckl. & Zeyh. (Sapind.).
ugandensis, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 138.—Afr. trop.

PAPPOPHORUM, Schreb. (Gramin.).
benguellense, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. I. 458 (= *Enneapogon benguellensis*).—Afr. trop.
caespitosum, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 177.—Reg. Argent.
Hassleri, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 280.—Parag.
pusillum, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. I. 458 (= *Enneapogon pusillum*).—Afr. trop.

PARABAENA, Miers (Menisperm.).
myriantha, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 264.—N. Guin.

PARADOMBEYA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2748 (1902). *STERCULIACEAE.*
burmanica, *Stapf, l. c.*—Ind. or.
sinensis, *Dunn, in Hook. Ic. Pl.* t. 2748.—China.

PARAMERIA, Benth. (Apocyn.).
Griffithii, *Pierre, in Rev. Cult. Colon.* xi. 229, nomen.—Cochinch.

PARAMIGYNA, Wight (Rutac.).
longipedunculata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 24.—Ins. Philipp.

PARAPODIUM, E. Mey. (Asclep.).
crispum, *N. E. Br. in Hook. Ic. Pl.* t. 2744.—Afr. austr.

PARARTOCARPUS, Baill. (Urtic.).
borneensis, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 634.—Borneo.
bracteata, *Becc. l. c.* 632 (= *Artocarpus bracteata*).—Malaya.
excelsa, *Becc. l. c.* 634.—Borneo.
papuana, *Becc. l. c.* 633.—N. Guin.
venenosa, *Becc. l. c.* 632 (= *Artocarpus venenosa*).—Arch. Mal.

PARASIA, Rafin. (Gentian.).
[BELMONTIA, E. Mey. I. K.]
Thomasii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 260.—Afr. austr.

PARATHESIS, Hook. f. (Myrsin.).
Candolleana, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 179.—N. Granat.
chiapensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 497.—Mexic.
Donnell-Smithii, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 176.—Am. cent.
Eggersiana, *Mez, l. c.*—Ecuador.
fusca, *Mez, l. c.* 175 (= *Ardisia fusca*).—Am. cent.
glabra, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 115.—Am. cent.
Moritziana, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 180.—Venez.
Oerstediana, *Mez, l. c.* 178.—Mexic.
Rothschuhiana, *Mez, l. c.* 76.—Am. cent.
serrulata, Mez, in Urb. Symb. Antill. ii. 408 = crenulata.
venezuelana, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 179.—Venez.

PARAVALLARIS, Pierre (Apocyn.).
macrophylla, *Pierre, ex Hua, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 278, descr.—Tonkin.

PARIETARIA, Linn. (Urtic.).
obtusa, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 359.—Am. bor.

PARINARIUM, Aubl. (Rosac.).
Goetzenianum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 153.—Afr. trop.
mindanaense, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 119.—Ins. Philipp.

PARINARIUM :—
racemosum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 19.—Ins. Philipp.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 182.—Afr. trop.

PARIS, Linn. (Liliac.).
Christii, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 255.—China.
Franchetiana, *Léveillé, l. c.* 256.—China.
Mercieri, *Léveillé, l. c.* 255.—China.
petiolata, *Baker, ex C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 145.—China.

PARKIA, R. Br. (Legum.).
Bussei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 154.—Afr. trop.

PARNASSIA, Linn. (Saxifr.).
alpicola, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 140.—Japon.
floridana, *Rydb. in N. Amer. Fl.* xxii. 80.—Am. bor.
intermedia, *Rydb. l. c.* 78.—Am. bor.
mexicana, *Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xxix. (1905) 488.—Mexic.
montanensis, *Fernald & Rydb. in N. Amer. Fl.* xxii. 79.—Am. bor.
rivularis, *Osterh. in N. Am. Fl.* xxii. 78.—Am. bor.
Townsendii, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 266.—Mexic.

PARONYCHIA, Linn. (Illecebr.).
franciscana, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 288.—Am. bor.
Wardi, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 400.—Am. bor.

PAROPSIA, Noronha (Passiflor.).
fragrans, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 572.—Madag.

PAROSELA, Cav. (Legum.).
[DALEA, Linn. I. K.]
acutifolia, *Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 144 (= *Dalea acutifolia*).—Mexic.
chrysorrhiza, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 304 (= *Dalea chrysorrhiza*).—Mexic.
crenulata, *Rose, l. c.* 306 (= *Dalea crenulata*).—Mexic.
delicata, *Rose, l. c.* 304.—Mexic.
diffusa, *Rose, l. c.* 306 (= *Dalea diffusa*).—Mexic.
divaricata, *Rose, l. c.* (= *Dalea divaricata*).—Mexic.
elongata, *Rose, l. c.* 306.—Mexic.
filiciformis, *Rose, l. c.* 303 (= *Dalea filiciformis*).—Mexic.
frutescens, *Vail, ex Rose, l. c.* (= *Dalea frutescens*).—Mexic.
Goldmani, *Rose, l. c.* 305.—Mexic.
gracillima, *Rose, l. c.* (= *Dalea gracillima*).—Mexic.
Greenmaniana, *Rose, l. c.* 303.—Mexic.
Holwayi, *Rose, l. c.* 304.—Mexic.
lasiostoma, *Rose, l. c.* 305.—Mexic.
maritima, *Rose, l. c.* 304 (= *Dalea maritima*).—Mexic.
minor, *Rose, l. c.* 306.—Mexic.
minutiflora, *Rose, l. c.* 306.—Mexic.
mutabilis, *Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 144 (= *Dalea mutabilis*).—Mexic.
neglecta, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 304 (= *Dalea neglecta*).—Mexic.
nutans, *Rose, l. c.* 306 (= *Dalea nutans*).—Mexic.
Palmeri, *Rose, l. c.* 304.—Mexic.
peninsularis, *Rose, l. c.*—Calif.
Porteri, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 395.—Am. bor.
procumbens, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 304 (= *Dalea procumbens*).—Mexic.
radicans, *Rose, l. c.* 305 (= *Dalea radicans*).—Mexic.
spiciformis, *Rose, l. c.* 303.—Mexic.
submontana, *Rose, l. c.* 306.—Mexic.
triphylla, *Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 144 (= *Dalea triphylla*).—Mexic.
uncifera, *Rose, l. c.* (= *Dalea uncifera*).—Mexic.
unifoliata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 303 (= *Dalea unifoliata*).—Mexic.
vernicia, *Rose, l. c.*—Mexic.
viridiflora, *Rose, l. c.* 305 (= *Dalea viridiflora*).—Mexic.

PARROTIOPSIS, Schneider, Ill. Handb. Laubholzk. i. (1904) 429. *HAMAMELIDACEAE.*
involucrata, *Schneider, l. c.* (= *Fothergilla involucrata*).—Reg. Himal.

PARSONSIA, P. Br. (Lythrac.).
[CUPHEA, P. Br. I. K.]
lythroides, *Small, Fl. S. E. U. S.* 829.—Am. bor.

PARSONSIA, R. Br. (Apocyn.).
rotata, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxix. 744.—Austral.
verticillata, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 351.—N. Guin.

PARTHENIUM, Linn. (Compos.).
Schottii, *Greenm. ex Millsp. & Chase, in Field Columb. Mus. Bot.* iii. 109.—Mexic.
Stramonium, *Greene, in Pittonia*, iv. (1901) 240.—Mexic.

PARTHENOCISSUS, Planch. (Ampelid.).
[VITIS, Linn. I. K. S. I, II.]
dumetorum, *Rehd. in Sarg. Trees & Shrubs*, 187.—Am. bor.
heptaphylla, *Britton, ex Small, Fl. S. E. U. S.* 759.—Am. bor.
laciniata, *Small, l. c.*—Am. bor.
texana, Rehd. in Sarg. Trees & Shrubs, 189 = heptaphylla.

PARVATIA, Decne. (Berberid.).
decora, *Dunn, in Hook. Ic. Pl.* t. 2712.—China.

PASACCARDOA, Kuntze (Compos.).
[PHYLLACTINIA, Benth. I. K. S. I.]
Baumii, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 426.—Afr. trop.

PASPALUM, Linn. (Gramin.).
amplum, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 77.—Am. bor.
australe, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1039.—Am. bor.
blepharophyllum, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 71.—Am. bor.
Bushii, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 74.—Am. bor.
• circulare, *Nash, in Britton, l. c.* 73.—Am. bor.
epile, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 72.—Am. bor.
glaberrimum, *Nash, in Small, l. c.* 76.—Am. bor.
gracillimum, *Nash, in Small, l. c.* 73.—Am. bor.
Hassleri, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 268.—Parag.
Helleri, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 376.—Ind. occ.
Hieronymi, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 198.—Reg. Argent.
Kearneyi, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 77.—Am. bor.
kentuckiense, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1039.—Am. bor.
laeviglume, *Scribn. in Small, Fl. S. E. U. S.* 75.—Am. bor.
longissimum, K. Schum. in Just, Jahresb. xxviii. I. 416, sphalm. = longicilium.
macroblepharum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 196.—Bras.
Muhlenbergii, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 75.—Am. bor.
oricolum, *Millsp. & Chase, in Field Columb. Mus. Bot.* iii. 28.—Am. cent.
plenipilum, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 73.—Am. bor.
portoricense, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 377.—Ind. occ.
praelongum, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 74.—Am. bor.
prostratum, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 74.—Am. bor.
reticulatum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 199.—Bras.
solitarium, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 77.—Am. bor.
sordidum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 197.—Bras.
Stuckertii, *Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 63.—Reg. Argent.
stramineum, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 74.—Am. bor.
tardum, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 76.—Am. bor.
Underwoodii, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 375.—Ind. occ.
verrucosum, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 270.—Parag.

PASSIFLORA, Linn. (Passiflor.).
aetheoantha, *Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, 1902, 60.—Bras.
alliacea, *Barb. Rodr. l. c.* 59.—Bras.
ambigua, *Hemsl. ex Hook. f. Bot. Mag.* t. 7822.—Am. cent.
bicrura, *Urb. Symb. Antill.* iii. 323.—Ind. occ.
cubensis, *Urb. l. c.* 326.—Ind. occ.
dasyadenia, *Urb. l. c.* 328.—Ind. occ.
Guedesii, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 437.—Bras.
luciensis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 324.—Ind. occ.
maculifolia, *Mast. in Gard. Chron.* 1902, ii. 334.—Hort.
monticola, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 692.—Venez.
nitens, *J. R. Johnston, l. c.*—Venez.
Quelchii, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 31.—Guiana.
Seguini, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 174.—China.
vernicosa, *Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, 1902, 62.—Bras.

PASTINACA, Linn.; emend. Calest. in Martelli, Webbia, 240. *UMBELLIFERAE.*
absinthifolia, *Calest. l. c.* 247 (= *Heracleum absinthifolium*).—As. occ.
alpina, *Calest. l. c.* 245 (= *Heracleum alpinum*).—Eur.
aurea, *Calest. l. c.* 243 (= *Heracleum aureum*).—Graecia.
austriaca, *Calest. l. c.* 244 (= *Heracleum austriacum*).—Eur.
byzanthina, *Calest. l. c.* 247 (= *Ainsworthia byzanthina*).—Turcia.
caspica, *Calest. l. c.* 245 (= *Heracleum caspicum*).—Rossia.
Clausii, *Calest. l. c.* (= *Heracleum Clausii*).—Rossia.
cordata, *Calest. l. c.* (= *Heracleum cordatum*).—Sicil.
granatensis, *Calest. l. c.* 244 (= *Heracleum granatense*).—Hispan.
humilis, *Calest. l. c.* (= *Heracleum humile*).—Oriens.
insularis, *Calest. l. c.* 242.—Corsica.
ligusticifolia, *Calest. l. c.* 246 (= *Heracleum ligusticifolium*).—Rossia.
macrocarpa, *Calest. l. c.* 245.—Hispan.
minima, *Calest. l. c.* 246 (= *Heracleum minimum*).—Eur.
montana, *Calest. l. c.* 245 (= *Heracleum montanum*).—Eur.
officinalis, *Calest. l. c.* 247 (= *Tordylium officinale*).—Eur.; As. occ.
Orphanidis, *Calest. l. c.* 245 (= *Heracleum Orphanidis*).—Turcia.
Orsinii, *Calest. l. c.* 246 (= *Heracleum Orsinii*).—Sicil.
palmata, *Calest. l. c.* 245 (= *Heracleum palmatum*).—Eur.
psaridiana, *Calest. l. c.* 242 (= *Malabaila psaridiana*).—Graecia.
pubescens, *Calest. l. c.* 246 (= *Heracleum pubescens*).—Reg. Caucas.
pyrenaica, *Calest. l. c.* (= *Heracleum pyrenaicum*).—Eur.
setosa, *Calest. l. c.* 245 (= *Heracleum setosum*).—Eur.
sibirica, *Calest. l. c.* 244 (= *Heracleum sibiricum*).—Eur.; As. bor.
Sphondylium, *Calest. l. c.* (= *Heracleum Sphondylium*).—Eur.; As. bor.
stenophylla, *Calest. l. c.* (= *Heracleum stenophyllum*).—Eur.
Tordylium, *Calest. l. c.* 247 (= *Tordylium maximum*).—Reg. Medit.
verticillata, *Calest. l. c.* 244 (= *Heracleum verticillatum*).—Turcia.
villosa, *Calest. l. c.* 246 (= *Heracleum villosum*).—Reg. Caucas.

PATAGONIUM, Schrank. (Legum.).
[ADESMIA, DC. I. K. S. i, ii.]
affine, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 511 (= *Adesmia affinis*).—Patag.
Ameghinoi, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires* vii 270 (= *Adesmia Ameghinoi*).—Patag.
aphananthum, *Speg. l. c.*—Patag.
arenicola, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 137.—Reg. Argent.
Berteroi, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 272 (= *Adesmia Berteroi*).—Patag.

PATAGONIUM:—
campestre, *Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 332.—Patag.
candidum, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 512 (= *Adesmia candida*).—Patag.
canescens, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 273 (= *Streptodesmia canescens*).—Patag.
carnosum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 275; *et in Reiche, Fl. Chile*, iii. 397 (= *Adesmia carnosa*).—Chili.
Clarenii, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 139.—Reg. Argent.
filipes, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 271 (= *Adesmia filipes*).—Patag.
glanduliferum, *Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 332.—Patag.
glareosum, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 483.—Reg. Argent.
graminideum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 272.—Patag.
griseum, *Speg. l. c.* 273 (= *Adesmia grisea*).—Patag.
karraikense, *Speg. l. c.* 274 (= *Adesmia karraikensis*).—Patag.
leptopodum, *Speg. l. c.* (= *Adesmia leptopoda*).—Patag.
nanum, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 485.—Reg. Argent.
Negeri, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 517 (= *Adesmia Negeri*).—Patag.
Nordenskiöldii, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 138.—Reg. Argent.
occultum, *R. Fries, l. c.* 135.—Reg. Argent.
patagonicum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 274 (= *Adesmia patagonica*).—Patag.
pendulum, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 516 (= *Adesmia pendula*).—Patag.
pinifolium, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 484 (= *Adesmia pinifolia*).—Reg. Argent.
polygaloides, *Chod. & Wilcz. l. c.* 482.—Reg. Argent.
rafaelense, *Chod. & Wilcz. l. c.* 485.—Reg. Argent.
Rudolphi, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 278 (= *Adesmia Rudolfi*).—Chili.
salicornioides, *Speg. l. c.* 275 (= *Adesmia salicornioides*).—Patag.
Schickendantzii, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 136 (= *Adesmia Schickendantzii*).—Reg. Argent.
Serrazzianum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 278 (= *Adesmia villosa*, Phil.).—Chili.
Silvestrii, *Speg. l. c.* 275.—Patag.
Simonsi, *Speg. l. c.* 272 (= *Adesmia Simonsi*).—Patag.
subsericeum, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 479.—Reg. Argent.
suffocatum, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 519 (= *Adesmia suffocata*).—Patag.
tehuelches, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 276 (= *Adesmia tehuelcha*).—Patag.
trijugum, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 481 (= *Adesmia trijuga*).—Reg. Argent.
triphyllum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 277 (= *P. trifoliatum*, Reiche, non Kuntze).—Chili.
triste, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 476.—Reg. Argent.
Vallis-pulchrae, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 272 (= *Adesmia Vallis-pulchrae*).—Patag.
villosum, *Speg. l. c.* 277 (= *Adesmia villosa*, Hook. f.).—Chili.

PATAGUA, Poepp. ex Reiche, Fl. Chile, iv. 461 = **Villaresia**, Ruiz & Pav. (Olac.).
chilensis, Poepp. ex Reiche, l. c. = V. mucronata.

PATRINIA, Juss. (Valerian.).
Dielsii, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxix. 597.—China.

PAULLINIA, Linn. (Sapind.).
bilobulata, *Radlk. in Engl. Jahrb.* xxxvii. 152.—Boliv.
bracteosa, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 321.—Am. cent.
echinata, *Radlk. in Engl. Jahrb.* xxxvii. 153.—Bras.
exalata, *Radlk. l. c.* 150.—Am. austr.
fimbriata, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 322.—Am. cent.
largifolia, *Radlk. in Engl. Jahrb.* xxxvii. 149.—Bras.
medullosa, *Radlk. l. c.* 154.—Bras.
navicularis, *Radlk. l. c.* xxxvi. 382.—Ecuador.
reticulata, *Radlk. l. c.* xxxvii. 152.—Bras.
tarapotensis, *Radlk. l. c.* 151.—Peruv.

PAULLINIA:—
trisulca, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 323.—Am. cent.
venusta, *Radlk. l. c.* 324.—Am. cent.

PAUROTIS, O. F. Cook, in Mem. Torr. Bot. Club, xii. (1902) 21. *PALMAE.*
androsana, *O. F. Cook, l. c.* 22.—Ins. Baham.

PAVETTA, Linn. (Rubiac.).
appendiculata, *Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* t. 39.—Afr. trop.
arenicola, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 391.—Afr. trop.
Bagshawei, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 163.—Afr. trop.
Deistelii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 353.—Afr. trop.
Ellenbeckii, *K. Schum. l. c.* 354.—Afr. trop.
Eylesii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 47.—Afr. trop.
grumosa, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 162.—Afr. trop.
Junodii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 354 (= *Chomelia Junodii*).—Afr. austr.
Kaessneri, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 250.—Afr. trop.
lasiobractea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 415.—Afr. trop.
lasiopeplus, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 354.—Afr. trop.
nana, *K. Schum. l. c.* xxxii. 146.—Afr. trop.
neurophylla, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 47.—Afr. trop.
paupercula, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 391.—Afr. trop.
stipulopallium, *K. Schum. l. c.* 392.—Afr. trop.
tarennoides, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 353.—Afr. trop.
Warburgiana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 127.—Afr. trop.
Zimmermanniana, *Valet. in Ic. Bogor.* t. 143.—Afr. trop.?

PAVONIA, Cav. (Malvac.).
belophylla, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 43.—Parag.
bullulata, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 299.—Parag.
cochensis, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 690.—Venez.
Edouardii, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 298.—Parag.
Ellenbeckii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 378.—Afr. trop.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 402.—Parag.
patuliloba, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 297.—Parag.
Perini, Perini, 'Canhamo Braziliensis' Prospectus (1905) 8 = Hibiscus unidens.
pulchra, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 42.—Parag.
rhodantha, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 44.—Parag.
vespertilionacea, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1002.—Afr. trop.
vitifolia, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 298.—Parag.

PAYENA, A. DC. (Sapot.).
lanceolata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 42.—Ins. Philipp.

PECTIANTIA, Rafin. (Saxifrag.).
[MITELLA, Tourn. I. K.]
Breweri, *Rydb. in N. Am. Fl.* xxii. 93 (= *Mitella Breweri*).—Am. bor.
latiflora, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
ovalis, *Rydb. l. c.* 94 (= *Mitella ovalis*).—Am. bor.
pentandra, *Rydb. l. c.* 93 (= *Mitella pentandra*).—Am. bor.

PECTINARIA, Haw. (Asclep.).
saxatilis, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1904, i. 211.—Afr. austr.

PECTIS, Linn. (Compos.).
Andersonii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 214.—Ins. Galap.
Barberi, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 48.—Mexic.
erecta, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 57.—Am. cent.

PECTIS :—
guaranitica, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 781.—Parag.
Hookeri, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxviii. 214 (=Lorentia gracilis).—Ins. Galap.
Lehmannii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 620.—Ecuador.
miser, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 273.—Am. bor.
propetes, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 49.—Mexic.
puberula, Greenm. l. c.—Mexic.
purpurea, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 225 (1905).—Mexic.
salina, T. S. Brandegee, l. c. 226.—Mexic.
scabra, T. S. Brandegee, l. c.—Mexic.
Schottii, Millsp. & Chase, in Field Columb. Mus. Bot. iii. 143.—Mexic.
taxifolia, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 148.—Am. bor.

PEDALIOPHYTON, Engl. Jahrb. xxxii. 111 (1902). *PEDALIACEAE.*
Busseanum, Engl. l. c.—Afr. trop.

PEDDIEA, Harv. (Thymel.).
polyantha, Gilg, in Engl. Jahrb. xxx. 361.—Afr. trop.

PEDICULARIS, Linn. (Scrophul.).
angustissima, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 151.—Am. bor.
Bodinieri, Vaniot, ex Bonati, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xiii. (1904) 243.—China.
crassicaulis, Vaniot, ex Bonati, l. c. 241.—China.
dubia, B. Fedtsch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb. i. 155.—As. cent.
Fauriaei, Bonati, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xii. (1903) 518.—Japon.
Futtereri, Diels, in Futterer, Durch Asien, Bot. repr. 20.—Tibet.
Galeobdolon, Diels, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 96.—China.
ganpinensis, Vaniot, ex Bonati, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xiii. (1904) 245.—China.
Grayi, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 100.—Am. bor.
gredensis, Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlviii. 414.—Hispan.
hians, Eastw. in Coult. Bot. Gaz. xxxiii. 289.—Am. bor.
Labordei, Vaniot, ex Bonati, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xiii. (1904) 242.—China.
Levelleana, Bonati, l. c. xii. (1903) 519.—Japon.
lunata, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 27.—Am. bor.
mogollonica, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 151.—Am. bor.
odontochila, Diels, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 97.—China.
pedemontana, Wolf, in Rouy, Illustr. Pl. Eur. t. 446.—Ital.
pseudo-Karoi, Bonati, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xv. (1905) p. xi.—Dahuria.
Rouyana, Wolf, ex Rouy, Illustr. Pl. Eur. t. 416.—Ital.
schugnana, B. Fedtsch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb. i. 156.—As. cent.
Vaniotiana, Bonati, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xiii. (1904) 246.—Japon.

PEDILANTHUS, Neck (Euphorb.).
rubescens, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 209 (1905).—Mexic.

PEDILOCHILUS, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 218. *ORCHIDACEAE.*
papuanum, Schlechter, l. c. 219.—N. Guin.

PELARGONIUM, L'Herit. (Geran.).
Goetzeanum, Engl. Jahrb. xxx. 334.—Afr. trop.
Heckmannianum, Engl. l. c. 335.—Afr. trop.
inaequilobum, Mast. in Gard. Chron. 1901, i. 133.—Afr. trop.

PELECYPHORA, Ehrenb. (Cactac.).
pectinata, Hort. ex Cobbold, in Journ. Hortic. (1903) 332, nomen.—Hab. ?

PELEXIA, Rich. (Orchid.).
adnata, Cogn. in Urb. Symb. Antill. iv. 164 (=Satyrium adnatum).—Ind. occ.

PELLACALYX, Korth. (Rhizoph.).
pustulata, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 47.—Ins. Philipp.

PELLETIERA, A. St. Hil. = **Asterolinon**, Hoffmgg. & Link (Primul.).
serpyllifolia, Webb, ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 316 = A. Linum-stellatum.

PEMPHIS, Forst. (Lythrac.).
madagascariensis, Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac. 187 (=Lagerstroemia madagascariensis).—Madag.

PENNISETUM, Rich. (Gramin.).
arvense, Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 119.—Afr. trop.
erythraeum, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. 39.—Afr. or. trop.
monostigma, Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 120.—Afr. trop.
montanum, Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 84 (=Hymenachne montana).—Reg. Argent.
nubicum, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. 37 (=Beckeropsis nubica).—Nubia.
Pappianum, Chiov. in Ann. di Bot. Roma, ii. 365.—Afr. trop.
Pirottae, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. 37.—Afr. or. trop.
rigidum, Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 84 (=Gymnothrix rigida).—Reg. Argent.
Schweinfurthii, Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 121.—Afr. trop.
scoparium, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. 38.—Afr. or. trop.
trachyphyllum, Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 122.—Afr. trop.

PENTANISIA, Harv. (Rubiac.).
annua, K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 385.—Afr. trop.
pentagyne, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. 350.—Afr. trop.
rhodesiana, S. Moore, in Journ. Bot. 1902, 252.—Afr. trop.
sericocarpa, S. Moore, l. c. 251.—Afr. trop.

PENTAPANAX, Seem. (Aral.).
bellenden-kerianse, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. xv. 491.—Austral.
verticillatum, Dunn. in Journ. Linn. Soc. xxxv. 498.—China.

PENTAPHRAGMA, Wall. (Campanul.).
albiflorum, H. H. W. Pearson, in Hook. Ic. Pl. t. 2706.—Malaya.
ellipticum, Poulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1903, 321.—Malaya.

PENTAPTILON, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. (1905) 564. *GOODENIACEAE.*
Careyi, E. Pritz. l. c. (=Catosperma Careyi).—Austral.

PENTAS, Benth. (Rubiac.).
concinna, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. 335.—Afr. trop.
hindsioides, K. Schum. l. c. xxxiv. 330.—Afr. trop.
Liebrechtsiana, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 153.—Afr. trop.
oncostipula, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiv. 329.—Afr. trop.
Wyliei, N. E. Br. in Kew Bull. 1901, 123.—Afr. austr.

PENTATROPIS, R. Br. (Asclep.).
fasciculatus, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 381 (=Pentarrhinum fasciculatum).—Afr. trop.

PENTSTEMON, Mitch. (Scrophul.).
Adamsianus, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 511.—Am. bor.
anguineus, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 208.—Calif.
Austini, Eastw. l. c. 206.—Calif.
australis, Small, Fl. S. E. U. S. 1060.—Am. bor.
Bakeri, Greene, Pittonia, iv. 318.—Am. bor.
Berryi, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1906, 209.—Calif.
calcareus, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 152 (1903).—Am. bor.
Cardwellii, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 510.—Am. bor.
cephalophorus, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 79.—Calif.

PENTSTEMON :—
cyathophorus, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 643.—Am. bor.
Dayanus, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 511.—Am. bor.
Eastwoodiae, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 4.—Am. bor.
erosus, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 28.—Am. bor.
exilifolius, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 230.—Am. bor.
formosus, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 100.—Am. bor.
Gormani, Greene, in Ottawa Natural. xvi. 39.—Am. bor.
Grinnellii, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 207.—Calif.
intonsus, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 44.—Calif.
isophyllus, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 267.—Mexic.
Kennedyi, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 97.—Am. bor.
macranthus, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 207.—Am. bor.
oreganus, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 515.—Am. bor.
oreophilus, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 642.—Am. bor.
Owenii, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 32.—Am. bor.
pallidus, Small, Fl. S. E. U. S. 1060.—Am. bor.
paniculatus, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 513.—Am. bor.
procumbens, Greene, Pl. Baker. iii. 23.—Am. bor.
rupicola, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 510.—Am. bor.
scabridus, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 208.—Calif.
stenosepalus, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 514.—Am. bor.
Stephensi, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 151 (1903).—Am. bor.
strictiformis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 642.—Am. bor.
suffrutescens, Rydb. l. c. 603.—Am. bor.
superbus, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 100.—Am. bor.
tenuis, Small, Fl. S. E. U. S. 1061.—Am. bor.
teucrioides, Greene, Pl. Baker. iii. 23.—Am. bor.
violaceus, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 96.—Am. bor.
Willcoxii, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 28.—Am. bor.
xylus, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxiv. 31.—Am. bor.

PENTZIA, Thunb. (Compos.).
athanasioides, S. Moore, in Journ. Bot. 1903, 133.—Afr. austr.
calva, S. Moore, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1020.—Afr. trop.
monocephala, S. Moore, l. c.—Afr. trop.

PEPEROMIA, Ruiz & Pav. (Piperac.).
acuminata, C. DC. in Urb. Symb. Antill. iii. 242 (=Piper acuminatum, Linn.).—Ind. occ.
albostriata, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 402.—Parag.
argyroneura, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 257.—Ins. Bismarck.
boninsimensis, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xv. 146.—Japon.
Broadwayi, C. DC. in Urb. Symb. Antill. iii. 240.—Ind. occ.
controversa, C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 117.—Reg. Amaz.
Davisii, Britton, in Torreya, ii. 48.—Ind. occ.
Dussii, C. DC. in Urb. Symb. Antill. iii. 231.—Ind. occ.
gibba, C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 116.—Peruv.
Harrisii, C. DC. in Urb. Symb. Antill. iii. 243.—Ind. occ.
Hassleri, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 401.—Parag.
japonica, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xv. 145.—Japon.
juruana, C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 117.—Reg. Amaz.
Lauterbachii, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 237.—N. Guin.
longipila, C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 115.—Peruv.
mararyna, C. DC. l. c. 117.—Reg. Amaz.
obovata, C. DC. in Urb. Symb. Antill. iii. 269 (=Piper obovatum).—Ind. occ.

PEPEROMIA :—
palcipila, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 358.—Bras.
robustior, Urb. Symb. Antill. iv. 191.—Ind. occ.
rungwensis, Engl. Jahrb. xxx. 290.—Afr. trop.
saxigaudens, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 402.—Parag.
Schlechteri, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 238.—N. Guin.
Schwackei, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 359.—Bras.
Sintenisii, C. DC. in Urb. Symb. Antill. iii. 240.—Ind. occ.
sipense, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 504, sphalm. = ripense.
Smithiana, C. DC. in Urb. Symb. Antill. 235.—Ind. occ.
Snodgrassii, C. DC. in Proc. Amer. Acad. xxxviii. (1902) 131.—Ins. Galap.
subelongata, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 401.—Parag.
sulcata, C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 116.—Reg. Amaz.
tenuilimba, C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 116.—Reg. Amaz.
tenuissima, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 358.—Bras.
trichoclada, C. DC. l. c. 360.—Bras.
truncigaudens, C. DC. in Urb. Symb. Antill. iii. 237.—Ind. occ.
ukingensis, Engl. Jahrb. xxx. 289.—Afr. trop.
yabucoana, Urb. & C. DC. in Urb. Symb. Antill. iii. 232.—Ind. occ.

PEPONIA, Naud. (Cucurb.).
Cogniauxii, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 344.—Afr. trop.
leucantha, Gilg, l. c. 367.—Afr. trop.
macroura, Gilg, l. c. 344.—Afr. trop.
rufotomentosa, Gilg, l. c. 345.—Afr. trop.
urticoides, Gilg, l. c. 346.—Afr. trop.

PERAMIUM, Salisb. (Orchid.).
[GOODYERA, R. Br. I. K.]
ophioides, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 302.—Am. bor.

PERDICIUM, Linn. (Compos.).
nutans, Poepp. ex Reiche, Fl. Chile, iv. 439 (= Perezia nutans).—Chili.
prenanthoides, Poepp. ex Reiche, l. c. (= Perezia prenanthoides).—Chili.

PERESKIA, Plum. (Cactac.).
nicoyana, A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 468.—Am. centr.

PEREZIA, Lag. (Compos.).
atacamensis, Reiche, Fl. Chile, iv. 443 (= Clarionea atacamensis).—Chili.
bellidifolia, Reiche, l. c. 455 (= Homoianthus bellidifolius).—Chili.
calophylla, Reiche, l. c. 453 (= Homoianthus calophyllus).—Chili.
capito, Reiche, l. c. 450 (= Homoianthus capito).—Chili.
ciliosa, Reiche, l. c. 444 (= Clarionea ciliosa).—Chili.
Foncki, Reiche, l. c. 452 (= Clarionea Foncki).—Chili.
laciniata, Reiche, l. c. 454 (= Clarionea laciniata).—Chili.
Lechleri, Wildem. Rés. Voy. Belgica, Bot. 178 (= Clarionea Lechleri).—Reg. Magell.
Lozani, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xli. 268.—Mexic.
megacephala, Greenm. l. c. 269.—Mexic.
palustris, Reiche, Fl. Chile, iv. 442 (= Homoianthus palustris).—Chili.
pampeana, Speg. Contrib. Fl. Tandil, 83.—Reg. Argent.
pectinata, Reiche, Fl. Chile, iv. 455 (= Homoianthus pectinatus).—Reg. Argent.
pinetorum, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 105 (1901).—Calif.
pinnata, Reiche, Fl. Chile, iv. 453 (= Clarionea pinnata).—Chili.
triceps, Reiche, l. c. 449 (= Homoianthus triceps).—Chili.
variabilis, Reiche, l. c. 450 (= Homoianthus variabilis).—Chili.

PERGULARIA, Linn. (Asclep.).
adenophylla, Schlechter & K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. 331.—Afr. trop.

PERGULARIA :—
angustiloba, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 134.—Ins. Philipp.
filipes, Schlechter, in Perkins, l. c. 133.—Ins. Philipp.

PERIBLEPHARIS, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 290. OCHNACEAE.
Schwackeana, Van Tiegh. l. c. 291; et in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xix. 14 (= Luxemburgea Schwackeana).—Bras.

PERIGLOSSUM, Decne. (Asclep.).
[CORDYLOGYNE, E. Mey. I. K.].
mossambicense, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxviii. 33.—Afr. trop.

PERISTYLUS, Blume (Orchid.).
[HABENARIA, Willd. I. K.]
candidus, J. J. Sm. Orchid. Java, 36.—Java.
cynosorchioides, Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 76.—N. Guin.
coeloceras, Finet, in Rev. Gén. Bot. xiii. 519.—China.
forceps, Finet, l. c. 521.—China.
monanthus, Finet, l. c. 523.—China.
neglectus, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 924 (= Habenaria neglecta).—Ind. or.
Nymanianus, Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 76.—N. Guin.
pseudophrys, Kraenzl. Orch. Gen. et Sp. i. 925 (= Habenaria pseudophrys).—Reg. Himal.
tentaculatus, J. J. Sm. Orchid. Java, 35 (= Glossula tentaculata).—Java.
tetralobus, Finet, in Rev. Gén. Bot. xiii. 524.—China.

PERITYLE, Benth. (Compos.).
grandifolia, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 224 (1905).—Mexic.
Rosei, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 45.—Mexic.
saxosa, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 225 (1905).—Mexic.

PERIZOMA, Miers (Solan.).
[SALPICHROA, Miers. I. K.]
rhomboidea, Small, Fl. S. E. U. S. 991 (= Atropa rhomboidea).—Am. bor.

PERNETTYA, Gaudich. (Ericac.).
marginata, N. E. Br. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. vi. 43.—Guiana.
ovata, Fernald, in Proc. Amer. Acad. xxxvi. 490.—Mexic.
Seleriana, Loesen. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 217.—Mexic.

PEROTIS, Ait. (Gramin.).
phleoides, Hack. in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich, xlix. 171.—Afr. austr.

PERRALDERIA, Coss. (Compos.).
[GRANTIA, Boiss. I. K.]
Dessignyana, Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, vii–viii. 217.—Alger.

PERRIERA, Courchet, in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. (1905) 284; et in Ann. Inst. Col. Marseille, xiii. (1905) 196. SIMARUBACEAE.
madagascariensis, Courchet, ll. cc.—Madag.

PERSEA, Plum. (Laurac.).
Baileyana, F. Muell. ex F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. 51.—Austral.
fusca, Mez, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 14.—Bras.
littoralis, Small, Fl. S. E. U. S. 820.—Am. bor.
nammu, Ind. Kew. ii. 474, sphalm. = seq.
nan-mu, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1316.—China.
pallida, Mez & Pittier, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 231.—Am. cent.
Pittieri, Mez, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 15.—Am. cent.

PERSICARIA, Linn. (Polygon.).
[POLYGONUM, Linn. I. K.].
aboriginum, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 41.—Am. bor.
abscissa, Greene, l. c. 46.—Am. bor.
alismaefolia, Greene, l. c. 44.—Calif.
ammophila, Greene, l. c. 47.—Am. bor.
Andrewsii, Greene, l. c. 109.—Am. bor.
arcuata, Greene, l. c. 24 (= Polygonum arcuatum).—Calif.
asclepiadea, Greene, l. c. 46.—Am. bor.
canadensis, Greene, l. c. 28.—Am. bor.
Careyi, Greene, l. c. 24 (= Polygonum Careyi).—Am. bor.

PERSICARIA :—
chelanica, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 49.—Am. bor.
coccinea, Greene, l. c. 24, 35 (= Polygonum coccineum).—Am. bor.
Covillei, Greene, l. c. 44.—Calif.
Cusickii, Greene, l. c. 42.—Am. bor.
emersa, Small, Fl. S. E. U. S. 376.—Am. bor.
fallax, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 24 (= Polygonum fallax, Greene).—Am. bor.
fistulosa, Greene, l. c. 32.—Am. bor.
fluitans, Greene, l. c. 26 (= Polygonum fluitans).—Am. bor.
franciscana, Greene, l. c. 42.—Calif.
fusiformis, Greene, l. c. 24 (= Polygonum fusiforme).—Am. bor.
grandifolia, Greene, l. c. 37, 49.—Am. bor.
Hartwrightii, Greene, l. c. 24, 46 (= Polygonum Hartwrightii).—Am. bor.
hesperia, Greene, l. c. 43.—Calif.
hirsuta, Small, Fl. S. E. U. S. 379 (= Polygonum hirsutum).—Am. bor.
homalostachya, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 48.—Am. bor.
hydropiperoides, Small, Fl. S. E. U. S. 378 (= Polygonum hydropiperoides).—Am. trop.
incarnata, Small, l. c. 377 (= Polygonum incarnatum).—Am. bor.
insignis, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 32.—Calif.
lactevirens, Greene, l. c. 31.—Am. bor.
Langloisii, Greene, l. c. 41.—Am. bor.
laurina, Greene, l. c. 35.—Am. bor.
lonchophylla, Greene, l. c. 37.—Am. bor.
longistyla, Small, Fl. S. E. U. S. 377 (= Polygonum longistylum).—Am. bor.
ludoviciana, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 24 (= Polygonum ludovicianum).—Am. bor.
mesochora, Greene, l. c. 28.—Am. bor.
mexicana, Small, Fl. S. E. U. S. 377 (= Polygonum mexicanum).—Am. bor.
muricalata, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 47.—Am. bor.
nebrascensis, Greene, l. c.—Am. bor.
Novae-Angliae, Greene, l. c. 34.—Am. bor.
omissa, Greene, l. c. 24 (= Polygonum omissum).—Am. bor.
opelousana, Small, Fl. S. E. U. S. 378 (= Polygonum opelousanum).—Am. bor.
ophiophila, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 44.—Calif.
oregana, Greene, l. c. 31.—Am. bor.
otophylla, Greene, l. c. 41.—Am. bor.
pennsylvanica, Small, Fl. S. E. U. S. 377 (= Polygonum pennsylvanicum).—Am. bor.
Persicaria, Small, l. c. 378 (= Polygonum Persicaria).—Reg. bor. temp.
persicarioides, Small, l. c. (= Polygonum persicarioides).—Am. bor.
plantaginea, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 40.—Am. bor.
plattensis, Greene, l. c. 29.—Am. bor.
Porteri, Greene, l. c. 35.—Am. bor.
portoricensis, Small, Fl. S. E. U. S. 377 (= Polygonum portoricense).—Am. calid.
pratincola, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 36.—Am. bor.
propinqua, Greene, l. c. 39.—Am. bor.
psychrophila, Greene, l. c. 31.—Am. bor.
punctata, Small, Fl. S. E. U. S. 379 (= Polygonum punctatum).—Am. bor. et austr.
purpurata, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 27.—Am. bor.
remota, Greene, l. c. 34.—Am. bor.
rigidula, Greene, l. c. 24, 39 (= Polygonum rigidulum).—Am. bor.
Rothrockii, Greene, l. c. 45.—Mexic.
segeta, Small, Fl. S. E. U. S. 378 (= Polygonum segetum).—Am. bor.
setacea, Small, l. c. 379 (= Polygonum setaceum).—Am. bor.
spectabilis, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 37.—Am. bor.
subcoriacea, Greene, l. c. 30.—Am. bor.
vestita, Greene, l. c. 38.—Am. bor.
villosula, Greene, l. c. 49.—Am. bor.
Wardii, Greene, l. c. 40.—Am. bor.

PERTYA, Sch. Bip. (Compos.).
Bodinieri, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xii. (1903) 116.—China.

PERULARIA, Lindl. (Orchid.).
[HABENARIA, Willd. I. K.]
flava, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 292 (= Habenaria flava).—Am. bor.

PERYMENIUM, Schrad. (Compos.).
calvum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 41.—Mexic.
flexuosum, *Greenm. l. c.* xli. 263.—Mexic.
macrocephalum, *Greenm. l. c.* xxxix. 108.—Mexic.

PETALIDIUM, Nees (Acanth.).
cirrhiferum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 307.—Afr. trop.
Gossweileri, *S. Moore, l. c.* 305.—Afr. trop.
tomentosum, *S. Moore, l. c.* 306.—Afr. trop.

PETALOLOPHUS, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, (1905) 265. *ANONACEAE.*
megalopus, *K. Schum. l. c.*—N. Guin.

PETALOSTEMON, Michx. (Legum.).
albidus, *Small, Fl. S. E. U. S.* 630.—Am. bor.
Porterianus, *Small, l. c.* 631.—Am. bor.
pubescens, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 395.—Am. bor.
pubescens, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 28 = pulcherrimum.
Stanfieldii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 631.—Am. bor.

PETALOSTIGMA, F. Muell. (Euphorb.).
Banksii, *Britten & S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 225.—Austral.

PETALOSTYLIS, R. Br. (Legum.).
millefolium, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 275.—Austral.

PETASITES, Linn. (Compos.).
dentata, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 102.—Am. bor.
gracilis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 186.—Am. bor.
Rechingeri, *Hayek, Sched. Fl. Stir.* i–ii. (1904) 29.—Hybr.

PETROMECON, Greene, Pittonia, v. (1905) 293. *PAPAVERACEAE.*
frutescens, *Greene, l. c.* 294.—Calif.
Palmeri, *Greene, l. c.* 293 (= *Eschscholtzia Palmeri*).—Calif.

PETROSAVIA, Becc. (Liliac.).
Miyoshia-Sakuraii, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 208 (= *Miyoshia Sakuraii*).—Japon.

PETUNGA, DC. (Rubiac.).
brevispica, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lix. (1902) 117.—Java.

PEUCEDANUM, Linn. (Umbellif.).
cartilagino-marginatum, *Makino, ex Yabe, in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xvi. iv. 100.—Japon.
deltoideum, *Makino, ex Yabe, l. c.* 99.—Japon.
elegans, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 430.—As. or.
Jaredi, *Eastw. in Zoe*, v. 88 (1900).—Calif.
kingaense, *Engl. Jahrb.* xxx. 368.—Afr. trop.
Malcolmii, *Hemsl. & H. H. W. Pearson, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 179.—As. cent.
medicum, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 496.—China.
montanum, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 93 (= *Lomatium montanum*).—Am. bor.
nagpurense, *Prain, Bengal Pl.* 540.—Ind. or.
oligophyllum, *Vandas, in Magyar Bot. Lap.* iv. 110.—Turcia.
orientale, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 93 (= *Lomatium orientale*).—Am. bor.
Podagraria, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 957.—China.
Porphyroscias, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 65 = decursivum.
praeruptorum, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 497.—China.
salsugineum, *Krylov, in Act. Hort. Petrop.* xxi. 8.—As. cent.
torilifolium, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 852.—China.

PEZISICARPUS, Vernet, in Bull. Econom. Indo-Chine, vii. (1904) 1193. *APOCYNACEAE.*
montana, *Vernet, l. c.*—Siam.

PHACA, Linn. (Legum.).
[Astragalus, Linn. I. K.]
artipes, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 664 (= *Astragalus artipes*).—Am. bor.
Bodinii, *Rydb. l. c.* 665 (= *Astragalus Bodinii*).—Am. bor.
cerussata, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus cerussatus*).—Am. bor.
Eastwoodiae, *Rydb. l. c.* 664 (= *Astragalus Eastwoodiae*).—Am. bor.
elatiocarpa, *Rydb. l. c.* 665 (= *Astragalus elatiocarpus*).—Am. bor.
humillima, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus humillimus*).—Am. bor.
leucoloba, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 65 (= *Astragalus leucolobus*).—Calif.
oxyphysa, *A. A. Heller, l. c.* 86 (= *Astragalus oxyphysus*).—Calif.
Reverchonii, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 619 (= *Astragalus Reverchonii*).—Am. bor.
tejonensis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 85 (= *Astragalus tejonensis*).—Calif.
Wetherillii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 665 (= *Astragalus Wetherillii*).—Am. bor.

PHACELIA, Juss. (Hydrophyll.).
alba, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 30.—Am. bor.
corrugata, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 26.—Am. bor.
Coulteri, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 241.—Mexic.
dissecta, *Small, Fl. S. E. U. S.* 972.—Am. bor.
eximia, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 204.—Calif.
foetida, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 58.—Am. bor.
Knighti, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 229.—Am. bor.
lenta, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 44.—Am. bor.
madrensis, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 85.—Mexic.
monosperma, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 95.—Am. bor.
racemosa, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 58 = nanatoides.
rupestris, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 152.—Am. bor.
stimulans, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 291.—Am. bor.

PHACELOPHRYNIUM, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. 120 (1902). *MARANTACEAE.*
bracteosum, *K. Schum. l. c.* 123 (= *Phrynium bracteosum*).—Ins. Philipp.
interruptum, *K. Schum. l. c.* 121 (= *Phrynium interruptum*).—Ins. Philipp.
longispica, *K. Schum. l. c.* 122.—Celebes.
maximum, *K. Schum. l. c.* (= *Phrynium maximum*).—Java.
nicobaricum, *K. Schum. l. c.* 121 (= *Phrynium nicobaricum*).—Ins. Nicobar.
tapirorum, *K. Schum. l. c.* 122 (= *Phrynium tapirorum*).—Penins. Mal.

PHACOPSIS, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 661. *LEGUMINOSAE.*
Pattersoni, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus Pattersoni*).—Am. bor.
praelongus, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus praelongus*).—Am. bor.

PHAEANTHUS, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).
acuminatus, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 11.—Ins. Philipp.

PHAEOMERIA, Lindl. (Scitam.).
[Amomum, Linn. I. K.]
atropurpurea, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 266 (= *Elettaria atropurpurea*).—Sumatra.
chrysocalyx, *K. Schum. l. c.* 265 (= *Amomum chrysocalyx*).—Sumatra.
ciliata, *K. Schum. l. c.* 266 (= *Amomum ciliatum*).—Zeylan.
Diepenhorstii, *K. Schum. l. c.* 265 (= *Elettaria Diepenhorstii*).—Sumatra.
fulgens, *K. Schum. l. c.* 262 (= *Hornstedtia fulgens*).—Penins. Mal.
fulviceps, *K. Schum. l. c.* 263 (= *Amomum fulviceps*).—Zeylan.

PHAEOMERIA:—
grandiligulata, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 268 (= *Amomum grandiligulatum*).—Sumatra.
hemisphaerica, *K. Schum. l. c.* (= *Elettaria hemisphaerica*).—Java.
magnifica, K. Schum. l. c. 262 = imperialis.
Maingayi, *K. Schum. l. c.* 266 (= *Amomum Maingayi*).—Penins. Mal.
moluccana, *K. Schum. l. c.*—Ins. Molucc.
novoguineensis, *K. Schum. l. c.* 265.—N. Guin.
pallida, *K. Schum. l. c.* 264 (= *Elettaria pallida*).—Java.
solaris, *K. Schum. l. c.* (= *Elettaria solaris*).—Java.
venusta, *K. Schum. l. c.* (= *Hornstedtia venusta*).—Penins. Mal.

PHAEOPAPPUS, Boiss. (Compos.).
[Centaurea, Linn. I. K.]
daghestanicus, *Lipsky, in Act. Hort. Tiflis*, vi. i. 62.—Reg. Caucas.
scleroblepharus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 271.—Oriens.

PHAIUS, Lour. (Orchid.).
borneensis, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 111 C.—Borneo.
Marthae, *Hort. ex Gartenfl.* 449.—Hybr.
occidentalis, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 211.—Afr. trop.
papuanus, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 139.—N. Guin.
simulans, *Rolfe, in Orch. Rev.* ix. 48.—Madag.

PHALAENOPSIS, Blume (Orchid.).
luteola, *Burbidge, Gardens of Sun*, 256.—Borneo.

PHALANGITES, Bub. Fl. Pyren. iv. 108 = **Anthericum**, Linn. (Liliac.).
Liliago, Bub. l. c. = A. Liliago.
ramosus, Bub. l. c. 109 = A. ramosum.

PHALERIA, Jack (Thymel.).
acuminata, *Knuth, Handb. Blütenb.* iii. 522 (= *Leucosmia acuminata*).—Ins. Fiji.
Burnettiana, *Knuth, l. c.* (= *Leucosmia Burnettiana*).—Ins. Fiji.

PHANOPYRUM, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 104 (1903). *GRAMINEAE.*
gymnocarpon, *Nash, l. c.* (= *Panicum gymnocarpon*).—Am. bor.

PHARBITIS, Choisy (Convolv.).
[Ipomoea, Linn. I. K.]
Lindheimeri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 964 (= *Ipomoea Lindheimeri*).—Am. bor.

PHARMACOSYCEA, Miq. (Urtic.).
[Ficus, Tourn. I. K.]
Brittoni, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 309.—Bolivia.

PHARUS, P. Br. (Gramin.).
cornutus, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 9 = vittatus.

PHASEOLUS, Linn. (Legum.).
antillanus, *Urb. Symb. Antill.* iv. 309.—Ind. occ.
brevicalyx, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 261.—Mexic.
Buseri, *Micheli, l. c.* 262.—Mexic.
cuernavacanus, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 311.—Mexic.
Dalzellii, *Cooke, Fl. Bombay*, 376.—Ind. or.
elongata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 311.—Mexic.
oaxacanus, *Rose, l. c.* 48.—Mexic.
occidentalis, *Rose, l. c.* 312.—Mexic.
pedatus, *Rose, l. c.* 48.—Mexic.
rubescens, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 158 (1902).—Calif.
Schlechteri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 91.—Afr. austr.
stenocarpus, *Harms, l. c.* 92.—Afr. trop.

PHAYLOPSIS, Willd. (Acanth.).
Lindaviana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 142.—Afr. trop.

PHELLODENDRON, Rupr. (Rutac.).
sachalinense, *Sargent, Trees & Shrubs*, 199, t. 94.—As. or. bor.

PHELLOPTERUS, Nutt. (Umbell.).
[CYMOPTERUS, Rafin. I. K.].
Species quattuor in Suppl. ii. enumeratae ad Phellopterum, *Nutt. (non Benth.), pertinent.*
camporum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 674.—Am. bor.

PHENAX, Wedd. (Urtic.).
pauciserrata, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 313.—Bolivia.

PHILADELPHUS, Linn. (Saxifr.).
angustifolius, *Rydb. in N. Am. Fl.* xxii. 166.—Am. bor.
argenteus, *Rydb. l. c.* 171.—Am. bor.
brachybotrys, *Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 128, nomen.—China.
confusus, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, xxix. 225.—Am. bor.
ellipticus, *Rydb. in N. Am. Fl.* xxii. 172.—Am. bor.
floridus, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 160.—Am. bor.
Fremontii, *Rydb. in N. Am. Fl.* xxii. 165.—Calif.
gloriosus, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 159.—Am. bor.
Helleri, *Rydb. in N. Am. Fl.* xxii. 166.—Am. bor.
intectus, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 160.—Am. bor.
Magdalenae, *Koehne, in Mitth. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1904, 83.—China.
Mearnsii, *Evans, in N. Am. Fl.* xxii. 174.—Am. bor.
minutus, *Rydb. in N. Am. Fl.* xxii. 173.—Am. bor.
pallidus, *Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. (1904) 373.—Eur.
Palmeri, *Rydb. in N. Am. Fl.* xxii. 173.—Mexic.
platyphyllus, *Rydb. l. c.* 167.—Am. bor.
pumilus, *Rydb. l. c.* 173.—Calif.
stramineus, *Rydb. l. c.* 172.—Calif.
strigosus, *Rydb. l. c.* 168.—Am. bor.
subcanus, *Koehne, in Mitth. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1904, 83.—China.

PHILGAMIA, Baill. Hist. Pl. Madag. Atlas (1894) t. 265. *MALPIGHIACEAE.*
hibbertioides, *Baill. l. c.*—Madag.

PHILIBERTIA, H. B. & K. (Asclep.).
bonariensis, *Malme, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 63 (= *Sarcostemma bonariense*).—Am. austr.
riparia, *Malme, l. c.; et in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvii. no. 8, 13 (= *Sarcostemma riparium*).—Parag.

PHILIPPIA, Klotzsch (Ericac.).
Evansii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 316.—Afr. austr.
kemensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 259.—Afr. trop.

PHILODENDRON, Schott (Arac.).
angustialatum, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 131.—Peruv.
bogotense, *Engl. l. c.* 130.—N. Granat.
chinchamayense, *Engl. l. c.* 125.—Peruv.
crassum, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 277.—Am. trop.
densivenium, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 132.—Peruv.
ellipticum, *Engl. l. c.* 126.—Ecuador.
Ernesti, *Engl. l. c.*—Reg. Amaz.
hastatum, *Engl. l. c.* 133.—Ecuador.
huanucense, *Engl. l. c.* 127.—Peruv.
juninense, *Engl. l. c.* 126.—Peruv.
Loefgrenii, *Engl. l. c.*—Bras.
marginatum, *Urb. Symb. Antill.* iv. 135.—Ind. occ.
musifolium, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 126.—Ecuador.
myrmecophilum, *Engl. in Karst. & Schenck. Vegetationsbilder*, iii. (1905) t. 2, et sub tt. 3–4; *Engl. Jahrb.* xxxvii. 127.—Reg Amaz.
nanegalense, *Engl. l. c.* 129.—Ecuador.
obliquifolium, *Engl. l. c.* 125.—Bras.
oligospermum, *Engl. l. c.* 132.—Ecuador.
pilatonense, *Engl. l. c.* 129.—Ecuador.
pulchellum, *Engl. l. c.* 132.—Reg. Amaz.
quitense, *Engl. l. c.* 129.—Ecuador.
riparium, *Engl. l. c.* 128.—Ecuador.
tarmense, *Engl. l. c.*—Peruv.
tenuipes, *Engl. l. c.* 131.—Ecuador.
Traunii, *Engl. l. c.* 127.—Reg. Amaz.
Uleanum, *Engl. l. c.* 131.—Reg. Amaz.

PHILODENDRON:—
validinervium, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 130.—Ecuador.
Weberbaueri, *Engl. l. c.* 133.—Peruv.
Wittianum, *Engl. l. c.* 132.—Reg. Amaz.

PHILOTRIA, Rafin. (Hydrochard.).
[ELODEA, Michx. I. K.]
canadensis, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 60.—Am. bor.
minor, *Small, Fl. S. E. U. S.* 47.—Am. bor.

PHLOGACANTHUS, Nees (Acanth.).
novoguineensis, *Lindau, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 388.—N. Guin.

PHLOMIS, Linn. (Labiat.).
balearica, Chod. in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève, xi. 61 = italica.
grandiflora, *H. S. Thompson, in Ann. Bot.* xix. 441.—As. Min.
megalantha, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 95.—China.

PHLOX, Linn. (Polemon.).
amplifolia, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 757.—Am. bor.
detonsa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 978.—Am. bor.
lanata, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 643.—Am. bor.
Lighthipei, *Small, Fl. S. E. U. S.* 978.—Am. bor.
mesoleuca, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 152.—Am. bor.
villosissima, *Small, Fl. S. E. U. S.* 977.—Am. bor.

PHOEBE, Nees (Laurac.).
costaricana, *Mez & Pittier, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 230.—Am. cent.
neurophylla, *Mez & Pittier, l. c.* 231.—Am. cent.
Pittieri, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 16.—Am. cent.
Tonduzii, *Mez, l. c.* 15.—Am. cent.

PHOLIDOTA, Lindl. (Orchid.).
sulcata, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 107 A.—Borneo.
yunnanensis, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 24.—China.

PHORADENDRON, Nutt. (Loranth.).
florianum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 133 (= *Viscum florianum*).—Ins. Galap.
galapageium, *Robinson, l. c.* (= *Viscum galapageium*).—Ins. Galap.
Giordanae, *Warb. in Tropenpfl.* ix. 635, nomen.—Venez.
Henslovii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 133 (= *Viscum Henslovii*).—Ins. Galap.
Knoopii, *Warb. in Tropenpfl.* ix. 635, nomen.—Venez.
Libocedri, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 608.—Am. bor.
Northropiae, *Urb. in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 33.—Ind. occ.
Palmeri, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 28.—Mexic.
uncinatum, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 134.—Ins. Galap.

PHOTINIA, Lindl. (Rosac.).
luzonensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 18.—Ins. Philipp.

PHRAGMIPEDIUM, Rolfe, in Orch. Rev. iv. (1896) 331, *sphalm.* = **Phragmopedilum**, Rolfe (Orchid.).

PHRAGMITES, Trin. (Gramin.).
pungens, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 771.—Afr. trop.

HRAGMOPEDILUM [“Phragmipedilum”], Rolfe, in Orch. Rev. ix. 175; Pfitz. in Engl. Pflanzenreich, Orchid.-Pleon. 42. *ORCHIDACEAE.*
Boissierianum, *Rolfe, l. c.* iv. 332 (= *Cypripedium Boissierianum*).—Peruv.
caricinum, *Rolfe, l. c.* (= *Cypripedium caricinum*).—Boliv.
caudatum, *Rolfe, l. c.* (= *Cypripedium caudatum*).—Reg. Andin.; Am. cent.
Czerwiakowianum, *Rolfe, l. c.* (= *Cypripedium Czerwiakowianum*).—Peruv.
Hartwegii, *Pfitz. in Engl. Pflanzenreich, Orchid.-Pleon.* 48 (= *Cypripedium Hartwegii*).—Ecuador.
Klotzschianum, *Rolfe, in Orch. Rev.* iv. 332 (= *Cypripedium Klotzschianum*).—Guiana.
Lindleyanum, *Rolfe, l. c.* (= *Cypripedium Lindleyanum*).—Guiana.

PHRAGMOPEDILUM:—
longifolium, *Rolfe, in Orch. Rev.* iv. 332 (= *Cypripedium longifolium*).—Reg. Andin.; Am. cent.
Sargentianum, *Rolfe, l. c.* (= *Selenipedium Sargentianum*).—Bras.
Schlimii, *Rolfe, l. c.* (= *Selenipedium Schlimii*).—N. Granat.
vittatum, *Rolfe, l. c.* (= *Cypripedium vittatum*).—Bras.

PHREATIA, Lindl. (Orchid.).
acuminata, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 506.—Java.
altigena, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 185.—N. Guin.
angraecoides, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
beiningiana, *Schlechter, l. c.* 186.—Ins. Bismarck.
brachystachys, *Schlechter, l. c.*—Ins. Bismarck.
bracteata, *Schlechter, l. c.* 187.—N. Guin.
inversa, *Schlechter, l. c.*—Ins. Bismarck.
laxa, *Schlechter, l. c.* 188.—N. Guin.
linearifolia, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
longicaulis, *Schlechter, l. c.* 189.—N. Guin.
luzoniensis, *Rolfe, in Ames, Orchid.* i. 96.—Ins. Philipp.
oxyantheroides, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 189.—Ins. Bismarck.
petiolata, *Schlechter, l. c.* 190.—N. Guin.
platychila, *Schlechter, l. c.* (= *Thelasis platychila*).—N. Guin.
pusilla, *Rolfe, in Orch. Rev.* xi. 244 (= *Oberonia pusilla*).—Austral.
rhomboglossa, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 190.—Ins. Bismarck.
saccifera, *Schlechter, l. c.* 191.—Ins. Bismarck.
scaphioglossa, *Schlechter, l. c.* 192.—Ins. Bismarck.
sphaerocarpa, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
sulcata, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 505 (= *Eria sulcata*)—Java; Sumatra.
valida, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 193.—N. Guin.

PHRYNE, Bub. Fl. Pyren. iii. 171 = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).
Columnae, Bub. l. c. 172 = S. Columnae.
Gesneri, Bub. l. c. 176 = S. Thalianum.
hispanica, Bub. l. c. 175 = S. hispanicum.
laxata, Bub. l. c. = S. Irio.
multisiliquosa, Bub. l. c. 174 = S. austriacum.
Peyrousiana, Bub. l. c. 178 = Descurainea Peyrousiana.
pinnatifida, Bub. l. c. 177 = Braya pinnatifida.
subulata, Bub. l. c. 173 = Sisymbrium polyceratium.
Sophia, Bub. l. c. 175 = S. Sophia.
tanacetifolia, Bub. l. c. = S. tanacetifolium.
vulgaris, Bub. l. c. 173 = S. officinale.

PHRYNIUM, Loefl. (Scitamin.).
baccatum, *K. Schum. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 233.—Afr. trop.
confertum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 56 (= *Calathea conferta*).—Afr. trop.
gracile, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 67.—Ins. Bismarck.
Mannii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich. Marant.* 56 (= *Calathea Mannii*).—Afr. trop.
Micholitzii, *Hort. ex Gard. Chron.* 1903, i. 245.—N. Guin.
minus, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 270.—Malaya.
pedunculatum, *Warb. ex K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 55.—N. Guin.
tetranthum, *K. Schum. l. c.*—Ind. or.
tonkinense, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 179.—Tonkin.

PHTHIRUSA, Mart. (Loranth.).
[LORANTHUS, Linn. I. K.].
papillosa, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiii. *Beibl.* lxxii. 15.—Bras.

PHYGELIUS, E. Mey. (Scrophul.).
aequalis, *Harv. ex Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 213.—Afr. austr.

PHYLA, Lour. (Verben.).
[LIPPIA, Linn. I. K.].
lucida, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1012.—Am. bor.

PHYLICA, Linn. (Rhamnac.).
Dodii, *N. E. Br. in Journ. Bot.* 1901, 399.—Afr. austr.

PHYLLACTIS, Pers. (Valerian.).
regularis, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901) repr. 67 (= *Valeriana regularis*).—Patag.
salicariifolia, *Speg. l. c.* 67 (= *Valeriana salicariifolia*).—Patag.

PHYLLANTHUS, Linn. (Euphorb.).
acacioides, *Urb. Symb. Antill.* iii. 287.—Ind. occ.
bahamensis, *Urb. l. c.* 289.—Ind. occ.
barbadensis, *Urb. l. c.* 287.—Ind. occ.
brisbanicus, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 1418.—Austral.
Buchii, *Urb. Symb. Antill.* iii. 288.—Ind. occ.
cuscutaeflorus, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 148.—Austral.
Drummondii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 692.—Am. bor.
evanescens, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 207 (1905).—Mexic.
Garberi, *Small, Fl. S. E. U. S.* 692.—Am. bor.
isolepis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 290.—Ind. occ.
liukiuensis, *Hayata, in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xx. no. 3, 11.—Japon; Ins. Liukiu.
Maitlandianus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 338.—Austral.
Matsumurae, *Hayata, ex Yabe, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 12; *et in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xx. no. 3, 11.—Japon.
Mocquerysianus, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér.* II. i. 564.—Madag.
Niinamii, *Hayata, in Journ. Coll. Sci. Tokyo*, xx. no. 3, 14.—Japon.
pachystylus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 286.—Ind. occ.
portoricensis, *Urb. l. c.* iv. 338 (= *Diasperus portoricensis*).—Ind. occ.
profusus, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 113.—Afr. trop.
radicans, *Small, Fl. S. E. U. S.* 692.—Am. bor.
saxicola, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 425.—Am. bor.
ugandensis, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 210.—Afr. trop.
Weinlandii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 287.—N. Guin.

PHYLLAUREA, Lour. (Euphorb.).
[CODIAEUM, Rumph. I. K.]
variegata, *W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* ix. 352 (= *Croton variegatum*, Linn.).—Malaya.

PHYLLOCACTUS, Link (Cactac.).
belgica, *Laet, in Wien, Ill. Gart. Zeit.* 1904, 409.—Hab.?
biformis, *K. Schum. Monatsschr. Kakt.* 1904, 11.—Hab.?
cartagensis, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 462.—Ind. occ.
costaricensis, *A. Weber, l. c.* 463.—Ind. occ.
Darrahii, *K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* i. 69.—Mexic.
grandilobus, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 464.—Ind. occ.
Kampmanni, *Hort. ex Orcutt, Rev. Cact.* ii. 91; *et in W. Amer. Sci.* xiii. 63.—Hab.?
lepidocarpus, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 462.—Ind. occ.
macrocarpus, *A. Weber, l. c.* 464.—Ind. occ.

PHYLLOCLADUS, Rich. (Conif.).
protractus, *Pilg. in Engl. Pflanzenreich, Taxac.* 99.—Malaya.

PHYLLOCOSMUS, Klotzsch (Linac.).
candidus, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 269.—Afr. trop.
Dewevrei, *Engl. Jahrb.* xxxii. 109.—Afr. trop.
senensis, *Engl. l. c.* 110.—Afr. trop.

PHYLLODES, Lour. (Scitamin.).
baccatum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xv. 442 (= *Phrynium baccatum*).—Afr. trop.

PHYLLODOCE, Salisb. (Ericac.).
[BRYANTHUS, S. G. Gmel. I. K.]
aleutica, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 1; *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 134 (= *Menziesia aleutica*).—Am. bor. occ.; As. bor. or.
Breweri, *A. A. Heller, l. c.* (= *Bryanthus Breweri*).—Am. bor.
glanduliflora, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 419 (= *Bryanthus glanduliflorus*).—Am. bor.
nipponica, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 131.—Japon.

PHYLLOPODIUM, Benth. (Scrophul.).
alpinum, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 128.—Afr. austr.
Augei, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. II. 313.—Afr. austr.
Baurii, *Hiern, l. c.* 320.—Afr. austr.
calvum, *Hiern, l. c.* 316.—Afr. austr.
minimum, *Hiern, l. c.* 318.—Afr. austr.
multifolium, *Hiern, l. c.* 316.—Afr. austr.
Rudolphi, *Hiern, l. c.* 320.—Afr. austr.
rupestre, *Hiern, in Journ. Bot.* 1903, 365.—Afr. austr.
Schlechteri, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. II. 319.—Afr. austr.
sordidum, *Hiern, l. c.* 314.—Afr. austr.

PHYLLOSPADIX, Hook. (Naiad.).
japonicus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xi. (1897) (137).—Japon.

PHYLLOSTACHYS, Sieb. & Zucc. (Gramin.).
congesta, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 438.—China.
Faberi, *Rendle, l. c.* 439.—China.
Henryi, *Rendle, l. c.* 440.—China.
heterocycla, *Matsum. Enum. Sci. Names* (1895) 213 (= *Bambusa heterocycla*).—Japon.
montana, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 441.—China.
nana, *Rendle, l. c.*—China.
quadrangularis, *Rendle, l. c.* 443 (= *Bambusa quadrangularis*).—China; Japon.
Veitchiana, *Rendle, l. c.*—China.

PHYLLOTA, Benth. (Legum.).
Georgii, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2778.—Austral.

PHYLLOXYLON, Baill. (Legum.).
Cloiselii, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 192.—Madag.
ensifolius, *Baill. ex Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 191.—Madag.
Perrieri, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 192.—Madag.

PHYMASPERMUM, Less. (Compos.).
appressum, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 139.—Afr. austr.

PHYSALIS, Linn. (Solan.).
floridana, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 983.—Am. bor.
minuta, *Griggs, in Torreya*, iii. 138.—Mexic.
missouriensis, *Mackenzie & Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xii. 84; *Fl. Jacks. County*, 167.—Am. bor.
monticola, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 711.—Am. bor.
pendula, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 983.—Am. bor.
puberula, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 502.—Mexic.
sinuata, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 986.—Am. bor.
subglabrata, *Mackenzie & Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xii. 86; *Fl. Jacks. County*, 167.—Am. bor.

PHYSARIA, A. Gray (Crucif.).
acutifolia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 279.—Am. bor.
brassicoides, *Rydb. l. c.* 1902, 237.—Am. bor.
floribunda, *Rydb. l. c.* 1901, 279.—Am. bor.
macrantha, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 69.—Am. bor.
vitulifera, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 278.—Am. bor.

PHYSEDRA, Hook. f. (Cucurb.).
chaetocarpa, *Harms & Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. 352.—Afr. trop.
elegans, *Harms & Gilg, l. c.* 353.—Afr. trop.
macrantha, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.

PHYSOSTEGIA, Benth. (Labiat.).
veroniciformis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1028.—Am. bor.

PHYSOSTELMA, Wight (Asclep.).
papuanum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 361.—N. Guin.

PHYSOSTEMON, Mart. (Capparid.).
[CLEOME, Linn. I. K.]
Hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 797.—Parag.

PHYSOTRICHIA, Hiern (Umbellif.).
arenaria, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 324.—Afr. trop.

PHYSURUS, Rich (Orchid.).
austrobrasiliensis, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 152.—Bras.
Henryi, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee, 87, errore = chinensis.
Kuczynskii, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 152.—Bras.
polygonatus, *Ames, in Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem.* vii. 50, nomen.—Am. cent.
purpureus, *Ames, l. c.*—Am. cent.
venustulus, *Ames, l. c.*—Am. cent.

PHYTEUMA, Linn. (Campan.).
Aizoon, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 38 (= *Podanthum Aizoon*).—As. Min.
gallicum, *R. Schulz, Monogr. Bearb. Phyteuma*, 88.—Gallia.
hedraianthifolium, *R. Schulz, l. c.* 150.—Eur.
hispanicum, *R. Schulz, l. c.* 127.—Hispan.
obtusifolium, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 38 (= *Podanthum obtusifolium*).—As. Min.
pedemontanum, *R. Schulz, Monogr. Bearb. Phyteuma*, 163.—Eur.
pyrenaicum, *R. Schulz, l. c.* 79.—Hispan.
scaposum, *R. Schulz, l. c.* 96.—Eur.
Schlatteri, *Chenev. in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève*, ix. 126.—Hybr.
Sintenisii, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 38 (= *Podanthum Sintenisii*).—As. Min.
tenerum, *R. Schulz, Monogr. Bearb. Phyteuma*, 122.—Eur.
Villarsii, *R. Schulz, l. c.* 143.—Gallia.

PHYTOLACCA, Tourn. (Phytolacc.).
rigida, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 422.—Am. bor.
vulgaris, Bub. Fl. Pyren. iii. 1 = decandra.

PICARDAEA, Urb. Symb. Antill. iii. 376 (1903). *RUBIACEAE.*
haitiensis, *Urb. l. c.* 377.—Ind. occ.

PICEA, Link (Conif.).
Abies, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* iv. 132 (= *Pinus Abies*).—Eur.
australis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 30.—Am. bor.
brachytila, *Masters, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 553.—China.
morindoides, *Rehder, in Sargent, Trees & Shrubs*, 95.—As. or.?
Neoveitchii, *Mast. in Gard. Chron.* 1903, i. 116, t. 51.—China.
Parryana, *Sarg. Man. Trees N. Amer.* 44.—Am. bor.
Wilsoni, *Mast. in Gard. Chron.* 1903, i. 133, t. 56.—China.

PICRADENIA, Hook. (Compos.).
[ACTINELLA, Nutt. I. K.]
Davidsoni, *Greene, Pittonia*, iv. 240.—Am. bor.
Earlei, *Cockerell, in Bull. Colorado Coll. Mus.* i. 1.—Am. bor.
helenioides, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 21.—Am. bor.

PICRADENIOPSIS, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 1008 (1901). *COMPOSITAE.*
oppositifolia, *Rydb. l. c.* (= *Bahia oppositifolia*).—Am. bor.

PICRIS, Linn. (Compos.).
angustissima, *Arv.-Touv. ex Chenev. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 331.—Eur.
benearnensis, *Rouy, in Bull. Assoc. Fr. de Bot.* iv. (*fide Bull. Herb. Boiss. Ind. Bot. Univ.* No. 1344).—Eur.
Kelleriana, *Arv.-Touv. ex Schroet. in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* xiv. 122; *et ex Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 483.—Eur.
Kochiana, *Rouy, in Bull. Assoc. Fr. de Bot.* iv. (*fide Bull. Herb. Boiss. Ind. Bot. Univ.* No. 1352).—Eur.
Saharae, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 235 (= *Spitzelia Saharae*).—Alger.

PIERIS, D. Don (Ericac.).
Bodinieri, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 253.—China.
Cavaleriei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 292.—China.

PIERIS:—
divaricata, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 252.—China.
Duclouxii, *Léveillé, l. c.* 253.—China.
Gagnepainiana, *Léveillé, l. c.* 251.—China.
kouyangensis, *Léveillé, l. c.* 253.—China.
longicornu, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 291.—China.
Martini, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 252.—China.
repens, *Léveillé, l. c.*—China.

PILEA, Lindl. (Urtic.).
Baurii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 133.—Ins. Galap.
comorensis, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 124.—Ins. Comor.
cymbifolia, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 311.—Bolivia.
filipes, *Rusby, l. c.*—Bolivia.
Friesiana, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 252.—N. Guin.
Mooreana, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxviii. I. 468 (= *Adicea Mooreana*).—Afr. trop.
Preussii, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 123.—Afr. trop.
ptericlada, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 121.—Am. cent.
sublobata, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 311.—Bolivia.
urerifolia, *Rusby, l. c.* 312.—Bolivia.

PILEUS, Ramirez, in Conzatti, Gén. Veget. Mexic. 343 (1905). *PASSIFLORACEAE.*
heptaphyllus, *Ramirez, l. c.*—Mexic.

PILOCEREUS, Lem. (Cactac.).
[CEREUS, Mill. I. K.]
alensis, *A. Weber, ex Gosselin, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* vi. (1905) 508.—Mexic.
Fouachianus, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1904, 386.—Ind. occ.
macrostibas, *K. Schum. in Monatsschr. Kakt.* xiii. 168.—Peruv.
rhodacanthus, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 485 (= *Echinopsis rhodacantha*).—Reg. Argent.
ruficeps, *A. Weber, ex Gosselin, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* vi. (1905) 509.—Mexic.
Ulei, *K. Schum. Gesamtb. Kakt. Nachtr.* i. 64.—Bras.

PILOSTYLES, Guill. (Cytin.).
[APODANTHES, Poit. I. K.]
globosa, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxi. 311 (1896) (= *Apodanthes globosa*).—Mexic.
Pringlei, *Hemsl. l. c.* (= *Apodanthes Pringlei*).—Mexic.

PILOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 646. *OCHNACEAE.*
glabrifolia, *Van Tiegh. l. c.* 238.—Bras.
ovalis, *Van Tiegh. l. c.* (= *Gomphia ovalis*).—Bras.

PIMELEA, Banks & Soland. (Thymel.).
Gilgiana, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 396.—Austral.
leucantha, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 393.—Austral.
ramosissima, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 324.—Ins. Bismarck.

PIMPINELLA, Linn. (Umbellif.).
Dunni, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 841.—China.
Erythraeae, *Armari, in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 149.—Afr. trop.
Fargesii, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 808.—China.
Fauriei, *Boissieu, l. c.* iii. 955.—Corea.
helosciadea, *Boissieu, l. c.* ii. 809.—China.
nikoensis, *Yabe, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 106.—Corea.
secnensis, *Reching. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xviii. 393.—Afr. austr.
silaifolia, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 809.—China.
Souliei, *Boissieu, l. c.* 810.—China.
sutchuensis, *Boissieu, l. c.* 808.—China.
tomentosa, *Engl. Jahrb.* xxx. 368.—Afr. trop.

PINANGA, Blume (Palmae.).
Barnesii, *Becc. in Martelli, Webbia*, 320.—Ins. Philipp.
chinensis, *Becc. l. c.* 326.—China.
Copelandi, *Becc. l. c.* 317.—Ins. Philipp.
Elmerii, *Becc. l. c.* 322.—Ins. Philipp.
lepidota, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 177.—Borneo.

PINANGA:—
rivularis, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 399.—Borneo.
singaporensis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 38.—Penins. Mal.
speciosa, *Becc. in Martelli, Webbia*, 315.—Ins. Philipp.

PINELLIA, Tenore (Arac.).
cordata, *N. E. Br. in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 178.—China.

PINGUICULA, Tourn. (Lentibular.).
arctica, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 293.—Am. bor.

PINUS, Linn. (Conif.).
Altamirani, *Shaw, in Sarg. Trees & Shrubs*, 209, t. 99.—Mexic.
caribaea, *Morelet, in Rev. Hortic. Côte d'Or*, Oct. 1851; *et in Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, vii. (1885) 97–101, *cf. Gard. Chron.* 1904, ii. 98.—Ind. occ.
eldarica, *Medw. in Act. Hort. Tifl.* vi. ii. 21.—Reg. Caucas.
funebris, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xx. 177.—China.
Henryi, *Masters, in Journ. Linn. Soc.* xxvi. 550.—China.
Mayriana, *Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest.* xiv. 21.—Am. bor.
Nelsoni, *Shaw, in Gard. Chron.* 1904, ii. 122.—Mexic.
Pringlei, *Shaw, in Sarg. Trees & Shrubs*, 211, t. 100.—Mexic.
recurvata, *Rowlee, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 107.—Ind. occ.
terthrocarpa, *Shaw, in Sarg. Trees & Shrubs*, 149.—Ind. occ.
tropicalis, *Morelet, in Rev. Hortic. Côte d'Or*, Oct. 1851; *et in Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle*, vii. (1885) 97–101, cf. *Gard. Chron.* 1904, ii. 98.—Ind. occ.

PIPER, Linn. (Piperac.).
acutilimbum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 110.—Reg. Amaz.
albidirameum, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 153.—Ins. Philipp.
Andersonii, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 194.—Ind. occ.
angustilimbum, *C. DC. l. c.* 201.—Ind. occ.
aromaticum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 355.—Bras.
asperilimbum, *C. DC. l. c.* iii. 398.—Parag.
asterotrichum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 111.—Peruv.
Balbisianum, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 205.—Ind. occ.
bathicarpum, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 153.—Ins. Philipp.
Biroi, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 238.—N. Guin.
Broadwayi, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 191.—Ind. occ.
bullatilimbum, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 112.—Reg. Amaz.
calophyllum, *C. DC. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 257.—Am. cent.
candelosum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 397.—Parag.
Christyi, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 215.—Hab. ?
concretiflorum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 111.—Reg. Amaz.
convallariodorum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 356.—Bras.
cordatum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 105, descr. emend.—Peruv.
cumbasonum, *C. DC. l. c.* 106.—Peruv.
dagatpanum, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 154.—Ins. Philipp.
davaoense, *C. DC. l. c.*—Ins. Philipp.
debile, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 400.—Parag.
dominicanum, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 205.—Ind. occ.
Dussii, *C. DC. l. c.* 190.—Ind. occ.
Eggersii, *C. DC. l. c.* 200.—Ind. occ.
escaleranum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 115.—Peruv.
glabrilimbum, *C. DC. l. c.* 107.—Reg. Amaz.
glabrispica, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 155.—Ins. Philipp.
guavanum, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 190.—Ind. occ.

PIPER:—
Harrisii, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 189.—Ind. occ.
Hartii, *C. DC. l. c.* 164.—Ind. occ.
Hassleri, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 397.—Parag.
hebecarpum, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 183.—Ind. occ.
Huberi, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 298.—Bras.
humillimum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 108.—Reg. Amaz.
jamaicense, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 192 (= *Artanthe jamaicensis*).—Ind. occ.
Johnstoni, *C. DC. in Proc. Amer. Acad.* xl. 685.—Venez.
leticianum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 104.—Peruv.
lividum, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 155.—Ins. Philipp.
longipes, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 399.—Parag.
macropodum, *C. DC. l. c.* iv. 1026.—China.
macrotrichum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii (1905) 109.—Reg. Amaz.
margaritanum, *C. DC. in Proc. Amer. Acad.* xl. 685.—Venez.
marivelesanum, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 155.—Ins. Philipp.
mediocre, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 104.—Peruv.
Mertoni, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 1285.—Austral.
microphyllum, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 190.—Ind. occ.
morsicola, *C. DC. l. c.* 194.—Ind. occ.
nemorale, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 109.—Reg. Amaz.
nudilimbum, *C. DC. l. c.* 113.—Reg. Amaz.
obtusilimbum, *C. DC. l. c.* 105.—Reg. Amaz.
Otophyllum, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 196.—Ind. occ.
ovatilimbum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 112.—Reg. Amaz.
pachyarthrum, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 239.—N. Guin.
parvibracteatum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 110.—Reg. Amaz.
parvispica, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 156.—Ins. Philipp.
paucinerve, *C. DC. l. c.*—Ins. Philipp.
pellitum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 114.—Reg. Amaz.
penninerve, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 157.—Ins. Philipp.
Picardae, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 207.—Ind. occ.
polysyphonum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1026.—China.
Readli, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 197.—Ind. occ.
retropilosum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 355.—Bras.
subrectinerve, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 180.—Ind. occ.
rubripunctulatum, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 158.—Ins. Philipp.
Sintenisii, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 181.—Ind. occ.
semivolubile, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 400.—Parag.
sibulanum, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 158.—Ins. Philipp.
stamineum, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 176 (= *Artanthe staminea*).—Ind. occ.
subglabrum, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 397.—Parag.
subpanduriforme, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 170 (= *Enckea subpanduriformis*).—Ind. occ.
subpurpureum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 113.—Reg. Amaz.
subscandens, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 357.—Bras.
suffrutescens, *C. DC. l. c.* 354.—Bras.
Swartzii, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 202 (= *Enckea Swartzii*).—Ind. occ.
taumanum, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 159.—Ins. Philipp.
tenuirameum, *C. DC. l. c.*—Ins. Philipp.

PIPER :—
tobagoanum, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 199.—Ind. occ.
torricellense, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 239.—N. Guin.
Trinitatis, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 197.—Ind. occ.
vermiculatum, *C. DC. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 107.—Reg. Amaz.
Warburgii, *C. DC. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 159.—Ins. Philipp.
Wrightii, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 189.—Ind. occ.

PIPERIA, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 269. *ORCHIDACEAE.*
Cooperi, *Rydb. l. c.* 636 (= *Habenaria Cooperi*).—Am. bor.
elegans, *Rydb. l. c.* 270 (= *Habenaria elegans*).—Am. bor.
elongata, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
lancifolia, *Rydb. l. c.* 637.—Am. bor.
leptopetala, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
longispica, *Rydb. l. c.* 639 (= *Gymnadenia longifolia*).—Am. bor.
maritima, *Rydb. l. c.* 641 (= *Habenaria maritima*).—Am. bor.
Michaeli, *Rydb. l. c.* 640 (= *Habenaria Michaeli*).—Am. bor. occ.
multiflora, *Rydb. l. c.* 638.—Am. bor.
unalaschensis, *Rydb. l. c.* 270 (= *Habenaria unalaschensis*).—Am. bor.

PIPTADENIA, Benth. (Legum.).
Erlangeri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 151.—Afr. trop.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 560.—Parag.

PIPTATHERUM, Beauv. = **Oryzopsis**, Michx. (Gramin.).
virescens, Bub. Fl. Pyren. iv. 294 (non Boiss.) = Oryzopsis paradoxa.

PIPTOCHAETIUM, J. & C. Presl (Gramin.).
[ORYZOPSIS, Michx. I. K.]
napostaense, *Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 103 (= *Oryzopsis napostaensis*).—Reg. Argent.

PIPTOSTIGMA, Oliver (Anonac.).
multinervium, *Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl.* vi. 55.—Afr. trop.
Preussii, *Engl. & Diels, l. c.* 54.—Afr. trop.

PIPTOTHRIX, A. Gray (Compos.).
ageratoides, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xli. 273.—Mexic.
jaliscensis, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 268.—Mexic.

PIQUERIA, Cav. (Compos.).
pyramidalis, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 475.—Mexic.

PIRIQUETA, Aubl. (Turnerac.).
glabrescens, *Small, Fl. S. E. U. S.* 794.—Am. bor.
guianensis, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 30.—Guiana.
leucantha, *Urb. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1117.—Parag.
ochroleuca, *Urb. l. c.* 1116.—Parag.
serrulata, *Urb. l. c.* 1115.—Parag.
subsessilis, *Urb. l. c.* 1117.—Parag.
viridis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 794.—Am. bor.

PISONIA, Plum. (Nyctagin.).
aruensis, *Barg.-Petr. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. viii. 618.—Ins. Aru.
Beccariana, *Barg.-Petr. l. c.* 612.—N. Guin.
corniculata, *Barg.-Petr. l. c.* 615.—N. Guin.
floridana, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 411.—Am. bor.
longifolia, *Sarg. Man. Trees N. Amer.* 314.—Am. bor.
triandra, *Barg.-Petr. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. viii. 610.—N. Guin.

PISTACIA, Linn. (Anacard.).
formosana, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 40.—Formosa.

PISTACIOPSIS, Engl. Jahrb. xxxii. (1902). *SIMARUBACEAE.*
Dekindtiana, *Engl. l. c.* 126.—Afr. trop.
gallaensis, *Engl. l. c.* 125.—Afr. trop.
Wakefieldii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

PITCAIRNIA, L'Hérit. (Bromel.).
auriculata, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 134.—N. Granat.
elliptica, *Mez & Sodiro, ex Mez, l. c.* iv. 624.—Ecuador.
lutescens, *Mez & Sodiro, ex Mez, l. c.* 626.—Ecuador.
Micheliana, *André, in Rev. Hortic.* 1901, 576.—Mexic.
monticola, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 197 (1905).—Mexic.
nobilis, *Mez & Sodiro, ex Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 623.—Ecuador.
palmoides, *Mez & Sodiro, ex Mez, l. c.* 626.—Ecuador.
rigida, *Mez, l. c.* 625.—Peruv.
sceptriformis, *Mez, l. c.* 628.—Peruv.
Sodiroi, *Mez, l. c.* 622.—Am. cent.
Weberbaueri, *Mez, l. c.* 627.—Peruv.
Werckleana, *Mez, l. c.* 622.—Am. cent.

PITHECOLOBIUM, Mart. (Legum.).
bahamense, *Northrop, in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 38.—Ind. occ.
compactum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 63.—Mexic.
flavovirens, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 442.—Ind. occ.
guaraniticum, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 483.—Parag.
Hassleri, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 483.—Parag.
macrandrium, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 3.—Am. cent.
mucronatum, *Britton, in Shattuck, Bahama Is.* 254.—Ind. occ.
parvifolium, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 19.—Ins. Philipp.
tomentosum, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 285.—Mexic.

PITTOSPORUM, Banks (Pittospor.).
Antunesii, *Engl. Jahrb.* xxxii. (1902) 130.—Afr. trop.
Balansae, *A. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1071.—Tonkin.
coccineum, *Beauvis. Gen. Montrous.* 7 (= *Quinsonia coccinea*).—N. Caled.
odoratum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 16.—Ins. Philipp.
pentandrum, *Merrill, l. c.* 18.—Ins. Philipp.
rarotongense, *Hemsl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 272.—Ins. Cook.

PITURANTHOS, Viv. (Umbellif.).
virgatus, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 157 (= *Deverra virgata*).—Alger.

PITYRODIA, R. Br. (Verben.).
Depremesnilii, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 517 (= *Chloanthes Depremesnilii*).—Austral.
lepidota, *E. Pritz. l. c.* 516 (= *Chloanthes lepidota*).—Austral.
loricata, *E. Pritz. l. c.* (= *Chloanthes loricata*).—Austral.
Muelleriana, E. Pritz. l. c. 517 = viscida.
petiolaris, *E. Pritz. l. c.* 520.—Austral.
teckiana, *E. Pritz. l. c.* 521 (= *Chloanthes teckiana*).—Austral.
viscida, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 30.—Austral.

PLACUS, Lour. (Compos.).
[BLUMEA, DC. I. K.]
Solandri, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 141.—Austral.

PLAGIANTHUS, Forst. (Malvac.).
chathamicus, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxiv. 319.—Ins. Chatham.

PLAGIOLOPHUS, Greenm. in Field Columb. Mus. Bot. iii. (1904) 125. *COMPOSITAE.*
Millspaughii, *Greenm. l. c.* 126.—Mexic.

PLANCHONELLA, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xix. 39. *OCHNACEAE.*
disticha, *Van Tiegh. l. c.*—Peruv.

PLANCHONIA, Blume (Myrtac.).
andamanica, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 142.—Ins. Andaman.
spectabilis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 30.—Ins. Philipp.

PLANTAGO, Linn. (Plantagin.).
Badali, *Pau, in Bol. Soc. Espan. Hist. Nat.* i. 156.—Eur.
carrenleofuensis, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 78.—Patag.
coelorhiza, *E. L. Morris & Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 734.—Patag.
ignota, *E. L. Morris, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 119.—Am. bor.
halophila, *E. P. Bickn. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1051.—Am. bor.
nitrophila, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 405.—Am. bor.
oblonga, *E. L. Morris, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 119.—Am. bor.
obversa, *E. L. Morris, l. c.* 121.—Am. bor.
picta, *E. L. Morris, l. c.* 118.—Am. bor.
pulvinata, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 75.—Patag.
retrorsa, *Greene, Pl. Baker.* iii. 32.—Am. bor.
septata, *E. L. Morris, in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 182.—Am. bor.
shastensis, *Greene, Pl. Baker.* iii. 32.—Am. bor.
speciosa, *E. L. Morris, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 120.—Am. bor.
verticillata, *E. L. Morris, l. c.* 117.—Am. bor.

PLANTINIA, Bub. Fl. Pyren. iv. 268 = **Phleum**, Linn. (Gramin.).
alpina, Bub. l. c. 272 = P. alpinum.
arenaria, Bub. l. c. 273 = P. arenarium.
aspera, Bub. l. c. 269 = P. asperum.
cuspidata, Bub. l. c. 270 = P. Michelii.
cylindracea, Bub. l. c. 274 = P. tenue.
phalaroidea, Bub. l. c. 269 = P. Boehmeri.
pratensis, Bub. l. c. 270 = P. pratense.
Tournefortii, Bub. l. c. 273 = Alopecurus Gerardi.

PLATANTHERA, Rich. (Orchid.).
[HABENARIA, Willd. I. K.]
albo-marginata, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 939 (= *Habenaria albo-marginata*).—Reg. Himal.
angolensis, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 203.—Afr. trop.
Henryi, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 55 (= *Habenaria Henryi*).—China.
Iinumae, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 89.—Japon.
juncea, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 942 (= *Habenaria juncea*).—Reg. Himal.
Makinoi, *Yabe, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 19.—Japon.
Matsudai, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 56.—Japon.
nematocaulon, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 942 (= *Habenaria nematocaulon*).—Reg. Himal.
nipponica, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 153.—Japon.
Okuboi, *Makino, l. c.* xix. 25.—Japon.
rhodostachys, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 203.—Afr. trop.
Takedai, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 120.—Japon.
undulata, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 27.—Java.
Yatabei, *Maxim. in Matsum. Ind. Pl. Japon.* ii. 262, nomen.—Japon.

PLATANUS, Linn. (Platan.).
glabrata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 493.—Mexic.

PLATEILEMA, Cockerell, in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 462. *COMPOSITAE.*
Palmeri, *Cockerell, l. c.* (= *Actinella Palmeri*).—Am. bor.

PLATYCALYX, N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap. iv. I. 335 (1905). *ERICACEAE.*
pumila, *N. E. Br. l. c.*—Afr. austr.

PLATYCARPHA, Less. (Compos.).
parvifolia, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 136.—Afr. austr.

PLATYCELYPHIUM, Harms, in Engl. Jahrb. xxxviii. (1905) 74. *LEGUMINOSAE.*
cyananthum, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

PLATYCLINIS, Benth. (Orchid.).
barbifrons, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1902, I. 366.—Sumatra.
brevilabrata, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 173.—Borneo.
odorata, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 72.—Penins. Mal.

PLATYMISCIUM, Vog. (Legum.).
dimorphandrum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 208.—Am. cent.

PLATYPUS, Small & Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 329 (1903). *ORCHIDACEAE.*
papilliferus, *Small, l. c.*—Am. bor.

PLATYSTEMON, Benth. (Papav.).
aculeolatus, *Greene, Pittonia*, v. 167.—Calif.
acutatus, *Greene, l. c.* 187.—Calif.
anemonoides, *Greene, l. c.* 177.—Calif.
antoninus, *Greene, l. c.* 180.—Calif.
arizonicus, *Greene, l. c.* 190.—Am. bor.
arvorum, *Greene, l. c.* 174.—Calif.
australis, *Greene, l. c.* 191.—Mexic.
capsularis, *Greene, l. c.* 165.—Calif.
cernuus, *Greene, l. c.* 193.—Calif.
commixtus, *Greene, l. c.* 176.—Calif.
communis, *Greene, l. c.* 169.—Calif.
confinis, *Greene, l. c.* 176.—Am. bor.
contortus, *Greene, l. c.* 175.—Calif.
crenatus, *Greene, l. c.*—Calif.
elegans, *Greene, l. c.* 173.—Calif.
emarginatus, *Greene, l. c.* 172.—Calif.
exscalptus, *Greene, l. c.* 182.—Calif.
glyptolobus, *Greene, l. c.*—Calif.
heterander, *Greene, l. c.* 181.—Calif.
hispidulus, *Greene, l. c.* 193.—Calif.
horridulus, *Greene, l. c.* 178.—Calif.
hyacinthinus, *Greene, l. c.* 180.—Calif.
leptander, *Greene, l. c.* 190.—Calif.
leucanthus, *Greene, l. c.* 188.—Calif.
mendocinus, *Greene, l. c.* 181.—Calif.
microlobus, *Greene, l. c.* 189.—Calif.
mohavensis, *Greene, l. c.* 176.—Am. bor.
nigricans, *Greene, l. c.* 174.—Calif.
nutans, *Greene, l. c.* 192.—Calif.
obtectus, *Greene, l. c.* 186.—Calif.
ornithopus, *Greene, l. c.* 167.—Calif.
pectinatus, *Greene, l. c.* 184.—Calif.
penicillatus, *Greene, l. c.* 185.—Calif.
petrinus, *Greene, l. c.* 166.—Calif.
pilosellus, *Greene, l. c.* 185.—Calif.
proximus, *Greene, l. c.* 172.—Calif.
purpuratus, *Greene, l. c.* 168.—Calif.
quercetorum, *Greene, l. c.* 173.—Calif.
remotus, *Greene, l. c.* 190.—Am. bor.
rigidulus, *Greene, l. c.* 167.—Calif.
rugosus, *Greene, l. c.* 183.—Calif.
setosus, *Greene, l. c.* 194.—Calif.
sphaerocarpus, *Greene, l. c.* 168.—Calif.
subereus, *Greene, l. c.* 184.—Calif.
tessellatus, *Greene, l. c.* 171.—Calif.
tortuosus, *Greene, l. c.* 170.—Calif.
turbinatus, *Greene, l. c.* 188.—Calif.
verecundus, *Greene, l. c.* 191.—Calif.
villosus, *Greene, l. c.* 165.—Calif.

PLECTIS, O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 352. *PALMAE.*
Oweniana, *O. F. Cook, l. c.* 353.—Am. cent.

PLECTRANTHUS, L'Hérit. (Labiat.).
adenophorus, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxx. 398.—Afr. trop.
albocaeruleus, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 130.—Afr. trop.
albo-violaceus, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxx. 397.—Afr. trop.
amaniensis, *Guerke, l. c.* xxxvi. 134.—Afr. trop.
andongensis, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxviii. i. 486 (=*Germanea andongensis*).—Afr. trop.
arthropodus, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1073.—Afr. austr.
Baumii, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 356.—Afr. trop.
concinnus, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxviii. i. 486 (=*Germanea concinna*).—Afr. trop.
Coppini, *Heck. in Rev. Cult. Colon.* viii. 164.—Afr. trop.
coreanus, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 166.—China.
crassus, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1904, i. 21; *Bot. Mag.* t. 8030.—Afr. trop.
Dinteri, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1070.—Afr. trop.
dolichopodus, *Briq. l. c.* 1069.—Afr. austr.
Draconis, *Briq. l. c.* 1071.—Afr. austr.
elegantulus, *Briq. l. c.* 1005.—Afr. austr.

PLECTRANTHUS:—
Ellenbeckii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 132.—Afr. trop.
grallatus, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1004.—Afr. austr.
Guerkei, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 328 (=*Germanea Guerkei*).—Afr. trop.
hararensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 132.—Afr. trop.
horridus, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxviii. i. 486 (=*Germanea horrida*).—Afr. trop.
intrusus, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 834.—Afr. trop.
keniensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 264.—Afr. trop.
Krookii, *Guerke, ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 48.—Afr. austr.
Mahonii, *N. E. Br. ex Hook. f. in Bot. Mag.* t. 7818.—Afr. trop.
mbaluensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi 136.—Afr. trop.
myrianthus, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1001.—Afr. austr.
Neumannii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 131.—Afr. trop.
nummularius, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1072.—Afr. austr.
pachystachyus, *Briq. l. c.* 1003.—Afr. austr.
rhomboideus, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 135.—Afr. trop.
sangerawensis, *Guerke, l. c.* 134.—Afr. trop.
saxatilis, *Guerke, l. c.* 133.—Afr. trop.
sculponeatus, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 167.—China.
transvaalensis, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1005.—Afr. austr.
ugandensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 200.—Afr. trop.

PLECTRITIS, DC. (Valerian.).
[VALERIANELLA, Tourn. I. K.]
minor, *Abrams, Fl. Los Angeles*, 382 (=*Valerianella macrocera*).—Calif.

PLECTRONIA, Linn. (Rubiac.).
corneloides, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 159.—Afr. trop.
Dewevrei, *Wildem. l. c.* Sér. V. i. 203.—Afr. trop.
Gentilii, *Wildem. l. c.* 82.—Afr. trop.
grisea, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 953 (=*Canthium griseum*).—Siam.
lamprophylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 335.—Afr. trop.
macrocarpa, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 351.—Afr. trop.
minutiflora, *K. Schum. l. c.* 352.—Afr. austr.
orbicularis, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 388.—Afr. trop.
psychotrioides, *K. Schum. ex Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 228.—Afr. trop.
pulchra, *K. Schum. ex Wildem. l. c.* 229.—Afr. trop.
scaberrima, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxii. (1902) 145.—Afr. trop.
Schmidtii, *J. Schmidt, in Bot. Tidsskr.* xxiv. 336.—Malaya.
sclerocarpa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 334.—Afr. trop.
siamensis, *Harms, in Bot. Tidsskr.* xxiv. 335.—Malaya.
stipulata, *Wildem. Pl. Nov. Hort. Then.* t. 38.—Afr. trop.
tomentosa, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 83.—Afr. trop.
Wightii, *T. Cooke, Fl. Bombay*, i. 606.—Ind. or.
xanthotricha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 335.—Afr. trop.

PLECTROPHORA, H. C. Focke (Orchid.).
[COMPARETTIA, Poepp. & Endl. I. K.]
cultrifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 185 (=*Jansenia cultrifolia*).—Bras.

PLEIOCARDIA, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1904) 85. *CRUCIFERAE.*
Breweri, *Greene, l. c.* 86 (=*Streptanthus Breweri*).—Calif.
fenestrata, *Greene, l. c.*—Calif.
foliosa, *Greene, l. c.* (=*Streptanthus foliosus*).—Am. bor.
gracilis, *Greene, l. c.* (=*Streptanthus gracilis*).—Calif.
hesperidis, *Greene, l. c.* (=*Streptanthus hesperidis*).—Calif.

PLEIOCARDIA:—
magna, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. (1904) 87.—Calif.
orbiculata, *Greene, l. c.* 86 (=*Streptanthus orbiculatus*).—Calif.
suffrutescens, *Greene, l. c.* (=*Streptanthus suffrutescens*).—Calif.
tortuosa, *Greene, l. c.* (=*Streptanthus tortuosus*).—Calif.

PLEIOCARPA, Benth. (Apocyn.).
breviloba, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 102 (=*Hunteria breviloba*).—Afr. trop.
camerunensis, *Stapf, l. c.* (=*Hunteria camerunensis*).—Afr. trop.
flavescens, *Stapf, l. c.* 101.—Afr. trop.
micrantha, *Stapf, l. c.* 100.—Afr. trop.
microcarpa, *Stapf, l. c.* 102.—Afr. trop.
pycnantha, *Stapf, l. c.* 99 (=*Hunteria pycnantha*).—Afr. trop.
salicifolia, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.

PLEIOCERAS, Baill. (Apocyn.).
Afzelii, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 166 (=*Wrightia Afzelii*).—Afr. trop.
Gilletii, *Stapf, l. c.* 167.—Afr. trop.
Whytei, *Stapf, l. c.* 604.—Afr. trop.
Zenkeri, *Stapf, l. c.* 166.—Afr. trop.

PLEIONE, D. Don (Orchid.).
[COELOGYNE, Lindl. I. K.]
bulbocodioides, *Rolfe, in Orch. Rev.* xi. 291 (=*Coelogyne bulbocodioides*).—China.
Delavayi, *Rolfe, l. c.* (=*Coelogyne Delavayi*).—China.
grandiflora, *Rolfe, l. c.* (=*Coelogyne grandiflora*).—China.
pogonioides, *Rolfe, l. c.* (=*Coelogyne pogonioides*).—China.
yunnanensis, *Rolfe, l. c.* 292 (=*Coelogyne yunnanensis*).—China.

PLEIOSTACHYA, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. (1902) 164. *MARANTACEAE.*
Morlaei, *K. Schum. l. c.* 165 (=*Ischnosiphon Morlaei*).—Ecuador.

PLEIOTAXIS, Steetz (Compos.).
huillensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxxii. (1902) 152.—Afr. trop.
vernonioides, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 365.—Afr. trop.

PLEODIPOROCHNA, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xviii. (1903) 58. *OCHNACEAE.*
Buettneri, *Van Tiegh. l. c.* (=*Ochna Buettneri*).—Afr. trop.

PLEOPETALUM, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. ix. (1903) 163; et in Journ. de Bot. xvii. (1903) 98. *OCHNACEAE.*
Gaudichaudi, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xviii. 47.—Ind. or.
Leschenaultii, *Van Tiegh. l. c.* 46.—Ind. or.
lucidum, *Van Tiegh. l. c.* 45 (=*Ochna lucida*).—Ind. or.
obtusatum, *Van Tiegh. l. c.* (=*Gomphia obtusata*).—Ind. or.

PLEOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 546. *OCHNACEAE.*
pubescens, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 243 (=*Gomphia pubescens*).—Bras.

PLEURICOSPORA, A. Gray (Monotrop.).
longipetala, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 429.—Am. bor.

PLEUROGYNA, Eschsch. (Gentian.).
fontana, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 177.—Am. bor.
macrantha, *Diels & Gilg, in Futterer, Durch Asien, Bot.* reps. 17.—Tibet.

PLEUROPHORA, D. Don (Lythrac.).
annulosa, *Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac.* 181.—Bolivia.

PLEURORIDGEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 215. *OCHNACEAE.*
alboserrata, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* xvi. 204 (=*Ochna alboserrata*).—Afr. trop.
Bussei, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xviii. 59 (=*Brackenridgea Bussei*).—Afr. trop.

PLEURORIDGEA :—
ferruginea, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 204 (= Ochna ferruginea).—Afr. trop.
Lasti, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
zanguebarica, Van Tiegh. l. c. 203 (= Brackenridgea zanguebarica).—Afr. trop.

PLEUROSPERMUM, Hoffm. (Umbellif.).
Wrightianum, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 847.—China.

PLEUROTHALLIS, R. Br. (Orchid.).
bupleurifolia, Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 159.—Bras.
laxiflora, Porsch, l. c. 155.—Bras.
Montserratii, Porsch, l. c. 158.—Bras.
nigro-hirsuta, Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 91.—Peruv.
ocellata, Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 156.—Bras.
ochracea, Porsch, l. c.—Bras.
penduliflora, Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 177.—Peruv.
roraimensis, Rolfe, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. vi. 66.—Guiana.
sulcata, Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 157.—Bras.
trachysepala, Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 178.—Peruv.
verruculosa, Kraenzl. l. c. 177.—Peruv.
versicolor, Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 155.—Bras.
vitellina, Porsch, l. c. 158.—Bras.

PLICOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 373. OCHNACEAE.
bicolor, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 223.—Bras.
Conegi, Van Tiegh. l. c. xviii. 7; et in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 33.—Bras.
granulosa, Van Tiegh. l. c.; et l. c. 32.—Bras.
Luschnathiana, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 223 (= Gomphia Luschnathiana).—Bras.
parviflora, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 100 (= Gomphia parviflora).—Bras.
Planchoniana, Van Tiegh. l. c.—Bras.
Riedeli, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 224.—Bras.
verniicosa, Van Tiegh. l. c. xviii. 7; et in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 33.—Bras.

PLOCOGLOTTIS, Blume (Orchid.).
neohibernica, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 145.—Ins. Bismarck.
pubiflora, Schlechter, l. c. 146.—N. Guin.

PLUCHEA, Cass. (Compos.).
caspia, O. Hoffm. ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1903, 147 (= Karelinia caspia).—As. cent.
Eggersii, Urb. Symb. Antill. iii. 407.—Ind. occ.

PLUMARIA, Bub. Fl. Pyren. iv. 195 = **Eriophorum**, Linn. (Cyperac.).
alpina, Bub. l. c. 247 = E. alpinum.
angustifolia, Bub. l. c. 195 = E. angustifolium.
latifolia, Bub. l. c. = E. latifolium.
Scheuchzeri, Bub. l. c. 247 = E. Scheuchzeri.
vaginata, Bub. l. c. 196 = E. vaginatum.

PLUMIERIA, Linn. (Apocyn.).
biglandulosa, Urb. Symb. Antill. iii. 337.—Ind. occ.
domingensis, Urb. l. c. 338.—Ind. occ.
gibbosa, Urb. l. c.—Ind. occ.
inaguensis, Britton, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. 448.—Ind. occ.
latifolia, Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 183.—Bras.
Marchii, Urb. Symb. Antill. iii. 334.—Ind. occ.
Paulinae, Urb. l. c. 336.—Ind. occ.
stenopetala, Urb. l. c. 335.—Ind. occ.

PNEUMONANTHE, Gleditsch (Gentian.).
[GENTIANA, Tourn. I. K.]
affinis, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 71 (= Gentiana affinis).—Am. bor.
Bigelovii, Greene, l. c. (= Gentiana Bigelovii).—Am. bor.
bracteosa, Greene, l. c. (= Gentiana bracteosa).—Am. bor.

PNEUMONANTHE :—
calycosa, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 71 (= Gentiana calycosa).—Am. bor.
clausa, Greene, l. c. (= Gentiana clausa).—Am. bor.
decora, Greene, l. c. (= Gentiana decora).—Am. bor.
flavida, Greene, l. c. (= Gentiana flavida).—Am. bor.
Forwoodii, Greene, l. c. (= Gentiana Forwoodii).—Am. bor.
interrupta, Greene, l. c. (= Gentiana interrupta).—Am. bor.
latifolia, Greene, l. c. (= Dasystephana latifolia).—Am. bor.
linearis, Greene, l. c. (= Gentiana linearis).—Am. bor.
Menziesii, Greene, l. c. (= Gentiana Menziesii).—Calif.
Newberryi, Greene, l. c. (= Gentiana Newberryi).—Am. bor.
oregana, Greene, l. c. (= Gentiana oregana).—Am. bor.
Parryi, Greene, l. c. (= Gentiana Parryi).—Am. bor.
parvifolia, Greene, l. c. (= Dasystephana parvifolia).—Am. bor.
platypetala, Greene, l. c. (= Gentiana platypetala).—Ins. Sitcha.
Porphyrio, Greene, l. c. (= Gentiana Porphyrio).—Am. bor.
puberula, Greene, l. c. (= Gentiana puberula).—Am. bor.
remota, Greene, l. c. (= Gentiana remota).—Am. bor.
Rusbyi, Greene, l. c. (= Gentiana Rusbyi).—N. Mexic.
Saponaria, Greene, l. c. (= Gentiana Saponaria).—Am. bor.
sceptrum, Greene, l. c. (= Gentiana sceptrum).—Am. bor.
setigera, Greene, l. c. (= Gentiana setigera).—Calif.
spathacea, Greene, l. c. (= Gentiana spathacea).—Mexic.

POA, Linn. (Gramin.).
aequatoriensis, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 450.—Ecuador.
alcea, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 436.—Am. bor.
ampla, Merrill, in Rhodora, iv. 145.—Am. bor.
brachyglossa, Piper, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 145.—Am. bor.
callichroa, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 603.—Am. bor.
Canbyi, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 764.—Am. bor.
chathamica, Petrie, in Trans. Proc. N. Z. Inst. xxxiv. 394.—Ins. Chatham.
Cheesemani, Hack. in Trans. Proc. N. Z. Inst. xxxv. 383.—N. Zel.
chubutensis, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 196.—Patag.
confusa, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 607.—Am. bor.
Cottoni, Piper, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 146.—Am. bor.
cucullata, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 377.—Ecuador.
eligulata, Hack. l. c. 375.—Eur.
erinacea, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 198.—Patag.
Faberi, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 423.—China.
Foucaudii, Hack. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, ix. (1905) 112.—Corsica.
glabrescens, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 154.—Am. bor.
gracillima, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 424.—China.
Grisebachii, R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. Ser. IV. i. no. 1, 182.—Reg. Argent.
heterogama, Hack. in Rec. Albany Mus. i. 112.—Afr. austr.
Hieronymi, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 380.—Reg. Argent.
incrassata, Petrie, in Trans. Proc. N. Z. Inst. xxxiv. 394.—N. Zel.
interior, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 604.—Am. bor.
irrigata, Lindm. in Bot. Notiser, 1905, 73, 88.—Scandia.
Jelskii, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 454.—Peruv.
kurilensis, Hack. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 524.—Ins. Kurile.

POA :—
Kurtzii, R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. Ser. IV. i. no. 1, 183.—Reg. Argent.
lactevirens, R. Fries, l. c. 181.—Reg. Argent.
laeviculmis, T. A. Williams, ex Elmer, in Coult. Bot. Gaz. xxxvi. 55.—Am. bor.
laevigata, Scribn. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 141.—Am. bor.
leioclada, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 452.—Ecuador.
macroclada, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 604.—Am. bor.
Mariesii, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 425.—China.
masenderana, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 915.—Oriens.
Matthewsii, Petrie, in Trans. Proc. N. Z. Inst. xxxiv. 392.—N. Zel.
monandra, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 376.—Peruv.
Multnomae, Piper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 435.—Am. bor.
nematophylla, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 606.—Am. bor.
novae-zelandiae, Hack. in Trans. Proc. N. Z. Inst. xxxv. 381.—N. Zel.
nudiflora, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 453.—Turkest.
pachypholis, Piper, in Proc. Biol. Soc. Washington, xviii. 146.—Am. bor.
phoenicea, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 605.—Am. bor.
pichinchensis, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1903, 199.—Ecuador.
plicata, Hack. l. c. 1902, 378.—Reg. Argent.
polyphylla, Hack. in Trans. Proc. N. Z. Inst. xxxv. 383.—Ins. Kermadec.
Prichardi, Rendle, in Journ. Bot. 1904, 324.—Patag.
prolixior, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 427.—China.
pudica, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 603.—Am. bor.
pugioniifolia, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 199.—Patag.
seticulmis, Petrie, in Trans. Proc. N. Z. Inst. xxxiv. 391.—N. Zel.
subpurpurea, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 606.—Am. bor.
tianschanica, Hack. ex O. Fedtsch. Fl. Pamir, 75.—As. cent.
trachyphylla, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 379 = pichinchensis.
tricholepis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 606.—Am. bor.
truncata, Rydb. l. c. 607.—Am. bor.
tuberifera, Faurie, ex Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 451.—Japon.
viridula, Palib. in Act. Hort. Petrop. xix. 135.—As. bor.
Williamsii, Nash, in Bull. N. Y. Bot. Gard. ii. 156.—Am. bor.

PODANTHUM, Boiss. (Campan.).
[PHYTEUMA, Linn. I. K.]
Aizoon, Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xx. 37.—As. Min.
cordifolium, Hausskn. l. c. 33 (= Campanula michauxioides).—As. Min.
obtusifolium, Hausskn. l. c. 37.—As. Min.
Sintenisii, Hausskn. l. c. 35.—As. Min.

PODOCARPUS, Pers. (Conif.).
gracilior, Pilg. in Engl. Pflanzenreich, Taxac. 71.—Afr. trop.
Harmsianus, Pilg. l. c. 68.—Reg. Andin.
Koordersii, Pilg. ex Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. lxviii. 268.—Java.
Ladei, F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ. xv. 899.—Austral.
longefoliolatus, Pilg. in Engl. Pflanzenreich, Taxac. 79.—N. Caled.
Nagi, Pilg. l. c. 60 = P. Nageia.
Parlatorei, Pilg. l. c. 86.—Reg. Andin.
rivularis, Pancher, ex Pilg. l. c. 76 = Novae-Caledoniae.
Urbanii, Pilg. l. c. 89.—Ind. occ.
usambarensis, Pilg. l. c. 70.—Afr. trop.
utilior, Pilg. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 189.—Peruv.

PODOCHILUS, Blume (Orchid.).
anomalus, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 116.—N. Guin.
appendiculatus, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 2.—Arch. Mal.
dendrobioides, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 117.—N. Guin.
densifolia, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 86.—Penins. Mal.
flaccidus, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 117.—N. Guin.
imitans, *Schlechter, l. c.* 118.—N. Guin.
montanus, *Schlechter, l. c.* 119.—N. Guin.
neo-pommeranicus, *Schlechter, l. c.*—Ins. Bismarck.
niveus, *Schlechter, l. c.* 120.—N. Guin.
oxysepalus, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
polystachius, *Schlechter, l. c.* 121.—Ins. Bismarck.
polytrichoides, *Schlechter, l. c.* 122.—N. Guin.
pseudopendulus, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
Smithianus, *Schlechter, l. c.* 123.—N. Guin.
Steffensianus, *Schlechter, l. c.* 124.—N. Guin.
tenuispica, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.

PODOCYBE, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. 1. 491, sphalm. = **Pogocybe**, Pierre (Legum.).

PODOLEPIS, Labill. (Compos.).
capillaris, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 621 (= *Siemssenia capillaris*).—Austral.
Georgei, *Diels, l. c.* 619.—Austral.

PODOSTEMON, Michx. (Podost.).
Barberi, *Willis, in Ann. Bot. Gard. Perad.* i. 230.—Ind. or.

PODRANEA, Sprague, in Dyer, Fl. Cap. iv. II. 449 (1904). *BIGNONIACEAE.*
Ricasoliana, *Sprague, l. c.* 450 (= *Tecoma Ricasoliana*).—Afr. austr.

POECILOCHROMA, Miers (Solan.).
Sodiroi, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 387.—Ecuador.

POGONIA, Juss. (Orchid.).
lenheirensis, *Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, i. 47.—Bras.
Mackinnoni, *Duthie, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxi. 43.—Ind. or.

POGOSTEMON, Desf. (Labiat.).
philippinensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 146.—Ins. Philipp.

POINCIANA, Tourn. (Legum.).
pauciflora, *Small, Fl. S. E. U. S.* 591 (= *Lebidibia pauciflora*).—Am. bor.

POINSETTIA, R. Grah. (Euphorb.).
[EUPHORBIA, Linn. I. K.]
barbellata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 722 (= *Euphorbia barbellata*).—Am. bor.
euphosperma, *Small, l. c.* 721 (= *Euphorbia euphosperma*).—Am. bor.
dentata, *Small, l. c.* 722 (= *Euphorbia dentata*).—Am. bor.
geniculata, *Small, l. c.* (= *Euphorbia geniculata*).—Am. bor.
havanensis, *Small, l. c.* (= *Euphorbia havanensis*).—Am. bor. et trop.
heterophylla, *Small, l. c.* (= *Euphorbia heterophylla*).—Am. bor. et trop.

POLEMONIELLA, A. A. Heller, Muhlenbergia, I. (1904) 57. *POLEMONIACEAE.*
micrantha, *A. A. Heller, l. c.* (= *Polemonium micranthum*).—Am. bor.

POLEMONIUM, Linn. (Polemon.).
albiflorum, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 437.—Am. bor.
Archibaldae, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 397.—Am. bor.
Berryi, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 440.—Calif.
californicum, *Eastw. l. c.* 437.—Calif.
calycinum, *Eastw. l. c.* 438.—Calif.
delicatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 29.—Am. bor.
fasciculatum, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 442.—Am. bor.
grande, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 153.—Am. bor.

POLEMONIUM :—
Grayanum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 635.—Am. bor.
molle, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 153.—Am. bor.
montrosensis, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xviii. 174.—Am. bor.
pterospermum, *Nelson & Cockerell, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvi. 45.—Am. bor.
robustum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 635.—Am. bor.
rotatum, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 441.—Am. bor.
shastense, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 205.—Calif.
speciosum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 29.—Am. bor.
Tevisii, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 440.—Calif.
tricolor, *Eastw. l. c.* 439.—Calif.

POLIANTHES, Linn. (Amaryll.).
durangensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 9.—Mexic.
elongata, *Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xxix. (1905) 437.—Mexic.
geminiflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 12 (= *Bravoa geminiflora*).—Mexic.
graminifolia, *Rose, l. c.* 11.—Mexic.
longiflora, *Rose, l. c.* 10.—Mexic.
montana, *Rose, l. c.* 11.—Mexic.
Nelsoni, *Rose, l. c.* 10.—Mexic.
palustris, *Rose, l. c.* 9.—Mexic.
platyphylla, *Rose, l. c.* 11.—Mexic.
Pringlei, *Rose, l. c.* 10.—Mexic.
sessiliflora, *Rose, l. c.* (= *Bravoa sessiliflora*).—Mexic.

POLLIA, Thunb. (Commelin.).
bracteata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 375.—Afr. trop.
cyanocarpa, *K. Schum. l. c.* 376.—Afr. trop.

POLLINIA, Trin. (Gramin.).
cantonensis, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 354.—China.
conjugata, *Prain, in Rec. Bot. Surv. India*, iii. 314 (= *Andropogon conjugatus*).—Ind. or.

POLYACHYRUS, Lag. (Compos.).
selinoides, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 374.—Chili.

POLYADOA, Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. I. 103 (1902). *APOCYNACEAE.*
Elliotii, *Stapf, l. c.* 104.—Afr. trop.
umbellata, *Stapf, l. c.* 103 (= *Carpodinus umbellata*).—Afr. trop.

POLYALTHIA, Blume (Anonac.).
Barnesii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 15.—Ins. Philipp.
Cumingiana, *Merrill, l. c.* xxxv. 71.—Ins. Philipp.
flava, *Merrill, l. c.* 12.—Ins. Philipp.
longipes, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent.* lxi. 293 (= *Monoon longipes*).—Java.
nemoralis, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1069.—Tonkin.
pulchrinervia, *Boerl. in Ic. Bogor.* 106.—Borneo.
sphaerocarpa *Boerl. ex Koord. & Valet. Meded. 'S Lands Plantent.* lxi. 289.—Java.
suaveolens, *Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl.* vi. 42.—Afr. trop.

POLYANDROCOCOS, Barb. Rodr. in Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro, i. 7 (1901). *PALMAE.*
caudescens, *Barb. l. c.* 8 (= *Diplothemium caudescens*).—Bras.
pectinata, *Barb. Rodr. l. c.* (= *Diplothemium pectinatum*).—Bras.
Torallyii, *Barb. Rodr. l. c.* (= *Diplothemium Torallyi*).—Bras.

POLYANTHEMUM, Bub. Fl. Pyren. iv 155 = **Leucojum**, Linn. (Amaryll.).
aestivale, Bub. l. c. = L. aestivum.

POLYCARENA, Benth. (Scrophul.).
arenaria, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. II. 330.—Afr. austr.
collina, *Hiern, l. c.* 325.—Afr. austr.
glaucescens, *Hiern, l. c.*—Afr. austr.
gracilipes, *N. E. Br. ex Hiern, l. c.* 332.—Afr. austr.

POLYCARENA :—
Leipoldtii, *Hiern. in Dyer, Fl. Cap.* iv. II. 326.—Afr. austr.
Maxii, *Hiern, l. c.* 328.—Afr. austr.
selaginoides, *Schlechter, ex Hiern, l. c.* 326.—Afr. austr.
tenella, *Hiern, l. c.* 333.—Afr. austr.
transvaalensis, *Hiern, l. c.* 330.—Afr. austr.

POLYCARPAEA, Lam. (Caryophyll.).
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 791.—Parag.
inaequalifolia, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 233.—Afr. trop.

POLYCEPHALIUM, Engl. (Olac.).
integrum, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb Boiss.* Sér. II. i. 744.—Afr. trop.

POLYCODIUM, Rafin. (Vaccin.).
[VACCINIUM, Linn. I. K.]
candicans, *Small, Fl. S. E. U. S.* 894.—Am. bor.
melanocarpum, *Small, l. c.*—Am. bor.
neglectum, *Small, l. c.* 893.—Am. bor.

POLYGALA, Linn. (Polygal.).
Anderssonii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 160.—Ins. Galap.
Antunesii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxii. (1902) 131.—Afr. trop.
arenicola, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* (1903) 273.—Afr. trop.
arenicola, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 426 (1905).—Am. bor.
Baumii, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 276.—Afr. trop.
benguellensis, *Guerke, l. c.* 277.—Afr. trop.
Caesalpini, Bub. Fl. Pyren. iii. 283 = rosea.
Carteri, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 426.—Am. bor.
collina, *T. S. Brandegee, in Zoe.* v. 204 (1905).—Mexic.
compacta, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 316.—Mexic.
corallicola, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 425.—Am. bor.
cymosarus, *Chod. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 25, nomen.—Bras.
Dekindtii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxii. 131.—Afr. trop.
desiderata, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 234.—Patag.
fallax, *Hayek, in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xv. 43.—Afr. austr.
flagellaris, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 427.—Am. bor.
floribunda, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 485.—China.
Francheti, *Chod. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 27, nomen.—Bras.
globulifera, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 486.—China.
goyazensis, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 25, nomen.—Bras.
guaranitica, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 57.—Parag.
Harperi, *Small, Fl. S. E. U. S.* 688.—Am. bor.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 436.—Parag.
Hugeri, *Small. Fl. S. E. U. S.* 686.—Am. bor.
imbricata, *Hayek, in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xv. 45.—Afr. austr.
kubangensis, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 275.—Afr. trop.
macroneura, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 418.—Ind. or.
Moyanoi, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901) repr. 16 (= *Acanthocladus Moyanoi*).—Patag.
nambalensis, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 276.—Afr. trop.
oedipus, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 232.—Patag.
oreophila, *Speg, l. c.* 230.—Patag.
paludicola, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 279.—Afr. trop.
pamparum, *Speg. in Bol. Agric. Argent.* i. 240.—Reg. Argent.
Paulayana, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 35.—Socotra.
psammophila, *Chod. & Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 309 (1901).—Bras.

POLYGALA :—
psammophila, Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 279 (1903).—Afr. trop.
rivularis, Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 278.—Afr. trop.
robusta, Guerke, l. c. 274.—Afr. trop.
saxicola, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 486.—China.
setifera, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 205 (1905).—Mexic.
sparsiflora, Small, Fl. S. E. U. S. 1333 = sparsifolia.
sparsifolia, Small, l. c. 686.—Am. bor.
tehuelchum, Speg. Nov. Add. Fl. Patag. i. (1901) repr. 16; Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. viii. 550 (= *Acanthocladus tehuelchus*).—Patag.
Telephium, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 435.—Parag.
Tempskyana, Auct. in Just, Jahresb. xxv. II. 494, sphalm. = *oxyptera, subsp.* Tempskyana.
tristis, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 434.—Parag.
usafuensis, Guerke, in Engl. Jahrb. xxx. 337.—Afr. trop.
ustulata, Chod. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. III. 27, nomen.—Bras.
Verdickii, Guerke ex Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 206.—Afr. trop.
Vilhelmi, Podp. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, liv. 330.—Hybr.
Zahlbruckneri, Hayek, in Ann. Nat. Hofmus. Wien, xv. 45.—Afr. austr.

POLYGONATUM, Adans. (Liliac.).
angulosum, Bub. Fl. Pyren. iv. 117 = officinale.
angustifolium, Bub. l. c. = verticillatum.
Bodinieri, Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xii. (1903) 262.—China.
ensifolium, Léveillé, l. c. 261.—China.
Haussknechtii, Bornm. & Sint. in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xviii. 52.—Reg. Casp.
inflatum, Kom. in Act. Hort. Petrop. xviii. 442.—As. or.
latifolium, Bub. Fl. Pyren. iv. 118 = multiflorum.
Martini, Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xii. (1903) 262.—China.
nipponicum, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 51.—Japon.

POLYGONUM, Linn. (Polygon.).
arcuatum, Greene, Pittonia, v. 201.—Calif.
auriculatum, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 117.—Japon.
bernardinum, Greene, Pittonia, v. 199.—Calif.
birmanicum, Gage, in Rec. Bot. Surv. India, ii. 412.—Burma.
Bodinieri, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 343.—China.
breviochreatum, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 117.—Japon.
calcatum, Lindm. in Bot. Notiser, 1904, 139.—Eur.; As.
caurianum, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 264.—Am. bor.
cephalophorum, Greene, Pittonia, v. 198.—Calif.
commixtum, Greene, Pl. Baker. iii. 14.—Am. bor.
consimile, Greene, Pittonia, v. 202.—Am. bor.
exile, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. ii. 286.—Am. bor.
fallax, Greene, Pittonia, v. 200.—Am. bor.
Fauriei, Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 423.—China.
flexile, Greene, Pittonia, v. 203.—Am. bor.
foliosum, Lindb. in Medded. Soc. Faun. et Fl. Fenn. xxvii. 3.—Eur.
Fowleri, Robinson, in Rhodora, iv. 67.—Am. bor.
fugax, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 167.—Am. bor.
glastifolium, Greene, Pittonia, v. 199.—Am. bor.
hastato-sagittatum, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 119.—Japon.
hayachinense, Makino, l. c. 191.—Japon.
jejunum, Greene, Pittonia, v. 198.—Am. bor.
Kinashii, Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 422.—Japon.
Krausseri, Rech. in Ann. Nat. Hofmus. Wien, xv. 33.—Afr. austr.
Labordei, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 344.—China.
leptocarpum, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 263.—Am. bor.

POLYGONUM :—
linearifolium, Greene, Pittonia, v. 197.—Am. bor.
Martini, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 340.—China.
montanum, Greene, Pl. Baker. iii. 13.—Am. bor.
muricatum, Maxim. ex Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 117 = breviochreatum.
omissum, Greene, Pittonia, v. 200.—Am. bor.
panduriforme, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 343.—China.
plumosum, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 166.—Am. bor.
prolificum, Robinson, in Rhodora, iv. 68.—Am. bor.
Reynoutria, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xv. 84 = cuspidatum.
sagittifolium, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 342.—China.
striatulum, Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. xxxi. 263.—Am. bor.
subalatum, Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto, vii. 12.—Lusitan.
vagans, Greene, Pittonia, v. 202.—Am. bor.
viscoferum, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 115.—Japon.
vulcanicum, Greene, Pittonia, v. 198.—Am. bor.

POLYMNIA, Linn. (Compos.).
Jelskii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 484.—Peruv.
Lehmannii, Hieron. l. c. xxviii. 599.—Ecuador.
Nelsonii, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. 99.—Mexic.
radiata, Small, Fl. S. E. U. S. 1239.—Am. bor.

POLYOCHNELLA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 547. *OCHNACEAE.*
Barteri, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 348.—Afr. trop.
brevipes, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
Buechneri, Van Tiegh. l. c.—Afr. trop.
congoensis, Van Tiegh. l. c. 349.—Afr. trop.
fruticulosa, Van Tiegh. l. c. xviii. 40 (= *Ochna fruticulosa*).—Afr. trop.
Gilletiana, Van Tiegh. l. c. (= *Ochna Gilletiana*).—Afr. trop.
gracilipes, Van Tiegh. l. c. xvi. 348 (= *Ochna gracilipes*).—Afr. trop.
hylophila, Van Tiegh. l. c. xviii. 40 (= *Ochna hylophila*).—Afr. trop.
integrifolia, Van Tiegh. l. c. xvi. 348 (= *Ochna integrifolia*).—Ins. Maurit.
mauritiana, Van Tiegh. l. c. (= *Ochna mauritiana*).—Ins. Maurit.
micrantha, Van Tiegh. l. c. xviii. 40 (= *Ochna micrantha*).—Afr. trop.
polyneura, Van Tiegh. l. c. (= *Ochna polyneura*).—Afr. trop.
punctulata, Van Tiegh. l. c. xvi. 349.—Afr. trop.
Welwitschii, Van Tiegh. l. c. 348 (= *Ochna Welwitschii*).—Afr. trop.

POLYODON, H. B. & K. (Gramin.).
[BOUTELOUA, Lag. Gramin.]
texanus, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 138 (= *Bouteloua texana*).—Am. bor.

POLYOSMA, Blume (Saxifr.).
philippinensis, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 16.—Ins. Philipp.

POLYOURATEA, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 190 (1902); et in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. 372. *OCHNACEAE.*
hexasperma, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 190 (= *Gomphia hexasperma*).—Bras.
Planchonii, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 268.—Bras.
polygyna, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 190 (= *Ouratea polygyna*).—Bras.
serrulata, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Par. Sér. VIII. xvi. 269 (= *Gomphia serrulata*).—Bras.
subverticillata, Van Tiegh. l. c. (= *Gomphia subverticillata*).—Bras.

POLYPLEURUM, Tayl. (Podost.).
[PODOSTEMON, Michx. I. K.]
acuminatum, Warm. in Danske Vid. Selsk. Skr. Ser. VI. xi. I. 15.—Ind. or.
Schmidtianum, Warm. l. c. 4.—Cochinch.

POLYPOGON, Desf. (Gramin.).
Alopecurus, Bub. Fl. Pyren. iv. 279 = monspeliensis.

POLYPTERIS, Nutt. (Compos.).
Lindenii, Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, xiv. 173 (= *Palafoxia Lindenii*).—Mexic.
maxima, Small, Fl. S. E. U. S. 1288.—Am. bor.

POLYSCIAS, Forst. (Aral.).
Albersiana, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 182.—Afr. trop.

POLYSPHAERIA, Hook. f. (Rubiac.).
arbuscula, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. 349.—Afr. trop.
macrophylla, K. Schum. l. c.—Afr. trop.
pedunculata, K. Schum. ex Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 226.—Afr. trop.

POLYSTACHYA, Hook. (Orchid.).
appendiculata, Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. iii. (1903) 238.—Afr. trop.
aristulifera, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 219.—Afr. trop.
bicalcarata, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxvi. 118.—Afr. trop.
Busseana, Kraenzl. l. c. xxxiii. 60.—Afr. trop.
crassifolia, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxviii. 7.—Afr. trop.
dolichophylla, Schlechter, l. c. 8.—Afr. trop.
Ellenbeckiana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiii. 62.—Afr. trop.
epiphytica, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 172.—Afr. trop.
flavescens, J. J. Sm. Orchid. Java, 284 = Zollingeri.
Gilletii, Wildem. Notices Pl. Utiles Congo, 313.—Afr. trop.
Goetzeana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxx. 287.—Afr. trop.
gracilis, Wildem. Notices Pl. Utiles Congo, 136.—Afr. trop.
holochila, Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 210.—Afr. trop.
Heyghei, Wildem. Notices Pl. Utiles Congo, 315.—Afr. trop.
inconspicua, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 218.—Afr. trop.
Kaessneriana, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiv. 59.—Afr. trop.
Kindtiana, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 21.—Afr. trop.
latifolia, Wildem. Notices Pl. Utiles Congo, 138.—Afr. trop.
Laurentii, Wildem. l. c. 132.—Afr. trop.
Lujae, Wildem. in Pl. Nov. Hort. Then. t. 18.—Afr. trop.
macropetala, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxvi. 117.—Afr. trop.
mayombensis, Wildem. Notices Pl. Utiles Congo, 134.—Afr. trop.
minuta, Britton, in Small, Fl. S. E. U. S. 328 (= *Epidendrum minutum*).—Am. bor.
miranda, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxx. 286.—Afr. trop.
mukandaensis, Wildem. Notices Pl. Utiles Congo, 139.—Afr. trop.
musozensis, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 217.—Afr. trop.
nyanzensis, Rendle, l. c.—Afr. trop.
mystacioides, Wildem. Notices Pl. Utiles Congo, 133.—Afr. trop.
Neobenthamia, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxviii. 7 (= *Neobenthamia gracilis*).—Afr. trop.
Plehniana, Schlechter, l. c. 8.—Afr. trop.
praealta, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxvi. 118.—Afr. trop.
Rolfeana, Kraenzl. l. c. xxxiii. 61.—Afr. trop.
Supfiana, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxviii. 9.—Afr. trop.
uniflora, Wildem. in Pl. Nov. Hort. Then. t. 19.—Afr. trop.
wahisiana, Wildem. in Belg. Colon. 1904, 183.—Afr. trop.
xerophila, Kraenzl. in Engl. Jahrb. xxxiv. 60.—Afr. trop.

POLYTHECIUM, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 377. *OCHNACEAE.*
andravinense, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 368 (= *Ochna andravinensis*).—Madag.

POLYTHECIUM :—
Bakeri, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 369.—Madag.
Baroni, Van Tiegh. l. c.—Madag.
Carvalhi, Van Tiegh. l. c. 368 (= Ochna Carvalhi).—Madag.
ciliatum, Van Tiegh. l. c. 367 (= Ochna ciliatum).—Madag.
citrinum, Van Tiegh. l. c. xviii. 55 (= Ochna citrina).—Afr. trop.
cochinchinense, Van Tiegh. l. c. xvi. 375.—Cochinch.
contortum, Van Tiegh. l. c. 370.—Madag.
cordatum, Van Tiegh. l. c. 369.—Ind. or.
discolor, Van Tiegh. l. c. xviii. 54; et in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 158.—Ind. or.
emarginatum, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 368 (= Ochna emarginata).—Madag.
Fischeri, Van Tiegh. l. c. 368 (= Ochna Fischeri).—Madag.
Grandidieri, Van Tiegh. l. c. 371.—Madag.
Griffithi, Van Tiegh. l. c. 374.—Ind. or.
Helferi, Van Tiegh. l. c.—Ind. or.
Hildebrandtii, Van Tiegh. l. c. 372.—Afr. trop.
Humblotianum, Van Tiegh. l. c. 368 (= Ochna Humblotiana).—Madag.
inaequale, Van Tiegh. l. c. 375.—Cochinch.
integrifolium, Van Tiegh. l. c. 371.—Madag.
Kingi, Van Tiegh. l. c. 374.—Ind. or.
Kirkii, Van Tiegh. l. c. 368 (= Ochna Kirkii).—Madag.
Lefevrei, Van Tiegh. l. c. 375.—Cochinch.
lokobense, Van Tiegh. l. c. 370.—Madag.
longipes, Van Tiegh. l. c. 371.—Madag.
lucens, Van Tiegh. l. c. 370.—Madag.
madagascariense, Van Tiegh. l. c. 367 (= Ochna madagascariensis).—Madag.
micranthum, Van Tiegh. l. c. 370.—Madag.
Moonii, Van Tiegh. l. c. 369.—Ind. or.
mucronatum, Van Tiegh. l. c. 372.—Afr. trop.
nitidum, Van Tiegh. l. c. 369 (= Ochna nitida).—Ind. or.
obovatum, Van Tiegh. l. c. 368 (= Ochna obovata).—Madag.
pedunculatum, Van Tiegh. l. c. 373.—Ind. or.
pellucidum, Van Tiegh. l. c. 374.—Ind. or.
polycarpum, Van Tiegh. l. c. 367 (= Ochna polycarpa).—Madag.
pulchrum, Van Tiegh. l. c. xvi. 368; et l. c. xviii. 54 (= Ochna pulchra).—Afr. austr.
pumilum, Van Tiegh. l. c. xvi. 373 (= Ochna pumila).—Ind. or.
Rehmannii, Van Tiegh. l. c. xviii. 55 (= Ochna Rehmannii).—Afr. austr.
Richardi Van Tiegh. l. c. xvi. 371.—Madag.
rubrum, Van Tiegh. l. c.—Madag.
rufescens, Van Tiegh. l. c. 369.—Ind. or.
spinulosum, Van Tiegh. l. c. 372.—Afr. trop.
splendidum, Van. Tiegh. l. c. 368 (= Ochna splendida).—Madag.
Thomasianum, Van Tiegh. l. c. xviii. 55 (= Ochna Thomasiana).—Afr. trop.
Thoreli, Van Tiegh. l. c. xvi. 376.—Cochinch.
Thwaitesii, Van Tiegh. l. c. 369.—Ind. or.

POLYTOCA, R. Br. (Gramin.).
cyathopoda, F. M. Bailey, Queensl. Fl. 1849.—Austral.
Sclerachne, F. M. Bailey, l. c.—Austral.

POLYTRIAS, Hack. (Gramin.).
diversiflora, Nash, in Torreya, v. 110 (= Andropogon diversiflorus).—Java.

POMMERESCHIA, Wittm. (Zingib.).
spectabilis, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib. 280 (= Croftia spectabilis).—Burma.

POPOWIA, Endl. (Anon.).
Baillonii, Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl. vi. 48 = Mannii, Baill.
Buchananii, Engl. & Diels, l. c. 47.—Afr. trop.
djurensis, Engl. & Diels, l. c. 49 (= Clathrospermum djurense).—Afr. trop.
elegans, Engl. & Diels, l. c. 45 (= Unona elegans).—Afr. trop.
ferruginea, Engl. & Diels, l. c. 46 (= Unona ferruginea).—Afr. trop.

POPOWIA :—
foliosa, Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl. vi. 52.—Afr. trop.
gracilis, Oliv. ex Engl. & Diels, l. c. 48.—Afr. trop.
Klainii, Engl. & Diels, l. c. 52.—Afr. trop.
Laurentii, Wildem. Enum. Pl. Laurent, 63.—Afr. trop.
lucidula, Engl. & Diels, in Engl. Monogr. Afr. Pfl. vi. 45 (= Unona lucidula).—Afr. trop.
macrocarpa, Engl. & Diels, l. c. 48.—Afr. trop.
Mannii, Engl. & Diels, l. c. 49 (non Baill.) (= Clathrospermum Mannii.).—Afr. trop.
parvifolia, Engl. & Diels, l. c. 46 (= Unona parvifolia).—Afr. trop.
Schweinfurthii, Engl. & Diels, l. c. 51.—Afr. trop.
stenosepala, Engl. & Diels, l. c. 49.—Afr. trop.
trichocarpa, Engl. & Diels, l. c. 47 (= Unona trichocarpa).—Afr. trop.
Whytei, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 81.—Afr. trop.

POPULUS, Linn. (Salic.).
ariana, Dode, Extr. Monogr. Inéd. Populus, 16.—Persia.
Besseyana, Dode, l. c. 38.—Am. bor.
Bethmontiana, Dode, l. c. 52.—Oriens.
bisattenuata, Dode, l. c. 50.—Eur.
Bogueana, Dode, l. c. 24.—Hab.?
Bonnetiana, Dode, l. c. 17.—Afr. bor.
Carreiriana, Dode, l. c. 49.—Hab.?
coloradensis, Dode, l. c. 58.—Am. bor.
Comesiana, Dode, l. c. 20.—Eur. or. austr.
Davidiana, Dode, l. c. 31.—China.
dimorpha, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 197 (1905).—Mexic.
Duclouxiana, Dode, Extr. Monogr. Inéd. Populus, 32.—China.
elaverensis, Dode, l. c. 49.—Gallia.
elongata, Dode, l. c. 61.—Am. bor.
epirotica, Dode, l. c. 23.—Eur. or. austr.
Eugenei, Dode, l. c. 46.—Hybr.
europaea, Dode, l. c. 51.—Eur.
euxylon, Dode, l. c. 41.—Am. bor.?
floccosa, Dode, l. c. 24.—Oriens.
Freyni, Dode, l. c. 20.—Oriens.
gallica, Dode, l. c. 51.—Eur.
Gamblei, Dode, l. c. 63.—Reg. Himal.
glabrata, Dode, l. c. 27.—China bor.
glaucicomana, Dode, l. c. 16.—Turkestan.
globosa, Dode, l. c. 27.—Oriens.
hastata, Dode, l. c. 64.—Am. bor.
Henryana, Dode, l. c. 39.—Am. bor.
Hervierana, Dode, l. c. 28.—Hab.?
heteroloba, Dode, l. c. 22.—Eur. or.
Hickeliana, Dode, l. c. 20.—Reg. Medit.
Hobartiana, Dode, l. c. 27.—Oriens.
hypomelaena, Dode, l. c. 55.—Eur. et As. bor.
incrassata, Dode, l. c. 41.—Am. bor.
Irishiana, Dode, l. c. 43.—Hybr.
Jacquemontiana, Dode, l. c. 66.—Reg. Himal.
Kanjilaliana, Dode, l. c. 60.—As. cent.
Krauseana, Dode, l. c. 46.—Hybr.
laticoma, Dode, l. c. 44.—Hybr.
lepida, Dode, l. c. 28.—Eur.
Litwinowiana, Dode, l. c. 17.—As. cent.
macranthela, Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. 142.—China.
mauritanica, Dode, Extr. Monogr. Inéd. Populus, 16.—Alger.
megaleuce, Dode, l. c. 24.—Eur.
Michauxi, Dode, l. c. 62.—Am. bor.
Morisetiana, Dode, l. c. 22.—Oriens.
Mulleriana, Dode, l. c. 48.—Eur.
Munsoniana, Dode, l. c. 33.—Hab.?
octorabdos, Dode, l. c. 57.—As. cent.
Paletskyana, Dode, l. c. 21.—Eur. or.; Turkestan.
palmata, Dode, l. c. 22.—Reg. Medit.
parvidentata, Dode, l. c. 30.—Oriens.
pekinensis, L. Henry, in Rev. Hortic. 1903, 355.—China.
peliostachya, Dode, Extr. Monogr. Inéd. Populus, 31.—China.
Peronneana, Dode, l. c. 23.—Eur.
pseudo-grandidentata, Dode, l. c. 31.—Hab.?
ramulosa, Dode, l. c. 46.—Hybr.
robusta, Dode, l. c. 45.—Hybr.
Sargentii, Dode, l. c. 40.—Am. bor.
Schroederiana, Dode, l. c. 56.—As. cent.?
scythica, Dode, l. c. 51.—Eur. or.

POPULUS :—
sinensis, Dode, Extr. Monogr. Inéd. Populus, 50.—China.
sinuata, Dode, l. c. 29.—Oriens.
sylvicola, Dode, l. c.—Oriens.
Thevestina, Dode, l. c. 52.—Reg. Medit.
Thracia, Dode, l. c.—Eur. or.
Trabutiana, Dode, l. c. 22.—Eur. or.
treyviana, Dode, l. c. 21.—Eur. or.
triangularis, Dode, l. c. 45.—Hybr.
triloba, Dode, l. c. 21.—Reg. Himal.
tschoudiana, Dode, l. c. 47.—Eur.
utilis, Dode, l. c. 45.—Hybr.
Vaillantiana, Dode, l. c. 46.—Eur.
valida, Dode, l. c. 25.—Bulgar.
vegeta, Dode, l. c. 45.—Hybr.
vistulensis, Dode, l. c. 51.—Eur.
Wislizeni, Sargent, Silva N. Amer. xiv. 71, t. 732.—Am. bor.
Wolfiana, Dode, Extr. Monogr. Inéd. Populus, 56.—As. cent.?
Woobstii, Dode, l. c. 60.—As. cent.?
yunnanensis, Dode, l. c. 63.—China.

PORANA, Burm. (Convolv.).
subrotundifolia, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 111.—Afr. trop.

PORCELIA, Ruiz & Pav. (Anonac.).
stenopetala, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xl. 1.—Am. cent.

POROCHNA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 214. OCHNACEAE.
Antunesii, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 367 (= Ochna Antunesii).—Afr. trop.
Aschersoniana, Van Tiegh. l. c. xviii. 57 (= Ochna Aschersoniana).—Afr. trop.
bifolia, Van Tiegh. l. c. xvi. 389.—Afr. trop.
brunnescens, Van Tiegh. l. c. 386 (= Ochna brunnescens).—Afr. trop.
davillaeflora, Van Tiegh. l. c. (= Ochna davilliflora).—Afr. trop.
Hiernii, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 125.—Afr. trop.
Hoffmanni-ottonis, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 387 (= Ochna Hoffmanni-ottonis).—Afr. trop.
huillensis, Van Tiegh. l. c. (= Ochna huillensis).—Afr. trop.
latisepala, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 125.—Afr. trop.
membranacea, Van Tiegh. l. c. 124 (= Ochna membranacea).—Afr. trop.
paniculata, Van Tiegh. l. c. 125.—Afr. trop.
quangensis, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xviii. 57 (= Ochna quangensis).—Afr. trop.
rubescens, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 124.—Afr. trop.

POROPHYLLUM, Vaill. (Compos.).
calcicola, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. 116.—Mexic.
Hasslerianum, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 730.—Parag.
Holwayanum, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 48.—Mexic.
maritimum, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 162 (1903).—Calif.
platyphyllum, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 397.—Parag.
quinqueflorum, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 235 (1905).—Mexic.

POROTHECA, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 263. MENISPERMACEAE.
petiolata, K. Schum. l. c.—N. Guin.

PORPHYROSPATHA, Engl. (Arac.).
crassifolia, Engl. Jahrb. xxxvii. 140.—N. Granat.

PORTEA, C. Koch (Bromel.).
Silveirae, Mez, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 5.—Bras.

PORTULACA, Linn. (Portulac.).
neglecta, Mackenzie & Bush, Fl. Jacks. County, 86; et in Trans. Acad. Sci. St. Louis, xii. 81.—Am. bor.

PORTULACA :—
perennis, *R. Fries, in Nov. Act Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 151.—Reg. Argent.
phaeosperma, *Urb. Symb. Antill.* iv. 233.—Ind. occ.
platensis, *Speg. Contrib. Fl. Tandil*, 8; *et in Bol. Agric. Argent.* i. 274.—Reg. Argent.
poliosperma, *Urb. Symb. Antill.* iv. 232.—Ind. occ.
rotundifolia, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 149.—Reg. Argent.
sedifolia, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 19.—Guiana.
sylvestris, Bub. Fl. Pyren. iii. 2 = oleracea.

POTAMOGETON, Linn. (Naiad.).
asiaticus, *Arth. Benn. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, ix. (1905) 103.—Manchuria.
Chamissoi, *Arth. Benn. in Journ. Bot.* 1904, 74.—Ins. Maurit.
distinctus, *Arth. Benn. l. c.* 72.—As. or.
floridanus, *Small, Fl. S. E. U. S.* 37.—Am. bor.
linguatus, *Hagstr. ex Dusén, in Oefvers. Vet. Akad. Forhandl. Stockh.* lviii. (1901) 259; *et ex Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 149.—Patag.
Livingstonei, *Arth. Benn. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 223.—Afr. trop.
Maackianus, *Arth. Benn. in Journ. Bot.* 1904, 74.—Japon.
Morongii, *Arth. Benn. l. c.* 1902, 145.—Japon.
numasakianus, *Arth. Benn. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, ix. (1905) 104.—Japon.
odontocarpus, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 393.—Austral.
pamiricus, *Baagoe, ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 182.—As. cent.
Preussii, *Arth. Benn. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 222.—Afr. trop.
Richardsonii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 599.—Am. bor.
Schweinfurthii, *Arth. Benn. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 230.—Afr. trop.
similis, *Arth. Benn. in Journ. Bot.* 1902, 146.—Austral.
strictifolius, *Arth. Benn. l. c.* 148.—Am. bor.

POTENTILLA, Linn. (Rosac.).
acuminata, *H. M. Hall, in Univ. Calif. Publ. Bot.* i. 86.—Am. bor.
Alexeenkoi, *Lipsky, in Act. Hort. Tiflis*, vi. 62.—Reg. Caucas.
Amthoris, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 107.—Hybr.
atrovirens, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 505.—Am. bor.
Ausserdorferi, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 110.—Hybr.
Bakeri, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 560.—Am. bor.
Breunia, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 107.—Hybr.
brunnescens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 173.—Am. bor.
callida, *H. M. Hall, in Univ. Calif. Publ. Bot.* i. 86.—Am. bor.
fallacina, *Blocki, in Wolosz. Fl. Polon. Exsicc.* no. 623.—Polonia.
filipes, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 174.—Am. bor.
Freyniana, *Bornm. in Mitth. Thuring. Bot. Ver.* n. s. xx. 12.—As. bor.
Hallii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 176.—Calif.
Hickmani, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 77.—Am. bor.
Hoelzlii, *Blocki, in Wolosz. Fl. Polon. Exsicc.* no. 624.—Hybr.
horrida, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 173.—Mexic.
Langeana, *Rydb. l. c.* 179.—Gronia.
Laresciae, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 463.—Eur.
madrensis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 30.—Mexic.
Mandoni, *Foucaud, in Bull. Soc. Bot. Rochel.* xxii. 30, fide *Index Univ. Bot.* 1205.—Eur.
Matsuokana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 161.—Japon.
Miyabei, *Makino, l. c.* 28.—Japon.

POTENTILLA :—
moesiaca, *Davidoff, in Magyar Bot. Lap.* iv. 27.—Bulgar.
obovatifolia, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 175.—Mexic.
Opizii, *Domin, in Sitz. Bohm. Ges. Wiss.* 1903, no. 25, 21.—Austria.
permollis, *Rydb. in Bull Torr. Bot. Club*, 1901, 175.—Am. bor.
propinqua, *Rydb. l. c.* 176.—Am. bor.
Rydbergiana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 30.—Mexic.
sikkimensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 201.—Reg. Himal.
stellulata, *Davidoff, in Magyar Bot. Lap.* iv. 28.—Bulgar.
stiriaca, *Hayek, in Mitth. Naturw. Ver. Steiermark*, xli. 174.—Hybr.
subquinata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 181.—Gronia.
Suskalovicii, *Adam. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxiv. 126.—Turcia.
ternata, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 30.—Japon.
ternata, Freyn, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 62 = Freyniana.
Townsendii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 174.—Mexic.

POTHOS, Linn. (Arac.).
ceylanicus, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 24.—Zeylan.
ellipticus, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 48.—Penins. Mal.
grandispatha, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
Hosei, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 178.—Borneo.
inaequalis, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 47.—Penins. Mal.
longipedunculatus, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 27.—Ins. Malay.
ovatifolius, *Engl. l. c.* 40.—Ins. Philipp.
philippinensis, *Engl. l. c.* 316.—Ins. Philipp.
yunnanensis, *Engl. l. c.* 28.—China.

POUPARTIA, Comm. (Anacard.).
gummifera, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 408.—Madag.

POUTERIA, Aubl. (Sapot.).
coriacea, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 109 (= *Gnapeba coriacea*).—Ind. occ.
semecarpifolia, *Pierre, l. c.* 108 (= *Guapeba semecarpifolia*).—Ind. occ.
splendens, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 657 (= *Lucuma splendens*).—Patag.

POUZOLZIA, Gaudich. (Urtic.).
fruticosa, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 127.—Afr. trop.

PRAINEA, King (Urtic.).
cuspidata, *Becc. Nelle Foreste di Borneo*, 636.—Borneo.
frutescens, *Becc. l. c.* 635.—Borneo.
papuana, *Becc. l. c.*—N. Guin.
Rumphiana, *Becc. l. c.* 636 (= *Metrosideros spuria*).—Java.

PRANGOS, Lindl. (Umbell.).
goktchiana, *O. & B. Fedtsch. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 963.—Reg. Caucas.

PRARAVINIA, Korth. (Rubiac.).
Minahassae, *Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 79 (= *Lasianthus Minahassae*).—Celebes.
Teysmanni, *Koord. l. c.* 75.—Celebes.

PRASOPHYLLUM, R. Br. (Orchid.).
attenuatum, *Fitzg. in Journ. Bot.* 1885, 136 (*non Fitzg. in Gard. Chron.* 1882, i. 495).—Austral.
Muelleri, *C. Andrews, in Journ. Muell. Soc. W. Austral.* Ser. I. ix. 19.—Austral.

PRATIA, Gaudich. (Campan.).
torricellensis, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 402.—N. Guin.

PREMNA, Linn. (Verben.).
chrysoclada, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 293 (= *Vitex chrysoclada*).—Afr. trop.
melanophylla, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 196.—Afr. trop.

PREMNA :—
membranacea, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 65.—Ins. Philipp.
oblongifolia, *Merrill, l. c.* xxix. 48.—Ins. Philipp.
sulphurea, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 292 (= *Vitex sulphurea*).—Afr. trop.
Zenkeri, *Guerke, l. c.*—Afr. trop.

PRENANTHES, Vaill. (Compos.).
acerifolia, *Matsum. Enum. Sci. Names* (1895) 234 (= *Nabalus acerifolius*).—Japon.
glandulosa, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 514.—China.
Henryi, *Dunn, l. c.*—China.
nipponica, *Matsum. Enum. Sci. Names* (1895) 235 (= *Nabalus nipponicus*).—Japon.
vitifolia, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 634.—China.

PRESCOTTIA, Lindl. (Orchid.).
polyphylla, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 153.—Bras.

PRESTONIA, R. Br. (Apocyn.).
glabrata, *K. Schum. ex Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 189.—Peruv.

PRETREOTHAMNUS, Engl. in Engl. Jahrb. xxxvi. (1905) 228. *PEDALIACEAE.*
rosaceus, *Engl. l. c.* 238.—Afr. trop.

PREVOSTEA, Choisy (Convolv.).
[BREWERIA, R. Br. I. K.]
breviflora, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 70.—Afr. trop.

PRIMULA, Linn. (Primul.).
Aitchisonii, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 105.—Afghan.
algida, Janka, ex Pax, l. c. 80 = frondosa.
altaica, Hort. ex Pax, l. c. 53 = amoena.
americana, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 500.—Am. bor.
androsacea, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 34.—China.
anglica, *Pax, l. c.* 66.—Hybr.
angustidens, Pax, l. c. 128 = Wilsoni.
Arendsii, *Pax, l. c.* 346.—Hybr.
atropurpurea, Hort. ex Pax, l. c. 56 = acaulis.
caulescens, *Pax, l. c.* 61.—Hybr.
Cavanillesii, *Fedde, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1904, 169 (= *Androsace spathulata*).—Am. austr.
cordifolia, Schur, ex Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 59 = officinalis.
Courtii, Hort. Veitch, ex Pax, l. c. 37 = sinensis.
cupularis, *Pax, l. c.* 63.—Hybr.
decipiens, Stein, ex Pax, l. c. 141 = hirsuta.
discolor, Schur, ex Pax, l. c. 59 = officinalis.
Dyeriana, *Watt, in Journ. Hortic. Soc. Lond.* xxix. 300.—Ind. or.
Edgeworthii, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 41.—Reg. Himal.
efarinosa, *Pax, l. c.* 79.—China.
Ellisiae, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Wash.* xv. 178.—Am. bor.
Falkneriana, *Porta, ex Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 62.—Hybr.
fallax, C. Richter, ex Pax, l. c. 61 = digenea.
Filchnerae, *Knuth, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 139.—China.
Franchetii, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 105 (= *Omphalogramma Souliei*).—China.
gaisbergensis, *Pax, l. c.* 64.—Hybr.
Giraldiana, *Pax, l. c.* 92.—China.
glomerata, *Pax, l. c.*—Reg. Himal.
Goeppertiana, *Pax, l. c.* 61.—Hybr.
Harrissii, *Watt, in Journ. Hortic. Soc. Lond.* xxix. 299.—Ind. or.
hazarica, *Duthie, in Ann. Bot. Gard. Calc.* ix. 49.—Ind. or.
Helenae, *Auct. in Proc. Biol. Soc. Washington*, xv. 254.—Am. bor.
Henryi, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 47 (= *Carolinella Henryi*).—China.
Hoelscheri, *Pax, l. c.* 347.—Hybr.
Inayati, *Duthie, in Ann. Bot. Gard. Calc.* ix. 49.—Ind. or.
Juliae, *Kusnez. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. Bot.* xxxi. (1901) (*Fl. Cauc. Crit.* i. 75).—Reg. Caucas.

PRIMULA:—
Knuthiana, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 79. —China.
leudrensis, Porta, ex Pax, l. c. 60 = media.
lilacina, Hort. ex Pax, l. c. 56 = acaulis.
longobarda, Porta, ex Pax, l. c. 136 = glaucescens.
macedonica, *Adamov. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 3. —Eur.
Mnischekii, Bayern, ex Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 54 = amoena.
Nelsoni, Hort. ex Stein, in Samenkat. Bot. Gart. Breslau, 1881 = hirsuta.
obovata, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 47 (= *Carolinella obovata*).—China.
obtusifolia, Hort. ex Pax, l. c. 76 = involucrata.
odontocalyx, *Pax, l. c.* 41.—China.
ossetica, *Kusnez. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. Bot.* xxxi. (1901) (*Fl. Cauc. Crit.* i. 112).—Reg. Caucas.
Partschiana, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 45 (= *Carolinella cordifolia*).—China.
Paxiana, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxv. 56. —China.
peduncularis, Bornm. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 261 = Dionysia peduncularis.
pseudodenticulata, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 91.—China.
pseudoelatior, *Kusnez. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. Bot.* xxxi. (1901) (*Fl. Cauc. Crit.* i. 63).—Reg. Caucas.
pulcherrima, Hort. ex Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 90 = denticulata.
pulverulenta, *Duthie, in Gard. Chron.* 1905, ii. 259.—China.
purpurea, Hort. ex Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 56 = acaulis.
Richteri, *Pax, l. c.* 68.—Hybr.
rosea, Hort. ex Pax, l. c. 56 = acaulis.
Ruprechtii, *Kusnez. in Trav. Soc. Nat. Pétersb. Bot.* xxxi. (1901) (*Fl. Cauc. Crit.* i. 64).—Reg. Caucas.
saxatilis, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 420.—Corea.
Schlagintweitiana, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 91.—Reg. Himal.
squamosa, Klatt, ex Pax, l. c. 30 = petiolaris.
szechuanica, *Pax, l. c.* 106.—China.
tangutica, *Duthie, in Gard. Chron.* 1905. ii. 42 (Jul. 1905).—China.
tangutica, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 108 (Nov. 1905).—China.
Traillii, *Watt, in Journ. Hortic. Soc. Lond.* xxix. 299. —Ind. or.
tristis, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 65.—Hybr.
Veitchii, *Duthie, in Gard. Chron.* 1905, i. 344.—China.
violodora, *Dunn, in Gard. Chron.* 1902, ii. 129.—China.
Warshenewskiana, *B. Fedtsch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 149.—As. cent.
Wiesbaurii, *Pax, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 63. —Hybr.
Wilsoni, *Dunn, in Gard. Chron.* 1902, i. 413.—China.

PRIONOSCIADIUM, S. Wats. (Umbellif.).
diversifolium, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 334.—Mexic.
moschatum, *Rose, l. c.* 335.—Mexic.
palustre, *Rose, l. c.*—Mexic.
Seleri, *Rose, l. c.*—Am. cent.
Townsendi, *Rose, l. c.*—Mexic.

PRISMATOMERIS, Thw. (Rubiac.).
subsessilis, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 91.—Penins. Mal.

PROBOSCELLA, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvii. (1903) 4. *OCHNACEAE.*
emarginata, *Van Tiegh. l. c.* 5.—Afr. trop.
Hoepfneri, *Van Tiegh. l. c.* 4.—Afr. trop.

PROCHNYANTHES, S. Wats. (Amaryll.).
mexicana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 14 (= *Polianthes mexicana*).—Mexic.

PROSERPINACA, Linn. (Halorag.).
platycarpa, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 432.—Am. bor.

PROSOPIS, Linn. (Legum.).
Benthami, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 296.—Reg. Argent.
Gilliesii, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 490 (= *Poinciana Gilliesii*).—Am. austr.

PROSOPIS:—
schinopoma, *Stuckert, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* Sér. III. xiii. 87.—Reg. Argent.
Vinalillo, *Stuckert, in Ann. Mus. Buenos Aires*, vii. 73.—Reg. Argent.

PROSTANTHERA, Labill. (Labiat.).
atroviolacea, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xvi. 190.—Austral.
granitica, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxx. 369.—Austral.

PROTARUM, Engl. in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 42 (1901). *ARACEAE.*
Sechellarum, *Engl. l. c.*—Ins. Seychell.

PROTEA, Linn. (Proteac.).
Baumii, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 221.—Afr. trop.
Bussceana, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 131.—Afr. trop.
chionantha, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 225.—Afr. trop.
chrysolepis, *Engl. & Gilg, l. c.* 222.—Afr. trop.
congensis, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 129.—Afr. trop.
curvata, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 131.—Afr. austr.
Dekindtiana, *Engl. Jahrb.* xxxii. (1902) 128.—Afr. trop.
Eickii, *Engl. l. c.* xxxiii. 130.—Afr. trop.
Goetzeana, *Engl. l. c.* xxx. 298.—Afr. trop.
haemantha, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 220.—Afr. trop.
Heckmanniana, *Engl. Jahrb.* xxx. 300.—Afr. trop.
kingaensis, *Engl. l. c.* 297 (*errore kinguensis*).—Afr. trop.
Lemairei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 30. —Afr. trop.
leucoblephara, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxviii. i. 451 (= *Leucadendron leucoblepharum*).—Afr. trop.
linearifolia, *Engl. Jahrb.* xxx. 296.—Afr. trop.
melliodora, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 224.—Afr. trop.
myrsinifolia, *Engl. & Gilg, l. c.* 223.—Afr. trop.
praticola, *Engl. Jahrb.* xxx. 297.—Afr. trop.
rubrobracteata, *Engl. l. c.* 299.—Afr. trop.
subvestita, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 132—Afr. austr.
trichophylla, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 226.—Afr. trop.
Wentzeliana, *Engl. Jahrb.* xxx. 298.—Afr. trop.

PROTOLIRION, Ridl. (Triurid.).
Miyoshia-Sakuraii, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 208 (= *Miyoshia Sakuraii*).—Japon.

PRUNELLA, Linn. (Labiat.).
[BRUNELLA, Linn. D. T. & H.]
scaberrima, *Aut. in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 206.—Am. bor.

PRUNUS, Linn. (Rosac.).
alabamensis, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 553.—Am. bor.
australis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 162.—Am. bor.
bokhariensis, *Schneider, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 51.—Ind. or.
brutia, *Terracc. in Atti Ist. Incor. Napoli*, Ser. IV. i. (1888) n. 7; *Ann. di Bot. Roma*, ii. 175.—Ital.
canescens, *Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 66.—China.
clarofolia, *Schneider, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 67. —China.
consociiflora, *Schneider, l. c.* 54.—China.
Cuthbertii, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 290. —Am. bor.
dictyoneura, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 57.—China.
discolor, *Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. (1905) 591 (= *Amygdalus discolor*).—Oriens.
eximia, *Small, in Torreya*, i. 146.—Am. bor.
Giraldiana, *Schneider, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 65.—China.
Haussknechtii, *Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. (1905) 592.—As. Min.
ichangana, *Schneider, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 50. —China.
integrifolia, *Sarg. Man. Trees N. Amer.* 531.—Am. bor.
itosakura, Sieb. in Verh. Batav. Gen. xii. 68 = pendula, *Maxim.*

PRUNUS:—
lanata, *Mackenzie & Bush, Fl. Jacks. County*, 109; *et in Trans. Acad. St. Louis*, xii. 83.—Am. bor.
leiocarpa, *Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. (1905) 591 (= *Amygdalus leiocarpus*).—Persia.
litigiosa, *Schneider, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 65. —China.
mitis, *Beadle, in Biltm. Bot. Studies*, i. 162.—Am. bor.
myrtifolia, *Urb. Symb. Antill.* v. 93 (= *Celastrus myrtifolius*).—Ind. occ.
nipponica, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 99.—Japon.
normalis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 572.—Am. bor.
paniculata, Edw. in Bot. Reg. t. 800 = pseudo-Cerasus.
pseudo-Cerasus, *Lindl. in Trans. Hort. Soc.* vi. (1826) 90.—China; Japon.
rufoides, *Schneider, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 55. —China.
scoparia, *Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. (1905) 590 (= *Amygdalus scoparius*).—Persia.
spartioides, *Schneider, l. c.* (= *Amygdalus spartioides*). —As. Min.
subhirtella, Miq. Prol. Fl. Jap. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. ii. 91 = pendula, *Maxim.*
tarda, *Sarg. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 108.—Am. bor.
trichopetala, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 70 (= *Cerasus trichopetala*).—Am. bor.
yedoensis, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 100.—Japon.

PSAMMISIA, Klotzsch (Vaccin.).
coriacea, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 42.—Guiana.

PSAMMOGETON, Edgew. (Umbell.).
Borszczowi, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 144.—As. cent.

PSAMMOMOYA, Diels & Loes. in Engl. Jahrb. xxxv. (1904) 339. *CELASTRACEAE.*
choretroides, *Diels & Loes. l. c.* 340.—Austral.
ephedroides, *Diels & Loes. l. c.*—Austral.

PSEPHELLUS, Cass. (Compos.).
[CENTAUREA, Linn. I. K.]
Bornmuelleri, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 22 (= *Centaurea Bornmuelleri*).—As. Min.
erinavensis, *Lipsky, in Act. Hort. Tiflis.* vi. 64.—Reg. Caucas.

PSEUDAEGLE, Miq. (Rutac.).
[CITRUS, Linn. I. K.]
trifoliata, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 15 (= *Citrus trifoliata*).—Japon.

PSEUDANTHUS, Wight (Amarant.).
[NOTHOSAERVA, Wight. I. K.]
tasmanicus, *Rodw. in Papers & Proc. Roy. Soc. Tasm.* 1900-1901 (1902) 107.—Tasm.

PSEUDARTHRIA, Wight (Legum.).
robusta, *Schlechter, ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 25 (= *Anarthrosyne robusta*).—Afr. austr.

PSEUDERANTHEMUM, Radlk. (Acanth.).
[ERANTHEMUM, Linn. I. K. S.]
corcovadense, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 632 (= *Eranthemum corcovadense*).—Parag.
malaccense, *Lindau, in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 40.—Ins. Philipp.

PSEUDIBATIA, Malme (Asclep.).
australis, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* iv. no. 14, 11. —Am. austr.
foetida, *Malme, l. c.* 14 (= *Gonolobus foetidus*).—Reg. Argent.
hirta, *Malme, l. c.* (= *Gonolobus hirtus*).—Reg. Argent.
lanata, *Malme, l. c.* 13 (= *Gonolobus lanatus*).—Reg. Argent.
Stuckertii, *Malme, l. c.* 15.—Reg. Argent.

PSEUDOBLEPHARIS, Baill. (Acanth.).
[SCLEROCHITON, Harv. I. K. S.]
coerulea, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 111.—Afr. trop.

PSEUDOCADIA, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 162 (1902). *LEGUMINOSAE.*
anomala, *Harms, l. c.* (= *Cadia anomala*).—Afr. trop.

PSEUDOCONNARUS, Radlk. (Connar.).
macrophyllus, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 891 (= *Rourea macrophylla*).—Bras.

PSEUDOCYMOPTERUS, Coult. & Rose (Umbell.).
aletifolius, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 574.—Am. bor.
sylvaticus, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 224.—Am. bor.

PSEUDOEUGENIA, Scortech. (Myrtac.).
singaporensis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 133.—Penins. Mal.

PSEUDOGALTONIA. Kuntze (Liliac.).
subspicata, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 853.—Afr. trop.

PSEUDOLACHNOSTYLIS, Pax (Euphorb.).
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Ser. IV. 205.—Afr. trop.

PSEUDOPANAX, C. Koch (Aral.).
laetevirens, *P. Dusén, in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 21.—Patag.

PSEUDOPROSOPIS, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 152 (1902). *LEGUMINOSAE.*
Fischeri, *Harms, l. c.* (= *Prosopis Fischeri*).—Afr. trop.

PSEUDOSOPUBIA, Engl. (Scrophul.).
Delamerei, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 261.—Afr. trop.

PSEUDOSPONDIAS, Engl. (Anacard.).
longifolia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 218.—Afr. trop.

PSEUDOTAENIDIA, Mackenzie, in Torreya, iii. (1903) 158. *UMBELLIFERAE.*
montana, *Mackenzie, l. c.* 159.—Am. bor.

PSEUDOTROPHIS, Warb. (Urtic.).
mindanaensis, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 165.—Ins. Philipp.

PSIDIUM, Linn. (Myrtac.).
campicolum, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 11.—Parag.
eriophyllum, *Barb. Rodr. l. c.* 12.—Parag.
Hasslerianum, *Barb. Rodr. l. c.* 9.—Parag.
igatemyense, *Barb. Rodr. l. c.* 10.—Parag.
lanatum, *Barb. Rodr. l. c.* 13.—Parag.
rufinervum, *Barb. Rodr. l. c.* 15.—Parag.
spodophyllum, *Barb. Rodr. l. c.* 14.—Parag.
triphyllum, *Barb. Rodr. l. c.* 12.—Parag.

PSILANTHELE, Lindau (Acanth.).
grandiflora, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 401.—Peruv.

PSILOCARPHUS, Nutt. (Compos.).
chilensis, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 36 (= *Bezanilla chilensis*).—Chili.
globuliferus, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901) repr. 88 (= *Micropus globuliferus*).—Patag.

PSILOSTROPHE, DC. (Compos.).
[Riddellia, Nutt. I. K.]
Bakeri, *Greene, Pl. Baker.* iii. 29.—Am. bor.
bienois, *Anct. in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvi. 186.—Am. bor.
cerifera, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvi. 21.—Am. bor.
innata, *Anct. in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvi. 186.—Am. bor.
pumila, Jones, ex A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvi. 22 = P. Bakeri.
sparsiflora, *A. Nelson, l. c.* 23.—Am. bor.
villosa, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1006.—Am. bor.

PSILOTRICHUM, Blume (Amarant.).
capitatum, F. Muell. Fragm. i. 238 = Ptilotus psilotrichoides.
densiflorum, *Lopr. in Malpighia*, xiv. 462; *et in Engl. Jahrb.* xxx. 110.—Afr. austr.
Robecchii, *Lopr. in Malpighia*, xiv. 451.—Afr. trop.
villosiflorum, *Lopr. l. c.* 452.—Afr. trop.

PSORALEA, Linn. (Legum.).
biovulata, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 135.—Afr. austr.
macrophylla, *Rowlee, in Small, Fl. S. E. U. S.* 623.—Am. bor.

PSYCHOTRIA, Linn. (Rubiac.).
anacamptopoda, *K. Schum. ex Wildem. in Ann. Mus Congo*, Sér. V. i. 64, nomen.—Afr. trop.
anacamptopus, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 360.—Afr. trop.
angustifolia, *Panch. ex Beauvis. Gen. Montrous.* 53 (= *Douarrea speciosa*).—N. Caled.
anomothyrsa, *K. Schum. & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. (1903) 3.—Am. cent.
arbuscula, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 476.—Ins. Carol.
aurea, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 396.—N. Guin.
avenis, *Panch. ex Beauvis. Gen. Montrous.* 53 (= *Douarrea speciosa*).—N. Caled.
bahamensis, *Millsp. ex Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 451.—Ind. occ.
bangweana, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 361.—Afr. trop.
brevistipula, *Urb. Symb. Antill.* iii. 386.—Ind. occ.
Buchii, *Urb. l. c.* 385.—Ind. occ.
cardiochlamys, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 19 (= *Uragoga cardiochlamys*).—N. Caled.
cephalidantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 361.—Afr. trop.
ceratalabastron, *K. Schum. l. c.* 362.—Afr. trop.
chrysoclada, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
coelospermum, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xv. 492.—Austral.
coeruleo-violacea, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 363.—Afr. trop.
coffeosperma, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
collicola, *K. Schum. l. c.* 364.—Afr. trop.
cyclophylla, *Urb. Symb. Antill.* iii. 383.—Ind. occ.
Dewevrei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 208.—Afr. trop.
discolor, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 327.—Bras.
distegia, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 337.—Afr. trop.
dolichocarpa, *Urb. Symb. Antill.* iii. 382.—Ind. occ.
Dusenii, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 364.—Afr. trop.
expansissima, *K. Schum. l. c.* 365.—Madag.
faucicola, *K. Schum. l. c.* xxxiv. 336.—Afr. trop.
fuscula, *K. Schum. l. c.* 338.—Afr. trop.
Garrettii, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 365.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 208.—Afr. trop.
griseola, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 337.—Afr. trop.
ionantha, *K. Schum. l. c.* xxxiii. 366.—Afr. trop.
lagenocarpa, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
lanceifolia, *K. Schum. l. c.* 367.—Afr. trop.
leucocentron, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
monanthos, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 19 (= *Uragoga monanthos*).—N. Caled.
mornicola, *Urb. Symb. Antill.* iii. 384.—Ind. occ.
neurodictyon, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 368.—Afr. trop.
paraguariensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 177.—Parag.
pleuroneura, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 368.—Afr. trop.
pleuropoda, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 5.—Am. cent.
polyphlebia, *Donn. Sm. l. c.* xxxiii. 253.—Am. cent.
pteropetala, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 369.—Afr. trop.
rubripilis, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.
salmoneiflora, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 396.—N. Guin.
semperflorens, *Panch. ex Beauvis. Gen. Montrous.* 54.—N. Caled.
stenocarpa, *Urb. Symb. Antill.* iii. 382.—Ind. occ.
subuniflora, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 19 (= *Uragoga subuniflora*).—N. Caled.
trichanthera, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 370.—Afr. trop.

PSYCHROGETON, Boiss. (Compos.).
[Aster, Tourn. I. K.]
turkestanicus, *O. Hoffm. ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 145 (= *Diplopappus turkestanicus*).—As. cent.

PTARMICA, Neck. (Compos.).
[Achillea, Linn. I. K.]
rupestris, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1906, 403.—Ital.

PTELEA, Linn. (Rutac.).
carolina, *Greene, in Torreya*, v. 99.—Am. bor.
mesochora, *Greene, l. c.* 100.—Am. bor.
microcarpa, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 293.—Am. bor.
obcordata, *Greene, in Torreya*, v. 99.—Am. bor.
serrata, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 292.—Am. bor.
Toxicodendron, *Small, l. c.* 294.—Am. bor.

PTELEODENDRON, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 480, sphalm. = **Pleodendron**, Van Tiegh. (Canell.).

PTEROCARPUS, Linn. (Legum.).
Antunesii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 89 (= *Calpurnia Antunesii*).—Afr. trop.
aphyllus, *Micheli, in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 266.—Mexic.
Blancoi, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* vi. 7.—Ins. Philipp.
Bussei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 171.—Afr. trop.
Cabrae, *Wildem. in Rev. Cult. Colon.* 1902, 43; *et in Belgique Coloniale*, viii. 198.—Afr. trop.
Dekindtianus, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 89.—Afr. trop.
Mutondo, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 57.—Afr. trop.
odoratus, *Wildem. l. c.* 58.—Afr. trop.
salignus, *Aresch. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxix. no. 2, 82, nomen.—Hab.?
Valentini, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 88.—Patag.

PTEROCAULON, Ell. (Compos.).
alopecuroideum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 386 (= *Conyza alopecuroides*).—Parag.
Balansae, *Chod. l. c.* 388.—Parag.
Hassleri, *Chod. l. c.* 387.—Parag.
Lorentzii, *Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvii. no. 12, 22.—Bras.
Malmeanum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 388.—Parag.
purpurascens, *Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvii. no. 12, 13.—Parag.
rugosum, *Malme, l. c.* 16 (= *Conyza rugosa*).—Bras.
subspicatum, *Malme, ex Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 388.—Parag.
subvirgatum, *Malme, in Bih. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvii. no. 12, 24.—Parag.

PTEROCEPHALUS, Vaill. (Dipsac.).
[Scabiosa, Tourn. I. K.]
Bretschneideri, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 601 (= *Scabiosa Bretschneideri*).—China.

PTEROCYMBIUM, R. Br. (Stercul.).
[Sterculia, Linn. I. K.]
macrocrater, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 117.—Ins. Philipp.
Schumannianum, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 317.—N. Guin.
tinctorium, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxvii. 24 (= *Heritiera tinctoria*).—Malaya.

PTERODISCUS, Hook. (Pedal.).
intermedius, *Engl. Jahrb.* xxxii. (1902) 112.—Afr. trop.
Ruspolii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

PTEROGLOSSASPIS, Reichb. f. (Orchid.).
argentina, *Rolfe, ex Stuck. in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires*, ix. 11.—Reg. Argent.
ecristata, *Rolfe, Orch. Rev.* 1904, 136 (= *Eulophia ecristata*).—Am. bor.

PTEROLEPIS, Miq. (Melast.).
cearensis, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 318.—Bras.
Glaziovii, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiii. *Beibl.* lxxii. 16.—Bras.

PTEROLOBIUM, R. Br. (Legum.).
membranulaceum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 22 (= *Mimosa membranulacea*).—Ins. Philipp.
Schmidtianum, *Harms, in Bot. Tidsskr.* xxiv. 265.—Malaya.

PTERONIA, Linn. (Compos.).
bromoides, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1011.—Afr. trop.
Dinteri, *S. Moore, l. c.* 1012.—Afr. trop.
Eenii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 325.—Afr. trop.
unguiculata, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1012.—Afr. trop.

PTEROSPERMUM, Schreb. (Stercul.).
formosanum, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 53.—Formosa.
lanceolatum, *Lignier & Bey. in Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. V. viii. 258, nomen.—Hab.?
Lamarckianum, *Hochr. in Bull. Inst. Buitenz.* xix. 21.—Ind. or.
macrocarpum, *Hochr. l. c.* 24; *et in Ic. Bogor.* tt. 152-153.—Ind. or.
Proteus, *Burkill, in Kew Bull.* 1901, 138.—China.

PTEROSTEMON, Schau. (Rosac.).
rotundifolius, *Ramirez, in La Naturaleza*, Ser. II. ii. 417.—Mexic.

PTEROSTYLIS, R. Br. (Orchid.).
Sargentii, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 57.—Austral.
semirubra, *F. Muell. Fragm. Phyt. Austral.* viii. 249.—Austral.
tristis, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 271.—N. Zel.

PTEROTABERNA, Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 125 (1902). *APOCYNACEAE.*
inconspicua, *Stapf, l. c.* 126 (= *Tabernaemontana inconspicua*).—Afr. trop.

PTEROXYGONUM, Damm. & Diels, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. (1905) 36. *POLYGONACEAE.*
Giraldii, *Damm. & Diels, l. c.* 36.—China.

PTERYGODIUM, Sw. (Orchid.).
deflexum, *Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc.* xvi. 151.—Afr. austr.
leucanthum, *Bolus, l. c.* 150.—Afr. austr.

PTILORIA, Rafin. (Compos.).
[STEPHANOMERIA, Nutt. I. K.]
lygodesmoides, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 7 (= *Stephanomeria lygodesmoides*).—Am. bor.
ramosa, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 894.—Am. bor.

PTILOTRICHUM, C. A. Mey. (Crucif.).
[ALYSSUM, Tourn. I. K.]
Lapeyrousianum, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 47.—Eur.
Peyrousii, Bub. Fl. Pyren. iii. 211 = Lapeyrousianum.

PTILOTUS, R. Br. (Amarant.).
chamaecladus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 193.—Austral.
depressus, *Fitzger. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. (1904) 33 (= *Trichinium depressum*).—Austral.
Macleayi, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. iii. 162 = polystachyoides.
petiolatus, *Farmar, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1089.—Austral.
roseo-albus, *Farmar, l. c.* 1090.—Austral.
Schwartzii, *Tate, in Trans. Proc. Roy. Soc. Austral.* xii. (1889) 82 (= *Trichinium Schwartzii*).—Austral.

PTYCHOPETALUM, Benth. (Olac.).
alliaceum, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 33.—Afr. trop.
nigricans, *Wildem. l. c.* 34.—Afr. trop.

PTYCHORAPHIS, Becc. (Palm.).
longiflora, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 39.—Penins. Mal.

PTYCHOSPERMA, Labill. (Palm.).
discolor, *Becc. in Martelli, Webbia*, 300.—N. Guin.
Hartmannii, *Becc. l. c.* 301.—N. Guin.
josephensis, *Becc. l. c.* 299.—N. Guin.
Normanbyi, Becc. in D'Albertis, N. Guinea, v. ii. 399 = Calyptrocalyx Albertisianus.
polyclados, *Becc. in Martelli, Webbia*, 301.—N. Guin.

PTYCHOTIS, Koch (Umbell.).
saxifraga, *Loret & Barrand, Fl. Montpel.* i. 283 (= *Seseli saxifragum*).—Eur.

PUCCINELLIA, Parl. (Gramin.).
[GLYCERIA, R. Br. I. K.]
rubida, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvi. 56.—Am. bor.

PUELIA, Franch. (Gramin.).
acuminata, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 125.—Afr. trop.
Schumanniana, *Pilg. l. c.* 126.—Afr. trop.
subsessilis, *Pilg. l. c.* 124.—Afr. trop.

PUERARIA, DC. (Legum.).
Warburgii, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 87.—Ins. Philipp.

PULASSARIUM, Rumpf. (Apocyn.).
[ALYXIA, Banks. I. K. S.]
flavescens, *Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn.* (1894) 261 (= *Alyxia flavescens*).—Cochinch.
pisiforme, *Pierre, l. c.* (= *Alyxia pisiformis*).—Cochinch.

PULICARIA, Gaertn. (Compos.).
kouyangensis, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 490.—China.

PULSATILLA, Linn. (Ranunc.).
[ANEMONE, Tourn. I. K.]
Duthiei, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 417.—Ind. or.

PULTENAEA, Sm. (Legum.).
arida, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 258.—Austral.
barbata, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 38.—Austral.
cinerascens, *Maiden & Betche, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxx. 361.—Austral.
Luehmannii, *Maiden, in Vict. Nat.* xxii. 100.—Austral.
Vrolandi, *Maiden, l. c.* 98.—Austral.
Weindorferi, *Reader, in Vict. Nat.* xxii. 51.—Austral.
Williamsoni, *Maiden, in Vict. Nat.* xxii. 99.—Austral.

PUPALIA, Juss. (Amarant.).
Robecchii, *Lopr. in Malpighia*, xiv. 446.—Afr. trop.

PUYA, Molina (Bromel.).
Brittoniana, *Baker, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 697.—Boliv.
Clava-Herculis, *Mez & Sodiro, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 863.—Ecuador.
ferox, *Mez, l. c.* 632.—Peruv.
glomerifera, *Mez & Sodiro, l. c.* 630.—Ecuador.
gummifera, *Mez & Sodiro, l. c.* 863.—Ecuador.
longisepala, *Mez, l. c.* 629.—Peruv.
oxyantha, *Mez, l. c.* 631.—Peruv.
Pichinchae, *Mez & Sodiro, l. c.* 633.—Ecuador.
Sodiroana, *Mez, l. c.* 630.—Ecuador.
Weberbaueri, *Mez, l. c.* 633.—Peruv.

PYCNOBOTRYA, Benth. (Apocyn.).
multiflora, *K. Schum. ex Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 203.—Afr. trop.

PYCNOCOMA, Benth. (Euphorb.).
trilobata, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 132.—Afr. trop.

PYCNOSPHAERA, Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 333 (1903). *GENTIANACEAE.*
Buchanani, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 565 (= *Faroa Buchanani*).—Afr. trop.
trimera, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 333.—Afr. trop.

PYCNOSTACHYS, Hook. (Labiat.).
Bussei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 131.—Afr. trop.
holophylla, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1000.—Afr. austr.
linifolia, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxx. 397.—Afr. trop.
purpurascens, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 998.—Afr. austr.
Schlechteri, *Briq. l. c.* 999.—Afr. austr.
uliginosa, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxx. 396.—Afr. trop.

PYCNOSTYLIS, Pierre (Menisp.).
loucoubensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 500 (= *Triclisia loucoubensis*).—Madag.

PYCNOTHYMUS, Small, Fl. S. E. U. S. 1042 (1903). *LABIATAE.*
rigidus, *Small, l. c.* (= *Satureia rigida*).—Am. bor.

PYCREUS, Beauv. (Cyper.).
chorisanthus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 526.—Afr. trop.
Delavayi, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 203.—China.
fernandezianus, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 5.—Chili.
grammicus, *C. B. Clarke, l. c.* 6.—Chili.
intermedius, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 290 (= *Cyperus intermedius*).—Afr. trop.
Lagunetto, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 6 (= *Cyperus Lagunetto*).—Chili; Reg. Argent.
melanostachyus, *C. B. Clarke, l. c.* 6.—Chili.
minimus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 302 (= *Cyperus minimus*).—Afr. trop.
nematodes, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 5.—Chili.
nyasensis, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 304.—Afr. trop.
tener, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 940.—Parag.
unioloides, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 49 (= *Cyperus unioloides*).—Japon.

PYGEUM, Gaertn. (Rosac.).
Henryi, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 493.—China.
platyphyllum, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 273.—N. Guin.

PYRENACANTHA, Wight (Olac.).
Menyharthii, *Schinz, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxviii. 427.—Afr. trop.

PYRETHRUM, Hall. (Compos.).
[CHRYSANTHEMUM, Tourn. I. K.]
Akinfiewi, *Alex. in Act. Hort. Tiflis*, vi. i. 58.—Reg. Caucas.
Debeauxianum, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 455.—Hispan.
Debeauxii, *Degen, Herv. & Reverch. in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xv. (1905) 99.—Eur.
egirdense, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 18.—As. Min.
Haussknechtii, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 19.—As. Min.
heterotomum, *Bornm. l. c.* 17.—As. Min.
leucopilodes, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 19 (= *Anthemis leucopilodes*).—As. Min.
pamiricum, *O. Fedtsch. Pl. Pamir*, 37.—As. cent.
pectinatum, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 16.—As. Min.

PYROLA, Linn. (Eric.).
Corbieri, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 254.—China.

PYRROCOMA, Hook. (Compos.).
[APLOPAPPUS, Cass. I. K.]
brachycephala, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 265.—Am. bor.
Hallii, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 299 (= *Aplopappus Hallii*).—Am. bor.
insecticruris, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 7 (= *Aplopappus insecticruris*).—Am. bor.
Kennedyi, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 265.—Am. bor.
lagopus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 130.—Am. bor.
lanceolata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 299 (= *Aplopappus lanceolatus*).—Am. bor.
tenuicaulis, *Howell, l. c.* (= *Aplopappus tenuicaulis*).—Am. bor.

PYRUS, Linn. (Rosac.).
acutiloba, Ilse, in Erfurt Jahrb. Akad. iv. (1866) 110 = rotundifolia.
bucharica, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 18.—Turkestan.
Doumeri, *Bois, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 113.—Anam.

PYRUS:—
Korshinskyi, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 17.—Turkestan.
Kurzii, *Watt ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 203.—Reg. Himal.
Niedzwetzkyana, *Hemsl. Bot. Mag.* t. 7975.—As. cent.
Scheideckeri, *Hort. ex Gartenfl.* 1904, 417, t. 1529.—Japon.

Q

QUALEA, Aubl. (Vochys.).
elegans, *Taub. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. nomen, 30.—Bras.
excelsa, *Glaz. l. c.* 31, nomen.—Bras.
minaensis, *Glaz. l. c.*, nomen.—Bras.
speciosa, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 425.—Bras.
Wittrockii, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* v. no. 6, (1905) 6.—Bras.

QUAMOCLIDION, Choisy (Nyctag.).
[MIRABILIS, Riv. I. K.]
laeve, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 687 (= *Oxybaphus laevis*).—Am. bor.

QUEKETTIA, Lindl. (Orchid.).
carinata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 199 (= *Capanemia carinata*).—Bras.
micromera, *Cogn. l. c.* 198 (= *Capanemia micromera*).—Bras.
Theresiae, *Cogn. l. c.* 200 (= *Capanemia Theresiae*).—Bras.

QUELCHIA, N. E. Br. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. vi. 41 (1901). COMPOSITAE.
conferta, *N. E. Br. l. c.*—Guiana.

QUELTIA, Salisb. (Amaryll.).
[NARCISSUS, Tourn. I. K.]
pallescens, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 36.—Gallia.
serotina, *Jord. l. c.*—Eur.

QUERCUS, Linn. (Cupulif.).
Alexanderi, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 336.—Am. bor.
Alvordiana, *Eastw. in Occas. Papers Calif. Acad. Sci.* ix. (1905) 48.—Calif.
ambigens, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 39.—Gallia.
aquifolia, *Trab. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 309.—Afr. bor.
austrina, *Small, Fl. S. E. U. S.* 353.—Am. bor.
Boyntoni, *Beadle, in Biltm. Bot. Stud.* i. 47.—Am. bor.
brachyloba, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 37.—Gallia.
Brayi, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 358.—Am. bor.
Carolinae, *Skan, ex Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 518.—China.
carpostachys, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 142.—Japon.
Cavaleriei, *Léveillé & Vaniot, l. c.*—China.
Eastwoodiae, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 210.—Am. bor.
ellipsoidea, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 38.—Gallia.
Gunnisonii, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 206.—Am. bor.
Havardi, *Rydb. l. c.* 213.—Am. bor.
Hondai, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 144.—Japon.
hybrida, *Small, Fl. S. E. U. S.* 350.—Am. bor.
Kernerii, *Simk. in Magyar Bot. Lap.* iii. 83.—Eur.
Laceyi, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 358.—Am. bor.
leptocarpa, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 38.—Gallia.
leptophylla, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 205.—Am. bor.
microcarya, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 357.—Am. bor.
microchlamys, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 38.—Gallia.
Mohriana, *Buckley, ex Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 219.—Am. bor.

QUERCUS:—
nitescens, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 207.—Am. bor.
novomexicana, *Rydb. l. c.* 208.—Am. bor.
obtusifolia, *Rydb. l. c.* 213.—Am. bor.
ovigera, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 37.—Gallia.
pauciloba, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 215.—Am. bor.
Pilgeriana, *Seemen, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 655.—Am. cent.
Pittieri, *Wesmael, ex Seemen, l. c.* 652.—Am. cent.
pumila, *Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest.* xiv. 172.—Am. bor.
pisiformis, *Small, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 357.—Am. bor.
rapurahuensis, *Pittier, ex Seemen, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 654.—Am. cent.
Rolfsii, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 422.—Am. bor.
Rydbergiana, *Cockerell, in Torreya*, iii. (1903) 7.—Am. bor.
Schneckii, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 333.—Am. bor.
subimbricaria, *Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest.* xiv. 172.—Am. bor.
submollis, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 202.—Am. bor.
subocculta, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 37.—Gallia.
succulenta, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 422.—Am. bor.
tomentella, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 37.—Gallia.
Tonduzii, *Seemen, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 656.—Am. cent.
truncatula, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 38.—Gallia.
utahensis, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 202.—Am. bor.
veneris, *Kerner, in Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. (1904) 191.—Cyprus.
Vreelandii, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 204.—Am. bor.
Wilcoxii, *Rydb. l. c.* 227.—Am. bor.

QUIINA, Aubl. (Guttif.).
decastyla, *Radlk. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 40, nomen.—Bras.
lucida, *Glaz. l. c.*, nomen.—Bras.

QUIRIVELIA, Poir. (Apocyn.).
[ICHNOCARPUS, R. Br. I. K.]
bantamensis, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 949 (= *Ichnocarpus bantamensis*).—Siam.

R

RADERMACHERA, Zoll. & Mor. (Bignon.).
[STEREOSPERMUM, Cham. I. K.]
Elmeri, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 48.—Ins. Philipp.
pentandra, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2728.—China.
sinica, *Hemsl. l. c., in indice* (= *Stereospermum sinicum*).—China.

RADICULA, Dill. (Crucif.).
[NASTURTIUM, Linn. I. K.]
alpina, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 114 (= *Roripa alpina*).—Am. bor.
calycina, *Greene, l. c.* 113 (= *Nasturtium calycinum*).—Am. bor.
Columbiae, *Greene, l. c.* 114 (= *Roripa Columbiae*).—Am. bor.
curvipes, *Greene, l. c.* 113 (= *Roripa curvipes*).—Am. bor.
curvisiliqua, *Greene, l. c.* (= *Sisymbrium curvisiliquum*).—Am. bor.
dictyota, *Greene, l. c.* (= *Nasturtium dictyotum*).—Am. bor.
limosa, *Greene, l. c.* (= *Nasturtium limosum*).—Am. bor.
lyrata, *Greene, l. c.* (= *Nasturtium lyratum*).—Am. bor.
multicaulis, *Greene, l. c.* (= *Roripa multicaulis*).—Am. bor.

RADICULA:—
Nuttallii, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 114 (= *Roripa Nuttallii*).—Am. bor.
obtusa, *Greene, l. c.* 113 (= *Nasturtium obtusum*).—Am. bor.
occidentalis, *Greene, l. c.* (= *Nasturtium occidentale*).—Am. bor.
officinalis, *Groves, in Bab. Man. Brit. Bot.* ed. IX. 26 (= *Nasturtium officinale*).—Reg. bor. temp.
pacifica, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 114 (= *Roripa pacifica*).—Am. bor.
polymorpha, *Greene, l. c.* 113 (= *Nasturtium polymorphum*).—Am. bor.
sessiliflora, *Greene, l. c.* (= *Nasturtium sessiliflorum*).—Am. bor.
sinuata, *Greene, l. c.* (= *Nasturtium sinuatum*).—Am. bor.
sphaerocarpa, *Greene, l. c.* (= *Nasturtium sphaerocarpum*).—Am. bor.
tenerrima, *Greene, l. c.* (= *Roripa tenerrima*).—Am. bor.
Walteri, *Greene, l. c.* 114 (= *Sisymbrium Walteri*).—Am. bor.

RAILLARDELLA, Benth. (Compos.).
scabrida, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 216.—Calif.

RAIMANNIA, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. (1905) 330. ONAGRACEAE.
Colimae, *Rose, l. c.*—Mexic.
confusa, *Rose, l. c.*—Mexic.
coronopifolia, *Rose, l. c.* (= *Oenothera coronopifolia*).—Am. bor.
Curtissii, *Rose, l. c.*—Am. bor.
Drummondii, *Rose, l. c.* 331 (= *Oenothera Drummondii*).—Am. bor.
grandis, *Rose, l. c.*—Am. bor.
heterophylla, *Rose, l. c.* (= *Oenothera heterophylla*).—Am. bor.
humifusa, *Rose, l. c.* (= *Oenothera humifusa*).—Am. bor.
laciniata, *Rose, l. c.* (= *Oenothera laciniata*).—Am. bor.
littoralis, *Rose, l. c.* (= *Oenothera littoralis*).—Mexic.
macrosceles, *Rose, l. c.* (= *Oenothera macrosceles*).—Am. bor.
rhombipetala, *Rose, l. c.* (= *Oenothera rhombipetala*).—Am. bor.

RAJANIA, Linn. (Dioscor.).
Sintenisii, *Uline, in Urb. Symb. Antill.* iii. 281.—Ind. occ.

RAMIREZELLA, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 44 (1903). LEGUMINOSAE.
glabrata, *Rose, l. c.* 45.—Mexic.
occidentalis, *Rose, l. c.*—Mexic.
pubescens, *Rose, l. c.*—Mexic.
strobilophora, *Rose, l. c.* 44 (= *Vigna strobilophora*).—Mexic.

RAMONA, Greene (Labiat.).
[AUDIBERTIA, Benth. I. K. S.]
pachystachya, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 4 (= *Audibertia pachystachya*).—Am. bor.
Vaseyi, *A. A. Heller, l. c.* 59 (= *Audibertia Vaseyi*).—Calif.

RAMONDIA, Rich. (Gesner.).
chloropoda, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 39.—Eur.
crenulata, *Jord. l. c.* 40.—Eur.
floribunda, *Jord. l. c.* 39.—Eur.
lobulosa, *Jord. l. c.*—Eur.

RANDIA, Houst. (Rubiac.).
armigera, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 332.—Malaya.
bellatula, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 342.—Afr. austr.
binata, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 205.—Penins. Mal.
brachythamnus, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 384.—Afr. trop.
Clarkei, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 213.—Penins. Mal.
congolana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 114.—Afr. trop.
Crosbyi, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 41.—Ins. Tonga.

RANDIA:—
Curtisii, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 208.—Penins. Mal.
curvata, *Valet. in Ic. Bogor.* t. 146 (= *Tocoyena scandens*).—Java.
Cuveliarana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 79.—Afr. trop.
eucodon, *K. Schum. in Bot. Tidsskr.* xxiv. 333.—Malaya.
exserta, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 343.—Afr. trop.
Forbesii, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 207.—Malaya.
hedrophylla, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 343.—Afr. trop.
Henryi, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxix. 581.—China.
impressinervis, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 206.—Malaya.
Kunstleri, *King & Gamble, l. c.* 216.—Malaya.
Lemairei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 155.—Afr. trop.
Lujae, *Wildem. in Compt. Rend. Acad. Sci. Par.* cxxxviii. 913; *Notices Pl. Utiles Congo*, 253.—Afr. trop.
oppositiflora, K. Schum. in Bot. Tidsskr. xxiv. 332 = densiflora.
penangiana, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 213.—Penins. Mal.
perakensis, *King & Gamble, l. c.* 210.—Penins. Mal.
purpureomaculata, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1901, 123.—Afr. trop.
sambesiaca, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 1015.—Afr. trop.
Scortechinii, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 210.—Malaya.
sphaerocoryne, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 344.—Afr. trop.

RANEVEA, L. H. Bailey, in Cycl. Am. Hortic. 1497 (1902). *PALMAE.*
Hildebrandtii, *L. H. Bailey, l. c.* (= *Ravenea Hildebrandtii*).—Ins. Comor.

RANUNCULUS, Linn. (Ranunc.).
alaiensis, *Ostenf. in Vidensk. Medd. Kjöbenh.* (1901) 1902, 309.—As. cent.
Alboffi, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 405.—Fuegia.
Allenii, *Robinson, in Rhodora*, vii. 220.—Am. bor.
amurensis, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxii. 294.—China.
australis, *Eastw. in Zoe*, v. 104 (1901).—Calif.
Blankinshipii, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 40.—Am. bor.
cardiopetalus, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 32.—Am. bor.
caricetorum, *Greene, Pittonia*, v. 194.—Am. bor.
Chaffanjonii, *P. Danguy, ex Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 322.—Turkestan.
dulcis, Bub. Fl. Pyren. iii. 384 = Sardous.
Durinei, *Brülle, ex Sart. in Ann. Sci. Nat.* Sér. IX. ii. 4.—Eur.
ficariifolia, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 289.—China.
Helleri, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 158.—Am. bor.
histipes, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 32.—Am. bor.
illinoensis, *Greene, Pittonia*, v. 195.—Am. bor.
intertextus, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 33.—Am. bor.
Kawakamii, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, 1904, 48.—Japon.
Komarowii, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 658.—As. cent.
kopetdaghensis, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 25.—Turkestan.
Labordei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 50.—China.
longilobus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 36.—Calif.
micropetalus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 158.—Am. bor.
multiformis, Bub. Fl. Pyren. iii. 394 = parnassifolius.
myssanus, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 506, sphalm. = nyssanus.
octopetalus, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 33.—Am. bor.
oligocarpus, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 206.—Patag.

RANUNCULUS:—
oreogenes, *Greene, Pl. Baker.* iii. 2.—Am. bor.
Phillipianus, *Wildem. Rés. Voy. Belgica, Bot.* 91.—Reg. Magell.
politus, *Greene, Pittonia*, v. 196.—Am. bor.
potamogetonoides, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 4.—Patag.
pseudo-caltha, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 285.—Reg. Argent.
pulsatillifolius, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 23.—Turkestan.
rapaceus, Bub. Fl. Pyren. iii. 386 = bulbosus.
Rigoi, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1903, 494.—Eur.
rudis, *Greene, in Ottawa Natural.* xvi. 33.—Am. bor.
Shaftoanus, *Finet & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 305 (= *Oxygraphis Shaftoana*).—Afghan.
Sodiroi, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* x. (1901) 209.—Am. trop.
stenolobus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 159.—Am. bor.
tauricus, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 248.—Orient.
tener, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 513.—Am. bor.
tenuipes, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 50.—Am. bor.
utahensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 158.—Am. bor.
verticillatus, *Eastw. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 144.—Am. bor.
Winkleri, Kom. Mater. Fl. Turkest. 59 = R. Komarowii.
Wolfianus, *Chenev. in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève*, ix. 121.—Helvet.
yukonensis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 169.—Am. bor.
Yvesii, *Burnat, in Rouy, Illustr. Fl. Eur.* t. 352.—Eur.

RAPANEA, Aubl. (Myrsin.).
[MYRSINE, Linn. I. K.]
achradifolia, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 354 (= *Myrsine achradifolia*).—Austral.
acrantha, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 433 (= *Myrsine acrantha*).—Jamaica.
acuminata, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 386.—Bras.
acutiloba, *Mez, l. c.* 390.—N. Granat.
affinis, *Mez, l. c.* 358 (= *Myrsine affinis*).—Java.
ambigua, *Mez, l. c.* 380.—Venez.
andina, *Mez, l. c.* 378.—Am. trop.
asymmetrica, *Mez, l. c.* 366.—Ins. Fiji.
avenis, *Mez, l. c.* 357 (= *Myrsine avenis*).—Java.
Balansae, *Mez, l. c.* 391.—Parag.
Benthamiana, *Mez, l. c.* 365.—Austral.
Boivinii, *Mez, l. c.* 376 (= *Myrsine Boivinii*).—Afr. austr.
borneensis, *Mez, l. c.* 359 (= *Myrsine borneensis*).—Borneo.
buxifolia, *Mez, l. c.* 362 (= *Myrsine buxifolia*).—China.
campanulata, *Mez, l. c.* 356 (= *Myrsine campanulata*).—Austral.
capitellata, *Mez, l. c.* (= *Myrsine capitellata*).—Ind. or.
ceylanica, *Mez, l. c.* 359.—Zeylan.
Cheesemannii, *Mez, l. c.* 371 (= *Myrsine Cheesemannii*).—N. Zel.
citrifolia, *Mez, l. c.* 368.—N. Caled.
cochinchinensis, *Mez, l. c.* 364 (= *Myrsine cochinchinensis*).—Cochinch.
collina, *Mez, l. c.* 372 (= *Myrsine collina*).—Ins. Tahiti.
comorensis, *Mez, l. c.* 375.—Ins. Comor.
cordata, *Mez, l. c.* 367 (= *Myrsine cordata*).—Malaya.
coriacea, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 428 (= *Samara coriacea*).—Ind. occ.
Courboniana, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 395.—Urug.
crassifolia, *Mez, l. c.* 365 (= *Myrsine crassifolia*).—Ins. Norfolk.
daphnites, *Mez, l. c.* 390 (= *Myrsine daphnites*).—Bras.
daphnoides, *Mez, l. c.* 357.—Ind. or.
dasyphylla, *Mez, l. c.* 363 (= *Myrsine dasyphylla*).—Borneo.
densiflora, *Mez, l. c.* 365 (= *Myrsine densiflora*).—N. Guin.
depauperata, *Mez, l. c.* 387.—Bras.
dependens, *Mez, l. c.* 377 (= *Myrsine dependens*).—Am. trop.

RAPANEA:—
diminuta, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 366.—N. Caled.
emarginella, *Mez, l. c.* 388 (= *Myrsine emarginella*).—Bras.
erythroxyloides, *Mez, l. c.* 375 (= *Myrsine erythroxyloides*).—Madag.
exigua, *Mez, l. c.* 364.—Zeylan.
Faberi, *Mez, l. c.* 358.—China.
falcata, *Mez, l. c.* 373 (= *Myrsine falcata*).—Ins. Tahiti.
ferruginea, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 429 (= *Caballeria ferruginea*).—Am. trop.
Forbesii, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 362.—Sumatra.
Gardneriana, *Mez, l. c.* 384 (= *Myrsine Gardneriana*).—Bras.
Gilliana, *Mez, l. c.* 376 (= *Myrsine Gilliana*).—Afr. austr.
glaucorubens, *Mez, l. c.* 394.—Bras.
Glazioviana, *Mez, l. c.* 378 (= *Myrsine Glazioviana*).—Bras.
glomeriflora, *Mez, l. c.* 394 (= *Myrsine glomeriflora*).—Bras.
Griffithiana, *Mez, l. c.* 360.—Ind. or.
Hasseltii, *Mez, l. c.* 362 (= *Myrsine Hasseltii*).—Java.
Howittiana, *Mez, l. c.* 354 (= *Myrsine Howittiana*).—Austral.
intermedia, *Mez, l. c.* 388.—Bras.
involucrata, *Mez, l. c.* 370.—N. Guin.
Jelskii, *Mez, l. c.* 379.—Am. trop.
Juergensenii, *Mez, l. c.* 388.—Mexic.
kermadecensis, *Mez, l. c.* 371 (= *Myrsine kermadecensis*).—N. Zel.
Korthalsii, *Mez, l. c.* 363 (= *Myrsine Korthalsii*).—Sumatra.
laetevirens, *Mez, l. c.* 395.—Am. austr.
lanceolata, *Mez, l. c.* 368 (= *Myrsine lanceolata*).—N. Caled.
lancifolia, *Mez, l. c.* 387 (= *Myrsine lancifolia*).—Bras.
latifolia, *Mez, l. c.* (= *Myrsine latifolia*).—Peruv.
Lecardii, *Mez, l. c.* 369.—N. Caled.
Lechleri, *Mez, l. c.* 380.—Peruv.
leucantha, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 345.—N. Guin.
leuconeura, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 389 (= *Myrsine leuconeura*).—Bras.
lifuensis, *Mez, l. c.* 368.—N. Caled.
lineata, *Mez, l. c.* 385.—Bras.
Loefgrenii, *Mez, l. c.* 382.—Bras.
longifolia, *Mez, l. c.* 373 (= *Myrsine longifolia*).—Ins. Tahiti.
Lorentziana, *Mez, l. c.* 394.—Bras.
lucida, *Mez, l. c.* 361 (= *Myrsine lucida*).—Ind. or.
macrophylla, *Mez, l. c.* 369 (= *Myrsine macrophylla*).—N. Caled.
Mandonii, *Mez, l. c.* 378.—Boliv.
Manglillo, *Mez, l. c.* 393 (= *Sideroxylon Manglillo*).—Peruv.
matensis, *Mez, l. c.* 391.—Am. trop.
megapotamica, *Mez, l. c.*—Bras.
melanophloeos, *Mez, l. c.* 375 (= *Myrsine melanophloeos*).—Afr. austr.
modesta, *Mez, l. c.* 367.—N. Caled.
myricifolia, *Mez, l. c.* 366 (= *Myrsine myricifolia*).—Ins. Fiji.
myrtillina, *Mez, l. c.* 370.—Austral.
myrtoidea, *Mez, l. c.* 377 (= *Myrsine myrtoides*).—N. Granat.
Nadeaudii, *Mez, l. c.* 372 (= *Myrsine coriacea*).—Ins. Tahiti.
neriifolia, *Mez, l. c.* (= *Myrsine neriifolia*).—As. or.
neurophylla, *Mez, l. c.* 374 (= *Myrsine neurophylla*).—Afr. trop.
novo-caledonica, *Mez, l. c.* 368.—N. Caled.
oligophylla, *Mez, l. c.* 392.—Peruv.
ovalifolia, *Mez, l. c.* 391.—Bras.
ovalis, *Mez, l. c.* 373 (= *Myrsine ovalis*).—Ins. Tahiti.
papuana, *Mez, l. c.* 365 (= *Myrsine papuana*).—N. Guin.
parvifolia, *Mez, l. c.* 389 (= *Myrsine parvifolia*).—Bras.
parvula, *Mez, l. c.* 384.—Bras.
paulensis, *Mez, l. c.* 382 (= *Myrsine paulensis*).—Bras.
Pearcei, *Mez, l. c.* 386.—Peruv.
pellucida, *Mez, l. c.* 394 (= *Myrsine pellucida*).—Peruv.
perforata, *Mez, l. c.* 395.—Parag.

RAPANEA:—
philippinensis, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 364 (= *Myrsine philippinensis*).—Ins. Philipp.
Pittieri, *Mez, l. c.* 378.—Am. cent.
platystigma, *Mez, l. c.* 370 (= *Myrsine platystigma*).—Austral.
Playfairii, *Mez, l. c.* (= *Myrsine Playfairii*).—China.
porosa, *Mez, l. c.* 355 (= *Myrsine porosa*).—Austral.
Porteriana, *Mez, l. c.* 358 (= *Myrsine Porteriana*).—Penins. Mal.
pseudocrenata, *Mez, l. c.* 393.—Boliv.
rawacensis, *Mez, l. c.* 363 (= *Myrsine rawacensis*).—Ins. Rawak.
rhododendroides, *Mez, l. c.* 374 (= *Myrsine rhododendroides*).—Afr. trop.
rivularis, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 536.—Peruv.
robusta, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 302.—Zeylan.
rotundifolia, *Mez, l. c.* 382.—Ind. occ.
rubens, *Mez, l. c.* 364.—Zeylan.
russorica, *Mez, l. c.* 373 (= *Myrsine russorica*).—Afr. trop.
salicina, *Mez, l. c.* 370 (= *Myrsine salicina*).—N. Zel.
Schwackeana, *Mez, l. c.* 379.—Bras.
Seychellarum, *Mez, l. c.* 376 (= *Myrsine Seychellarum*).—Ins. Seychell.
simensis, *Mez, l. c.* 373 (= *Myrsine simensis*).—Afr. trop.
Sodiroana, *Mez, l. c.* 385.—Ecuador.
Sprucei, *Mez, l. c.* 358 (= *Myrsine Sprucei*).—Am. trop.
squarrosa, *Mez, l. c.* 390.—Bras.
stenophylla, *Mez, l. c.* 370.—N. Caled.
striata, *Mez, l. c.* 357.—Ind. or.
subsessilis, *Mez, l. c.* 354 (= *Myrsine subsessilis*).—Austral.
sumatrana, *Mez, l. c.* 364 (= *Myrsine sumatrana*).—Sumatra.
tahitensis, *Mez, l. c.* 373 (= *Myrsine tahitensis*).—Ins. Tahiti.
Thwaitesii, *Mez, l. c.* 357.—Ind. or.
torricellensis, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 346.—N. Guin.
Trinitatis, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 432 (= *Myrsine Trinitatis*).—Ind. occ.
uluguruensis, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 374 (= *Myrsine uluguruensis*).—Afr. trop.
umbellata, *Mez, l. c.* 384 (= *Myrsine umbellata*).—Bras.
umbellulata, *Mez, l. c.* 362 (= *Myrsine umbellulata*).—Malaya.
umbrosa, *Mez, l. c.* 386 (= *Myrsine umbrosa*).—Bras.
urceolata, *Mez, l. c.* 356 (= *Myrsine urceolata*).—Austral.
Urvillei, *Mez, l. c.* 371 (= *Myrsine Urvillei*).—N. Zel.
variabilis, *Mez, l. c.* 355 (= *Myrsine variabilis*).—Austral.
venosa, *Mez, l. c.* 386 (= *Myrsine venosa*).—Bras.
Vescoi, *Mez, l. c.* 372 (= *Myrsine Vescoi*).—Ins. Tahiti.
Vieillardii, *Mez, l. c.* 369 (= *Myrsine Vieillardii*).—N. Caled.
villicaulis, *Mez, l. c.* 379.—Bras.
Wettsteinii, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 537.—Bras.
Wightiana, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 360 (= *Myrsine Wightiana*).—Ind. or.
yunnanensis, *Mez, l. c.* 359.—China.

RAPATEA, Aubl. (Rapat.).
spectabilis, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 101.—Peruv.

RAPHANISTRUM, Tourn. = **Raphanus**, Tourn. (Crucif.).
Landra, Bub. Fl. Pyren. iii. 249 = Raphanus Landra.
innocuum, Bub. l. c. = Raphanus Raphanistrum.

RAPHIA, Beauv. (Palm.).
Gentiliana, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 29.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. l. c.* 26.—Afr. trop.
Sese, *Wildem. l. c.* 28.—Afr. trop.

RAPHIOLEPIS, Lindl. (Rosac.).
umbellata, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 13 = japonica.

RAPHIONACME, Harv. (Asclep.).
denticulata, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 275.—Afr. trop.

RAPHIONACME:—
globosa, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 271 (= *Rhaphiacme globosa*).—Afr. trop.
jurensis, *N. E. Br. l. c.* 272.—Afr. trop.
linearis, *N. E. Br. l. c.* 270 (= *Rhaphiacme linearis*).—Afr. trop.
Michelii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 181.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. l. c.* 182.—Afr. trop.

RAPINIA, Montr. (Verben.).
triphylla, *Montrouz. ex Beauvis. Gen. Montrouz.* 67 (= *Vitex Rapini*).—N. Caled.

RATIBIDA, Rafin. (Compos.).
[LEPACHYS, Rafin. I. K.]
picta, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1260.—Am. bor.

RAUWOLFIA, Plum. (Apocyn.).
Cumminsii, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 114.—Afr. trop.
Goetzei, *Stapf, l. c.* 113.—Afr. trop.
gonioclada, K. Schum. ex Stapf, l. c. 110 = macrophylla.
leucopoda, K. Schum. ex Stapf, l. c. = macrophylla.
liberiensis, *Stapf, l. c.* 601.—Afr. trop.
obliquinervis, *Stapf, l. c.* 112.—Afr. trop.
sambesiaca, *Schinz, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxviii. 434.—Afr. trop.
sessilifolia, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 103.—Bras.
Volkensii, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 116 (= *Tabernaemontana Volkensii*).—Afr. trop.
Welwitschii, *Stapf, l. c.* 110.—Afr. trop.

RAWSONIA, Harv. & Sond. (Bixac.).
reticulata, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 357.—Afr. trop.

RAYNAUDETIA, Bub. Fl. Pyren. iii. 17 = **Telephium**, Tourn. (Ficoid.).
mediterranea, Bub. l. c. 18 = T. Imperati.

RAZOUMOWSKYA, Hoffm. (Loranth.).
[ARCEUTHOBIUM, Bieb. I. K.]
tsugensis, *Rosend. in Minnes. Bot. Stud.* iii. 272.—Am. bor.

REBSAMENIA, Conzatti, Gén. Veget. Mexic. 117 (1903). *MALVACEAE.*
arborea, *Conzatti, l. c.* 118.—Mexic.

REICHARDIA, Roth (Compos.).
[PICRIDIUM, Desf. I. K.]
orientalis, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 238 (= *Scorzonera orientalis*).—Alger.

REINWARDTIODENDRON, Koord. (Meliac.).
Merrillii, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 74.—Ins. Philipp.

RELBUNIUM, Benth. & Hook. f. (Rubiac.).
alpicola, *K. Schum. & R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 101.—Reg. Argent.
mazocarpum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 250—Mexic.

RENANTHERA, Lour. (Orchid.).
moschifera, *Knuth, Handb. Blütenb.* iii. 214 (= *Arachnanthe moschifera*).—Malaya.

RENEALMIA, Linn. f. (Scitam.).
albo-rosea, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 293.—Afr. trop.
angustifolia, *K. Schum. l. c.* 304.—Bras.
antillarum, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 202 (= *Alpinia antillarum*).—Ind. occ.
batangana, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 295.—Afr. trop.
brasiliensis, *K. Schum. l. c.* 305.—Bras.
chalcochlora, *K. Schum. l. c.* 297.—N. Granat.
coelobractea, *K. Schum. l. c.* 307.—Bras.
congoensis, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 30.—Afr. trop.
dermatopetala, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 304.—Boliv.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. ex Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 543, descr. ampl.—Afr. trop.
Engleri, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 293.—Afr. trop.
erythroneura, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 31.—Afr. trop.

RENEALMIA:—
Fischeri, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 294.—Afr. trop.
floribunda, *K. Schum. l. c.* 300.—Bras.
geostachys, *K. Schum. l. c.* 303.—Peruv.
goyazensis, *K. Schum. & Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 23.—Bras.
hygrophila, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 284.—N. Granat.
jalapensis, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 29.—Mexic.
laxa, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 292.—Afr. trop.
Lehmannii, *K. Schum. l. c.* 298.—N. Granat.
longifolia, *K. Schum. l. c.* 289.—Afr. trop.
longipes, *K. Schum. l. c.* 305.—Bras.
lutea, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 683.—Venez.
macrocolea, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 294.—Afr. trop.
micrantha, *K. Schum. l. c.* 298.—Boliv.
oligosperma, *K. Schum. l. c.* 300.—Ecuador.
Petasites, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 26.—Bras.
platycolea, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 305.—Venez.
polyantha, *K. Schum. l. c.* 295.—Afr. trop.
porphyrobractea, *K. Schum. l. c.* 287.—Ecuador.
pycnostachys, *K. Schum. l. c.* 302.—Bras.
reticulata, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 25.—Bras.
rubro-flava, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 297.—Ecuador.
sessilifolia, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 33.—Am. trop.
spicata, *Gagnep. l. c.* 27.—Peruv.
stenostachys, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 306.—Afr. trop.

RENNELLIA, Korth. (Rubiac.).
paniculata, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 89.—Penins. Mal.

RESEDA, Tourn. (Resed.).
bucharica, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 15.—Turkestan.
gracilis, Bub. Fl. Pyren. iii. 254 = Gayana.
Plinii, Bub. l. c. 253 = suffruticulosa.
sudanica, *A. Chevalier, in Act. Congo, Bot.* 1900 (1901) 273.—Afr. trop.

RESTIO, Linn. (Restiac.).
Dielsii, *Gilg, ex Diels & Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 88.—Austral.
leucoblephara, *Gilg, ex Diels & Pritz. l. c.*—Austral.
praefixus, *Mast. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 778.—Afr. austr.
stenostachyus, *Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxviii. 108.—Austral.

RESTREPIA, H. B. & K. (Orchid.).
crassifolia, *Edwall, in Revista Centr. Sci. Campinas*, ii. 193.—Bras.

RETINIPHYLLUM, Humb. & Bonpl. (Rubiac.).
laxiflorum, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 36.—Guiana.

RETINOSPORA, Sieb. & Zucc. (Conif.).
[THUYA, Linn. I. K.]
Sanderi, *Hort. in Gard. Chron.* 1903, i. 266, *et Suppl.* April 25, t. 107.—Hab. ?

REYNOSIA, Griseb. (Rhamnac.).
Northropiana, *Urb. Symb. Antill.* iii. 315.—Ind. occ.

RHABDADENIA, Muell. Arg. (Apocyn.).
corallicola, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 434.—Am. bor.
macrantha, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 7.—Am. cent.

RHABDODENDRON, Gilg & Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 152. *RUTACEAE.*
columnare, *Gilg & Pilg. l. c.*—Reg. Amaz.

RHABDOPHYLLUM, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 201 (1902); et in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1903) 216. *OCHNACEAE.*
acutissimum, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xviii. 34.—Afr. trop.

RHABDOPHYLLUM:—
affine, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* xvi. 201 (1902) (= *Gomphia affinis*).—Afr. trop.
angustum, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 324.—Afr. trop.
Arnoldianum, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* xvi. 202 (1902) (= *Ouratea Arnoldiana*).—Afr. trop.
Barteri, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 322.—Afr. trop.
Buchholzii, *Van Tiegh. l. c.* xviii. 34.—Afr. trop.
calophyllum, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* xvi. 201 (1902) (= *Gomphia calophylla*).—Afr. trop.
densum, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 322.—Afr. trop.
discolor, *Van Tiegh. l. c.* 321 (= *Gomphia discolor*).—Afr. trop.
leptoneurum, *Van Tiegh. l. c.* xviii. 34.—Afr. trop.
longipes, *Van Tiegh. l. c.* xvi. 323.—Afr. trop.
myrioneurum, *Van Tiegh. l. c.* xviii. 34.—Afr. trop.
nutans, *Van Tiegh. l. c.* xvi. 322.—Afr. trop.
paniculatum, *Van Tiegh. l. c.* 321.—Afr. trop.
pauciflorum, *Van Tiegh. l. c.* 324.—Afr. trop.
penicillatum, *Van Tiegh. l. c.* 323.—Afr. trop.
Preussi, *Van Tiegh. l. c.* 322.—Afr. trop.
Quintasii, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.
refractum, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* xvi. 201 (1902) (= *Ouratea refracta*).—Afr. trop.
rubrum, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 323.—Afr. trop.
Staudti, *Van Tiegh. l. c.* 322.—Afr. trop.
stenorachis, *Van Tiegh. l. c.* xviii. 34.—Afr. trop.
Thollonii, *Van Tiegh. l. c.* xvi. 323.—Afr. trop.
umbellatum, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.
Viancini, *Van Tiegh. l. c.* 324.—Afr. trop.
Welwitschi, *Van Tiegh. l. c.* 322.—Afr. trop.

RHABDOTHAMNOPSIS, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxxv. (1903) 517. *CYRTANDRACEAE.*
sinensis, *Hemsl. l. c.*—China.

RHACOMA, Linn. (Celastr.).
[MYGINDA, Linn. I. K.]
aquifolia, *Urb. Symb. Antill.* v. 77 (= *Myginda aquifolia*).—Ind. occ.
coriacea, *Urb. l. c.* 71 (= *Crossopetalum coriaceum*).—Ind. occ.
gonoclada, *Urb. l. c.* 75.—Ind. occ.
rostrata, *Urb. l. c.* 78.—Ind. occ.
spathulifolia, *Urb. l. c.* 70.—Ind. occ.
Urbaniana, *Loes. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 162.—Peruv.

RHAMNIDIUM, Reiss. (Rhamnac.).
Hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 541.—Parag.
Moreireanum, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 110, nomen.—Bras.

RHAMNUS, Tourn. (Rhamnac.).
castorea, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 64.—Am. bor.
cuspidata, *Greene, l. c.*—Calif.
discolor, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 51.—Am. cent.
fasciculata, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 63.—Am. bor.
hispanorum, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 440.—Hispan.
Nelsoni, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 50.—Mexic.
nevadensis, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington,* xviii. 174.—Am. bor.
nipponica, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 98 = dahurica.
obliqua, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 51.—Mexic.
obtusissima, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 64.—Calif.
Pringlei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 51.—Mexic.
revoluta, *Rose, l. c.*—Mexic.
ursina, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 63.—Am. bor.
Yoshinoi, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* xviii. 97.—Japon.

RHAMPHICARPA, Benth. (Scrophul.).
montana, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 129.—Afr. trop. & austr.

RHAMPHIDIA, Lindl. (Orchid.).
[HETAERIA, Blume. I. K.]
japonica, Reichb. f. in Bot. Zeit. xxvi. (1878) 39 = Myrmechis japonica.

RHAPHIDOPHORA, Hassk. (Arac.).
Copelandii, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 115.—Ins. Philipp.
gratissima, *Becc. Nelle Foreste di Borneo,* 604.—Borneo.
laetevirens, *Ridley, in Journ. Bot.* 1902, 37.—Penins. Mal.
Merrillii, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 115.—Ins. Philipp.
Perkinsiae, *Engl. l. c.*—Ins. Philipp.
Sarasinorum, *Engl. l. c.* 114.—Celebes.
Warburgii, *Engl. l. c.* 116.—Ins. Philipp.

RHAPHIDOSPORA, Nees (Acanth.).
[JUSTICIA, Houst. I. K.]
oblongifolia, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 71.—Afr. trop.

RHAPHIS, Lour. (Gramin.).
[CHRYSOPOGON, Trin. I. K.]
pauciflorus, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 67 (= *Sorghum pauciflorum*).—Am. bor.

RHAPTOPETALUM, Oliv. (Olac.).
brachyantherum, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. IX. i. 373.—Afr. trop.
sessilifolium, *Engl. Jahrb.* xxxii. 101.—Afr. trop.
Thollonii, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. IX. i. 372 (= *Brazzeia Thollonii*).—Afr. trop.

RHEKTOPHYLLUM, N. E. Br. (Arac.).
congense, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 844.—Afr. trop.

RHEXIA, Linn. (Melast.).
delicatula, *Small, Fl. S. E. U. S.* 824.—Am. bor.
Nashii, *Small, l. c.*—Am. bor.

RHIGOZUM, Burch. (Bignon.).
madagascariense, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 98.—Madag.
somalense, *Hallier f. in Engl. Jahrb.* xxxii. 127.—Afr. trop.
spinosum, *Burch. ex Sprague, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 451.—Afr. austr.

RHINANTHUS, Linn. (Scrophul.).
Pampaninii, *Chab. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. xii. 199.—Ital.

RHIPSALIS, Gaertn. (Cactac.).
angustissima, *A. Weber, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1902, 465.—Ind. occ.
Biolleyi, *A. Weber, l. c.* 467.—Ind. occ.
gracilis, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1903, i. 18.—Bras.
Novaesii, *Loefgr. in Revista Centr. Sci. Campinas,* iii. 60, nomen.—Bras.
pilocarpa, *Loefgr. l. c.* ii. 188; *et in Monatsschr. Kakt.* xiii. 52.—Bras.

RHIZANTHEMUM, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xv. 364 (1901). *LORANTHACEAE.*
celebicum, *Van Tiegh. l. c.*—Arch. Mal.
Forsteni, *Van Tiegh. l. c.*—Arch. Mal.

RHODIOLA, Linn. (Crassul.).
[SEDUM, Tourn. I. K.]
alaskana, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 39.—Am. bor.
neomexicana, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 38.—Am. bor.
polygama, *Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 39 (= *Sedum polygamum*).—Am. bor.
roanensis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 39 (= *Sedum roanense*).—Am. bor.

RHODOCISTUS, Spach = **Cistus**, Tourn. (Cistac.).
osbeckiaefolius, Webb, ex Gross. in Engl. Pflanzenreich, Cistac. 12 = C. ochreatus.

RHODODENDRON, Linn. (Ericac.).
Baenitzianum, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 337.—N. Guin.
Cavaleriei, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1903, 48.—China.
Copelandi, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 42.—Ins. Philipp.
Cuthbertii, *Small, in Torreya,* ii. 9.—Am. bor.
Duclouxii, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1903, 49.—China.
Franchetianum, *Léveillé, l. c.* 46.—China.
Giulianettii, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 335.—N. Guin.

RHODODENDRON:—
Hymenanthes, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 33 = Metternichii.
Maximowiczianum, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1903, 47.—China.
mindanaense, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 41.—Ins. Philipp.
salicifolium, *Becc. Nelle Foreste di Borneo,* 147.—Borneo.
Schadenbergii, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 172.—Ins. Philipp.
Schlechteri, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 338.—N. Guin.
spectabile, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 42.—Ins. Philipp.
xanthopetalum, *Merrill, l. c.* 41.—Ins. Philipp.

RHODOSPATHA, Poepp. (Arac.).
longipes, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 114.—N. Granat.

RHODOTYPOS, Sieb. & Zucc. (Rosac.).
tetrapetala, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 13 = R. Kerrioides.

RHOEIDIUM, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1905) 143. *ANACARDIACEAE.*
cinereum, *Greene, l. c.* 144.—Mexic.
glabellum, *Greene, l. c.* 143.—Am. bor.
microphyllum, *Greene, l. c.* (= *Rhus microphylla*).—Am. bor.
potosinum, *Greene, l. c.* 144.—Mexic.
retusum, *Greene, l. c.*—Mexic.
rugulosum, *Greene, l. c.* 143.—Am. bor.
vestitum, *Greene, l. c.*—Am. bor.

RHOICISSUS, Planch. (Ampelid.).
[VITIS, Linn. I. K.]
edulis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 86.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. l. c.* 85.—Afr. trop.

RHOMBOLYTRUM, Link (Gramin.).
[TRIODIA, R. Br. I. K.]
albescens, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 129 (= *Sieglingia albescens*).—Am. bor.

RHOPALANDRIA, Stapf (Menisperm.).
lobata, *C. H. Wright, in Kew Bull.* 1901, 119.—Afr. trop.

RHOPALOCARPUS, Bojer, in Trav. Soc. Hist. Nat. Ile Maurice, 1846, 149. *RHOPALOCARPACEAE.*
[ROPALOCARPUS, Boj. I. K.]
longipetiolatus, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2774.—Madag.
similis, *Hemsl. l. c.*—Madag.

RHUS, Linn. (Anacard.).
arenaria, *Engl. Jahrb.* xxxii. 132.—Afr. trop.
commiphoroides, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 289.—Afr. trop.
floridana, *Mearns, in Proc. Biol. Soc. Wash.* xv. 149.—Am. bor.
littoralis, *Mearns, l. c.* 148.—Am. bor.
macrothyrsa, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 56.—Am. bor.
occidentalis, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 86.—Am. bor.
Pentheri, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien,* xv. 52.—Afr. austr.
polyneura, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 288.—Afr. trop.
rhomboidea, *Small, Fl. S. E. U. S.* 727.—Am. bor.
Rydbergii, *Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 601.—Am. bor.
utahensis, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 57.—Am. bor.

RHYNCHANTHERA, DC. (Melast.).
glabrescens, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 180.—Bras.
ortinocensis, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 431.—Venez.

RHYNCHODIA, Benth. (Apocyn.).
Pierrei, *Spire, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 556.—Cochinch.

RHYNCHOPYLE, Engl. (Arac.).
Havilandii, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 125.—Borneo.

RHYNCHOSIA, Lour. (Legum.).
affinis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 152.—Afr. trop.
ambacensis, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Dolicholus ambacensis*).—Afr. trop.
australis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 48.—Mexic.
Baumii, *Harms, in Warb. Kunene-Samberi Exped.* 263.—Afr. trop.
bicolor, *Micheli, in Mem. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, xxxiv. 264.—Mexic.
Buettneri, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 90.—Afr. trop.
chrysantha, *Schlechter, ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 27.—Afr. austr.
cuernavacana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 313.—Mexic.
Dekindtii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 90.—Afr. trop.
Drummondii, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Dolicholus Drummondii*).—Am. bor.
elachistantha, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. (1908) 100.—Afr. or. trop.
Grevei, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 121.—Madag.
Hagenbeckii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. *Beibl.* lxxii. 29.—Bras.
Harmsiana, *Schlechter, ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 26.—Afr. austr.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 904.—Parag.
huillensis, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Dolicholus huillensis*).—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 153.—Afr. trop.
Lewtonii, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Dolicholus Lewtonii*).—Am. bor.
lutea, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 491.—China.
luteola, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Dolicholus luteolus*).—Afr. trop.
moninensis, *Harms, in Warb. Kunene-Samberi Exped.* 264.—Afr. trop.
Pentheri, *Schlechter, ex A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xx. (1905) 26.—Afr. austr.
procurrens, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Dolicholus procurrens*).—Afr. trop.
pycnantha, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 332.—Afr. trop.
rupicola, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 202 (1905).—Mexic.
sericosemium, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 91.—Afr. trop.
uruguaya, *Arech. in Anal. Mus. Montevid.* iii. 395.—Urug.
venulosa, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Dolicholus venulosus*).—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 199.—Afr. trop.
violacea, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxvii. i. 496 (= *Dolicholus violaceus*).—Afr. trop.

RHYNCHOSPORA, Vahl (Cyperac.).
pluricarpa, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 148.—Bras.
solitaria, *Harper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 468.—Am. bor.

RHYNCHOTROPIS, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. 86 (1901). *LEGUMINOSAE.*
Dekindtii, *Harms, l. c.* 87.—Afr. trop.
Poggei, *Harms, l. c.* 86 (= *Indigofera Poggei*).—Afr. trop.

RHYTACHNE, Desv. (Gramin.).
gracilis, *Stapf, in Journ. de Bot.* 1905, 98.—Afr. trop.

RHYTIDANTHERA, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xix. (1904) 44. *OCHNACEAE.*
fragrans, *Van Tiegh. l. c.*—N. Granat.
splendida, *Van Tiegh. l. c.*—N. Granat.
sulcata, *Van Tiegh. l. c.*—N. Granat.

RHYTIDOPHYLLUM, Mart. (Gesner.).
caribaeum, *Urb. Symb. Antill.* ii. 386.—Ind. occ.
coccineum, *Urb. l. c.* 385.—Ind. occ.

RIBES, Linn. (Saxifr.).
arcuatum, *Jancz. ex Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 135.—Hybr.!
ascendens, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 244.—Am. bor.
Brandegei, *Eastw. l. c.* 242.—Am. bor.

RIBES:—
camporum, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 63.—Am. bor.
Carrierei, *Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. (1904) 418.—Hybr.
ceriferum, *Coville & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 298.—Mexic.
coloradense, *Coville, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiv. 3.—Am. bor.
Congdoni, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 101.—Calif.
distans, Jancz. ex Vilm. & Bois. Frut. Vilm. Cat. i. 136 = mandshuricum.
dubium, *Jancz. ex Vilm. & Bois, l. c.* 137.—Hybr.
Dugesii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 78.—Mexic.
futurum, *Jancz. ex Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 131.—Hybr.
Gayanum, Reiche, Fl. Chile, iii. 39 = villosum.
glanduliferum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 66.—Calif.
glaucescens, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 245.—Am. bor.
grande, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 339.—Mexic.
Greeneianum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 111.—Calif.
Hittellianum, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 245.—Am. bor.
huronense, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 467.—Am. bor.
Hystrix, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 248.—Am. bor.
indecorum, *Eastw. l. c.* 243.—Am. bor.
latifolium, *Jancz. ex Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 132, nomen.—China, Japon.
lentum, *Coville & Rose, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xv. 28.—Am. bor.
manshuricum, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxii. 437.—China.
Maximoviczii, *Kom. l. c.* 443.—China.
melanocarpum, *Jancz. ex Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 136, nomen.—Tibet.
neglectum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 298.—Mexic.
Nelsoni, *Coville & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 297.—Mexic.
oligacanthum, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 246.—Am. bor.
Orizabae, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 339.—Mexic.
paradoxum, *Jancz. ex Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 138, nomen.—Reg. Argent.
Pringlei, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 298.—Mexic.
Purpusi, *Koehne, ex Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 64.—Am. bor.
rugosum, *Coville & Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 300.—Mexic.
Scuphami, *Eastw. in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 242.—Am. bor.
sericeum, *Eastw. l. c.* 246.—Am. bor.
sutchuenense, *Jancz. ex Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 133, nomen.—China.
ussuriense, *Jancz. ex Vilm. & Bois, l. c.* 138, nomen.—China.
vagum, *Jancz. ex Vilm. & Bois, l. c.* 135.—Hybr.
variegatum, *A. Nelson, Analyt. Key Fl. Pl. Rocky Mts.* 34.—Am. bor.
veganum, *Auct. in Proc. Biol. Soc. Washington*, xv. 255.—Am. bor.
Vilmorini, *Jancz. ex Vilm. & Bois. Frut. Vilm. Cat.* i. 136, nomen.—Tibet.
viridifolium, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 77.—Calif.
Warszewiczii, *Jancz. ex Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 133.—Sibir.

RICHARDIA, Kunth (Arac.).
cantabrigiensis, *Lynch, in Gard. Chron.* 1904, i. 226.—Hybr.
Rossii, *Chalwin, in Gard. Chron.* 1897, i. 259 (descr. 58).—Afr. austr.
Sprengeri, *Comes, in Atti Ist. Incoragg. Napoli*, Ser. V. iii. no. 7; *fide Terracc. in Bot. Centralbl.* lxxxix. 660.—Afr. austr.
Strhmannii, Sprenger, in Wien, Ill. Gart. Zeit. 1901, 415, sphalm. = Rehmannii.

RICINOCARPOS, Desf. (Euphorb.).
stylosus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 335.—Austral.

RIEDELIA, Oliv. (Scitamin.).
affinis, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 373 (= *Alpinia affinis*).—N. Guin.
Albertisii, *K. Schum. l. c.* (= *Alpinia Albertisii*).—N. Guin.
Bismarckii-montium, *K. Schum. l. c.* 440.—N. Guin.
macrantha, *K. Schum. l. c.* 373 (= *Alpinia macrantha*).—N. Guin.
monophylla, *K. Schum. l. c.* 439.—N. Guin.
Nymanii, *K. Schum. l. c.* 374.—N. Guin.
stricta, *K. Schum. l. c.* 439.—N. Guin.

RIEDELIELLA, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. Beibl. lxxii. (1903) 25. *LEGUMINOSAE.*
graciliflora, *Harms, l. c.*—Bras.

RIEDLEA, Vent. (Stercul.).
[MELOCHIA, Dill. I. K.]
glabrescens, *Small, Fl. S. E. U. S.* 780.—Am. bor.

RIGIOSTACHYS, Planch. (Simarub.).
connaroïdes, *Loes. & Soler. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 37.—Mexic.
roureoïdes, *Loes. & Soler. l. c.* 39.—Mexic.

RINOREA, Aubl. (Violac.).
[ALSODEIA, Thou. I. K.]
Afzelii, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 138.—Afr. trop.
Albersii, *Engl. l. c.* 135.—Afr. trop.
Batangae, *Engl. l. c.* 134.—Afr. trop.
bipindensis, *Engl. l. c.* 145.—Afr. trop.
comorensis, *Engl. l. c.* 136.—Ins. Comoro.
Copelandi, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 45.—Ins. Philipp.
Dinklagei, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 141.—Afr. trop.
Elliotii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
Engleriana, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 11.—Afr. trop.
ferruginea, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 144.—Afr. trop.
gabunensis, *Engl. l. c.* 140.—Afr. trop.
gracilipes, *Engl. l. c.* 136.—Afr. trop.
Holtzii, *Engl. l. c.* xxxiv. 317.—Afr. trop.
insularis, *Engl. l. c.* xxxiii. 145.—Afr. trop.
juruana, *Ule, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 158.—Bras.
Kaessneri, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 317.—Afr. trop.
kamerunensis, *Engl. l. c.* xxxiii. 139.—Afr. trop.
liberica, *Engl. l. c.* 142.—Afr. trop.
longicuspis, *Engl. l. c.* 137.—Afr. trop.
longisepala, *Engl. l. c.* 143.—Afr. trop.
micrantha, *Ule, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 157.—Bras.
natalensis, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 135.—Afr. austr.
Poggei, *Engl. l. c.* 137.—Afr. trop.
Preussii, *Engl. l. c.* 138.—Afr. trop.
scandens, *Ule, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 157.—Bras.
Scheffleri, *Engl. Jahrb.* xxxiii. 142.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Engl. l. c.* 138 (= *Alsodeia Stuhlmannii*).—Afr. trop.
umbricola, *Engl. l. c.* 144.—Afr. trop.
yaundensis, *Engl. l. c.* 146.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

RITCHIEA, R. Br. (Capparid.).
Afzelii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 212.—Afr. trop.
aegleifolia, *Gilg, l. c.* 207.—Afr. trop.
Albersii, *Gilg. l. c.* 208.—Afr. trop.
brachypoda, *Gilg, l. c.* 213.—Afr. trop.
Busnei, *Gilg, l. c.* 209.—Afr. trop.
caloneura, *Gilg, l. c.* 210.—Afr. trop.
fragariodora, *Gilg, l. c.* 207.—Afr. trop.
glossopetala, *Gilg, l. c.* 210.—Afr. trop.
grandiflora, *Gilg, l. c.* 213 (= *Maerua grandiflora*).—Afr. trop.
heterophylla, *Gilg, l. c.* 212.—Afr. trop.
insignis, *Gilg, l. c.* 209 (= *Maerua insignis*).—Afr. trop.
longipedicellata, *Gilg, l. c.* 211.—Afr. trop.
macrantha, *Pax & Gilg, ex Gilg, l. c.* 210.—Afr. trop.
macrocarpa, *Gilg, l. c.* 211.—Afr. trop.
Steudneri, *Gilg, l. c.* 208.—Afr. trop.
Welwitschii, *Gilg, in Mitth. Sem. Or. Sprachen*, 1901, Abt. III; *et in Engl. Jahrb.* xxxiii. 209.—Afr. trop.

RIVEA, Choisy (Convolv.).
Barnesii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 40.—Ins. Philipp.

ROBINSONELLA, Rose & Baker f. (Malvac.).
edentula, *Rose & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 417.—Am. cent.
pilosa, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 320.—Am. cent.

ROCHELIA, Reichb. (Borag.).
disperma, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 195 (= *Lithospermum dispermum*).—Alger.

RODGERSIA, A. Gray (Saxifr.).
tabularis, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxii. 410 (= *Saxifraga tabularis*).—China.

RODRIGUEZIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).
negrensis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 158 (= *Burlingtonia negrensis*).—Bras.
uliginosa, *Cogn. l. c.* 169 (= *Capanemia uliginosa*).—Bras.

ROELLA, Linn. (Campan.).
amplexicaule, *Dod, in Journ. Bot.* 1901, 400.—Afr. austr.
Inaizwae, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xviii. 401.—Afr. austr.

ROEMERIA, Medic. (Papav.).
macrostigma, *Fedde, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 168.—Persia.

ROEPEROCHARIS, Reichb. f. (Orchid.).
[HABENARIA, Willd. I. K.]
Rendlei, *Kraenzl. Orchid. Gen. et Sp.* i. 926 (= *Habenaria Rendlei*).—Afr. trop.
Wentzeliana, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxx. 283.—Afr. trop.

ROJASIA, Malme, in Arkiv Bot. Stockh. iv. (1905) no. 14, 10. *ASCLEPIADACEAE.*
gracilis, *Malme, l. c.* (= *Gothofreda gracilis*).—Am. austr.

ROLLINIA, A. St. Hil. (Anonac.).
cardiantha, *Diels, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 134.—Reg. Amaz.
Hassleriana, *R. Fries, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1172.—Parag.
intermedia, *R. Fries, l. c.*—Parag.
longipetala, *R. Fries, l. c.* 1273.—Parag.
peruviana, *Diels, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 135.—Peruv.
Ulei, *Diels, l. c.* 136.—Peruv.

ROMANOVIA, Hort. ex Gard. Chron. 1903, t. 245; et Suppl. Apr. 25, t. 108 (Palmae).
Nicolai, *Hort. l. c.*—Hab.

ROMANZOFFIA, Cham. (Hydrophyll.).
californica, *Greene, Pittonia*, v. 39.—Calif.
glauca, *Greene, l. c.* 38.—Am. bor.
Leibergii, *Greene, l. c.*—Am. bor.
Macounii, *Greene, l. c.* 37.—Am. bor.
mendocina, *Greene, l. c.* 40.—Calif.
rubella, *Greene, l. c.* 37.—Am. bor.
spergulina, *Greene, l. c.* 41.—Calif.
Suksdorfii, *Greene, l. c.* 38.—Am. bor.

ROMNEYA, Harv. (Papav.).
Coulteri, Parsons, Wild Flow. Calif. 64 = trichocalyx.

ROMULEA, Maratti (Irid.).
acutiflora, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 45.—Alger.
affinis, *Jord. & Fourr. l. c.* 42.—Corsica.
armoricana, *Jord. l. c.* 44.—Gallia.
atroviolacea, *Jord. l. c.*—Corsica.
corsica, *Jord. & Fourr. l. c.* 43.—Corsica.
diluta, *Jord. l. c.* 46.—Alger.
erythropoda, *Jord. l. c.* 42.—Corsica.
flexifolia, *Jord. l. c.* 45.—Alger.
lepida, *Jord. l. c.* 46—Alger.
longistyla, *Jord. l. c.* 44.—Alger.
obtusiflora, *Jord. l. c.* 46.—Alger.
pallida, *Jord. l. c.* 45.—Alger.
parviflora, Bub. Fl. Pyren. iv. 150 (non Eckl.) = Columnae.
planifolia, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* ii. 46.—Hab. ?
tortilis, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1003.—Afr. austr.

RONDELETIA, Linn. (Rubiac.).
Christii, *Urb. Symb. Antill.* iii. 377.—Ind. occ.

RORIPA, Scop. (Crucif.).
[NASTURTIUM, R. Br. I. K.]
bonariensis, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 434 (= *Nasturtium bonariense*).—Am. austr.
clavata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 235.—Am. bor.
integra, *Rydb. l. c.* 236.—Am. bor.
Philippiana, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 434 (= *Nasturtium Philippianum*).—Patag.
Underwoodii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 235.—Am. bor.
Williamsii, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 171.—Am. bor.

ROSA, Tourn. (Rosac.).
aciculata, *Cockerell, in Proc. Acad. Philad.* lvi. 114.—Am. bor.
Aldersonii, *Greene, Pittonia*, v. 110.—Calif.
annisiensis, *Fouill. in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiii. (1904) 335.—Gallia.
calnonensis, *Tourlet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 199.—Eur.
decipiens, *Linton, Fl. Derby.* 137.—Anglia.
Dybowskii, *H. Braun, in Wolosz. Fl. Polon. Exsicc.* no. 942.—Polonia.
Gravereauxiana, *Duffort; vide Malinvaud, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 374.—Hybr.
Guineti, *Schmidely, in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève*, viii. 48.—Hybr.
Hergtiana, *Schulze, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 197.—Hybr.
Hugonis, *Hemsl. in Bot. Mag.* t. 8004.—China.
jaluana, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxii. 537.—China.
koreana, *Kom. l. c.* xviii. 434.—Corea.
lancifolia, *Small, Fl. S. E. U. S.* 527.—Am. bor.
macrocarpa, Watt, ex Crépin, in Compt. Rend. Soc. Bot. Belg. xxviii. 13 = gigantea.
mohavensis, *Parish, in Bull. S. Calif. Acad. Sci.* i. (1902) 87.—Calif.
Miyoshii, *Focke, in Abh. Nat. Ver. Brem.* xvii. 435.—Japon.
mutsuana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xix. 150 = yesoensis.
oreophila, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 561.—Am. bor.
pecosensis, *Cockerell, in Proc. Acad. Philad.* lvi. 110.—Am. bor.
permiscibilis, *Schmidely, in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève*, ix. 132.—Hybr.
pinetorum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 53.—Calif.
praetincta, *Cockerell, in Proc. Acad. Philad.* lvi. 110.—Am. bor.
pseudoformosa, *Tourlet, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 202.—Eur.
pseudoiatromisa, *Schmidely, in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève*, viii. 46.—Helvet.
rivalis, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 198.—Calif.
Seraphini, *Viv. Fl. Cors. Sp. Nov.* 8.—Eur.
sorbiflora, *Focke, in Gard. Chron.* 1905, i. 227.—China.
stytiaca, *Sabr. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, liv. 551.—Eur.
ultramontana, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 107.—Calif.
Underwoodii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 560.—Am. bor.
yainacensis, *Greene, Pittonia*, v. 109.—Am. bor.
yesoensis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 150.—Hybr.

ROSCOEA, Sm. (Scitamin.).
auriculata, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 118.—Reg. Himal.
blanda, *K. Schum. l. c.* 121.—China.
Brandisii, *K. Schum. l. c.* 119.—Reg. Himal.
cautleoides, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. p. lxxv.—China.
Chamaeleon, *Gagnep. l. c.* p. lxxvi.—China.
debilis, *Gagnep. l. c.*—China.
intermedia, *Gagnep. l. c.* p. lxxiii.—China.
praecox, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 122.—China.

ROSEANTHUS, Cogn. (Cucurb.).
elongatus, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 337.—Calif.

ROTALA, Linn. (Lythrac.).
cryptantha, *Koehne, in Engl. Pflanzenreich, Lythrac.* 42 (= *Ammannia cryptantha*).—Madag.
brevistyla, *Baker, f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 153.—Afr. trop.

ROTHROCKIA, A. Gray (Asclep.).
fruticosa, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 165 (1903).—Calif.
umbellata, *T. S. Brandegee, l. c.*—Calif.

ROTTBOELLIA, Linn. f. (Gramin.).
Kerstingii, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 125.—Afr. trop.

ROULINIELLA, Vail, in Bull. Torr. Bot. Club, xxix. (1902) 662. *ASCLEPIADACEAE.*
columbiana, *Vail, l. c.* 663.—N. Granat.
foetida, *Vail, l. c.* 667 (= *Roulinia Jacquinii*).—Mexic.
jaliscana, *Vail, l. c.* 668.—Mexic.
lignosa, *Vail, l. c.* 665.—Mexic.
Palmeri, *Vail, l. c.* 664 (= *Roulinia Palmeri*).—N. Mexic.
racemosa, *Vail, l. c.* 665 (= *Roulinia racemosa*).—Mexic.
unifaria, *Vail, l. c.* 663 (= *Roulinia unifaria*).—Am. bor.

ROUPALA, Aubl. (Proteac.).
pallida, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 29.—Bras.

ROUREA, Aubl. (Connar.).
albidoflavescens, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 316.—Afr. trop.
hondurensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xl. 2.—Am. cent.
volubilis, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxvii. 36 = heterophylla.

ROUSSELIA, Gaudich. (Urtic.).
humilis, Urb. Symb. Antill. iv. 205 = lappulacea.

ROUYA, Coincy, in Le Natural. Sér. II. ccxxlix. 213 (1901), fide Ind. Bot. Univ. No. 656. *UMBELLIFERAE.*
polygama, *Coincy, in Le Natural. l. c., fide Ind. Bot. Univ.* No. 656 (= *Thapsia polygama*).—Reg. Medit.

ROYENA, Linn. (Eben.).
Goetzei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxx. 372.—Afr. trop.
Nyassae, *Guerke, l. c.* 373.—Afr. trop.

ROYSTONEA, O. F. Cook, in Science, ii. (1900) 479; et in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 549. *PALMAE.*
borinquena, *O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 552.—Ind. occ.
floridana, *O. F. Cook, l. c.* 554.—Am. bor.

RUBACER, Rydberg, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 274. *ROSACEAE.*
columbianum, *Rydberg, l. c.*—Am. bor.
odoratum, *Rydberg, l. c.* (= *Rubus odoratus*).—Am. bor.
parviflorum, *Rydberg, l. c.* (= *Rubus parviflorus*).—Am. bor.
tomentosum, *Rydberg, l. c.* (= *Rubus velutinus*).—Am. bor.
velutinum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 106.—Calif.

RUBIA, Linn. (Rubiac.).
margaritifera, *Reiche, Fl. Chile*, iii. 138.—Chili.
Schumanniana, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxix. 583.—China.

RUBUS, Linn. (Rosac.).
abieticolus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 90.—Eur.
abruptifolius, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 323.—Eur.
acanthophorus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 80.—Eur.
accedens, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 329.—Eur.
accessivus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 63.—Eur.
aceratispinus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 23.—Eur.
acuminifer, *Sudre, l. c.* lii. 343.—Eur.

RUBUS:—

agnatus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 58.—Hybr.
alnicolus, *Sudre, l. c.* 62.—Eur.
altbergensis, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 339.—Eur.
altipratensis, *Sprib. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 342.—Germania.
altissimus, *Fritsch, in Hayek, Sched. Fl. Stir.* v–vi. 11.—Styria.
amabilis, *Focke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 58.—China.
amoeniflorens, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 64.—Eur.
amphilogus, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 344.—Hybr.
amplifiorus, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 218.—China.
amplifoliatus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 137.—Eur.
anglesensis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 15.—Eur.
anisacanthoides, *Sudre, l. c.* lii. 328.—Eur.
anoplocladus, *Sudre, l. c.* 337.—Eur.
apum, *Fritsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 85.—Styria.
Arbor, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 217.—China.
arcanus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 71.—Hybr.
ardens, *Sudre, l. c.* 67.—Eur.
arduennensis, *Libert, ex Erichsen, in Verh. Nat. Ver. Hamburg,* iii. viii. 20.—Eur.
argutifrons, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 321.—Eur.
argutipilus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 88.—Eur.
arvernensis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 22.—Eur.
Aschersoniellus, *Borb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 278.—Hungar.
asclepiadeus, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* ii. 337.—Eur.
aspernatus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 77.—Eur.
aulonensis, *Sudre, l. c.* 91.—Eur.
aureliacensis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr* li. 17.—Hybr.
aurensis, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 230.—Eur.
Baenitzii, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 316.—Hybr.
balneariensis, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 68.—Eur.
basalticarum, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 20.—Gallia.
bedaticus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 57.—Hybr.
belophoroides, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 70.—Eur.
betulifolius, *Small, Fl. S. E. U. S.* 518.—Am. bor.
bigeneris, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 93.—Hybr.
biturigensis, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 95.—Eur.
blandus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 60.—Eur.
Bodinieri, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 97.—China.
bortensis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 16.—Hybr.
botryoides, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 431.—Eur.
Boyntoni, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xix. 9.—Am. bor.
brachyanchus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 19.—Hybr.
brachythyrsus, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 234.—Eur.
Brevieri, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 27.—Hybr.
brigantinus, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto,* viii. 120.—Lusitan.
brumalis, *Sudre, Rub. Pyr.* 88; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 341.—Eur.
Caldasianus, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto,* viii. 8.—Lusitan.
caliginosus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 21.—Eur.
calligynus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 82.—Eur.
callimorphus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 14.—Gallia.
calvifolius, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 228.—Eur.
cantalicus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 14.—Hybr.
carpinifolius, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 519.—Am. bor.

RUBUS:—

cataractarum, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 69.—Eur.
caudatus, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 420.—Eur.
Cavaleriei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 218.—China.
centiformis, *Frieder. ex Erichsen, in Verh. Nat. Ver. Hamburg,* iii. viii. 56.—Eur.
cercinus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 26.—Hybr.
Chaffanjoni, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 98.—China.
Chateaui, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 26.—Hybr.
Chedlacanus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 101.—Eur.
chenensis, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 77.—Eur.
chenevardianus, *Schmidely, l. c.* 80.—Eur.
chlorobelus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 319.—Eur.
chlorocephalus, *Sudre, l. c.* 338.—Eur.
chnoostachyoides, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 335.—Hybr.
clivicolus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 73.—Eur.
cognominatus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 108.—Eur.
collinus, *Sudre, Rub. Pyr.* 123; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 17.—Hybr.
columbianus, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 495.—Am. bor.
columnaris, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 64.—Eur.
complanatispinus, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 231.—Eur.
consanguineus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 76 (1902).—Eur.
consanguineus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 58.—Hybr.
conterminus, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 6.—Eur.
coruscus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 93; *Rub. Herb. Bor.* 45; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 16.—Hybr.
corymbulifer, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 334.—Eur.
corymbulosus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 86.—Hybr.
Coutinhi, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto,* viii. 117.—Lusitan.
craponensis, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 77.—Eur.
crebrifolius, *Borb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 277.—Hungar.
crinitus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 83.—Eur.
Crux, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xix. 8.—Am. bor.
cuneifer, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 67.—Hybr.
curtiglandulosus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 87.—Eur.
curtistamineus, *Sudre, l. c.* 84.—Eur.
curvifolius, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 78.—Eur.
debilispinus, *Sudre, Arr. Pyr.* (1902); *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 333.—Eur.
deceptiosus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 144.—Eur.
densiglandulosus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 85.—Eur.
densispinus, *Sudre, l. c.* 94.—Eur.
derasifolius, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 335.—Eur.
derasiformis, *Sudre, l. c.* 334.—Eur.
disjunctiflorus, *Sudre, l. c.* 322.—Eur.
Doggettii, *C. H. Wright, in Johnston, Uganda Prot.* i. 325.—Afr. trop.
doranus, *Sudre, Batotheca europ. fasc.* i. *Notes,* 13; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 23.—Eur.
drepanophorus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 24.—Eur.
dunensis, *Rogers, in Journ. Bot.* 1901, 382.—Hibern.
durimontanus, *Sabransky, in Hayek, Sched. Fl. Stir.* v–vi. 13.—Hybr.
echinocalyx, *Erichsen, in Verh. Nat. Ver. Hamburg,* iii. viii. 31.—Eur.
elzinus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 340.—Eur.
eosinus, *Sabransky, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 391.—Hybr.

RUBUS:—

erectiflorens, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 86.—Eur.
erraticus, *Sudre, Rév. Rub. Herb. du Turn*; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 383.—Eur.
erubescens, *Lidforss, in Arkiv Bot.* iv. no. 6, 35.—Eur.
Erythrandus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 61.—Eur.
erythrinellus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 341.—Eur.
euchloos, *Focke, in Aschers & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl.* vi. i. 470.—Eur.
eustephanos, *Focke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 54.—China.
evagatus, *Sudre, Batotheca europ. fasc.* i. no. 23; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 16.—Eur.
excavaticaulis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 12.—Hybr.
excultus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 66.—Eur.
exilis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 340.—Eur.
eximius, *Erichsen, in Verh. Nat. Ver. Hamburg,* iii. viii. 61.—Eur.
expolitus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 66.—Eur.
fallens, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 424.—Eur.
fasciculatus, *Duthie, in Ann. Bot. Gard. Calc.* ix. 39.—Ind. or.
Fastigii, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 421.—Hybr.
faucium, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 39.—Eur.
Fauriei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1905, 60.—Japon.
Figertii, *Sprib. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 345.—Germania.
Fioniae, *Frieder. ex Erichsen, in Verh. Nat. Ver. Hamburg,* iii. viii. 58.—Eur.
fissurarum, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 75.—Eur.
flaviflorens, *Sudre, l. c.* 85.—Eur.
flaviramus, *Sudre, l. c.* 74.—Eur.
florentulus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 96.—Hybr.
foliosiformis, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 145.—Eur.
fragilipes, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 88.—Eur.
friburgensis, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 77.—Eur.
fruticetorum, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 236.—Eur.
fulgens, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 95.—Hybr.
furvus, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 3; *et in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 70.—Eur.
galbinifolius, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 7.—Eur.
galbinifrons, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 64.—Eur.
Gentilianus, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 99.—China.
glabellus, *Sudre, l. c.* xii. (1903) 76.—Eur.
glaucinellus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 341.—Eur.
graciliflorens, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 89.—Eur.
grandiformis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 328.—Eur.
gratiflorens, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 62.—Eur.
Grossularia, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1905, 61.—Japon.
Guilhoti, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 86.—Eur.
gymnothyrsus, *Sudre, Rub. Herb. Bor.*; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 15.—Eur.
hanovrensis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 325.—Eur.
harpactor, *Sabransky, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 386.—Austria.
hastifolius, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 218.—China.
Hayekii, *Sabransky, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 388.—Hybr.
hebecaulis, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 105.—Eur.

RUBUS:—

heterocolor, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 79.—Hybr.
heterophylloides, *Sudre, Rub. Pyr.* 168; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 328; *et in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 82.—Eur.
Hiraseanus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* xvi. 144.—Japon.
hirsutulus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 95 (1903).—Hybr.
hirsutulus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 21 (1904).—Eur.
holochlorus, *Sabransky, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* liv. 543.—Eur.
holsaticus, *Erichsen, in Verh. Nat. Ver. Hamburg,* iii. viii. 14.—Eur.
Hulubi, *Tocl, in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 24, 17.—Hab.?
Holzfussii, *Sprib. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers,* 344.—Germania.
Honigii, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 337.—Eur.
hoplophorus, *Sabransky, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 387.—Hybr.
horriduliformis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 318.—Eur.
humiliformis, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 93.—Eur.
humilifrons, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 335.—Eur.
hypochlous, *Sudre, l. c.* 342.—Eur.
illegitimus, *Sabransky, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 394.—Hybr.
illepidus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 94.—Hybr.
immanis, *Ashe, in Journ. E. Mitchell Sci. Soc.* xix. 8.—Am. bor.
inaequalilis, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 78.—Eur.
incisus, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 429.—Eur.
infestiformis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 342.—Eur.
informis, *Sabransky, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 396.—Hybr.
infrapubens, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 107.—Eur.
innocens, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* ii. 335.—Eur.
innoxius, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 74.—Eur.
iseranus, *Barber, in Abh. Nat. Ges. Görlitz,* xxxiii; *ex Just, Jahresb.* xxix. i. 557.—Eur.
itoensis, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1905, 62.—Japon.
jactabundus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 91.—Eur.
Jamini, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 102.—China.
Johannis-Ulrici, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 335.—Hybr.
jordanninus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 22.—Hybr.
kerriifolius, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 100.—China.
Kinashii, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1905, 66.—Japon.
kingaensis, *Engl. Jahrb.* xxx. 313.—Afr. trop.
labans, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 71.—Hybr.
lachnocarpus, *Focke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 56.—China.
lanceifolius, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 336.—Eur.
latidentatus, *Sudre, l. c.* li. 16.—Hybr.
latiorifolius, *Sudre, l. c.* lii. 342.—Eur.
latiorifrons, *Sudre, l. c.* li. 12. Hybr.
laxipilus, *Sudre, l. c.* 14.—Hybr.
Legrandianus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 143.—Eur.
leptosepalus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 324.—Eur.
Lettii, *Rogers, in Journ. Bot.* 1901, 381.—Hibern.
leucanthemoides, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 19.—Hybr.
longiglandulosus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 86.—Eur.
lumectorum, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 134.—Eur.

RUBUS:—

lupimontanus, *Figert, ex Sprib. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers,* 347.—Germania.
luteicaulis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 336.—Eur.
Makinoensis, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1905, 60.—Japon.
marmoratus, *Léveillé & Vaniot, l. c.* 64.—Japon.
Matuschekii, *Sabransky, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 356.—Austria.
Matsumuranus, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1906, 66.—Japon.
meionodontes, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* ii. 337.—Hybr.
melanocaulon, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 293.—Eur.
Merinoi, *Pau, ex Merino, in Bol. Soc. Arag.* iii. 188.—Hispan.
micrubelus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 341.—Eur.
minusculus, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1905, 63.—Japon.
minutidentatus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 323.—Eur.
Munguilloni, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 101.—China.
mucronifer, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 104.—Eur.
multibracteatus, *Léveillé & Vaniot, l. c.* 99.—China.
mundiflorus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 80.—Eur.
murivagum, *Sudre, l. c.* 94.—Eur.
myriadenus, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 218.—China.
nanus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 327.—Eur.
napophiloides, *Sudre, l. c.* li. 25.—Eur.
nigrescans, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 498.—Am. bor.
notabilis, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 71.—Eur.
Nothus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 91.—Eur.
nudistylus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 339.—Eur.
oblongulus, *Sudre, l. c.* 338.—Eur.
omalus, *Sudre, Rub. Pyr.* 142; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 324, 335.—Eur.
onnyensis, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 77.—Eur.
oreiformis, *Sudre, Batotheca europ. fasc.* i. *Notes,* 15; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 28.—Hybr.
oreigenus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 13.—Gallia.
oreus, *Sudre, Batotheca europ. fasc.* i. *Notes,* 11; *ex Bull. Soc. Bot. Fr* li. 22.—Eur.
orthopus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 78.—Eur.
ossalensis, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 229.—Eur.
ostensus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 94.—Hybr.
ostryifolius, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 497.—Am. bor.
oueosanensis, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1905, 62.—Corea.
pallidipes, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 89.—Eur.
pallidulifolius, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 329.—Eur.
parviflorens, *Sudre, l. c.* 325.—Eur.
parviflorus, *Figert, ex Sprib. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers,* 343.—Germania.
parviserratus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 322.—Eur.
parviserrulatus, *Sudre, l. c.* 340.—Eur.
parvulidens, *Sudre, l. c.* 317.—Eur.
patulispinus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 72.—Hybr.
peracutidens, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 331.—Eur.
perconfertus, *Sudre, l. c.* li. 18.—Hybr.
pergratiosus, *Sudre, l. c.* lii. 323.—Eur.
persistens, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 519.—Am. bor.
personatus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 96.—Hybr.
piletodermis, *Sudre, Batotheca europ. fasc.* i. *Notes,* 7; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 15.—Hybr.
piluliferus, *Focke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 55.—China.
pinfaensis, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1904, repr. 5.—China.
planicaulis, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 62.—Hybr.

RUBUS:—

Pleioplos, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 64.—Eur.
plicatiformis, *Sabransky, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 316.—Austria.
podophylloides, *Sudre, Rub. Herb. Bor.* 57; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 323.—Eur.
polyacanthoides, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 319.—Eur.
polycardius, *Borb. & Sabr. in Magyar Bot. Lap.* ii. 337.—Eur.
polysetosus, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 427.—Eur.
portuensis, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto,* viii. 10.—Lusitan.
praedatus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 79.—Eur.
progenerans, *Lidforss, in Arkiv Bot.* iv. no. 6, 20.—Hybr.
propinquiformis, *Sudre & Bouvet, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 92.—Eur.
propinquus, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 340.—Eur.
provisus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 92.—Hybr.
pullatifolius, *Sudre, l. c.* 83.—Eur.
puripalvis, *Sudre, l. c.* 81.—Eur.
purpuratiformis, *Sudre, l. c.* 73.—Hybr.
purpuratus, *Sudre, Rub. Pyr.* 82; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 339; *et in Bull. Assoc. Fr. Bot* iv. 4.—Eur.
pseudo-degener, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 142.—Eur.
pseudodenticulatus, *Sabransky, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* liv. 542.—Hybr.
pseudo-inermis, *Motelay, in Act. Soc. Linn. Bordeaux,* lviii. 61.—Gallia.
pseudomacrophyllus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 77.—Eur.
pseudo-oreus, *Schmidely, l. c.* iv. 95.—Hybr.
pseudo-propinquus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 93.—Eur.
pseudo-villarsianus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 80.—Eur.
Randii, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 497.—Am. bor.
recondiformis, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 92.—Eur.
recurvans, *Blanchard, in Rhodora,* vi. 224.—Am. bor.
retentus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 72.—Hybr.
Rhenii, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 343.—Hybr.
rhodinus, *Keller, l. c.* 433.—Eur.
rhodophyllus, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 516.—Am. bor.
ribisoideus, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* xv. 159.—Japon.
rigidulatus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 319.—Eur.
rigiduliformis, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 39.—Eur.
rimmersbergensis, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 428.—Eur.
robustiramus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 333.—Hybr.
Roblenae, *Tocl, in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 24, 19.—Hab.?
roribaccus, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 498.—Am. bor.
roseipetalus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 91.—Eur.
rosellus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 72.—Eur.
rotundellus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 23.—Eur.
rubicundiflorus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 58.—Hybr.
rubrisetus, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 497.—Am. bor.
rugosulus, *Sabransky, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 392.—Hybr.
rungwensis, *Engl. Jahrb.* xxx. 314.—Afr. trop.
saboensis, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 80.—Eur.
saltuivagus, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 237.—Eur.
salvanensis, *Schmidely, in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève,* viii. 51, nomen.—Helvet.

RUBUS:—
sanguineus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 94.—Hybr.
sanzenbergensis, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 333.—Hybr.
scabricaulis, *Sudre, Rub. Herb. Bor.* 71; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 322.—Eur.
scabriformis, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 322.—Eur.
scabrosiformis, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 153.—Eur.
scalarostachys, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 329.—Eur.
schaubergensis, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 430.—Eur.
Schmidelyanus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 21.—Eur.
Schubei, *Sprib. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 347.—Germania.
scitulus, *Suder, Rub. Pyr.* 75; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 317, 328.—Eur.
secophiloides, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 125.—Eur.
semicalvus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 333.—Eur.
semiticolus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 77.—Eur.
separinoides, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 100.—Eur.
sericatiflons, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 336.—Eur.
serraticuspis, *Sudre, l. c.* 340.—Eur.
serrigerus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 95.—Hybr.
sessiliglandulosus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 76, 598.—Hybr.
silvaparsus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi (1902) 75.—Eur.
similigenus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 19.—Hybr.
soechaviensis, *Sabransky, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* liv. 545.—Eur.
Sonderi, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 419.—Eur.
sparseglandulosus, *Hayek, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 355.—Eur.
spinifer, *Suder, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 343.—Eur.
spinosellus, *Sudre, l. c.* 317.—Eur.
spinosulus, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 6.—Eur.
spinulifolius, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 69 (*Rub. Pyr.* 155).—Eur.
status, *Sudre, l. c.* 76.—Eur.
stereacanthoides, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi, (1902) 71.—Eur.
strictispinus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 327.—Eur.
suavedrianus, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 124.—Eur.
subalbicans, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* v. 210.—Eur.
subcrenatus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 96.—Helvetia.
subhercynus, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* ii. 335.—Eur.
subhirtus, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 343.—Eur.
subhystrix, *Borb. & Holuby, ex Borb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 279.—Hungar.
submitis, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 77.—Eur.
subriglandulosus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 327.—Eur.
subrosilis, *Sudre, l. c.* li. 15.—Hybr.
substiriacus, *Borb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 277.—Hybr.
subtilissimus, *Sudre, Rub. Pyr.* 87; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 339, 344.—Eur.
subuniflorus, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 498.—Am. bor.
Sudreanus, *Sabransky, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* liv. 546.—Hybr.
Sudrei, *Bouvet, in Compt. Rend. Assoc. Fr. Avanc. Sci.* 1903, ii. 683 (1904).—Gallia.
superfluus, *Sabransky, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 389.—Hybr.
supinus, *Sabransky, l. c.* 357.—Austria.
Tabanimontanus, *Figert, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 178.—Eur.
taiwanianus, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* xvi. 3.—Japon.
tenuidentatus, *Sudre, Rub. Pyr.* 92; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 344.—Eur.

RUBUS:—
thyrsifloroglandulosus, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 426.—Eur.
thyrsifloroideus, *Keller, l. c.* 425.—Eur.
Toclii, *Domin, in Magyar Bot. Lap.* iv. 135.—Hybr.
torrentium, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 75.—Eur.
Toussainti, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers,* xxxi. (1902) 101.—Eur.
trachycaulon, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 324.—Eur.
trichopoides, *Sudre, l. c.* 335.—Eur.
trifoliatus, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto,* viii. 18.—Lusitan.
truncifactus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 344.—Eur.
turicensis, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 423.—Eur.
umbraculorum, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 92.—Hybr.
uncinulatus, *Sudre, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 330.—Eur.
Vahlii, *Frider. in Bot. Tidsskr.* xxvii. 108.—Ins. Mader.
valdepilosus, *Schmidely, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 78.—Eur.
valdeproximus, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 232.—Eur.
valdespinosus, *Suder, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 81.—Eur.
valesiensis, *Sudre, in Bull. Soc. Étud. Sci. Angers.* xxxi. (1902) 136.—Eur.
validispinus, *Sudre, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 69.—Eur.
vallicularum, *Sudre, in Bull. Assoc. Fr. Bot.* iv. 237.—Eur.
venustulus, *Suder, l. c.* 5.—Eur.
vepallidus, *Sudre, Rub. Pyr.* 175; *ex Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 330; *et in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 89.—Eur.
vermontanus, *Blanchard, in Amer. Bot.* viii. (1904) 1.—Am. bor.
vesprimiensis, *Borb. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 274.—Hungar.
vestitoides, *Keller, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 341.—Hybr.
vitodurensis, *Keller, l. c.*—Eur.
Wartmanni, *Keller, l. c.* 422.—Eur.
Yabei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1905, 65.—Japon.
subothicus, *Figert & Sprib. ex Sprib. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 346.—Germania.

RUDBECKIA, Linn. (Compos.).
acuminata, *Boynton & Beadle, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1256.—Am. bor.
ampla, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 234.—Am. bor.
Chapmani, *Boynton & Beadle, in Biltm. Bot. Studies,* i. 14.—Am. bor.
foliosa, *Boynton & Beadle, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1256.—Am. bor.
graminifolia, *Boynton & Beadle, in Biltm. Bot. Studies,* i. 12.—Am. bor.
missouriensis, *Engelm. ex Boynton & Beadle, l. c.* 17.—Am. bor.
monticola, *Small, in Torreya,* i. 67.—Am. bor.
palustris, *Eggert, ex Boynton & Beadle, in Biltm. Bot. Studies,* i. 16.—Am. bor.
palustris, *Eggert, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 987.—Am. bor.
Sullivanti, *Boynton & Beadle, in Biltm. Bot. Studies,* i. 15.—Am. bor.
tenax, *Boynton & Beadle, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1257.—Am. bor.
umbrosa, *Boynton & Beadle, in Biltm. Bot. Studies,* i. 16.—Am. bor.

RUDGEA, Salisb. (Rubiac.).
ceratopetala, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. (1903) 3.—Am. cent.
ceriantha, *K. Schum. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 190.—Peruv.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 179.—Parag.

RUELLIA, Plum. (Acanth.).
albo-violacea, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 318.—Mexic.
Baurii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 13.—Afr. austr.

RUELLIA:—
Beyrichiana, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 34 (= *Dipteracanthus Beyrichianus*).—Bras.
consocialis, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 319.—Bras.
cordata, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 173 (1903).—Calif.
cupheoides, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 502.—Mexic.
cygniflora, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 186.—Afr. trop.
glanduloso-notata, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 367.—Bras.
glanduloso-punctata, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 196 (= *Dipteracanthus glanduloso-punctatus*).—Bras.
glischrocalyx, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 321.—Peruv.
gloeocalyx, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 388.—N. Guin.
gongodes, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 187.—Afr. trop.
haematantha, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 322.—Peruv.
humilis, *Lindau, l. c.* iii. 629 (= *Dipteracanthus humilis*).—Parag.
hypericoides, *Lindau, l. c.* (= *Dipteracanthus hypericoides*).—Parag.
leucantha, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 109 (1901).—Calif.
lithophila, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 187.—Afr. trop.
malacophylla, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 14.—Afr. austr.
microphylla, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 630 (= *Arrhostoxylum microphyllum*).—Parag.
multifolia, *Lindau, l. c.* (= *Dipteracanthus multifolius*).—Parag.
oxysepala, *C. B. Clarke, ex Schinz, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxviii. 78.—Afr. trop.
parviflora, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 854.—Am. bor.
phyllocalyx, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 320.—Peruv.
stenophylla, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 14.—Afr. austr.
succulenta, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 437.—Am. bor.
tarapotana, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 318.—Peruv.
thyrsostachya, *Lindau, l. c.* 320.—Peruv.
Woodii, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 13.—Afr. austr.
yurimaguensis, *Lindau, l. c.* 317.—Peruv.

RULAC, Adans. (Sapind.).
[ACER, Tourn. I. K.]
texana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 743 (= *Acer texana*).—Am. bor.

RULINGIA, R. Br. (Stercul.).
luteiflora, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 369.—Austral.
Tratmanni, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 37.—Austral.

RUMEX, Linn. (Polygon.).
Areschougii, *Beck, Ic. Fl. Germ.* xxiv. 44.—Hybr.
Bakeri, *Greene, Pl. Baker.* iii. 15.—Am. bor.
confinis, *Greene, Pittonia,* iv. (1901) 306.—Am. bor.
Daiwoo, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* xv. 124 (= *Lapathum Daiwoo*).—Japon.
digeneus, *Beck, Ic. Fl. Germ.* xxiv. 31.—Hybr.
Ellenbeckii, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 61.—Afr. trop.
ellipticus, *Greene, Pittonia,* iv. 234.—Am. bor.
fenestratus, *Greene, l. c.* (1901) 306.—Am. bor.
garsensis, *Teyber, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* liv. 14.—Hybr.
gracilipes, *Greene, Pittonia,* iv. (1901) 304.—Am. bor.
hararensis, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 61.—Afr. trop.
Haussknechtii, *Beck, Ic. Fl. Germ.* xxiv. 28.—Hybr.
hesperius, *Greene, Pittonia,* iv. 234.—Am. bor.
Jungneri, *Camus, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1236.—Hybr.
Murbeckii, *Beck, Ic. Fl. Germ.* xxiv. 32.—Hybr.
Niesslii, *Wildt. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liv. 331.—Hybr.

RUMEX :—
polyrrhizus, *Greene, Pittonia*, iv. (1901) 305.—Am. bor.
procerus, *Greene, l. c.*—Am. bor.
scandicus, *Beck, Ic. Fl. Germ.* xxiv. 45.—Hybr.
spurius, *Camus, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1233.—Hybr.
thuringiacus, *Beck, Ic. Fl. Germ.* xxiv. 27.—Hybr.
Trimenii, *Camus, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1239.—Hybr.
Wettsteinii, *Wildt, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liv. 380.—Hybr.
Wirtgeni, *Beck, Ic. Fl. Germ.* xxiv. 44.—Hybr.

RUMFORDIA, DC. (Compos.).
aragonensis, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 38.—Am. cent.
polymnioides, *Greenm. l. c.* xxxix. 99.—Am. cent.

RUNGIA, Nees (Acanth.).
eriostachya, *Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1905, 62.—Afr. trop.
obcordata, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 71.—Afr. trop.
philippinensis, *C. B. Clarke, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 92.—Ins. Philipp.

RUPPIA, Linn. (Naiad.).
rostellata, Koch, ex Reichb. Ic. Fl. Crit. ii. 66 = maritima.

RUSSELIA, Jacq. (Scrophul.).
Deamii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 474.—Mexic.
furfuracea, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 219 (1905).—Mexic.
trachypleura, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 474.—Mexic.

RUTA, Linn. (Rutac.).
tenuifolia, Bub. Fl. Pyr. iii. 357 = chalepensis.

RUTIDEA, DC. (Rubiac.).
brachyantha, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 350.—Afr. trop.

RUYSCHIA, Jacq. (Ternstroem.).
platyadenia, *Gilg, ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 41, nomen.—Bras.

RYNCHOSPORA, Vahl (Cyper.).
Curtissii, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 195.—Am. bor.
dolichostyla, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 179.—Afr. trop.
Earlei, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 197.—Am. bor.
ecuadorensis, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxxiv. Beibl. lxxviii. 5.—Ecuador.
Faberi, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 259.—China.
Fauriei, *C. B. Clarke, ex Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 197.—China.
Franchetiana, *C. B. Clarke, ex Léveillé, l. c.*—Japon.
Fujiiana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 183.—Japon.
Hassleri, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1023.—Parag.
Hattoriana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 189.—Japon.
indianolensis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 193.—Am. bor.
intermedia, *Britton, in Small, l. c.* 194.—Am. bor.
japonica, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 184.—Japon.
locuples, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxxiv. Beibl. lxxviii. 5.—Ecuador.
microcephala, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 195.—Am. bor.
miliata, *Britton, l. c.* 197.—Am. bor.
Miyakeana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 184.—Japon.
nipponica, *Makino, l. c.* xviii. 145.—Japon.
perplexa, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 197.—Am. bor.
Plankii, *Britton, l. c.* 196.—Am. bor.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 69.—Mexic.
prolifera, *Small, Fl. S. E. U. S.* 198.—Am. bor.
rubra, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 180 = Wallichiana.

RYNCHOSPORA :—
Smallii, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1321.—Am. bor.
solitaria, *Harper, in Bull. Torr. Bot. Club*, xxviii. 468.—Am. bor.
Umemurae, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 187.—Japon.
Yasudana, *Makino, l. c.* 188.—Japon.

RYSSOPTERYS, Blume (Malpigh.).
intermedia, *Hochr. in Bull. Inst. Buitenz.* xix. 45; *Pl. Bogor Exsicc.* 21.—Malaya.

S

SABAL, Adans. (Palmae).
megacarpa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 223.—Am. bor.
princeps, *Hort. ex Knuth, Handb. Blütenb.* iii. 65.—Hab. ?
uresana, *Trel. in Missouri, Bot. Gard. Rep.* xii. 80.—Mexic.

SABAZIA, Cass. (Compos.).
anomala, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 262.—Mexic.
Purpusi, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 162 (1903).—Calif.

SABBATIA, Adans. (Gentian.).
foliosa, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 155.—Am. bor.
grandiflora, *Small, Fl. S. E. U. S.* 928.—Am. bor.
Harperi, *Small, l. c.*—Am. bor.
simulata, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 448.—Ind. occ.

SABICEA, Aubl. (Rubiac.).
affinis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 77.—Afr. trop.
bicarpellata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 337.—Afr. trop.
camporum, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 434.—N. Granat.
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 112.—Afr. trop.
discolor, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 105.—Afr. trop.
gigantostipula, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 337.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 78.—Afr. trop.
lasiocalyx, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 106.—Afr. trop.
longepetiolata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 78.—Afr. trop.
speciosissima, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 338.—Afr. trop.
trichochlamys, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

SABINA, Hall (Conif.).
[JUNIPERUS, Tourn. 1. K.]
alpestris, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 5.—Eur.
barbadensis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 33 (= *Juniperus barbadensis*).—Am. bor.
Knightii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 598 (= *Juniperus Knightii*).—Am. bor.
monosperma, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
occidentalis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 47 (= *Juniperus occidentalis*).—Calif.
sabinoides, *Small, Fl. S. E. U. S.* 33 (= *Cupressus sabinoides*).—Am. bor.
scopulorum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 598 (= *Juniperus scopulorum*).—Am. bor.
utahensis, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
Villarsii, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 4—Eur.

SABULINA, Reichb. (Caryophyll.).
[ARENARIA, Rupp. 1. K.]
aretioides, *Hayek, Sched. Fl. Stir.* iii–iv. 6 (= *Arenaria aretioides*).—Eur.
cerastiifolia, *Bub. Fl. Pyren.* iii. 45 (= *Arenaria cerastiifolia*).—Pyren.
recurva, *Bub. l. c.* 47 (= *Arenaria recurva*).—Eur.; Orient.
verna, *Bub. l. c.* 45 (= *Arenaria verna*).—Eur.; Am. bor.

SACCARDOPHYTUM, Speg. Nov. Add. Fl. Patag. ii. (1902), repr. 61. *SOLANACEAE.*
pycnophylloides, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902) repr. 61.—Patag.

SACCIOLEPIS, Nash, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 383 = **Saccolepis**, Nash (Gramin.).

SACCOLABIUM, Blume (Orchid.).
amboinense, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 106.—Ins. Ambon.
arachnanthe, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 83.—Penins. Mal.
camptocentrum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 225.—N. Guin.
cladophylax, *Schlechter, l. c.* 226.—N. Guin.
Fargesii, *Kraenzl. in Journ. de Bot.* 1903, 423.—China.
gracilistipes, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 227.—N. Guin.
hortense, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 88.—Penins. Mal.
insectiferum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 641.—Java.
javanicum, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 122 B. (= *Oeceoclades javanica*).—Java.
juncifolium, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 666 (= *Schoenorchis juncifolia*).—Java.
latifolium, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 230 (= *Cleisostoma latifolium*).—Malaya.
leucanthum, *Schlechter, l. c.* 227.—N. Guin.
luteum, *Volk, in Engl. Jahrb.* xxxi. 461.—Ins. Carol.
Machadonis, *Ridley, in Journ. As Soc. Straits*, xxxix. 82.—Penins. Mal.
micranthum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 646 (= *Omoea micrantha*).—Java.
microphyton, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 228.—Ins. Bismarck.
Myosurus, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 84.—Penins. Mal.
odoratissimum, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 645.—Java.
pallidum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 229.—N. Guin.
paniculatum, *Schlechter, l. c.* 228 (= *Carteretia paniculata*).—Ins. Bismarck.
patinatum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 84.—Malaya.
porphyrodesme, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 229.—N. Guin.
purpureum, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 4.—Arch. Mal.
rhopalorrhachis, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 644 (= *Dendrocolla rhopalorrhachis*).—Java.
rugosulum, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 82.—Penins. Mal.
serpentinum, *J. J. Sm. in Rec. Trav. Bot. Néerl.* i. 157.—Borneo.
sphaeroceras, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 230.—N. Guin.
squamatum, Frapp. in Cord. Fl. Réun. 195 = Listrostachys bracteosa.
Toramanum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 141.—Japon.

SACCOLEPIS, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 89 (1901). *GRAMINEAE.*
gibba, Nash, l. c. = striata.
striata, *Nash, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 383.—Am. bor.

SACHSIA, Griseb. (Compos.).
bahamensis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 408.—Ind. occ.

SADIRIA, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. (1902) 181. *MYRSINACEAE.*
erecta, *Mez, l. c.* 183 (= *Pimelandra erecta*).—Ind. or.
eugeniifolia, *Mez, l. c.* 182 (= *Pimelandra eugeniifolia*).—Ind. or.
Griffithii, *Mez, l. c.* 183 (= *Pimelandra Griffithii*).—Ind. or.
solanifolia, *Mez, l. c.* 182.—Ind. or.

SAGERAEA, Dalz. (Anonac.).
[BOCAGEA, A. St. Hil. 1. K.]
glabra, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 12.—Ins. Philipp.

SAGINA, Linn. (Caryophyll.).
alpina, *Don, ex Garry, Notes. Engl. Bot.* 36.—Anglia.
ciliata, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 50 (= *Alsinella ciliata*).—Calif.
lemoviscensis, *Auct. in Bull. Soc. Bot. Deux-Sèvres*, xvi. (1904); *ex Bot. Centralbl.* xcix. 72.—Hybr.

SAGITTA, Adans. = **Sagittaria**, Rupp. (Alism.).
palustris, Bub. Fl. Pyren. iv. 4 = Sagittaria sagittifolia.

SAGITTARIA, Rupp. (Alism.).
Aginashi, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xv. 104.—Japon.
australis, Small, Fl. S. E. U. S. 45.—Am. bor.
brevirostra, Mackenzie & Bush, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1905, 102.—Am. bor.
esculenta, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 679.—Am. bor.
paniculata, Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot. i. 40.—Am. bor.
spathulata, Buchenau, in Engl. Pflanzenreich, Alismat. 40 (= Lophotocarpus spathulatus).—Am. bor.

SAHAGUNIA, Liebm. (Urtic.).
urophylla, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xl. 11.—Am. cent.

SALACIA, Linn. (Celastr.).
bipindensis, Loes. ex Fritsch, in Bot. Centralbl. Beih. xi. 346.—Afr. trop.
corcovadensis, Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. III. 108, nomen.—Bras.
macrocarpa, Welw. ex Fritsch, in Bot. Centralbl. Beih. xi. 351.—Afr. trop.
nitida, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 415.—Afr. trop.
Parkinsonii, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 304.—Ins. Bismarck.
Staudtiana, Loes. ex Fritsch, in Bot. Centralbl. Beih. xi. 355.—Afr. trop.

SALICORNIA, Linn. (Chenopod.).
pulvinata, R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. Ser. IV. i. no. 1, 157.—Reg. Argent.

SALIX, Linn. (Salic.).
aberrans, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 267.—Hybr.
accedens, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 175.—Hybr.
acutidens, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 315.—Am. bor.
albicans, Bonjean, in A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. i. 359.—Hybr.
ambigens, A. & G. Camus, l. c. ii. 272.—Hybr.
arbusculoides, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 183.—Hybr.
Bakeri, Seemen, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 635.—Calif.
Biondiana, Seemen, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 32.—China.
bottnica, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 173.—Hybr.
boutignyana, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. i. 336.—Hybr.
Camusi, Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe, 1904, repr. 11.—China.
chlorolepis, Fernald, in Rhodora, vii. 186.—Am. bor.
coerulea, E. Wolf, in Engl. Jahrb. xxxii. 275; et in Act. Hort. Petrop. xxi. 157.—As. cent.
Coesteri, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 169.—Hybr.
confinis, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 268.—Hybr.
congesta, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 617.—Am. bor.
Cornuaulti, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 175.—Hybr.
Covillei, Eastw. in Zoe, v. 80 (1900).—Calif.
cyclophylla, Seemen, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 41.—Japon.
daiseniensis, Seemen, Salic. Japon. 65.—Japon.
Dalecarlica, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 181.—Hybr.
dodecandra, Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. 141.—China.
dolichostyla, Seemen, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 39.—Japon.
fastidiosa, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 266.—Hybr.
Fauriei, Seemen, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 40.—Japon.
Fernaldii, Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot. i. 46.—Am. bor.
Figerti, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 213.—Hybr.
flava, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 273.—Am. bor.

SALIX:—
franciscana, Seemen, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 634.—Calif.
futura, Seemen, Salic. Japon. 71.—Japon.
germanorum, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 170.—Hybr.
Gilgiana, Seemen, Salic. Japon. 59.—Japon.
Gilloti, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. i. 355.—Hybr.
glaucovillosa, Masetti, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, liii. 358.—Hybr.
Goodingi, C. R. Ball, in Coult. Bot. Gaz. xl. 376.—Am. bor.
Harmsiana, Seemen, Salic. Japon. 73.—Japon.
Heidenreichii, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 180.—Hybr.
heteromorpha, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 264.—Hybr.
hirsutophylla, A. & G. Camus, l. c. 270.—Hybr.
hypoleuca, Seemen, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 31.—China.
indagata, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 103.—Hybr.
iterata, A. & G. Camus, l. c. 264.—Hybr.
jessoensis, Seemen, Salic. Japon. 31.—Japon.
Khekii, Treffer, in A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 217.—Hybr.
Kinashii, Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. 141.—Japon.
Komarowi, E. Wolf, in Engl. Jahrb. xxxii. 279; et in Act. Hort. Petrop. xxi. 195.—As. cent.
lanatella, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 173.—Hybr.
Langeana, Rouy, l. c. 180.—Hybr.
lasiogyne, Seemen, Salic. Japon. 32.—Japon.
leiocarpa, Coville, in Proc. Washington Acad. Sci. iii. 338.—Am. bor.
leiophylla, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 108.—Hybr.
liegnitzensis, A. & G. Camus, l. c. 105.—Hybr.
linearifolia, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. (1901) 316.—Am. bor.
linearifolia, E. Wolf, in Engl. Jahrb. xxxii. 276 (1903); et in Act. Hort. Petrop. xxi. 160.—As. cent.
Lintoni, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 214.—Hybr.
litigiosa, A. & G. Camus, l. c. 106.—Hybr.
Lloydi, A. & G. Camus, l. c. i. 279.—Hybr.
longistylis, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 163.—Am. bor.
ludibunda, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 275.—Hybr.
luteosericea, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 316.—Am. bor.
macrior, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 187.—Hybr.
macrostachya, E. Wolf, in Engl. Jahrb. xxxii. 276; et in Act. Hort. Petrop. xxi. 165.—As. cent.
Makinoana, Seemen, in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 173.—Japon.
margaritifera, E. Wolf, in Engl. Jahrb. xxxii. 276; et in Act. Hort. Petrop. xxi. 162.—As. cent.
Matsumurnei, Seemen, Salic. Japon. 71.—Japon.
Maximowiczii, Kom. in Act. Hort. Petrop. xviii. 442; et l. c. xxii. 25.—China.
Meinshauseni, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 163.—Hybr.
melanostachys, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 141 = Thunbergiana.
mirifica, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 178.—Hybr.
Nelsoni, C. R. Ball, in Coult. Bot. Gaz. xl. 379.—Am. bor.
nigrolepis, Shirai, ex Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 141 = Thunbergiana.
norvegica, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 186.—Hybr.
ormsbyensis, Seemen, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 635.—Am. bor.
pachnophora, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 403.—Am. bor.
padifolia, Rydb. l. c. 1901, 272 (non Anderss.) = padophylla.
padophylla, Rydb. l. c. 499.—Am. bor.
paludum, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 171.—Hybr.
paracallinntha, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 121.—Hybr.

SALIX:—
paraspunctata, A. & G. Camus, Class. Monog. Saales d'Eur. ii. 276.—Hybr.
parcipila, Rehm. ex A. & G. Camus, l. c. 144 = subaurita.
pentandroides, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 166.—Hybr.
perobscura, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 194.—Hybr.
perrostrata, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 163; et in Britton, Man. Fl. N. U. S. 317.—Am. bor.
pithoensis, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 180.—Hybr.
polyandra, Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe, 1904, repr. 10.—China.
propinqua, A. & G. Camus, Class. Monog. Saales d'Eur. ii. 213.—Hybr.
pseudo-alba, E. Wolf, in Engl. Jahrb. xxxii. 276; et in Act. Hort. Petrop. xxi. 167.—As. cent.
pseudo-caerulescens, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 172.—Hybr.
pseudo-dontana, Rouy, l. c.—Hybr.
pseudosperia, Rouy, l. c. 161.—Hybr.
purpureaformis, Rouy, l. c. 188 = rubroformis.
Pustoriae, Rouy, l. c. 174.—Hybr.
pygmaea, A. & G. Camus, Class. Monog. Saales d'Eur. ii. 260.—Hybr.
recognita, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 176.—Hybr.
rhaetica, Rouy, l. c. 174.—Hybr.
Richteri, Rouy, l. c. 177.—Hybr.
rubriformis, Tourl. in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 311 (1903).—Hybr.?
rubroformis, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 174 (1904).—Hybr.
Saidaeana, Seemen, Salic. Japon. 68.—Japon.
scandica, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 172.—Hybr.
Scholzi, Rouy, l. c. 174.—Hybr.
Seemannii, Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 164.—Am. bor.
semihastata, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 234.—Hybr.
semilanata, A. & G. Camus, l. c. 205.—Hybr.
semilapponum, A. & G. Camus, l. c. 251.—Hybr.
semimyrsinites, A. & G. Camus, l. c. 139.—Hybr.
semimyrtilloides, A. & G. Camus, l. c. 188.—Hybr.
seminigricans, A. & G. Camus, l. c. 130.—Hybr.
semiphylicifolia, A. & G. Camus, l. c. 131.—Hybr.
serissima, Fernald, in Rhodora, vi. 6.—Am. bor.
serrulatifolia, E. Wolf, in Engl. Jahrb. xxxii. 277; et in Act. Hort. Petrop. xxi. 163.—As. cent.
Shiraii, Seemen, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 40.—Japon.
Sonderiana, Jaape, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. xxii. Beiheft. 79.—Hybr.
spathulifolia, Seemen, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 31.—China.
squamata, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 317.—Am. bor.
stenophylla, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 271.—Am. bor.
stolonifera, Coville, in Proc. Washington Acad. Sci. iii. 333.—Am. bor.
subnuda, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 181.—Hybr.
subversifolia, A. & G. Camus, Class. Monog. Saales d'Eur. ii. 203.—Hybr.
tomentella, A. & G. Camus, l. c. 270.—Hybr.
Tweedyi, C. R. Ball, in Coult. Bot. Gaz. xl. 377.—Am. bor.
turfosa, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 267.—Hybr.
Uechtritzii, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 177.—Hybr.
Ulothii, Rouy, l. c. 173.—Hybr.
vacciniformis, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 319.—Am. bor.
variifolia, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 907.—Oriens.
Whiteana, A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur. ii. 239.—Hybr.
Wilsoni, Seemen, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 28.—China.
Wolfiana, Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 187.—Hybr.

SALIX :—
Wolfii, *Christ, in A. & G. Camus, Class. Monog. Saules d'Eur.* ii. 238.—Hybr.
wyomingensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 271.—Am. bor.

SALMASIA, Bub. = **Aira**, Linn. (Gramin.).
Cupanii, Bub. Fl. Pyren. iv. 317 = A. caryophyllea.
elegans, Bub. l. c. 318 = A. capillaris.
flexuosa, Bub l. c. 319 = A. flexuosa.
lendigera, Bub. l. c. 407 = A. lendigera.
multiculmis, Bub. l. c. 317 = A. caryophyllea.
praecox, Bub. l. c. 316 = A. praecox.
vulgaris, Bub. l. c. = A. caryophyllea.

SALMEA, DC. (Compos.).
Gaumeri, *Greenm. ex Millsp. & Chase, in Field Columb. Mus. Bot.* iii. 124.—Mexic.

SALOMONIA, Heist. ex Fabricius, Enum. Pl. Hort. Helmstad. ed. 2. (1763) 38. *LILIACEAE.*
[POLYGONATUM, Adans. D. T. & H.]
biflora, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 273 (= *Polygonatum biflorum*).—Am. bor.
commutata, *Britton, l. c.* (= *Polygonatum commutatum*).—Am. bor.

SALOMONIA, Lour. (Polygal.).
Cavaleriei, *Léveillé, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 291.—China.
Martini, *Léveillé, l. c.* 290.—China.
Seguini, *Léveillé, l. c.* 291.—China.

SALPINGA, Mart. (Melast.).
ciliata, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 167.—Peruv.

SALPINGACANTHUS, S. Moore, in Journ. Bot. 1904, 107. *ACANTHACEAE.*
nobilis, *S. Moore, l. c.*—Bras.

SALSOLA, Linn. (Chenopod.).
aperta, *Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 197.—As. cent.
setubalensis, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 434.—Socotra.
Tosellii, *Urumoff, in Period. Spisan.* lxiii. (1902); *ex Bot. Centralbl.* xcii. (1903) 207.—Eur.

SALVIA, Linn. (Labiat.).
ageratifolia, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 499.—Mexic.
albicans, *Fernald, l. c.* 501.—Mexic.
ancistrocarpha, *Fernald, l. c.* xl. 56.—Mexic.
anomala, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 190.—China.
Bodinieri, *Vaniot, l. c.* 191.—China.
brachyphylla, *Urb. Symb. Antill.* iii. 368.—Ind. occ.
Buchii, *Urb. l. c.* 369.—Ind. occ.
bulgarica, *Davidoff, in Magyar Bot. Lap.* iv. 29.—Bulgar.
Burchellii, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 130.—Afr. austr.
chlorophylla, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1080.—Afr. trop.
chrysadenia, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 279.—Orient.
Davidsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 246.—Am. bor.
Dinteri, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1075.—Afr. austr.
Dugesii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 500.—Mexic.
exigua, *Adamov. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 3.—Eur.
fasciculata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 54.—Mexic.
grewiaefolia, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 109.—Bras.
igualensis, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 500.—Mexic.
Lobryana, *Aznav. in Magyar Bot. Lap.* i. 195.—Eur.
mattogrossensis, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 188.—Bras.
molina, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 53.—Mexic.
natalensis, *Briq. & Schinz, in Bull. Herb Boiss.* Sér. II. iii. 1078.—Afr. austr.
orophila, *Briq. in Beih. Bot. Centralbl.* xiii. 81.—N. Granat.
pannosa, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 54.—Mexic.

SALVIA :—
peninsularis, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 108 (1901).—Calif.
pseudo-jaminiana, *Chevall. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 442.—Afr. bor.
Regnelliana, *Briq. in Arkiv Bot. Stockh.* ii. no. 10, 3.—Bras.
Schenckii, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1079.—Afr. austr.
Schlechteri, *Briq. l. c.* 1077.—Afr. austr.
setulosa, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 499.—Mexic.
similis, *T. S. Brandegee, in Zoe,* v. 108 (1901).—Calif.
tehuacana, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 53.—Mexic.
Theresae, *Briq. in Beih. Bot. Centralbl.* xiii. 82.—Ecuador.
Townsendii, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 55.—Mexic.
xerobia, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1076.—Afr. austr.

SAMADERA, Gaertn. (Simarub.).
Harmandii, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 218.—Siam.

SAMBUCUS, Tourn. (Caprifol.).
microbotrys, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 503.—Am. bor.

SAMERARIA, Desv. (Crucif.).
[ISATIS, Linn. I. K.]
nummularia, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 53.—Persia.

SAMOLUS, Linn. (Primul.).
cinerascens, *Pax & Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul.* 340 (= *Androsace cinerascens*).—Mexic.
flexuosus, Baudo, ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 342 = porosus.

SAMUELA, Trelease, in Missouri Bot. Gard. Rep. 1902, 116. *LILIACEAE.*
carnerosana, *Trelease, l. c.* 118.—Mexic.
Faxoniana, *Trelease, l. c.* 117.—Am. bor.

SANCHEZIA, Ruiz & Pav. (Acanth.).
filamentosa, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 314.—Peruv.
loranthifolia, *Lindau, l. c.*—Peruv.

SANDERELLA, Kuntze (Orchid.).
[PARLATOREA, Barb. Rodr. I. K. S. I.]
discolor, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 239 (= *Parlatorea discolor*).—Bras.

SANDORICUM, Cav. (Meliac.).
Harmsianum, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 31.—Ins. Philipp.
Vidalii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* vi. 8.—Ins. Philipp.

SANGUINARIA, Bub. Fl. Pyren. iv. 256 = **Digitaria**, Heist. (Gramin.).
ciliaris, Bub. l. c. 257 = D. ciliaris.
humifusa, Bub. l. c. = D. glabra.
Nevenurae, Bub. l. c. 256 = D. sanguinalis.
vaginata, Bub. l. c. 258 = D. paspaloides.

SANGUINARIA, Dill. (Papav.).
australis, *Greene, Pittonia,* v. 307.—Am. bor.
Dilleniana, *Greene, l. c.*—Am. bor.
mesochora, *Greene, l. c.* 308.—Am. bor.
rotundifolia, *Greene, l. c.* 307.—Am. bor.

SANICULA, Linn. (Umbell.).
patagonica, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* vii. 295.—Patag.
Smallii, *E. P. Bickn. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1049.—Am. bor.

SANSEVIERIA, Thunb. (Haemodor.).
Andradae, *Godef. Leb. Sansev. Gigant. Afr. Or.* 17 (d'Andradae); *ex Gérome, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 171.—Afr. trop.
Cornui, *Hort. ex Gérome & Labroy, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 173.—Hab.?
fasciata, *Cornu, ex Gérome & Labroy, l. c.*—Afr. trop.
grandis, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 7877.—Afr. trop.?
Laurentii, *Wildem. in Rev. Cult. Colon.* xiv. 231.—Afr. trop.

SANSEVIERIA :—
liberica, *Hort. ex Gérome & Labroy, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 173.—Afr. trop.
metallica, *Hort. ex Gérome & Labroy, l. c.*—Hab.?
Perrotti, *Warb. in Tropenpfl.* 1901, 191.—Afr. trop.
Stuckyi, *Godef. Leb. Sansev. Gigant. Afr. Or.* 33; *ex Gérome, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 173.—Afr. trop.

SANTIRIA, Blume (Burser.).
nitida, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 29.—Ins. Philipp.

SANVITALIOPSIS, Sch. Bip. (Compos.).
[ZINNIA, Linn. I. K.]
Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 261 (= *Grypocarpha Nelsonii*).—Mexic.

SAPIUM, P. Br. (Euphorb.).
Bussei, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 284.—Afr. trop.
caribaeum, *Urb. Symb. Antill.* iii. 308.—Ind. occ.
ciliatum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2683.—Bras.
cupuliferum, *Hemsl. l. c.* 2679.—Reg. Argent.
eglandulosum, *Ule, in Engl. Jahrb.* xxxv. 673.—Reg. Amaz.
lateriflorum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* sub t. 2680.—Mexic.
Marmieri, *Huber, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 49; *et in Bol. Mus. Para.* iii. 367.—Bras.
mexicanum, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2660.—Mexic.
Poeppigii, *Hemsl. l. c.* 2678.—Peruv.
rhombifolium, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 307.—Bras.
subsessile, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2684 (1901).—Am. austr.
subsessile, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. (1905) 677 (= *Excoecaria subsessilis*).—Parag.
subulatum, *Chod. & Hassl. l. c.* 678 (= *Excoecaria subulata*).—Parag.
suffruticosum, *Pax, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 284.—Afr. trop.
Taburu, *Ule, in Engl. Jahrb.* xxxv. 671.—Reg. Amaz.
Thomsonii, Godef. Leb. ex Jumelle, Pl. Caoutch. Gutta, 151 = tolimense.
tolimense, *Hort. ex Jumelle, Pl. Caoutch. Gutta,* 151.—N. Granat.
Warmingii, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 677 (= *Excoecaria Warmingii*).—Parag.

SAPONARIA, Linn. (Caryophyll.).
silenoides, *H. Winkl. in Vidensk. Medd. Kjöbenh.* (1901) 1902, 50.—As. cent.

SAPOTA, Plum. (Sapot.).
[ACHRAS, Linn. I. K.]
Zapotilla, *Coville, ex Safford, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* ix. 370 (= *Achras Sapota*).—Am. austr.

SAPROSMA, Blume. (Rubiac.).
glomerulatum, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 98.—Penins. Mal.
Ridleyi, *King & Gamble, l. c.* 100.—Penins. Mal.
Scortechinii, *King & Gamble, l. c.* 99.—Penins. Mal.

SARANTHE, Eichl. (Scitam.).
[MYROSMA, Linn. f. I. K.]
composita, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. 139 = Riedeliana.
gladioli, *K. Schum. l. c.* 138 (= *Maranta gladioli*).—Hort.
glumacea, K. Schum. l. c. 139 = pygmaea.

SARARANGA, Hemsl. (Pandanac.).
philippinensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 5.—Ins. Philipp.

SARCANTHUS, Lindl. (Orchid.).
apiculatus, *J. J. Sm. Orchid. Java,* 598 (= *Camarotis apiculata*).—Java.
cernuus, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 36 (= *Cleisostoma cernuum*).—China.
elongatus, *Rolfe, l. c.*—China.
Fordii, *Rolfe, l. c.* 37 (= *Cleisostoma Fordii*).—Hongkong.
javanicus, *J. J. Sm. Orchid. Java,* 600 (= *Echioglossum javanicum*).—Java.
muticus, *J. J. Sm. l. c.* 602 (= *Echioglossum muticum*).—Java.
pachyncris, *J. J. Sm. l. c.* 603.—Java.

SARCANTHUS:—
quartus, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 608 (= *Echioglossum quartum*).—Java.
rigidus, J. J. Sm. l. c. 599 = uniflorus.
sagittatus, *J. J. Sm. l. c.* 607 (= *Cleisostoma sagittatum*).—Java.
uniflorus, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 123 B.—Java.

SARCOCEPHALUS, Afzel. (Rubiac.).
Diderrichii, *Wildem. in Masui, État. Indép. Congo Expos. Brux.* 1897, 439; *et in Rev. Cult. Colon.* ix. 7.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. in Rev. Cult. Colon.* ix. 8.—Afr. trop.
Trillesii, *Pierre, ex Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 37.—Afr. trop.

SARCOCHILUS, R. Br. (Orchid.).
appendiculatus, J. J. Sm. Orchid. Java, 564 = pusillus.
auriferus, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 34 (= *Dendrobium auriferum*).—China.
leucarachne, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 372 (= *Thrixspermum leucarachne*).—Penins. Mal.
major, *F. N. Williams, l. c.* (= *Adenoncos major*).—Penins. Mal.
Newportii, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 2014.—Austral.
ramuanus, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 232 (= *Renanthera ramuana*).—Ins. Bismarck.
Taeniophyllum, *J. J. Sm. Orch. Ambon*, 93.—Ins. Ambon.
Teysmanni, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 557 (= *Aerides Teysmanni*).—Java.
virescens, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xxxix. 86.—Penins. Mal.
Weinthalii, *F. M. Bailey, in Queensl. Agric. Journ.* xiii. 346.—Austral.

SARCOGLOTTIS, Presl (Orchid.).
gutturosa, *Ames, in Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem.* vii. 49 (= *Spiranthes gutturosa*).—Am. cent.
Schaffneri, *Ames, l. c.* 50 (= *Spiranthes Schaffneri*).—Am. cent.

SARCOMPHALUS, P. Br. (Rhamnac.).
crenatus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 316.—Ind. occ.
Taylori, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 445—Ind. occ.

SARCOPHRYNIUM, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. 35. *MARANTACEAE.*
adenocarpum, *K. Schum. l. c.* 37 (= *Phrynium adenocarpum*).—Afr. trop.
Arnoldianum, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 107.—Afr. trop.
baccatum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 39 (= *Phrynium baccatum*).—Afr. trop.
bisubulatum, *K. Schum. l. c.* 37 (= *Phrynium bisubulatum*).—Afr. trop.
brachystachyum, *K. Schum. l. c.* 1902, 36 (= *Phrynium brachystachyum*).—Afr. trop.
leiogonium, *K. Schum. l. c.* 39 (= *Phrynium leiogonium*).—Afr. trop.
macrostachyum, *K. Schum. l. c.* 37 (= *Phrynium macrostachyum*).—Afr. trop.
oxycarpum, *K. Schum. l. c.* 38 (= *Phrynium oxycarpum*).—Afr. trop.
prionogonium, *K. Schum. l. c.* 39 (= *Phrynium prionogonium*).—Afr. trop.
spicatum, *K. Schum. l. c.* 40.—Afr. trop.
velutinum, *K. Schum. l. c.* 38 (= *Phrynium velutinum*).—Afr. trop.
villosum, *K. Schum. l. c.* (= *Phrynium villosum*).—Afr. trop.

SARCOSPERMA, Hook. f. (Sapot.).
paniculatum, *Stapf & King, in Hook. Ic. Pl.* t. 2690 (= *Bracea paniculata*).—Penins. Mal.

SAROTHAMNUS, Wimm. (Legum.).
[CYTISUS, Linn. I. K.]
ochroleucus, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlviii. 416.—Hispan.

SASA, Makino & Shibata, in Bot. Mag. Tokyo, xv. (1901) 18. *GRAMINEAE.*
albomarginata, *Makino & Shibata, l. c.* 25 (= *Bambusa albomarginata*).—Japon.
borealis, *Makino & Shibata, l. c.* 24 (= *Bambusa borealis*).—Japon.

SASA:—
chartacea, *Makino & Shibata, in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 27 (= *Arundinaria chartacea*).—Japon.
kurilensis, *Makino & Shibata, l. c.* (= *Arundinaria kurilensis*).—Japon.
nipponica, *Makino & Shibata, l. c.* 24 (= *Bambusa nipponica*).—Japon.
paniculata, *Makino & Shibata, l. c.* 25 (= *Bambusa paniculata*).—Japon.
ramosa, *Makino & Shibata, l. c.* 24 (= *Bambusa ramosa*).—Japon.
tessellata, *Makino & Shibata, l. c.* 27 (= *Bambusa tessellata*).—Japon.

SASSAFRAS, Linn. (Laurac.).
Laurus, *Macl. in Torreya*, 1905, 198 (= *Laurus Sassafras*).—Patag.

SATUREIA, Linn. (Labiat.).
debilis, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 203 (= *Micromeria debilis*).—Alger.
Ellenbeckii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 129.—Afr. trop.
eugenioides, *Loes. ex R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. 107 (= *Xenopoma eugenioides*).—Reg. Argent.
Hochreutineri, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 201.—Alger.
pilosa, *Velen. in Sitzb. Bohm. Akad.* 1899, no. 40, 6.—Bulgar.
procumbens, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 245.—Mexic.
pusilla, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 698 (= *Micromeria pusilla*).—Reg. Magell.
silvatica, *Maly, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1904, 250 (= *Calamintha silvatica*).—Eur.
taurica, *Velen. in Sitz. Bohm. Ges. Wiss.* 1903, no. 28, 9.—Bulgar.
Uhligii, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 128.—Afr. trop.
varbossania, *Maly, in Wiss. Mitth. Bosn. u. Hercegov.* viii. 444.—Eur.
vulgaris, *Béguin. Fl. Anal. Ital.* iii. 61 (= *Clinopodium vulgare*).—Ital.

SATYRIUM, Linn. (Orchid.).
Gilletii, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo*, 153.—Afr. trop.
kermesinum, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 945; *et in Engl. Jahrb.* xxx. 283.—Afr. trop.
leptopetalum, *Kraenzl. l. c.* xxxvi. 119.—Afr. trop.
miserum, *Kraenzl. l. c.* xxx. 284.—Afr. trop.
monophyllum, *Kraenzl. l. c.*—Afr. trop.
morrumbalaensis, *Wildem. in Pl. Nov. Hort. Then.* t. 14.—Afr. trop.
Pentherianum, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 944.—Afr. austr.
Princeae, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 66.—Afr. trop.
Proschii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 2.—Afr. trop.
setchuenicum, *Kraenzl. Orch. Gen. et Sp.* i. 946.—China.
Stolzianum, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 67.—Afr. trop.
Usambarae, *Kraenzl. l. c.* xxxiii. 56.—Afr. trop.

SAURAUJA, Willd. (Ternstroem.).
aequatoriensis, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 426.—Ecuador.
bibracteata, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 318.—N. Guin.
cinnamomea, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 42.—Ins. Philipp.
floribunda, *Benth. ex Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 426.—Ecuador.
involucrata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 41.—Ins. Philipp.
Nelsoni, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 52.—Mexic.
pauciflora, *Rose, l. c.*—Mexic.
Pringlei, *Rose, l. c.*—Mexic.
pulchra, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 426.—N. Granat.
reticulata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 53.—Mexic.
Schlimii, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 427.—N. Granat.
Sprucei, *Sprague, l. c.*—Ecuador.

SAURAUJA:—
subglabra, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 43.—Ins. Philipp.
Whitfordi, *Merrill, l. c.* 42.—Ins. Philipp.

SAUROGLOSSUM, Lindl. (Orchid.).
[SPIRANTHES, Rich. I. K.]
cranichoides, *Ames, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 117 (= *Pelexia cranichoides*).—Am. bor.

SAUROMATUM, Schott (Arac.).
angolense, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 142.—Afr. trop.
brevipes, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1903, II. 93.—Reg. Himal.

SAUROPUS, Blume (Euphorb.).
androgynus, *Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull.* i. 30 (= *Cluytia androgyna*).—As. austr. or.

SAUSSUREA, DC. (Compos.).
acrophila, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 108.—China.
Baroniana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 625.—China.
Bullockii, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 509.—China.
chitralica, *Duthie, in Ann. Bot. Gard. Calc.* ix. 45.—Ind. or.
crispa, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 21.—China.
dolichopoda, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 623.—China.
dubia, *Freyn, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 282.—As. bor.
Giraldii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 108.—China.
graminea, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 509.—China.
intermedia, *Freyn, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 280.—As. bor.
Karoi, *Freyn, l. c.* 279.—As. bor.
lanuginosa, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 20.—China.
Leontodon, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 509.—China.
mandshurica, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 424.—As. or.
microcephala, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 624.—China.
mutabilis, *Diels, l. c.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 109.—China.
odontophylla, *Freyn, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 282.—As. bor.
otophylla, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 109.—China.
Porcii, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* iii. 311.—Eur. cent.
Rosthornii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 625.—China.
saxatilis, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 423.—As. or.
sobarocephala, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 108.—China.
splendida, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 424.—As. or.
stenophylla, *Freyn, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 280.—As. bor.
umbrosa, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 423.—As. or.
vaginata, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 510.—China.
virescens, *Freyn, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 283.—As. bor.
zeaensis, *Freyn, l. c.* 282.—As. bor.

SAVASTANA, Schrank (Gramin.).
[HIEROCHLOE, S. G. Gmel. I. K.]
antarctica, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 184 (= *Hierochloe antarctica*).—Patag.

SAVIA, Willd. (Euphorb.).
bahamensis, *Britton, in Torreya*, iv. 104.—Ind. occ.

SAXIFRAGA, Tourn. (Saxifr.).
aequidentata, *Rosend. in Engl. Jahrb.* xxxvii. *Beibl.* lxxxiii. 70 (= *Micranthes aequidentata*).—Am. bor.
asiatica, *Hayek, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxvii. 672.—As. cent.
capillaris, *Hort. ex Guenthart, Beitr. Blüthenb.* 73.—Hab.?
cebennensis, *Rouy & Cam. Fl. de Fr.* vii. 55.—Eur.
Churchilli, *Hort. ex Guenthart, Beitr. Blüthenb.* (1902) 70.—Hab.?
Churchilli, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 193.—Hybr.

SAXIFRAGA—
Duthiei, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvi. 419.—Ind. or.
Engleri, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 193.—Hybr.
fassana, *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 217.—Eur. cent.
Ferdinandi-Coburgi, *Kellerer & Sündermann, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1901, 116.—Eur.
galacifolia, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 172.—Am. bor.
Greenei, *Blank, in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 65.—Am. bor.
Huteri, *Ausserd. ex Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 194.—Hybr.
ingrata, *Huter, l. c.* 195.—Hybr.
Korshinskii, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 436.—As. or.
latina, *Hayek, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxvii. 678.—Ital.
lilacina, *Duthie, in Gard. Chron.* 1904, i. 290.—Ind. or.
luteopurpureum, Hort. ex Gard. Chron. 1894, i. 556 = apiculata ×.
Malyi, Hort. ex Gard. Chron. l. c. = apiculata ×.
manshuriensis, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xxii. 415.—China.
meridionalis, *Hayek, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxvii. 671.—Montenegr.
micranthifolia, *Rosend. in Engl. Jahrb.* xxxvii. *Beibl.* lxxxiii. 66 (= *Robertsonia micranthifolia*).—Am. bor.
Nathorstii, *Hayek, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxvii. 661.—Am. arct.
Newcombei, *Small, in Torreya*, ii. 55.—Am. bor.
nipponica, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 10.—Japon.
pulvinata, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 172.—Am. bor.
radiata, *Small, in N. Am. Fl.* xxii. 128.—Reg. arct.
Reyeri, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 194.—Hybr.
simulata, *Small, in N. Am. Fl.* xxii. 128.—Am. bor.
Souliei, *Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 396.—Hybr.
speciosa, *Doerfl. & Hayek, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxvii. 677.—Ital.
Vierhapperi, *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 70.—Hybr.
zermattensis, *Hayek, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxvii. 695.—Hybr.

SCABIOSA, Linn. (Dipsac.).
calcicola, *Blonski, in Magyar Bot. Lap.* iv. 38.—Eur.
cephalarioides, *Lojac. Fl. Sic.* ii. i. 42.—Sicil.
communis, *Rouy, Fl. Fr.* viii. 122.—Eur.
malacitanus, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 402.—Hispan.
nevadensis, *Huter, l. c.*—Hispan.

SCAEVOLA, Linn. (Gooden.).
arenaria, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 572.—Austral.
decurrens, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 26.—Austral.
Dielsii, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 571.—Austral.
Helmsii, *E. Pritz. l. c.* 572.—Austral.

SCALESIA, Arn. (Compos.).
Helleri, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. (1902) 217.—Ins. Galap.
Hopkinsii, *Robinson, l. c.*—Ins. Galap.
microcephala, *Robinson, l. c.* 218.—Ins. Galap.
narbonensis, *Robinson, l. c.*—Ins. Galap.
retroflexa, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2715.—Ins. Galap.
Snodgrassii, *Robinson, in Proc. Amer. Acad.* xxxviii. 219.—Ins. Galap.

SCALIGERIA, DC. (Umbell.).
[CONOPODIUM, Koch. I. K.]
ferganensis, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 136.—As. cent.
hirtula, *Lipsky, l. c.* 134 (= *Conopodium hirtulum*).—As. cent.

SCANDIX, Tourn. (Umbell.).
bulgarica, *Davidoff, in Magyar Bot. Lap.* iv. 25.—Bulgar.

SCAPHOPETALUM, Mast. (Stercul.).
Dewevrei, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 97.—Afr. trop.

SCAPHYGLOTTIS, Poepp. & Endl. (Orchid.).
Cogniauxiana, *Wildem. in Gard Chron.* 1905, i. 33, 121.—Mexic.
guatemalensis, *Ames, in Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem.* vii. 36, nomen.—Am. cent.

SCHAEFFERIA, Jacq. (Celastr.).
ephedroides, *Urb. Symb. Antill.* v. 87.—Ind. occ.
Marchii, *Griseb. in Urb. Symb. Antill.* v. 87, descr.—Ind. occ.
serrata, *Loes. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 162.—Peruv.

SCHEELEA, Karst. (Palm.).
corumbaensis, *Barb. Rodr. Sert. Palm. Bras.* i. 54.—Bras.
parviflora, *Barb. Rodr. l. c.* 58.—Bras.

SCHEFFLERA, Forst. (Aral.).
angustifolia, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 53.—Ins. Philipp.
Koordersii, *Harms, in Ann. Jard. Buitenz.* xix. 17; *et ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 93.—Celebes.
Minahassae, *Harms, l. c.* 17; *et l. c.* 93.—Celebes.
Sarasinorum, *Harms, ex Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 93.—Celebes.
Schumanniana, *Harms, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 331.—N. Guin.
Ulei, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 156.—Peruv.

SCHEFFLERODENDRON, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. 87 (1901). *LEGUMINOSAE.*
adenopetalum, *Harms, l. c.* 88 (= *Millettia adenopetala*).—Afr. trop.
usambarense, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

SCHICKENDANTZIA, Pax (Amaryll.).
pygmaea, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, ix. 8 (= *Alstroemeria pygmaea*).—Reg. Argent.

SCHICKENDANTZIELLA, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, ix. (1903) 8. *LILIACEAE.*
[SCHICKENDANTZIA, Speg., non Pax.]
trichosepala, *Speg. l. c.* (= *Schickendantzia trichosepala*).—Reg. Argent.

SCHINZIELLA, Gilg (Gentian.).
tetragona, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 334.—Afr. trop.

SCHISMATOGLOTTIS, Zoll. & Mor. (Arac.).
bitaeniata, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 124.—Celebes.
longicaulis, *Ridley, in Journ. Bot.* 1902, 37.—Sumatra.
longifolia, *Ridley, l. c.*—Penins. Mal.
marginata, *Ridley, l. c.* 36.—Penins. Mal.

SCHISTOSTIGMA, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 399. *EUPHORBIACEAE.*
papuanum, *Lauterb. l. c.*—N. Guin.

SCHIVERECKIA, Andrz. (Crucif.).
[ALYSSUM, Tourn. I. K.]
Bornmuelleri, *Prantl, ex Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 6, descr.—As. Min.

SCHIZACHYRIUM, Nees (Gramin.).
[ANDROPOGON, Linn. I. K.]
acuminatum, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 59.—Am. bor.
gracile, *Nash, l. c.* 60 (= *Andropogon gracilis*).—Am. bor.
maritimum, *Nash, l. c.* 59 (= *Andropogon maritimus*).—Am. bor.
oligostachyum, *Nash, l. c.* (= *Andropogon oligostachyus*).—Am. bor.
scoparium, *Nash, l. c.* (= *Andropogon scoparius*).—Am. bor.
stoloniferum, *Nash, l. c.*—Am. bor.
triaristatum, *Nash, l. c.* 60.—Am. bor.
villosissimum, *Nash, l. c.* 59.—Am. bor.

SCHIZANDRA, Michx. (Magnol.).
Henryi, *C. B. Clarke, in Gard. Chron.* 1905, ii. 162.—China.

SCHIZOBASIS, Baker (Liliac.).
Schlechteri, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 783.—Afr. austr.

SCHIZOCARPUM, Schrad. (Cucurb.).
jaliscanum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 337.—Mexic.
reflexum, *Rose, l. c.* 55.—Mexic.

SCHIZOGLOSSUM, E. Mey. (Asclep.).
aciculare, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 363.—Afr. trop.
alpestre, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 384.—Afr. trop.
Baumii, *Schlechter, ex N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 361; *et in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 340.—Afr. trop.
biauriculatum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 29.—Afr. austr.
Cabrae, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 182.—Afr. trop.
Carsoni, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 366 (= *Xysmalobium Carsoni*).—Afr. trop.
chlorojodinum, *N. E. Br. l. c.* (= *Gomphocarpus chlorojodina*).—Afr. trop.
Conrathii, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 27.—Afr. austr.
crassipes, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 383.—Afr. austr.
Debeersianum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 323.—Afr. trop.
distinctum, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 371 (= *Margaretta distincta*).—Afr. trop.
dolichoglossum, *N. E. Br. l. c.* 367 (= *Xysmalobium dolichoglossum*).—Afr. trop.
eximium, *N. E. Br. l. c.* 370 (= *Asclepias eximia*).—Afr. trop.
garcianum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 28.—Afr. austr.
gwelense, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 360.—Afr. trop.
Huttonae, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 383.—Afr. austr.
lasiopetalum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 29.—Afr. austr.
loreum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 310.—Afr. austr.
macroglossum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 324.—Afr. trop.
monticola, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 27.—Afr. austr.
morumbenense, *Schlechter, l. c.* 28.—Afr. trop.
Pentheri, *Schlechter, in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xviii. 397.—Afr. trop.
polynema, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 30.—Afr. austr.
propinquum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 311.—Afr. austr.
Randii, *S. Moore, l. c.* 310.—Afr. austr.
scyphostigma, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 384.—Afr. trop.
simulans, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 369.—Afr. trop.
spurium, *N. E. Br. l. c.* 367 (= *Xysmalobium spurium*).—Afr. trop.
strictissimum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 254.—Afr. trop.
togoense, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 31.—Afr. trop.
Welwitschii, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 365 (= *Odontostelma Welwitschii*).—Afr. trop.
Whytei, *N. E. Br. l. c.* 367.—Afr. trop.

SCHIZOSTACHYUM, Nees (Gramin.).
chinense, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 448.—China.

SCHLECHTERINA, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 148 (1902). *PASSIFLORACEAE.*
mitostemmatoides, *Harms. l. c.*—Afr. austr.

SCHMALZIA, Desv. (Anacard.).
[RHUS, Tourn. I. K.]
affinis, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 135.—Am. bor.
anisophylla, *Greene, l. c.* 136.—Calif.
anomala, *Greene, l. c.* 139.—Calif.
arenaria, *Greene, l. c.* 130.—Am. bor.
Ashei, *Small, Fl. S. E. U. S.* 729.—Am. bor.
Bakeri, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 132.—Am. bor.
betryoides, *Greene, l. c.* 138.—Am. bor.
cissodes, *Greene, l. c.* 136.—Am. bor.
cognata, *Greene, l. c.* 141.—Am. bor.

SCHMALZIA :—
copallina, Small, Fl. S. E. U. S. 728 (= Rhus copallina).—Am. bor.
crataegifolia, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 130.—Am. bor.
crenata, Greene, l. c. 128 (= Toxicodendron crenatum).—Am. bor.
cruciata, Greene, l. c. 139.—Calif.
elegantula, Greene, l. c. 136.—Am. bor.
Emoryi, Greene, l. c. 133.—Am. bor.
formosa, Greene, l. c. 131.—Am. bor.
glabra, Small, Fl. S. E. U. S. 729 (= Rhus glabra).—Am. bor.
glabrata, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 132.—Am. bor.
glauca, Greene, l. c. 138.—Mexic.
glomerata, Greene, l. c. 140.—Am. bor.
hederacea, Greene, l. c. 135.—Am. bor.
hirta, Small, Fl. S. E. U. S. 729 (= Rhus hirta).—Am. bor.
hirtella, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 137.—Am. bor.
illinoensis, Greene, l. c. 131.—Am. bor.
lanceolata, Small, Fl. S. E. U. S. 728.—Am. bor.
lasiocarpa, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 141.—Am. bor.
leiocarpa, Greene, l. c. 133.—Am. bor.
malacophylla, Greene, l. c. 138.—Calif.
Michauxii, Small, Fl. S. E. U. S. 729 (= Rhus Michauxii).—Am. bor.
microphylla, Small, l. c. 728 (= Rhus microphylla).—Am. bor.
Nortonii, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 132.—Am. bor.
obtusifolia, Small, Fl. S. E. U. S. 729.—Am. bor.
oregana, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 140.—Am. bor.
oxyacanthoides, Greene, l. c. 134.—Am. bor.
pulchella, Greene, l. c.—Am. bor.
puncticulata, Greene, l. c. 137.—Am. bor.
quercifolia, Greene, l. c. 141.—Am. bor.
quinata, Greene, l. c. 139.—Calif.
racemulosa, Greene, l. c. 142.—Am. bor.
sabulosa, Greene, l. c. 136.—Am. bor.
scaberula, Greene, l. c. 138.—Mexic.
serotina, Greene, l. c. 131.—Am. bor.
serrata, Greene, l. c. 129.—Am. bor.
simplicifolia, Greene, l. c. 135.—Am. bor.
straminea, Greene, l. c. 139.—Calif.
subpinnata, Greene, l. c. 133.—Am. bor.
tridophylloides, Greene, l. c. 141.—Am. bor.
trilobata, Small, Fl. S. E. U. S. 728; Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 132 (= Rhus trilobata).—Am. bor.
trinervata, Greene, l. c. 137.—Am. bor.
virens, Small, Fl. S. E. U. S. 729 (= Rhus virens).—Am. bor.

SCHOENOBIBLUS, Mart. (Thymel.).
elliptica, Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 162.—Reg. Amaz.
grandifolia, Urb. Symb. Antill. ii. 465.—Ind. occ.

SCHOENOCAULON, A. Gray (Liliac.).
dubium, Small, Fl. S. E. U. S. 250 (= Helonias dubia).—Am. bor.

SCHOENOCRAMBE, Greene (Crucif.).
decumbens, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 409.—Am. bor.

SCHOENOPLECTUS, Palla (Cyper.).
[Scirpus, Linn. I. K.]
americanus, Volkart, in Schinz & Keller, Fl. Schweiz, ed. II. 75 (= Scirpus americanus).—Helvetia.
fluitans, Palla, in Koch, Syn. Deutsch. Fl. ed. III. 2539 (= Scirpus fluitans).—Eur.
Savii, Palla, l. c. (= Scirpus Savii).—Eur.

SCHOENOXIPHIUM, Nees (Cyper.).
caricinum, Kuek. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 49.—Tibet.
Clarkeanum, Kuek. l. c.—Reg. Himal.

SCHOENUS, Linn. (Cyper.).
Andrewsii, Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxviii. 112.—Austral.
caespititius, Fitzg. l. c. 110.—Austral.
fuscescens, C. B. Clarke, in Engl. Jahrb. xxxv. 79.—Austral.
Jamesonianus, Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxvii. 245.—Austral.
laevigatus, Fitzg. l. c. xxviii. 111.—Austral.
laxus, Fitzg. l. c.—Austral.
Medwedewi, Meinsh. in Act. Hort. Petrop. xviii. 272.—Rossia.

SCHOENUS :—
Rodwayanus, Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxvii. 243.—Austral.
sesquispicula, C. B. Clarke, in Engl. Jahrb. xxxv. 80.—Austral.
triangularis, Volk. in Engl. Jahrb. xxxi. 458.—Ins. Carol.

SCHOLTZIA, Schau. (Myrtac.).
decussata, Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. i. 19.—Austral.

SCHOMBOCATTLEYA, Hort. ex Orch. Rev. 1905, 249 = **Schomburgkio-cattleya**, Hort. (Orchid.).
spiralis, Hort. ex Orch. Rev. l. c. = Schomburgkio-cattleya spiralis.

SCHOMBURGKIA, Lindl. (Orchid.).
campecheana, Kraenzl. in Gard. Chron. 1903, II. 381.—Am. cent.

SCHOMBURGKIO-CATTLEYA, Hort. ex Journ. Soc. Hort. Fr. 1903, 534. Gen. hybr. ORCHIDACEARUM.
spiralis, Hort. l. c.—Hybr.

SCHREBERA, Roxb. (Oleac.).
americana, Gilg. in Engl. Jahrb. xxx. 71 (= Nathusia americana).—Peruv.
argyrotricha, Gilg, l. c. 74.—Afr. austr.
Holstii, Gilg, l. c. 72 (= Nathusia Holstii).—Afr. trop.
latialata, Gilg, l. c. 73.—Afr. austr.
obliquifoliolata, Gilg, l. c. 72.—Afr. trop.
oligantha, Gilg, l. c. 71.—Afr. trop.
tomentella, Gilg, l. c. 74.—Afr. trop.
Welwitschii, Gilg, l. c. 73.—Afr. trop.

SCHRENKIA, Fisch. & Mey. (Umbell.).
songarica, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xxiii. 163.—As. cent.
syrdarjensis, Lipsky, l. c. 160.—As. cent.

SCHULTESIA, Mart. (Gentian.).
guyanensis, Malme, in Arkiv Bot. Stockh. iii. no. 12, 9 (= Exacum guianense).—Bras.
Hassleriana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 549.—Parag.

SCHUMANNIANTHUS, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. li. (1904) 169. MARANTACEAE.
dichotomus, Gagnep. l. c. 176 (= Phrynium dichotomum).—As. or. austr.

SCHUURMANSIA, Blume, (Violac.).
Gilgiana, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 319.—N. Guin.

SCHAWBEA, Endl. (Acanth.).
salicifolia, Lindau, in Engl. Jahrb. xxxiii. (1902) 191.—Afr. trop.

SCHYCHOWSKYA, Endl. (Urtic.).
[Fleurya, Gaudich. I. K.]
interrupta, W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. 371 (= Urtica interrupta).—Geront. trop.

SCIADOPANAX, Seem. (Aral.).
[Panax, Linn. I. K.]
Albersiana, Viguier, in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. 305 (= Polyscias Albersiana).—Afr. trop.
Elliotii, Viguier, l. c. (= Polyscias Elliotii).—Afr. trop.
farinosa, Viguier, l. c. 304 (= Aralia farinosa).—Afr. trop.
ferruginea, Viguier, l. c. (= Panax ferrugineum).—Afr. trop.
floccosa, Viguier, l. c. (= Panax floccosum).—Madag.
fulva, Viguier, l. c. (= Panax fulvum).—Afr. trop.
Grevei, Viguier, l. c. (= Panax Grevei).—Madag.
malosana, Viguier, l. c. 305 (= Polyscias malosana).—Afr. trop.
polybotrya, Viguier, l. c. (= Polyscias polybotrya).—Afr. trop.
Preussii, Viguier, l. c. (= Polyscias Preussii).—Afr. trop.

SCIADOPHYLLUM, P. Br. (Aral.).
systylum, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xxxi. 113.—Am. cent.
umbellatum, N. E. Br. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. vi. 32.—Guian.

SCIAPHILA, Blume, (Triurid.).
corallophyton, K. Schum. & Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 64.—Ins. Bismarck.
flosculosa, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. 650, in obs.—Ins. Philipp.
japonica, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. (1902) 211.—Japon.
macra, K. Schum. & Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 65.—Ins. Bismarck.
monticola, K. Schum. & Schlechter, l. c.—Ins. Bismarck.
torricellensis, K. Schum. & Schlechter, l. c. 64.—N. Guin.
tosaensis, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xix. 140.—Japon.

SCILLA, Linn. (Liliac.).
aggregata, Baker, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1001.—Afr. austr.
Antunesii, Engl. Jahrb. xxxii. 94.—Afr. trop.
axillaris, C. H. Wright, in Gard. Chron. 1903, I. 386.—Hab. ?
Baumiana, Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 195.—Afr. trop.
Conrathii, Baker, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1002.—Afr. austr.
eriospermoides, Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 195.—Afr. trop.
Fehri, Baker, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 788.—Afr. austr.
graminifolia, Baker, l. c. iv. 1001.—Afr. austr.
hypoxidioides, Schoenl. in Rec. Albany Mus. i. 48.—Afr. austr.
londonensis, Baker, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1002.—Afr. austr.
marginata, Baker, l. c.—Afr. austr.
Neumannii, Engl. Jahrb. xxxii. 95.—Afr. trop.
pubescens, Baker, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 853.—Afr. austr.
Radkae, Davidoff, in Magyar Bot. Lap. iv. 29.—Bulgar.
Rehmanni, Baker, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 853.—Afr. austr.
Schlechteri, Baker, l. c. iv. 1002.—Afr. austr.
tristachya, Baker, l. c. 1001.—Afr. austr.

SCINDAPSUS, Schott (Arac.).
falcifolius, Engl. Jahrb. xxxvii. 119.—Celebes.
siamensis, Engl. in Bot. Tidsskr. xxiv. 273.—Malaya.

SCIRPUS, Linn. (Cyperac.).
atrocinctus, Fernald, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 1045.—Am. bor.
depauperatus, Kom. in Act. Hort. Petrop. xx. 345.—As. bor.
equisetiformis, Meinsh. in Act. Hort. Petrop. xviii. 261.—Turkest.
Fernaldi, E. P. Bickn. in Torreya, i. 96.—Am. bor.
filipes, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 249.—China.
fimbristyloides, K. Schum. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 436 = Bulbostylis Schimperiana.
fontinalis, Harper, in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 322.—Am. bor.
fuirenoides, Maxim. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 250.—China.
hemiuncialis, C. B. Clarke, in Wildem. Pl. Nov. Hort. Then. 23, t. 6.—Afr. austr.
heterochaetus, Chase, in Rhodora, vi. 70.—Am. bor.
kamerunensis, K. Schum. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 435 = Bulbostylis erraticus.
karuizawensis, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xviii. 119.—Japon.
Klingei, Meinsh. in Act. Hort. Petrop. xviii. 262.—As. cent.
Kuckenthalianus, Junge, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. xxii. (1905) Beiheft. 73.—Hybr.
leiocarpus, Meinsh. in Act. Hort. Petrop. xviii. 249 (= Fimbristylis leiocarpus).—As. bor.
Lugardi, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 458.—Afr. trop.
Macounii, Holm, in Amer. Journ. Sci. Ser. IV. xviii. 21.—Am. bor.
Michelii, Bub. Fl. Pyren. iv. 204 = Michelianus.

SCIRPUS:—
mitsukurianus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 7.—Japon.
multicalamis, Bub. Fl. Pyren. iv. 204 = Eleocharis multicaulis.
multiculmeus, Bub. l. c. = Eleocharis multicaulis.
occidentalis, *Chase, in Rhodora*, vi. 68.—Am. bor.
oxylepis, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 263.—Rossia.
Philippii, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 32.—Chili.
polyopsis, Bub. Fl. Pyren. iv. 197 = maritimus.
pseudo-fluitans, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 28.—Japon.
sachalinensis, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 260.—Sibir.
saximontanus, *Fernald, in Rhodora*, iii. 251.—Am bor.
Schmidtianus, *Junge, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anst.* xxii. *Beiheft.* 72.—Hybr.
schotensis, *Meinsch. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 248.—Sibir.
Stauntoni, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 253.—China.
turkestanicus, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 247 (= *Isolepis turkestanica*).—Turkest.
verruciferus, *Meinsh. l. c.* 246 (= *Isolepis verrucifera*).—Manchuria.
Wardianus, *J. R. Drummond, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 147.—Baluch.
xerophilus, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 142.—Bras.

SCLERIA, Berg (Cyperac.).
Acriulus, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 509 (= *Acriulus madagascariensis*).—Afr. trop.
Curtissii, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 200.—Am. bor.
cuyabensis, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 144.—Bras.
glabra, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 200.—Am. bor.
greigiifolia, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 509 (= *Acriulus greigiifolius*).—Afr. trop.
nyasensis, *C. B. Clarke, l. c.* 504.—Afr. trop.
pusilla, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 144.—Bras.
violacea, *Pilg. l. c.*—Bras.

SCLEROCARPUS, Jacq. (Compos.).
major, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1250.—Am. bor.
sessilifolius, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 38.—Mexic.

SCLEROLOBIUM, Vog. (Legum.).
Beaurepairei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. *Beibl.* lxxii. 23.—Bras.
Melinonii, *Harms, l. c.* 24.—Guiana.
Pilgerianum, *Harms, l. c.*—Bras.
Urbanianum, *Harms, l. c.* 23.—Bras.

SCLEROTHECA, A. DC. (Campan.).
viridiflora, *Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 285.—Ins. Cook.

SCOLOPIA, Schreb. (Bixac.).
theifolia, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 350.—Afr. trop.

SCOLOSANTHUS, Vahl (Rubiac.).
bahamensis, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 452.—Ind. occ.
densiflorus, *Urb. Symb. Antill.* iii. 381.—Ind. occ.

SCOPARIA, Linn. (Scrophul.).
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 291.—Parag.
nudicaulis, *Chod. & Hassl. l. c.*—Parag.

SCORODOPHLOEUS, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. 77 (1901). *LEGUMINOSAE.*
Zenkeri, *Harms, l. c.* 78.—Afr. trop.

SCORZONERA, Linn. (Compos.).
amasiana, *Hausskn. & Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 24, descr.—As. Min.
multiceps, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 272.—Oriens.
Reverchoni, *O. Debeaux, ex Hervier, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xv. (1905) 107.—Eur.
rupicola, *Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xx. 25, descr.—Persia.

SCROPHULARIA, Tourn. (Scrophul.).
glabrata, *Davidson, in Bull. S. Calif. Acad. Sci.* i. (1902) 26.—Am. bor.

SCROPHULARIA:—
micradenia, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 277.—Oriens.
neglecta, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 1058.—Am. bor.
pallescens, *Lowe, ex Menez. in Ann. Sci. Nat. Porto*, viii. 96.—Ins. Mader.
serrulata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1058.—Am. bor.

SCULERTIA, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 468, sphalm. = **Scubertia**, Kunth (Liliac.).

SCUTELLARIA, Riv. (Labiat.).
Austinae, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 493.—Calif.
Bushii, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 785.—Am. bor.
Bussei, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 120.—Afr. trop.
Churchilliana, *Fernald, in Rhodora*, iv. 138.—Am. bor.
glabriuscula, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 156.—Am. bor.
Helleri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1024.—Am. bor.
leucantha, *Loes. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 167.—Reg. Amaz.
linearifolia, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 493.—Calif.
longiflora, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 437.—Am. bor.; Ind. occ.
Mellichampii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1022.—Am. bor.
nevadensis, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 492.—Am. bor.
nipponica, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, vi. 54 = transitra.
platensis, *Speg. in Com. Mus. Buenos Aires*, i. 320.—Reg. Argent.
pusilla, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxx. 393.—Afr. trop.
sanhedrinus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 31.—Calif.
semicircularis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 116.—Burma.
transitra, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xviii. 70.—Japon.
trinervata, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 169.—China.
tuberosa, *Vaniot, l. c.* 168.—China.
viarum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 32.—Calif.
violascens, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxx. 392.—Afr. trop.

SCUTINANTHE, Thwaites (Burser.).
[CANARIUM, Linn. I. K.]
Boerlagii, *Hochr. Pl. Bogor. Exsicc.* 64.—Hab.?

SCYPHOSYCE, Baill. (Urtic.).
Gilletii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 26.—Afr. trop.

SCYTANTHUS, Liebm. (Raffles.).
[CYTINUS, Tourn. I. K.]
americanus, *Solms, in Engl. Pflanzenreich, Raffles.* 17 (= *Cytinus americanus*).—Mexic.
Andrieuxii, *Solms, l. c.* 18 (= *Bdallophyton Andrieuxii*).—Mexic.
oxylepis, *Solms, l. c.* (= *Cytinus oxylepis*).—Mexic.

SCYTOPETALUM, Pierre (Olac.).
brevipes, *Pierre, ex Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. IX. i. 348.—Afr. trop.
Duchesnei, *Engl. Jahrb.* xxxii. 101.—Afr. trop.
latifolium, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. IX. i. 342.—Afr. trop.
Pierreanum, *Van Tiegh. l. c.* 343 (= *Egassea Pierreana*).—Afr. trop.

SEBAEA, Soland. (Gentian.).
Baumii, *Schinz, in Mitth. Geogr. Gesell. Lübeck*, Heft xvii. 27.—Afr. trop.
Brehmeri, *Schinz, l. c.* 50.—Afr. austr.
confertiflora, *Schinz, l. c.* 52.—Afr. austr.
Conrathii, *Schinz, l. c.* 31.—Afr. austr.
cuspidata, *Schinz, l. c.* 28.—Afr. austr.
Dregei, *Schinz, l. c.* 51.—Afr. austr.
exigua, *Schinz, l. c.* 26 (= *Chironia exigua*).—Afr. austr.
Flanaganii, *Schinz, l. c.* 47.—Afr. austr.
gibbosa, *Dod, in Journ. Bot.* 1901, 401.—Afr. austr.
Gilgii, *Schinz, in Mitth. Geogr. Gesell. Lübeck*, Heft xvii. 27.—Afr. austr.
grandiflora, *Schinz, l. c.* 45.—Afr. austr.
humilis, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 127.—Afr. austr.
laxa, *N. E. Br. l. c.* 128.—Afr. austr.
Macowanii, *Gilg, ex Schinz, in Mitth. Geogr. Gesell. Lübeck*, Heft xvii. 47.—Afr. austr.

SEBAEA:—
Marlothii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 83.—Afr. austr.
multiflora, *Schinz, in Mitth. Geogr. Gesell. Lubeck*, Heft xvii. 44.—Afr. austr.
multinodis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 548.—Afr. trop.
ochroleuca, *Dod, in Journ. Bot.* 1901, 400.—Afr. austr.
oreophila, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxx. 377.—Afr. trop.
pratensis, *Gilg, l. c.*—Afr. trop.
rara, *Dod, in Journ. Bot.* 1901, 401.—Afr. austr.
rhomboidea, *Schinz, in Mitth. Geogr. Gesell. Lübeck*, Heft xvii. 15.—Afr. austr.
saccata, *Schinz, l. c.* 25.—Afr. austr.
scabra, *Schinz, l. c.* 37.—Afr. austr.
Schimperiana, Buching. ex Schinz, in Mitth. Geogr. Gesell. Lübeck, Heft xvii. 28 = brachyphylla.
sclerosepala, *Gilg, ex Schinz, l. c.* 23.—Afr. austr.
transvaalensis, *Schinz, l. c.* 49.—Afr. austr.
vitellina, *Schinz, l. c.* 38.—Afr. austr.
wittebergensis, *Schinz, l. c.* 45.—Afr. austr.

SEBASTIANIA, Spreng. (Euphorb.).
hexaptera, *Urb. Symb. Antill.* iii. 303.—Ind. occ.
mexicana, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 205 (1905).—Mexic.
Picardae, *Urb. Symb. Antill.* iii. 304.—Ind. occ.
Ramirezii, *Maury, in La Naturaleza*, Ser. II. iii. 405.—Mexic.

SECAMONE, R. Br. (Asclep.).
delagoensis, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 35.—Afr. austr.
Dewevrei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 191.—Afr. trop.
dolichorhachys, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 326.—Madag.
floribunda, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 282.—Afr. trop.
leonensis, *N. E. Br. l. c.* 281 (= *Toxocarpus leonensis*).—Afr. trop.
mombasica, *N. E. Br. l. c.* 284.—Afr. trop.
phillyreoides, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 182.—Afr. trop.
rariflora, *S. Moore, l. c.* 183.—Afr. trop.
usambarica, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 281.—Afr. trop.

SECURIDACA, Linn. (Polygal.).
amazonica, *Chod. in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 427.—N. Granat.
cordata, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 688.—Venez.
fallax, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 57.—Parag.

SEDASTRUM, Rose, in N. Am. Fl. xxii. 58 (1905). *CRASSULACEAE.*
chapalense, *Rose, l. c.* 59 (= *Sedum chapalense*).—Mexic.
ebracteatum, *Rose, l. c.* (= *Sedum ebracteatum*).—Mexic.
glabrum, *Rose, l. c.* 58.—Mexic.
Hemsleyanum, *Rose, l. c.* (= *Sedum Hemsleyanum*).—Mexic.
incertum, *Rose, l. c.* 59 (= *Sedum incertum*).—Mexic.
Painteri, *Rose, l. c.* 58.—Mexic.
rubricaule, *Rose, l. c.* 59.—Mexic.

SEDELLA, Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1903) 45. *CRASSULACEAE.*
Congdoni, *Britton & Rose, l. c.* (= *Sedum Congdoni*).—Calif.
pumila, *Britton & Rose, l. c.* (= *Sedum pumilum*).—Calif.

SEDUM, Tourn. (Crassul.).
albanicum, *Beck, in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xix. 74.—Graecia.
anomalum, *Britton, in N. Am. Fl.* xxii. 72 (= *Gormania anomala*).—Calif.
australe, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 41 (1903).—Am. cent.
australe, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. (1905) 16.—Ins. Philipp.
Bodinieri, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 2.—China.
boreale, *Hort. ex Guenthart, Beitr. Blüthenb.* 49.—Hab.?

SEDUM :—
bulbiferum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. (145), nomen. Hab.?
Burnati, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, v. 100.—Corsica.
caerulans, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 3.—China.
calcaratum, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 40.—Mexic.
californicum, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 44.—Calif.
Cockerellii, *Britton, l. c.* 41.—Am. bor.
Conzattii, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 42.—Mexic.
definitum, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 4.—China.
diversifolium, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 44.—Mexic.
frigidum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 282.—Am. bor.
Griffithsii, *Rose, in N. Am. Fl.* xxii. 71.—Am. bor.
guttatum, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 42.—Mexic.
hakonense, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xv. (1901) 35.—Japon.
Havardi, *Rose, in N. Am. Fl.* xxii. 74.—Am. bor.
Hemsleyanum, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 41.—Mexic.
Horakii, *Rohl. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1904, no. 38, 50.—Montenegr.
kuisianum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 60.—Japon.
Leibergii, *Britton, in N. Am. Fl.* xxii. 73.—Am. bor.
longipes, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 43.—Mexic.
luteoviréns, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, v. 100.—Corsica.
minimum, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 40.—Mexic.
muscoideum, *Rose, l. c.* 39.—Mexic.
naviculare, *Rose, l. c.* 42.—Mexic.
Nelsoni, *Rose, l. c.* 43.—Mexic.
nutans, *Rose, l. c.*—Mexic.
oxycoccoides, *Rose, l. c.* 40.—Mexic.
pekinense, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 2.—China.
phyllanthum, *Léveillé & Vaniot, l. c.*—China.
polygamum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 283.—Am. bor.
pruinosum, *Britton, in N. Am. Fl.* xxii. 72.—Calif.
Purpusi, *Rose, in N. Am. Fl.* xxii. 69.—Mexic.
racemiferum, Halacsy, Consp. Fl. Graec. i. 592 = Grisebachii.
roanense, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 497.—Am. bor
Scallanii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 48.—China.
senanense, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 213.—Japon.
shastense, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 41.—Calif.
subalpinum, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 61.—Am. bor.
submontanum, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 40.—Mexic.
Woodii, *Britton, in N. Am. Fl.* xxii. 73.—Am. bor.
Wootoni, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 44.—Am. bor.
Yabeanum, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 10.—Japon.
yedoense, Makino, l. c. xix. 67 = japonicum.
yosemitense, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 44.—Calif.

SELAGO, Linn. (Selagin.).
aggregata, *Rolfe, in Dyer, Fl. Cap.* v. 152.—Afr. austr.
Atherstonei, *Rolfe, l. c.* 156.—Afr. austr.
Barbula, *Harv. ex Rolfe, l. c.* 137.—Afr. austr.
Bolusii, *Rolfe, l. c.* 145.—Afr. austr.
brevifolia, *Rolfe, l. c.* 150.—Afr. austr.
Burchellii, *Rolfe, l. c.* 139.—Afr. austr.
Burkei, *Rolfe, l. c.* 146.—Afr. austr.
compacta, *Rolfe, l. c.* 155.—Afr. austr.
Cooperi, *Rolfe, l. c.* 136.—Afr. austr.
corrigioloides, *Rolfe, l. c.* 163.—Afr. austr.
curvifolia, *Rolfe, l. c.* 173.—Afr. austr.
diosmoides, *Rolfe, l. c.* 169.—Afr. austr.
elata, *Rolfe, l. c.* 156.—Afr. austr.

SELAGO :—
ferruginea, *Rolfe, in Dyer, Fl. Cap.* v. 147.—Afr. austr.
Flanaganii, *Rolfe, l. c.* 138.—Afr. austr.
foliosa, *Rolfe, l. c.* 152.—Afr. austr.
Forbesii, *Rolfe, l. c.* 139.—Afr. austr.
fruticulosa, *Rolfe, l. c.* 169.—Afr. austr.
Goetzei, *Rolfe, ex Engl. in Engl. Jahrb.* xxx. 403.—Afr. trop.
humilis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Cap.* v. 162.—Afr. austr.
Junodii, *Rolfe, in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich*, xlix. 196.—Afr. austr.
lamprocarpa, *Schlechter, ex Rolfe, in Dyer, Fl. Cap.* v. 170.—Afr. austr.
lepidioides, *Rolfe, l. c.* 157.—Afr. austr.
linearifolia, *Rolfe, l. c.* 144.—Afr. austr.
linearis, *Rolfe, l. c.* 140.—Afr. austr.
lithospermoides, *Rolfe, l. c.* 138.—Afr. austr.
longiflora, *Rolfe, l. c.* 159.—Afr. austr.
longipedicellata, *Rolfe, l. c.*—Afr. austr.
longituba, *Rolfe, l. c.* 151.—Afr. austr.
lydenbergensis, *Rolfe, l. c.* 156.—Afr. austr.
Morrisii, *Rolfe, l. c.* 170.—Afr. austr.
Muddii, *Rolfe, l. c.* 157.—Afr. austr.
Mundii, *Rolfe, l. c.* 168.—Afr. austr.
natalensis, *Rolfe, l. c.* 151.—Afr. austr.
Nelsoni, *Rolfe, l. c.* 152.—Afr. austr.
ovata, *Rolfe, l. c.* 143.—Afr. austr.
pachypoda, *Rolfe, l. c.* 136.—Afr. austr.
pubescens, *Rolfe, l. c.* 138.—Afr. austr.
punctata, *Rolfe, l. c.* 151.—Afr. austr.
ramosissima, *Rolfe, l. c.* 170.—Afr. austr.
Rehmanni, *Rolfe, l. c.* 157.—Afr. austr.
rigida, *Rolfe, l. c.* 147.—Afr. austr.
robusta, *Rolfe, l. c.* 143.—Afr. austr.
Rustii, *Rolfe, l. c.* 158.—Afr. austr.
Sandersoni, *Rolfe, l. c.* 136.—Afr. austr.
Saundersiae, *Rolfe, l. c.* 144.—Afr. austr.
Schlechteri, *Rolfe, l. c.* 139.—Afr. austr.
setulosa, *Rolfe, l. c.* 150.—Afr. austr.
speciosa, *Rolfe, l. c.* 144.—Afr. austr.
Thomii, *Rolfe, l. c.* 171.—Afr. austr.
transvaalensis, *Rolfe, l. c.* 158.—Afr. austr.
Tysoni, *Rolfe, l. c.* 158.—Afr. austr.
villicalyx, *Rolfe, l. c.* 135.—Afr. austr.
villicaulis, *Rolfe, l. c.* 140.—Afr. austr.
villosa, *Rolfe, l. c.* 156.—Afr. austr.
Wilmsii, *Rolfe, l. c.* 151.—Afr. austr.
Woodii, *Rolfe, l. c.* 155.—Afr. austr.
Zeyheri, *Rolfe, l. c.* 147.—Afr. austr.

SELENIA, Nutt. (Crucif.).
aperta, *Small, Fl. S. E. U. S.* 486.—Am. bor.

SELINUM, Linn. (Umbell.).
coreanum, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 956.—China.
cryptotaenium, *Boissieu, l. c.* 847.—China.
melanotilingia, *Boissieu, l. c.* 956.—China.
Oliverianum, *Boissieu, l. c.* 846.—China.

SEMECARPUS, Linn. f. (Anacard.).
Elmeri, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 26.—Ins. Philipp.
Engleriana, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 303.—N. Guin.
laxiflora, *K. Schum. l. c.* 302.—N. Guin.
macrophylla, *Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull.* i. 33.—Ins. Philipp.
macrothyrsa, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 26.—Ins. Philipp.
Merrilliana, *Perkins, l. c.* 27.—Ins. Philipp.
micrantha, *Perkins, l. c.*—Ins. Philipp.
sideroxyloides, *Perkins, l. c.* 28.—Ins. Philipp.
Taftiana, *Perkins, l. c.*—Ins. Philipp.
trachyphylla, *Perkins, l. c.* 29.—Ins. Philipp.
venenosa, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 467.—Ins. Carol.

SEMIAQUILEGIA, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 119 (1902). *RANUNCULACEAE.*
adoxoides, *Makino, l. c.* (= *Isopyrum adoxoides*).—Japon.

SEMPERVIVUM, Rupp. (Crassul.).
Candollei, *Rouy & Cam. Fl. de Fr.* vii. 139.—Eur.
Kindingeri, *Adam. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxiv. 125.—Turcia.
Simonkaianum, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* i. 134.—Eur.
velutinum, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1901, ii. 318.—Ins. Canar.?
Wolfianum, *Chenev. in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève*, ix. 130.—Hybr.

SENEBIERA, DC. (Crucif.).
Ruellii, Bub. Fl. Pyren. iii. 246 = S. Coronopus.

SENECIO, Linn. (Compos.).
achyrotrichus, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 105.—China.
Adamsi, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 379.—Am. bor.
affinis, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
alatipes, *Greenm. l. c.* 21, nomen.—Am. bor.
albescens, *Burb. & Colgan, ex Burb. in Ir. Nat. & Journ. Bot.* Dec. 1902.—Hybr.
albonervius, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
amadorensis, *Greenm. l. c.* 20, nomen.—Am. bor.
ambifarius, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 134.—Afr. trop.
Ameghinoi, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 7.—Patag.
anacletus, *Greene, in Pittonia*, iv. (1901) 307.—Am. bor.
Antunesii, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 151.—Afr. trop.
appendiculatus, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 90, nomen.—Am. bor.
arenicola, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 161.—Chili.
argentatus, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 373.—Patag.
Aschersonianus, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 642.—N. Granat.
atriapiculatus, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1026.—Am. bor.
Bagshawei, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 178.—Afr. trop.
Bakeri, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 205.—Chili.
Baumii, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 422.—Afr. trop.
Bernoullianus, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
Bodinieri, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 348.—China.
brachyanthus, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
breviligulatus, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 639.—N. Granat.
brevilimbus, *S. Moore, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1021.—Afr. trop.
calyculatus, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 419.—Am. cent.
camporum, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
capillarifolius, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 8.—Patag.
carnerensis, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
Chaberti, *Petitm. in Monde des Pl.* Sér. II. vi. 48.—Hybr.
chersodomus, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 261 (= *Chersodoma candida*).—Chili.
chicharrensis, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
choiquelauensis, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 6.—Patag.
chrismarii, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
chrysanthus, *Greenm. l. c.* 21, nomen.—Am. bor.
chubutensis, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 9.—Patag.
coahuilensis, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 19, nomen.—Am. bor.
colu-huapiensis, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 5.—Patag.
conchilobus, *Engelm. ex Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
congolensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 56.—Afr. trop.
contristatus, *Greene, Pl. Baker.* iii. 24.—Am. bor.
convallium, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 20. nomen.—Am. bor.
convolvuloides, *Greenm. l. c.* 22, nomen.—Am. bor.
Conzattii, *Greenm. l. c.* 21, nomen.—Am. bor.
copeyensis, *Greenm. l. c.* 22, nomen.—Am. bor.
cotuloides, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 155.—Chili.
Coulteri, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
Crawfordii, *Britton, in Torreya*, i. 21.—Am. bor.
crepidineus, *Greene, in Ottawa Naturalist*, xv. 250.—Am. bor.
cristobalensis, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 22, nomen.—Am. bor.

SENECIO :—

cryphiactis, O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 423.—Afr. trop.
decompositus, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 634.—Venez.
decorus, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
Dekindtianus, Volkens & O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxxii. 161.—Angola.
diabolicus, Speg. Nov. Add. Fl. Patag. ii. (1902), repr. 10.—Patag.
dididymantha, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 508.—China.
diffusus, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
dileptiifolius, Greene, in Ottawa Naturalist, xv. 251.—Am. bor.
dolichopappes, O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxx. 438.—Afr. trop.
Dryas, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 504.—China.
Duclouxii, Dunn, l. c.—China.
Dusenii, O. Hoffm. ex P. Dusén, in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. viii. 21.—Patag.
Eggersii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 645.—Ecuador.
Elliotii, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 360.—Afr. trop.
ellipticifolius, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 637.—N. Granat.
Engleri, Hieron. l. c. 644.—Ecuador.
ericoides, Reiche, Fl. Chile, iv. 264.—Chili.
Ervendbergii, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 19, nomen.—Am. bor.
fibrillosus, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 505.—China.
filicifolius, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
firmipes, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. 119.—Am. cent.
foetidus, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 377.—Am. bor.
foliolosus, Reiche, Fl. Chile, iv. 236.—Chili.
Fremontii, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 1028.—Am. bor.
ganpinensis, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xii. (1903) 19.—China.
Gentilianus, Vaniot, l. c. xi. (1902) 350.—China.
Gilgii, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
glanduloso-hirtellus, Reiche, Fl. Chile, iv. 172.—Chili.
glumaceus, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 505.—China.
Greenmanianus, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 643.—Venez.
Guerkei. Hieron. l. c. 646.—N. Granat.
Hartmannii, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
hederoides, Greenm. l. c. 22, nomen.—Am. bor.
Henrici, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 351.—China.
hirsuticaulis, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
Hoi, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 506.—China.
Hugonis, S. Moore, in Journ. Bot. 1906, 142.—China.
hypomalacus, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
incisus, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 61 (= Jacobaea incisa).—Sicil.
inutilis, Speg. Nov. Add. Fl. Patag. ii. (1902), repr. 11.—Patag.
iodanthus, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
jacalensis, Greenm. l. c. nomen.—Am. bor.
Jacksoni, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 358.—Afr. trop.
Jelskii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 509.—Peruv.
johannesburgensis, S. Moore, in Journ. Bot. 1903, 401.—Afr. austr.
Julianus, Speg. Nov. Add. Fl. Patag. ii. (1902), repr. 8.—Patag.
Karstenii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 641.—N. Granat.
katangensis, O. Hoffm. ex Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. (1903), p. xi.—Afr. trop.
kematongensis, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 347.—China.
Kerberi, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 22, nomen.—Am. bor.

SENECIO :—

kernensis, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
Kingii, Greenm. l. c. nomen.—Am. bor.
koreanus, Kom. in Act. Hort. Petrop. xviii. 421.—China.
Labordei, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 345.—China.
lachnorhizus, O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxxii. 150.—Afr. trop.
lanatifolius, Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 612.—Am. bor.
Langlassei, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
lanicaulis, Greenm. l. c. 22, nomen.—Am. bor.
lapathifolius, Greene, Pl. Baker. iii. 25.—Am. bor.
latipes, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
lentior, S. Moore, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1022.—Afr. trop.
leonensis, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 19, nomen.—Am. bor.
leucanthemus, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 506.—China.
leucanthus, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
Leveillei, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 346.—China.
limosus, O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 422.—Afr. trop.
Lindheimeri, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
lividovulgaris, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 68.—Sicil.
Loeseneri, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 510.—Peruv.
longipedunculatus, Halacsy, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, liv. 484.—Graecia.
lucens, Urb. Symb. Antill. iii. 413.—Ind. occ.
luticola, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 507.—China.
macropus, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
Magnusii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 642.—N. Granat.
majus, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 118 = Whippleanus.
Martini, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 346.—China.
maulinus, Reiche, Fl. Chile, iv. 270.—Chili.
metallicorum, S. Moore, in Journ. Bot. 1908, 134.—Afr. austr.
milanjiensis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 359.—Afr. trop.
mohinorensis, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
monanthos, Diels, in Engl. Jahrb. xxix. 621.—China.
montuosus, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 354.—Afr. trop.
multicapitatus, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
multnomensis, Greenm. l. c. 20, nomen.—Am. bor.
Murrayi, Bornm. in Engl. Jahrb. xxxiii. Beibl. lxxii. 1.—Ins. Canar.
Mustersi, Speg. Nov. Add. Fl. Patag. ii. (1902), repr. 12.—Patag.
nandensis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 360.—Afr. trop.
oreganus, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 377.—Am. bor.
oreophilus, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
oreopolus, Greenm. l. c. nomen.—Am. bor.
pachyrhizus, O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxx. 435.—Afr. trop.
paeninsularis, S. Moore, in Journ. Bot. 1904, 374.—Patag.
pagosanus, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 7.—Am. bor.
paucinervis, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 507.—China.
Paulsenii, O. Hoffm. ex Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1903, 152.—As. cent.
pembrinensis, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 19, nomen.—Am. bor.
pentodontus, Greene, Pl. Baker. iii. 26.—Am. bor.
petasioides, Greenm. in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 419.—Am. cent.
Philippii, Wildem. Rés. Voy. Belgica, Bot. 172.—Reg. Magell.
Pilgerianus, Diels, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 106.—China.

SENECIO :—

platensis, Arech. in Anal. Mus. Montevid. Sér. II. i. 11.—Urug.
pleistocephalus, S. Moore, in Journ. Bot. 1905, 170.—Afr. austr.
poculiferus, S. Moore, l. c. 1904, 376.—Patag.
popayanensis, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 638.—N. Granat.
potosinus, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
Prichardi, S. Moore, in Journ. Bot. 1904, 375.—Patag.
prionophyllus, Greene, in Ottawa Naturalist, xv. 250.—Am. bor.
profundorum, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 507.—China.
pseudosonchus, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 349.—China.
pseudosylvaticus, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 63 = aegyptius.
pseudotomentosus, Mackenzie & Bush, in Trans. Acad. St. Louis, xii. 87.—Am. bor.
psiadioides, O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxx. 436.—Afr. trop.
pterocaulis, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. 119.—Mexic.
putcalensis, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 635.—Ecuador.
pyrrhochrous, Greene, Pl. Baker. iii. 24.—Am. bor.
pyroloides, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
Ragazzii, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. 190.—Afr. trop.
Rautanenii, S. Moore, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1022.—Afr. trop.
reglensis, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
rhyacophilus, Greenm. l. c. 21, nomen.—Am. bor.
Robinsonianus, Greenm. l. c. 22, nomen.—Am. bor.
Rolandi-Bonaparte, Wolf, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 20.—Eur.
Rosei, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
Rothschuhianus, Greenm. l. c. xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
Rothrockii, Greenm. l. c. 20, nomen.—Am. bor.
rotundus, Small, Fl. S. E. U. S. 1304.—Am. bor.
ruwenzoriensis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 355.—Afr. trop.
Santarosae, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
semicordatus, Mackenzie & Bush, in Rep. Missouri Bot. Gard. 1905, 107.—Am. bor.
seminiveus, Wood & Evans, in Natal Colon. Herb. Rep. 1900 (1901), 8; et in Journ. Bot. 1901, 169.—Afr. austr.
sericeo-nitens, Speg. Nov. Add. Fl. Patag. ii. (1902), repr. 6.—Patag.
serraquitchensis, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
Sichenanus, Busch, in Bull. Jard. Bot. Pétersb. v. 135.—As. Min.
solenoides, Dunn, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 508.—China.
sonchoides, Lojac. Fl. Sic. ii. t. 66.—Sicil.
sordidus, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
sotikensis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 357.—Afr. trop.
sparsilobatus, Parish, in Coult. Bot. Gaz. xxxviii. 462.—Calif.
spartareus, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 358.—Afr. trop.
streptothamnus, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
subauriculatus, Greenm. l. c. 21, nomen.—Am. bor.
Szyszylowiczii, Hieron. in Engl. Jahrb. xxxvi. 508.—Peruv.
teliformis, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
telmatophilus, O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 423.—Afr. trop.
tener, O. Hoffm. in Engl. Jahrb. xxx. 434.—Afr. trop.
Theresiae, O. Hoffm. in Beih. Bot. Centralbl. xiii. 55.—Peruv.
Tonduzii, Greenm. in Engl. Jahrb. xxxii. 23, nomen.—Am. bor.
transmarinus, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 356.—Afr. trop.

SENECIO :—
trianthemos, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 437.—Afr. trop.
tripinnatifidus, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 466.—Chili.
trixioides, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
tropaeolifolius, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 437.—Afr. trop.
tugelensis, *Wood & Evans, in Natal Colon. Herb. Rep.* 1900 (1901), 8; *et in Journ. Bot.* 1901, 169.—Afr. austr.
uintahensis, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
ukingensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 435.—Afr. trop.
ulloocosanus, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 637.—N. Granat.
Urbani, *Hieron. l. c.* 640.—N. Granat.
Urumovi, *Velen. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 52.—Eur.
urundensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 355.—Afr. trop.
uspantanensis, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 22, nomen.—Am. bor.
ussanguensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 438.—Afr. trop.
Vaseyi, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
Veitchianus, *Hemsl. in Gard. Chron.* 1905, II. 212.—China.
viejensis, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 21, nomen.—Am. bor.
viscidus, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 124.—Afr. austr.
vittatus, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 169.—Chili.
vulgari-humilis, *Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis*, 187.—Afr. bor.
Watsoni, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 19, nomen.—Am. bor.
willowensis, *Greenm. l. c.* 20, nomen.—Am. bor.
Wilsonianus, *Hemsl. in Gard. Chron.* 1905, II. 212.—China.
Wolfii, *Greenm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 20, nomen.—Am. bor.
Wrightii, *Greenm. l. c.* nomen.—Am. bor.
xenostylus, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 150.—Afr. trop.

SEPTILIA Rafin. (Scrophul.).
[Herpestis, Gaertn. f. I. K.]
caroliniana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1064 (= *Obolaria caroliniana*).—Am. bor.
crenulata, *Small, l. c.* (= *Monniera crenulata*).—Am. bor.

SEQUOIA, Endl. (Conif.).
Washingtoniana, *Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest.* xiv. 61 (= *Wellingtonia gigantea*).—Calif.

SERAPIAS, Linn. (Orchid.).
Garbariorum, *Murr, in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1901, 117; *et ex M. Schulze, in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xvii. 40.—Hort.

SERICOCARPUS, Nees (Compos.).
acutisquamosus, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1206.—Am. bor.

SERICOCOMA, Fenzl (Amarant.).
heterochiton, *Lopr. in Malpighia*, xiv. 441.—Afr. trop.
leucoclada, *Lopr. l. c.* 440.—Afr. trop.
shepperioides, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 872.—Afr. trop.

SERICOSTACHYS, Gilg & Lopr. in Malpighia, xiv. (1901) 448. *AMARANTACEAE.*
scandens, *Gilg & Lopr. l. c.* 449.—Afr. trop.
tomentosa, *Lopr. l. c.* 450.—Afr. trop.

SERJANIA, Plum. (Sapind.).
brachyptera, *Radlk. in Engl. Jahrb.* xxxvii. 145.—Peruv.
columbiana, *Radlk. l. c.* 149.—N. Granat.
corindifolia, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. (1903) 210.—Mexic.
flaviflora, *Radlk. l. c.* 211.—Mexic.
fuscostriata, *Radlk. in Engl. Jahrb.* xxxvii. 147.—Peruv.
grandidens, *Radlk. l. c.* 144.—N. Granat.
incana, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 806.—Parag.
inscripta, *Radlk. in Engl. Jahrb.* xxxvii. 145.—Bras.

SERJANIA :—
longistipula, *Radlk. in Engl. Jahrb.* xxxvii. 148.—Peruv.
pannifolia, *Radlk. l. c.* 146.—Boliv.
striolata, *Radlk. l. c.* 147.—Peruv.

SERRATULA, Dill. (Compos.).
lycopifolia, *Fiori, in Fiori & Paol. Fl. Ital.* iii. 320; *Fiori & Paol. Ic. Fl. Ital.* 441.—Ital.
Martini, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 21.—China.

SERSALISIA, R. Br. (Sapot.).
[Lucuma, Molina. I. K.]
Afzelii, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 30.—Afr. trop.
cerasifera, *Engl. l. c.* (= *Sapota cerasifera*).—Afr. trop.
disaco, *Engl. l. c.* (= *Chrysophyllum disaco*).—Afr. trop.
Kaessneri, *Engl. l. c.* 31.—Afr. trop.
usambarensis, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

SESAMOTHAMNUS, Welw. (Pedal.).
Erlangeri, *Engl. Jahrb.* xxxii. 113.—Afr. trop.
Busseanus, *Engl. l. c.* 114.—Afr. trop.
Rivae, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

SESAMUM, Linn. (Pedal.).
repens, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 371.—Afr. trop.

SESBANIA, Scop. (Legum.).
affinis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 141.—Afr. trop.
coerulescens, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 260.—Afr. trop.
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 327.—Afr. trop.
microphylla, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 260.—Afr. trop.
paludosa, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 82 (1897) (= *Aeschynomene paludosa*).—Ind. or.

SESELI, Linn. (Umbell.).
Alexeenkoi, *Lipsky, in Act. Hort. Tiflis*, vi. i. 55.—Reg. Caucas.
anomalum, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 359.—Hispan.
arcticum, *Calest. in Martelli, Webbia*, 203 (= *Libanotis arctica*).—Rossia.
giganteum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 140.—As. cent.
karateginum, *Lipsky, l. c.* 141.—As. cent.
Provostii, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 842.—China.
pubicarpum, *Simk. in Magyar Bot. Lap.* iii. 84.—Eur.
splendens, *Calest. in Martelli, Webbia*, 199 (= *Ligusticum splendens*).—Reg. Pyren.

SESELINIA, G. Beck (Umbell.).
[Seseli, Linn. I. K. S. I.]
serbica, *Calest. in Martelli, Webbia*, 182 (= *Seseli serbicum*).—Eur.

SESLERIA, Scop. (Gramin.).
insularis, *Sommier, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1905, 126.—Ins. Balear.
latifolia, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* iv. 133.—Serbia.

SETARIA, Beauv. (Gramin.).
abyssinica, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 460.—Afr. trop.
apiculata, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxviii. I. 417 (= *Chaetochloa apiculata*).—Austral.
brevispica, *K. Schum. l. c.* (= *Chaetochloa brevispica*).—Eur.
gibbosa, *K. Schum. l. c.* (= *Chaetochloa gibbosa*).—Am. bor.
Glaziovii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 460.—Bras.
Hassleri, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 275.—Parag.
hispida, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxviii. I. 417 (= *Chaetochloa hispida*).—Ind. occ.
leiantha, *Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 78.—Reg. Argent.
leucopila, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxviii. I. 417 (= *Chaetochloa leucopila*).—Mexic.
macrosperma, *K. Schum. l. c.* (= *Chaetochloa macrosperma*).—Am. bor.
panis, *Jessen, Deutsch. Graeser*, 248.—Eur.
rigida, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxviii. I. 417 (= *Chaetochloa rigida*).—Am. bor.
villosissima, *K. Schum. l. c.* (= *Chaetochloa villosissima*).—Am. bor.

SETOURATEA, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 1902, 35; et in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 192. *OCHNACEAE.*
angusta, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. (1902) 287.—Bras.
Glazioviana, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* 1902, 40; *et in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. (1902) 287.—Bras.
lata, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. (1902) 286.—Bras.
linearis, *Van Tiegh. l. c.* xviii. 13 (= *Gomphia linearis*).—Bras.
stipulata, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* 1902, 39 (= *Ochna stipulata*).—Bras.
tridentata, *Van Tiegh. l. c.*—Bras.
Vellozii, *Van Tiegh. l. c.* 40.—Bras.
Weddelliana, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. (1902) 287 (= *Microuratea Weddelliana*).—Bras.

SEYMERIA, Pursh (Scrophul.).
integrifolia, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 89.—Mexic.

SHAWIA, Forst. (Compos.).
[Olearia, Moench. I. K.]
arguta, *J. Britten, Bot. Cook Voy.* 49 (= *Olearia arguta*).—Austral.

SHERBOURNIA, G. Don (Rubiac.).
bignoniaefolia, *Hua, in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun*, xiv. 394 (= *Gardneria bignoniaefolia*).—Afr. trop.
Brazzaei, *Hua, l. c.*—Afr. trop.
calycina, *Hua, l. c.* (= *Gardneria calycina*).—Afr. trop.
Zenkeri, *Hua, l. c.* (= *Gardneria Zenkeri*).—Afr. trop.

SHOREA, Roxb. (Dipterocarp.).
balangeroides, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* 108.—Arch. Mal.
mollis, *Boerl. l. c.* 110.—Arch. Mal.
obtusoides, *Boerl. l. c.* 107.—Arch. Mal.

SIBBALDIOPSIS, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 499 (1901). *ROSACEAE.*
tridentata, *Rydb. l. c.* 500 (= *Potentilla tridentata*).—Am. bor.

SIBIRAEA, Maxim. (Rosac.).
[Spiraea, Linn. I. K.]
altaiensis, *Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. (1905) 485 (= *Spiraea altaiensis*).—As. cent.
croatica, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* iv. 255.—Croatia.

SICKINGIA, Willd. (Rubiac.).
hexandra, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 38.—Bras.

SICYOS, Linn. (Cucurb.).
peninsularis, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 159 (1903).—Calif.

SIDA, Linn. (Malvac.).
Ameghinoi, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 20.—Patag.
Boivini, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 40.—Ins. Comor.
brachystachys, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 362.—Austral.
callimorpha, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 295.—Parag.
cardiophylla, *Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 362.—Austral.
chubutensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 246.—Patag.
cymbalaria, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 291.—Parag.
Dinteriana, *Hochr. l. c.* ii. 1001.—Afr. trop.
Hassleri, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 33.—Parag.
linoides, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 246 (= *Malvastrum linoides*).—Patag.
longifolia, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 212 (1905).—Mexic.
menispermifolia, *Lignier & Bey, in Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. V. viii. (1904) 248, nomen.—Ind. or.
multicrena, *Hochr. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 295.—Parag.
paraguariensis, *Hochr. l. c.* 294.—Parag.
tehuelches, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 247.—Patag.
texana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 772.—Am. bor.

SIDALCEA, A. Gray (Malvac.).
crenulata, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 93.—Am. bor.
hydrophila, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 107.—Calif.
interrupta, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 75.—Calif.
nervata, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 94.—Am. bor.
ranunculacea, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 76.—Calif.
rostrata, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 80.—Am. bor.

SIDERANTHUS, Nutt. (Compos.).
[APLOPAPPUS, Cass. I. K.]
annuus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 653.—Am. bor.
aureus, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1186 (= *Aplopappus aureus*).—Am. bor.
australis, *Rydb. in Small, l. c.* (= *Eriocarpum australe*).—Am. bor.
Cotula, *Small, l. c.*—Am. bor.
glaberrimus, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 933.—Am. bor.
Gooddingi, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 266.—Am. bor.
grindelioides, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 932 (= *Eriocarpum grindelioides*).—Am. bor.
Machaeranthera, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1186.—Am. bor.
megacephalus, *Small, l. c.* 1185 (= *Eriocarpum megacephalum*).—Am. bor.
phyllocephalus, *Small, l. c.* 1186 (= *Aplopappus phyllocephalus*).—Am. bor.
rubiginosus, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 932 (= *Eriocarpum rubiginosum*).—Am. bor.

SIDERITIS, Tourn. (Labiat.).
euboea, *Heldr. in Delt. Syllog. Parn.* 1900, 4; *ex Halacsy, Consp. Fl. Graec.* ii. 499.—Graecia.
gaditana, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 418.—Eur.
Ibanyenzii, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 68; *et ex Munuera, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 103.—Hispan.

SIDEROCARPOS, Small, in Bull. N. York Bot. Gard. ii. 91. *LEGUMINOSAE.*
flexicaulis, *Small, l. c.* (= *Acacia flexicaulis*).—Am. bor.; Mexic.

SIDEROXYLON, Linn. (Sapot.).
Ahernianum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 55.—Ins. Philipp.
angustifolium, *Merrill, l. c.* 56.—Ins. Philipp.
chrysophylloides, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 122 (= *Micropholis dominicensis*).—Ind. occ.
coriaceum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 44.—Ins. Philipp.
cryptophlebium, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 26 (= *Myrsine cryptophlebia*).—Ins. Aldabra.
domingense, *Urb. Symb. Antill.* v. 135.—Ind. occ.
glomeratum, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 472.—Ins. Carol.
jamaicense, *Urb. Symb. Antill.* v. 134.—Ind. occ.
longepetiolatum, *King & Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc.* ix. 50.—Ind. or.
macranthum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 56.—Ins. Philipp.
portoricense, *Pierre, in Urb. Symb. Antill.* v. 134.—Ind. occ.
quadriloculare, *Pierre, l. c.* 133.—Ind. occ.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1908, 402.—Afr. austr.
ramiflorum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 42.—Ins. Philipp.
uniloculare, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. (1903) 5.—Am. cent.
vitiense, *Burkill, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 44 (= *Sapota vitiensis*).—Ins. Tonga.

SIEGESBECKIA, Linn. (Compos.).
somalensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 342.—Afr. trop.

SIEGLINGIA, Bernh. (Gramin.).
[TRIODIA, R. Br. I. K.]
antarctica, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 214 (= *Triodia antarctica*).—Reg. Magell.

SIEVERSIA, Willd. (Rosac.).
[GEUM, Linn. I. K.]
ciliata, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 509 (= *Geum ciliatum*).—Am. bor.

SIEVERSIA:—
gracilipes, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 4 (= *Potentilla gracilipes*).—Am. bor.
Peckii, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 508 (= *Geum Peckii*).—Am. bor.

SILENE, Linn. (Caryophyll.).
aperta, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 75.—Calif.
Battandierana, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 136.—Alger.
capitata, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 440.—As. or.
concolor, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 153.—Am. bor.
demawendica, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 118.—Persia.
eldana, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 338.—Eur.
emarginata, *Pantu & Procop. in Bul. Erb. Inst. Bot. Bucarest*, i. 94.—Eur.
glaucina, *F. N. Williams, in Journ. Bot.* 1905, 282.—Chili.
grandis, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 487.—Calif.
Hayekiana, *Hand.-Mazz. & Janchen, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 429.—Eur.
jennensis, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 449.—Hispan.
koreana, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 440.—Corea.
oranensis, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 137.—Alger.
Pomeli, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Alger. Tunis*, 66.—Afr. bor.
salsuginosa, *Fomine, in Act. Hort. Tiflis*, vi. iii. 34.—Reg. Caucas.
schugnanica, *B. Fedtsch. in Trav. Mus. Bot. Acad. Petersb.* i. 119.—As. cent.
ventricosa, *Adam. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 180.—Turcia.
Williamsii, *Britton, in Britton & Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 168.—Am. bor.

SILPHIUM, Linn. (Compos.).
angustum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1244.—Am. bor.
confertifolium, *Small, l. c.* 1243.—Am. bor.
Elliottii, *Small, l. c.*—Am. bor.
Gatesii, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 793.—Am. bor.
glabrum, *Eggert, in Small, Fl. S. E. U. S.* 1243.—Am. bor.
ovatifolium, *Small, in Fl. S. E. U. S.* 1242.—Am. bor.

SILVIA, Allem. (Laurac.).
[ENDIANDRA, R. Br. I. K.]
polyantha, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 239.—Bras.

SIMBULETA, Forsk. (Scrophul.).
[ANARRHINUM, Desf. I. K.]
composita, *Pau, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 211.—Hybr.
fruticosa, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 208 (= *Anarrhinum fruticosum*).—Alger.
pedata, *Hochr. l. c.* 207 (= *Anarrhinum pedatum*).—Alger.

SINNINGIA, Nees (Gesner.).
discolor, *Sprague, in Gard. Chron.* 1904, II. 87 (= *Ligeria discolor*).—Bras.
Regina, *Sprague, l. c.*—Bras.

SIPANEA, Aubl. (Rubiac.).
acinifolia, *Spruce, ex Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 433.—Venez.

SIPARUNA, Aubl. (Monim.).
argyrochrysea, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxviii. 702.—Guiana.
calocarpa, *Perkins, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 158.—Peruv.
caloneura, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxviii. 681.—Ind. occ.
cervicornis, *Perkins, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 145.—Reg. Amaz.
chlorantha, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxviii. 677.—Bras.
chrysantha, *Perkins, l. c.* 686.—Boliv.
chrysothrix, *Perkins, l. c.* xxxi. 746.—Am. cent.
cinerea, *Perkins, l. c.* xxviii. 695.—Boliv.
crassiflora, *Perkins, l. c.* 702.—Peruv.
davillifolia, *Perkins, l. c.* 681.—Am. cent.

SIPARUNA:—
exsculpta, *Perkins, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 144.—Peruv.
glossostyla, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxviii. 704.—Bras.
grandiflora, *Perkins, l. c.* 695 (= *Citrosma grandiflora*).—N. Granat.
grisea, *Perkins, l. c.* xxxi. 747.—Am. cent.
griseo-flavescens, *Perkins, l. c.* xxviii. 693.—Am. cent.
harongifolia, *Perkins, l. c.* 686.—Peruv.
hylophila, *Perkins, l. c.* 685.—Bras.
hypoglauca, *Perkins, l. c.* 691.—Boliv.
lepidantha, *Perkins, l. c.* 701.—Am. trop. austr.
loretensis, *Perkins, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 143.—Peruv.
lyrata, *Perkins, l. c.* 142.—Peruv.
macrotepala, *Perkins, l. c.* 140.—Peruv.
magnifica, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxviii. 699.—Peruv.
Mathewsii, *Perkins, l. c.* 680.—Peruv.
microphylla, *Perkins, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 140.—Reg. Amaz.
minutiflora, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxviii. 674.—Bras.
Moriae, *Perkins, l. c.* 675.—Bras.
paralleloneura, *Perkins, l. c.* 688.—Am. cent.
parviflora, *Perkins, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 141.—Peruv.
patelliformis, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxviii. 692.—Am. cent.
pyricarpa, *Perkins, l. c.* 690 (= *Citrosma pyricarpa*).—Peruv.
salvioides, *Perkins, l. c.* 697.—Ecuador.
Santae-Luciae, *Perkins, l. c.* 677.—Ind. occ.
sarmentosa, *Perkins, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 145.—Reg. Amaz.
saurauiifolia, *Perkins, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 155.—Peruv.
scabra, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxviii. 684.—Ind. occ.
spectabilis, *Perkins, l. c.* 686.—Boliv.
steleandra, *Perkins, l. c.* 700.—N. Granat.
stellulata, *Perkins, l. c.* 689.—Venez.
Sumichrastii, *Perkins, l. c.* 682.—Mexic.
tabacifolia, *Perkins, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 144.—Peruv.
tenuipes, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxviii. 680.—Bras.
ternata, *Perkins, l. c.* 691.—N. Granat.
tetraceroides, *Perkins, l. c.* 689.—Am. cent.
tomentosa, *Perkins, l. c.* 691 (= *Citrosma tomentosa*).—Peruv.
Tonduziana, *Perkins, l. c.* xxxi. 746.—Am. cent.
Tulasnei, *Perkins, l. c.* xxviii. 688.—Peruv.
Uleana, *Perkins, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 142.—Peruv.
umbelliflora, *Perkins, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 153.—Peruv.
Urbaniana, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxviii. 683.—Ind. occ.
venezuelensis, *Perkins, l. c.* 679.—Venez.
Weberbaueri, *Perkins, in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 154.—Peruv.

SIPHONANDRIUM, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 394. *RUBIACEAE.*
intricatum, *K. Schum. l. c.* 395.—N. Guin.

SIPHONANTHUS, Linn. (Verben.).
[CLERODENDRON, Linn. I. K.]
capitata, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 198 (= *Clerodendron capitatum*).—Afr. trop.
floribunda, *J. Britten, Bot. Cook Voy.* 75 (= *Clerodendron floribundum*).—Austral.
nuxioides, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 197.—Afr. trop.
rotundifolia, *S. Moore, l. c.* 198 (= *Clerodendron rotundifolium*).—Afr. trop.
triphylla, *Hiern, ex S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 405 (= *Clerodendron triphyllum*).—Afr. austr.

SIPHONELLA, Small, Fl. S. E. U. S. 1129 (1903). *VALERIANACEAE.*
longiflora, *Small, l. c.* (= *Fedia longiflora*).—Am. bor.
Nuttallii, *Small, l. c.* (= *Fedia Nuttallii*).—Am. bor.

SIPHONOGLOSSA, Oerst. (Acanth.).
gentianifolia, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 370.—Parag.
linifolia, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 75 (= *Aulojusticia linifolia*).—Afr. austr.

SIPHONYCHIA, Torr. & Gray (Illecebr.).
pauciflora, *Small, Fl. S. E. U. S.* 402.—Am. bor.

SISYMBRIUM, Linn. (Crucif.).
Ameghinoi, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 217.—Patag.
decumbens, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 60 (= *Schoenocrambe decumbens*).—Am. bor.
erucastroides, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1268 (= *Brassica erucastroides*).—Persia.
fuegianum, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 9 (= *Schizopetalum fuegianum*).—Patag.
hararense, *Engl. Jahrb.* xxxii. 98.—Afr. trop.
Knenckeri, *Bornm. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1903, 45, 127.—Sinai.
maclovianum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 216 = fuegianum.
Morenoanum, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 291.—Reg. Argent.
parvulum, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 25.—As. cent.
pinnatum, Jepson, Fl. W. Mid. Calif. 215 = canescens.
procerum, *K. Schum. in Just's Jahresb.* xxviii. 1. 434 (= *Sophia procera*).—Am. bor.
pseudo-Boissieri, *Degen, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xv. (1906) 170.—Hispan.
robustum, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 290.—Reg. Argent.
subscandens, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* i. (1901), repr. 11.—Patag.
tehuelches, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 218.—Patag.
turcomanicum, *Litw. in Trav. Mus. Bot. Acad. Pétersb.* i. 86.—Turkestan.
turritoides, *Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 90.—Am. cent.
viscosum, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 60 (= *Sophia viscosa*).—Am. bor.

SISYRANTHUS, E. Mey. (Asclep.).
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 200.—Afr. austr.

SISYRINCHIUM, Linn. (Irid.).
amethystinum, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 581.—Am. bor.
amoenum, *E. P. Bickn. l. c.* 584.—Am. bor.
apiculatum, *E. P. Bickn. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 287.—Am. bor.
arenicola, *E. P. Bickn. l. c.*—Am. bor.
biforme, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 575.—Am. bor.
bracteatum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 74.—Mexic.
Brayi, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 585.—Am. bor.
Bushii, *E. P. Bicken. l. c.* 587.—Am. bor.
campestre, *E. P. Bickn. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 286.—Am. bor.
Canbyi, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 588.—Am. bor.
capillare, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1105.—Parag.
colubriferum, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 589.—Am. bor.
Eastwoodiae, *E. P. Bickn. l. c.* 1904, 385.—Calif.
ensigerum, *E. P. Bickn. l. c.* 1901, 580.—Am. bor.
exile, *E. P. Bickn. l. c.* 573.—Am. bor.
Farwellii, *E. P. Bickn. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 287.—Am. bor.
flaccidum, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 591.—Am. bor.
flaviflorum, *E. P. Bickn. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 286.—Am. bor.
fibrosum, *E. P. Bickn. in Small, Fl. S. E. U. S.* 298.—Am. bor.
funereum, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 387.—Calif.
grande, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1106.—Parag.
Greenei, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 383.—Am. bor.
Hasslerianum, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1106.—Parag.
hastile, *E. P. Bickn. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 285.—Am. bor.
Helleri, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 590.—Am. bor.
hesperium, *E. P. Bickn. l. c.* 1904, 390.—Calif.
hirsutum, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1106.—Parag.

SISYRINCHIUM:—
intermedium, *E. P. Bickn. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 286.—Am. bor.
longifolium, *E. P. Bickn. in Small, Fl. S. E. U. S.* 300.—Am. bor.
longipedunculatum, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 577.—Am. bor.
macrocarpon, *E. P. Bickn. l. c.* 576.—Am. bor.
macrophyllum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 28.—Mexic.
maritimum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 48.—Calif.
oreophilum, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 381.—Calif.
Palmeri, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 75.—Mexic.
pruinosum, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 578.—Am. bor.
radicatum, *E. P. Bickn. l. c.* 576.—Am. bor.
recurvatum, *E. P. Bickn. in Small, Fl. S. E. U. S.* 299.—Am. bor.
strictum, *E. P. Bickn. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 288.—Am. bor.
texanum, *E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 576.—Am. bor.
varians, *E. P. Bickn. l. c.* 583.—Am. bor.
violaceum, *E. P. Bickn. in Small, Fl. S. E. U. S.* 301.—Am. bor.

SISYROLEPIS, Radlk. apud F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. (1905) 222. *SAPINDACEAE.*
siamensis, *Radlk. l. c.*—Siam.

SITANION, Rafin. (Gramin.).
[ELYMUS, Linn. I. K.]
albescens, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvi. 57.—Am. bor.
basalticola, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 234.—Am. bor.
ciliatum, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvi. 58.—Am. bor.
marginatum, *Scribn. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 469.—Am. bor.
rubescens, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 234.—Am. bor.
strictum, *Elmer, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvi. 59.—Am. bor.
velutinum, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 233.—Am. bor.

SLOANEA, Linn. (Tiliac.).
meianthera, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 208.—Am. cent.
Nymanii, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 314.—N. Guin.

SMELOWSKIA, C. A. Mey. (Crucif.).
alba, B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop. xxiii. 423 = cinerea.
americana, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 239.—Am. bor.
lineariloba, *Rydb. l. c.* 1904, 555.—Am. bor.
sisymbrioides, *Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 137 (= *Hutchinsia sisymbrioides*).—As. cent.
tibetica, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 76 (= *Capsella Thomsoni*).—As. cent.

SMILAX, Linn. (Liliac.).
brevipes, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 42.—Corsica.
conferta, *Jord. l. c.* 43.—Corsica.
Goetzeana, *Engl. Jahrb.* xxx. 275.—Afr. trop.
inermis, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 43.—Corsica.
intricatissima, *Jord. l. c.* 44.—Gallia.
lata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 264.—Am. bor.
Nebelii, *Gilg. in Engl. Jahrb.* xxxiv. *Beibl.* lxxv. 26.—China.
oxycarpa, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 43.—Corsica.
peduncularis, *Jord. l. c.* 42.—Corsica.
platyphylla, *Jord. l. c.* 43.—Corsica.
subarmata, *O. E. Schulz, in Urb. Symb. Antill.* v. 23.—Ind. occ.

SMITHIA, Ait. (Legum.).
Goetzei, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 329.—Afr. trop.
Harmsiana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 52.—Afr. trop.

SOBOLEWSKIA, Bieb. (Crucif.).
caucasica, *Busch, in Bull. Jard. Bot. Pétersb.* v. 72.—Reg. Caucas.
truncata, *Busch, l. c.*—Reg. Caucas.

SOBRALIA, Ruiz & Pav. (Orchid.).
pubescens, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 347 (= *Palmorchis pubescens*).—Bras.
Rodriguesii, *Cogn. l. c.* 340 (= *Palmorchis sobralioides*).—Bras.
Weberbaueriana, *Kraenzl. in Fedde, Repert. Nov. Sp.* i. 188.—Peruv.

SOLANUM, Linn. (Solan.).
amatitlanense, *Coult. & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 420.—Am. cent.
arizonicum, *Parish, in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 165.—Am. bor.
arrazolense, *Coult. & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 421.—Am. cent.
Brownii, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 747.—Parag.
Buettneri, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 59.—Afr. trop.
Concepcionis, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. iv. 82.—Parag.
darassumense, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 57.—Afr. trop.
dennekense, *Damm. l. c.*—Afr. trop.
Dewevrei, *Damm. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 290.—Afr. trop.
dimorphum, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 56.—Hort.
Durandii, *Damm. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Sér. III. i. 290.—Afr. trop.
Ellenbeckii, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 58.—Afr. trop.
evolvulifolium, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 211.—Am. cent.
Hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 747.—Parag.
interius, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 641.—Am. bor.
ipomaeoides, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 80.—Parag.
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 176.—Afr. trop.
longestamineum, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 58.—Afr. trop.
lyciiforme, *Damm. l. c.* xxxvii. 168.—Reg. Argent.
margaritense, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 695.—Venez.
mazatenangense, *Coult. & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 421.—Am. cent.
mitratum, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 211.—Am. cent.
mollinum, *Fernald, in Sargent, Trees & Shrubs*, i. 97.—Mexic.
paraguariense, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 814.—Parag.
polyadenium, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 89.—Mexic.
pseudoauriculatum, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 81.—Parag.
pseudolycioides, *Chod. & Hassl. l. c.* 84.—Parag.
quichense, *Coult. & Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 422.—Am. cent.
quindiuense, *A. Zahlbr. in Beih. Bot. Centralbl.* xiii. 82.—N. Granat.
racemigerum, *Zodda, in Ann. di Bot. Roma*, ii. 272 (= *Lycopersicum racemigerum*).—Am. bor.
runsoriense, *C. H. Wright, in Johnston, Uganda Prot.* i. 326.—Afr. trop.
Sanctaeclarae, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 211.—Am. cent.
saptaceum, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 60.—Afr. trop.
tenuilobatum, *Parish, in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 165.—Am. bor.
Theresiae, *A. Zahlbr. in Beih. Bot. Centralbl.* xiii. 83.—Boliv.
togoense, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 59.—Afr. trop.
Tuerckheimii, *Greenm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 212.—Am. cent.
turneroides, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 814.—Parag.

SOLANUM :—
umbratile, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 695.—Venez.
Wallacei, *Parish, in Proc. Calif. Acad.* Ser. III. ii. 166.—Am. bor.
Wildemanii, *Damm. ex Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo*, Ser. III. i. 291.—Afr. trop.
wissaduloides, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 105.—Parag.
withaniifolium, *Damm. in Engl. Jahrb.* xxxviii. 58.—Afr. trop.
Zoccagnianum, *Damm. in Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 177, nomen.—Afr. trop.

SOLDANELLA, Linn. (Primul.).
austriaca, *Vierh. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 502.—Eur.
carpatica, *Vierh. l. c.* 504.—Eur.
Jancheni, *Vierh. l. c.* 506.—Hybr.
lungoviensis, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 349.—Hybr.
mixta, *Vierh. in Urb. & Graebn. Festschr. Aschers.* 506.—Hybr.
occidentalis, *Vierh. l. c.* 503.—Eur.
uremanniana, *Vierh. l. c.* 508.—Hybr.
Wettsteinii, *Vierh. l. c.* 507.—Hybr.

SOLENANTHUS, Ledeb. (Borag.).
albanicus, *Degen & Baldacci, in Magyar Bot. Lap.* ii. 315 (=*Cynoglossum albanicum*).—Albania.
karateginus, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 196.—As. cent.
Kuschakewiczii, *Lipsky, l. c.* 182 (=*Kuschakewiczia turkestanica*).—As. cent.
plantaginifolius, *Lipsky, l. c.* 198.—As. cent.
Reverchonii, *Degen, in Magyar Bot. Lap.* ii. 311 (=*Cynoglossum Reverchoni*).—Hispan.
stylosus, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 193 (=*Cynoglossum stylosum*).—As. cent.

SOLIDAGO. Linn. (Compos.).
aureola, *Greene, in Pittonia*, iv. 236.—Am. bor.
austrina, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1200.—Am. bor.
caurina, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 40.—Am. bor.
celtidifolia, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1196.—Am. bor.
chrysolepis, *Fernald, in Ottawa Naturalist*, xix. 168.—Am. bor.
Earlei, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1197.—Am. bor.
hesperius, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 303.—Am. bor.
laeta, *Greene, Pittonia*, v. 138.—Am. bor.
laevicaulis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 649.—Am. bor.
longipetiolata, *Mackenzie & Bush, Fl. Jacks. County*, 194; *et in Trans. Acad. St. Louis*, xii. 87.—Am. bor.
ludoviciana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1199.—Am. bor.
Niederederi, *Khek, in Allg. Bot. Zeitschr.* 1905, 22.—Hybr.
pallescens, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 776.—Am. bor.
pendula, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1197.—Am. bor.
pinetorum, *Small, l. c.* 1200.—Am. bor.
polyphylla, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 651.—Am. bor.
Porteri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1194.—Am. bor.
Pringlei, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 505.—Mexic.
radulina, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 650.—Am. bor.
Randii, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 937.—Am. bor.
rubra, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 649.—Am. bor.
scopulorum, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 264.—Am. bor.
serra, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 650.—Am. bor.
strigosa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1198.—Am. bor.
Vaseyi, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 7 (1900); *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 776.—Am. bor.
venulosa, *Greene, Pittonia*, v. 138.—Am. bor.
viscidula, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 651.—Am. bor.
Wardii, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 935.—Am. bor.
yukonensis, *Gandoger, in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 213.—Am. arct.

SOLLYA, Lindl. (Pittosp.).
erecta, *Andrews, in Journ. Muell. Soc. W. Austral.* i. 38.—Austral.

SONCHUS, Linn. (Compos.).
Dianthoseris, *Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma*, viii. 200 (=*Dianthoseris Rueppellii*).—Afr. trop.
lasiorhizus, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 444.—Afr. trop.
violaceus, *O. Hoffm. l. c.* 443.—Afr. trop.
vulgaris, *Rouy, Fl. Fr.* ix. 204.—Gallia.

SOPHIA, Linn. (Crucif.).
[SISYMBRIUM, Tourn. I. K.]
andrenarum, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 48.—Am. bor.
brachycarpa, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 462 (=*Sisymbrium brachycarpon*).—Am. bor.
brevipes, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, xxix. 238.—Am. bor.
californica, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
Cumingiana, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 447 (=*Sisymbrium Cumingianum*).—Am. austr.
deserticola, *Macl. l. c.* 448 (=*Sisymbrium deserticolum*).—Patag.
glandulifera, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 281.—Am. bor.
glaucescens, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 448 (=*Sisymbrium glaucescens*).—Patag.
heterotricha, *Macl. l. c.* (=*Descurainea heterotricha*).—Patag.
intermedia, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 462.—Am. bor.
leptophylla, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, xxix. 230.—Am. bor.
myriophylla, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 462 (=*Sisymbrium myriophyllum*).—Am. bor.
obtusa, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 96.—Am. bor.
purpurascens, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 556.—Am. bor.
ramosa, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
serrata, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 96.—Am. bor.
tenuissima, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 450 (=*Sisymbrium tenuissimum*).—Patag.
viscosa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, xxix. 236.—Am. bor.

SOPHORA, Linn. (Legum.).
Bakeri, *C. B. Clarke, ex Baker, in Kew Bull.* 1901, 139 (vide citationem priorem in supplemento secundo).—Ind. or.
chathamica, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxiv. 319.—Ins. Chatham.

SOPHRONANTHE, Benth. (Scrophul.).
[GRATIOLA, Rupp. I. K.]
pilosa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1067 (=*Gratiola pilosa*).—Am. bor.

SOPHRONITIS, Lindl. (Orchid.).
australis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. v. 322.—Bras.
rupestris, *Cogn. l. c.* (=*Constantia rupestris*).—Bras.

SOPUBIA, Buch.-Ham. (Scrophul.).
conferta, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 191.—Afr. trop.
fastigiata, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 387.—Afr. austr.
ugandensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 192.—Afr. trop.

SORBARIA, A. Br. (Rosac.).
[SPIRAEA, Linn. I. K.]
arborea, *Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. (1904) 490.—China.
assurgens, *Vilm. & Bois, Frut. Vilm. Cat.* i. 75.—China.
stellipila, *Schneider, Ill. Handb. Laubholzk.* i. (1904) 489.—Japon.

SORBUS, Linn. (Rosac.).
[PYRUS, Tourn. I. K.]
acutiloba, *Hedl. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxv. No. 1, 106 (=*Pyrus acutiloba*).—Germania.
alpina, *Hedl. l. c.* 115 (=*Pyrus alpina*).—Hybr.?
americana, Herb. L. B. ex Hedl. l. c. = commixta.
armeniaca, *Hedl. l. c.* 69.—Armenia.
arranensis, *Hedl. l. c.* 60.—Scotia.
austriaca, *Hedl. l. c.* 65.—Eur.
carpinifolia, *Hedl. l. c.* 85.—Eur.
cashmiriana, *Hedl. l. c.* 35.—Reg. Himal.
commixta, *Hedl. l. c.* 38.—Japon.
cuspidata, *Hedl. l. c.* 80 (=*Crataegus cuspidata*).—Reg. Himal.

SORBUS :—
decipiens, *Hedl. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxv. no. 1, 95 (=*Pyrus decipiens*).—Eur.; Oriens.
decurrens, *Hedl. l. c.* 48.—Hybr.?
discolor, *Hedl. l. c.* 37 (=*Pyrus discolor*).—China.
dubia, *Hedl. l. c.* 96.—Hybr.?
glabrata, *Hedl. l. c.* 45.—Eur.
incana, *Hedl. l. c.* 105.—Hybr.?
incisa, *Hedl. l. c.* 52.—Eur.
insignis, *Hedl. l. c.* 32 (=*Pyrus insignis*).—Reg. Himal.
japonica, *Koehne, in Wittm. Gartenfl.* 1901, 408.—Japon.
longifolia, *Hedl. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxv. no. 1, 62.—Eur.
Matsumurana, *Koehne, in Wittm. Gartenfl.* 1901, 407 (=*Pyrus Matsumurana*).—Japon.
Meinichii, *Hedl. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxv. no. 1, 49.—Hybr.
minima, *Hedl. l. c.* 61 (=*Pyrus minima*).—Cambria.
nepalensis, Hort. ex. Hedl. l. c. 80 = cuspidata.
obtusata, *Hedl. l. c.* 92 (=*Crataegus obtusata*).—Hort.
obtusifolia, *Hedl. l. c.* 80.—Eur.
parviflora, *Hedl. l. c.* 39 (=*Pyrus micrantha*).—Japon.
paucicrenata, *Hedl. l. c.* 98 (=*Pyrus paucicrenata*).—Hybr.?
pekinensis, *Koehne, in Wittm. Gartenfl.* 1901, 406.—China.
persica, *Hedl. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxv. no. 1, 70.—Persia.
pohuashanensis, *Hedl. l. c.* 33 (=*Pyrus pohuashanensis*).—China.
pseudaria, *Hedl. l. c.* 110 (=*Crataegus pseudaria*).—Gallia.
pubescens, *Hedl. l. c.* 116.—Hybr.?
quercifolia, *Hedl. l. c.* 50.—Hybr.?
rotundifolia, *Hedl. l. c.* 104 (=*Pyrus rotundifolia*, Bechstein).—Eur.
salicifolia, *Hedl. l. c.* 78.—Eur.
semipinnata, *Hedl. l. c.* 55 (=*Pyrus semipinnata*).—Eur.
semitorminalis, *Hedl. l. c.* 107.—Hybr.?
sibirica, *Hedl. l. c.* 44.—Sibiria.
sorbifolia, *Hedl. l. c.* 114.—Am. bor.
splendida, *Hedl. l. c.* 43.—Hybr.?
tomentosa, Hedl. l. c. 76 = Pyrus Aria.
turkestanica, Hedl. l. c. 69 = Pyrus turkestanica.

SORGHASTRUM, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 71 (1901). *GRAMINEAE.*
avenaceum, *Nash, l. c.* (=*Chrysopogon avenaceus*).—Am. bor.
Linnaeanum, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 66.—Am. bor.
nutans, *Nash, l. c.* (=*Andropogon nutans*).—Am. bor.
secundum, *Nash, l. c.* 67 (=*Andropogon secundus*).—Am. bor.

SORINDEIA, Thou. (Anacard.).
nitidula, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 221.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. l. c.* 220.—Afr. trop.
Warneckei, *Engl. l. c.* 221.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.* 220.—Afr. trop.

SOWERBAEA, Sm. (Liliac.).
multicaulis, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 09.—Austral.

SOYAUXIA, Oliv. (Passifl.).
grandifolia, *Gilg & Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 102.—Afr. trop.

SOYERIA, Monn. (Compos.).
[CREPIS, Vaill. I. K.]
jubata, *Rouy, Fl. Fr.* ix. 232.—Eur.

SPARGANIUM, Linn. (Typhac.).
macrocarpum, *Makino, in Matsum. Ind. Pl. Jap.* ii. 23, nomen.—Japon.
multipedunculatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 598.—Am. bor.
nipponicum, *Makino, in Matsum. Ind. Pl. Jap.* ii. 23, nomen.—Japon.
yamatense, *Makino, l. c.* 24, nomen.—Japon.

SPARTINA, Schreb. (Gramin.).
Bakeri, *Merrill, in U. S. Dept. Agric. Pl. Industry Bull.* ix. 14.—Am. bor.
Pittieri, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 237.—Am. cent.

SPATHICARPA, Hook. (Arac.).
Burchelliana, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 142.—Bras.

SPATHIDOLEPIS, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 356. *ASCLEPIADACEAE.*
torricellensis, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.

SPATHIPHYLLUM, Schott (Arac.).
grandifolium, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 119.—N. Granat.
Huberi, *Engl. l. c.* 120.—Peruv.
laeve, *Engl. l. c.*—Am. cent.
quindiuense, *Engl. l. c.*—N. Granat.
tenerum, *Engl. l. c.*—Peruv.

SPATHOGLOTTIS, Blume (Orchid.).
pulchra, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 147.—Ins. Bismarck.
unguiculata, *Reichb. f. in Seem. Fl. Vit.* (1865) 300 (= *Limodorum unguiculatum*).—N. Caled.

SPATHOLOBUS, Hassk. (Legum.).
pulcher, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 489.—China.
suberectus, *Dunn, l. c.*—China.
varians, *Dunn, l. c.* 490.—China.

SPATULARIA, Haw. (Saxifr.).
[SAXIFRAGA, Linn. I. K.]
Brunoniana, *Small, in N. Am. Fl.* xxii. 149.—Am. bor.
bryophora, *Small, l. c.* 148 (= *Saxifraga bryophora*).—Calif.
ferruginea, *Small, l. c.* 150 (= *Saxifraga ferruginea*).—Am. bor.
foliolosa, *Small, l. c.* 149 (= *Saxifraga foliolosa*).—Reg. arct.
Michauxii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 502 (= *Saxifraga Michauxii*).—Am. bor.
Newcombei, *Small, in N. Am. Fl.* xxii. 149 (= *Saxifraga Newcombei*).—Am. bor.
petiolaris, *Small, l. c.* 150 (= *Hexaphoma petiolaris*).—Am. bor.
Vreelandii, *Small, l. c.* 149.—Am. bor.

SPECULARIA, Heist. (Campan.).
calycina, *Lojac. Fl. Sic.* ii. 1. 229.—Sicil.
Juliani, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 222.—Afr. bor.

SPERGULARIA, J. & C. Presl (Caryophyll.).
advena, *Hy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 338.—Gallia.
arenosa, *Foucaud, ex Merino, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 496.—Hispan.
australis, *Sampaio, in Ann. Acad. Poly. Porto*, xxvii. 183.—Lusitan.
Bocconi, *Foucaud, ex Merino, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 496.—Hispan.
Heldreichi, *Foucaud, ex Munnera, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 79.—Hispan.
Langei, *Foucaud, ex Merino, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 496.—Hispan.
rupicola, Towns. Fl. Hamp. ed. ii. 72 = rupestris.

SPERMACOCE, Dill. (Rubiac.).
ambigua, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 180 (1904).—Mexic.

SPHACELE, Benth. (Labiat.).
Blochmanae, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 495.—Calif.
gracilis, *Eastw. in Zoe*, v. 83 (1900).—Calif.

SPHAERALCEA, A. St. Hil. (Malvac.).
australis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 249.—Patag.
Crandallii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 564.—Am. bor.
grandiflora, *Rydb. l. c.* 565.—Am. bor.
Margaritae, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 156 (1903).—Calif.
Martii, *Cockerell, in Coult. Bot. Gaz.* xxxii. 60.—Am. bor.
parvifolia, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 94.—Am. bor.
patagonica, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 251 (= *Malva patagonica*).—Patag.

SPHAERANTHUS, Vaill. (Compos.).
flexuosus, *O. Hoffm. ex Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. p. x.—Afr. trop.

SPHAERANTHUS:—
humilis, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 410.—Afr. trop.
Taylorii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 330.—Afr. trop.

SPHAERELLA, Bub. Fl. Pyren. iv. 320 (1901) = **Airopsis**, Desv. (Gramin.).
pumila, Bub. l. c. = A. globosa.

SPHAEROCODON, Benth. (Asclep.).
melananthum, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 412.—Afr. trop.
platypodum, *K. Schum. ex Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 225.—Afr. trop.

SPHAEROMERIA, Nutt. (Compos).
[TANACETUM, Tourn. I. K.]
cana, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 7 (= *Tanacetum canum*).—Am. bor.
capitata, *A. A. Heller, l. c.* (= *Tanacetum capitatum*).—Am. bor.
potentilloides, *A. A. Heller, l. c.* (= *Tanacetum potentilloides*).—Am. bor.
simplex, *A. A. Heller, l. c.* (= *Tanacetum simplex*).—Am. bor.

SPHAEROSTIGMA, Fisch. & Mey. (Onagr.).
[OENOTHERA, Linn. I. K.]
angelorum, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 62 (= *Oenothera angelorum*).—Calif.
arenicolum, *A. Nelson, l. c.* 59.—Calif.
erythrum, *Davidson, in Bull. S. Calif. Acad. Sci.* i. (1902) 118.—Am. bor.
filiforme, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 57.—Am. bor.
Hitchcockii, *A. Nelson, l. c.* 62.—Am. bor.
Lemmoni, *A. Nelson, l. c.* 61.—Calif.
Nelsonii, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 1 = minor.
pallidum, *Abrams, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 539.—Calif.
pterospermum, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 63 (= *Oenothera pterosperma*).—Calif.
rutilum, *A. Nelson, l. c.* (= *Oenothera rutila*).—Calif.
senex, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xviii. 173.—Am. bor.
tortum, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xl. 60.—Am. bor.
tortuosum, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvii. 95.—Am. bor.

SPHAEROTHYLAX, Bisch. (Podost.).
Warmingiana, *Gilg, in Danske Vid. Selsk. Skr.* Ser. VI. xi. t. 17; *et in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 240.—Afr. trop.

SPHEDAMNOCARPUS, Planch. (Malpigh.).
pulcherrimus, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 272.—Afr. trop.
Wilmsii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 249.—Afr. austr.

SPHENOSTYLIS, E. Mey. (Legum.).
[VIGNA, Savi. I. K.]
holosericea, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 176 (= *Vigna holosericea*).—Afr. trop.
Kerstingii, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

SPHINCTANTHUS, Benth. (Rubiac.).
Hasslerianus, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 170.—Parag.

SPIGELIA, Linn. (Logan.).
guaranitica, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 917.—Parag.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 407.—Parag.
nicotianaeflora, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 917.—Parag.
paraguayensis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 406.—Parag.
Valenzuelae, *Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 917.—Parag.

SPILANTHES, Jacq. (Compos.).
Eggersii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 608.—Ecuador.
macrophylla, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 109.—Am. cent.
nervosa, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 724.—Parag.
popayanensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 610.—N. Granat.

SPIRAEA, Linn. (Rosac.).
Aemiliana, *Schneid. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 347.—Japon.
angulata, *Fritsch, ex Schneid. l. c.*—China.
Beauverdiana, *Schneid. l. c.* 348.—Japon.
Billardi, *Meehan; cf. Gard. Chron.* 1904, ii. 400.—Hybr.
Boissieri, *Schneid. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 341.—Afghan.
Fauriana, *Schneid. l. c.* 337.—Japon.
Fritschiana, *Schneid. l. c.* 347.—China.
hirsuta, *Schneid. l. c.* 342.—China.
Maximowicziana, *Schneid. l. c.* 341.—China.
pachystachys, *Hort. ex Worsley, in Gard. Chron.* 1905, ii. 322.—Hybr.
Pratti, *Schneid. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 345.—China.
Veitchi, *Hemsl. in Gard. Chron.* 1903, i. 258.—China.
Zabeliana, *Schneid. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 343.—Ind. or.

SPIRAEANTHEMUM, A. Gray (Saxifr.).
ellipticum, *Vieill. ex Pampan. in Ann. di Bot. Roma*, ii. 50.—N. Caled.
pubescens, *Pampan, l. c.*—N. Caled.

SPIRANTHES, Rich. (Orchid.).
Arechavaletae, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 9.—Urug.
delicatula, *Kraenzl. l. c.*—Parag.
Grayi, *Ames, in Rhodora*, vi. 44.—Am. bor.
intermedia, *Ames, l. c.* v. 262.—Hybr.
laciniata, *Ames, Orchid.* i. 120 (= *Gyrostachys laciniata*).—Am. bor.
neglecta, *Ames, in Rhodora*, vi. 30.—Am. bor.
parviflora, *Ames, Orchid.* i. 137 (= *Gyrostachys parviflora*).—Am. bor.

SPIROPETALUM, Gilg (Connar.).
triplinerve, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 93.—Afr. trop.

SPIROSTACHYS, S. Wats. (Chenopod.).
olivascens, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 149.—Patag.

SPODIOPOGON, Trin. (Gramin.).
formosanus, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 351.—China.
sagittifolius, *Rendle, l. c.* 352.—China.

SPONDIANTHUS, Engl. in Engl. Jahrb. xxxvi. (1905) 215. *ANACARDIACEAE.*
glaber, *Engl. l. c.* 216.—Afr. trop.
Preussii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

SPONDIAS, Linn. (Anacard.).
Klaineana, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 215 (= *Antrocaryon Klaineanum*).—Afr. trop.
Soyauxii, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

SPONGOPYRENA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 216; et in Journ. de Bot. xvi. 200. *OCHNACEAE.*
cyanescens, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* xvi. 201.—Afr. trop.
elongata, *Van Tiegh. l. c.* (= *Ochna elongata*).—Afr. trop.
reniformis, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 319.—Afr. trop.
Staudtii, *Van Tiegh. l. c.*—Afr. trop.

SPOROBOLUS, R. Br. (Gramin.).
attenuatus, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 123.—Am. bor.
bahamensis, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 56.—Ins. Baham.
Baumianus, *Pilg. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 175.—Afr. trop.
brasiliensis, Hack. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 278 = ramosissimus.
canovirens, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1042.—Am. bor.
compositus, *Merrill, ex Hitchc. in U. S. Dept. Agric. Bull. Pl. Ind.* lxviii. 55 (= *Agrostis composita*).—Am. bor.
ejuncidus, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 106.—Am. bor.
flexuosus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 601.—Am. bor.
gracilis, *Merrill, in Rhodora*, iv. 48 (= *Vilfa gracilis*).—Am. bor.
Hancei, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 387.—China.

SPOROBOLUS :—
japonicus, *Maxim, ex Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 388 (= *Agrostis japonica*).—China; Japon.
ligularis, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 57.—Ecuador.
Menyharthii, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 769.—Afr. trop.
micranthus, *Conr. & Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 198.—Afr. austr.
patulus, *Hack. l. c.* 1902, 58.—Madag.
pectinatus, *Hack. l. c.* liii. 198.—Afr. austr.
polycladus, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 769.—Afr. trop.
Richardsonii, *Merrill, in Rhodora*, iv. 46 (= *Vilfa Richardsonis*).—Am. bor.
tenuissimus, Hack. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 278 = minutiflorus.
Torreyanus, *Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 107.—Am. bor.

SPRAGUEA, Torr. (Portul.).
eximia, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 486.—Calif.
pulchella, *Eastw. l. c.* 1902, 79.—Am. bor.

SPYRIDIUM, Fenzl (Rhamnac.).
denticuliferum, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 355.—Austral.
kalganense, *Diels, l. c.*—Austral.

STAAVIA, Dahl (Bruniac.).
comosa, *Colozza, in Ann. di Bot. Roma*, ii. 35 (= *Brunia comosa*).—Afr. austr.
lateriflora, *Colozza, l. c.* 36; *et in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* x. 397.—Afr. austr.

STACHYDEOMA, Small, Fl. S. E. U. S. 1040 (1903). *LABIATAE.*
ciliata, *Small, l. c.* (= *Hedeoma ciliata*).—Am. bor.
graveolens, *Small, l. c.* 1041 (= *Hedeoma graveolens*).—Am. bor.

STACHYPHRYNIUM, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. (1902) 45. *MARANTACEAE.*
cylindricum, *K. Schum. l. c.* 49 (= *Phrynium cylindricum*).—Ind. or.
Griffithii, *K. Schum. l. c.* (= *Phrynium Griffithii*).—Ind. or.
Jagorianum, *K. Schum. l. c.* 48 (= *Phrynium Jagorianum*).—Ind. or.
latifolium, *K. Schum. l. c.* 49 (= *Phrynium latifolium*).—Java.
minus, K. *Schum. l. c.* 48 (= *Phrynium minus*).—Ind. or.
spicatum, *K. Schum. l. c.* 46 (= *Phrynium spicatum*).—Ind. or.
sumatranum, *K. Schum. l. c.* 46 (= *Phrynium sumatranum*).—Sumatra.
zeylanicum, *K. Schum. l. c.* 46 (= *Phrynium zeylanicum*).—Ind. or.

STACHYS, Linn. (Labiat.).
albiflora, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 131.—Afr. austr.
arenicola, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 792.—Am. bor.
aristata, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 67.—Mexic.
atlantica, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 792.—Am. bor.
Clingmanii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1032.—Am. bor.
cymbalaria, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1088.—Afr. austr.
dolichodeira, *Briq. l. c.* 1081.—Afr. austr.
Duriaei-hirta, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 268.—Afr. bor.
flaccida, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 80.—Am. bor.
fruticetorum, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1083.—Afr. austr.
Galpini, *Briq. l. c.* 1082.—Afr. austr.
hantamensis, *Vatke, in Bot. Zeit.* xxxiii. (1875) 462.—Afr. austr.
latidens, *Small, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 793.—Am. bor.
latipes, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 87.—Mexic.
leptoclada, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1084.—Afr. austr.
lupulina, *Briq. l. c.* 1082.—Afr. austr.

STACHYS :—
lythroides, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1031.—Am. bor.
marrubiifolio-hirta, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 268.—Afr. bor.
Martini, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiv. (1904) 187.—China.
pachycalymma, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1087.—Afr. trop.
parilis, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 131.—Afr. austr.
pascuicola, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1086.—Afr. austr.
petrogenes, *Briq. l. c.* 1086.—Afr. austr.
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 245.—Mexic.
ramosa, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 116.—Calif.
rivularis, *A. A. Heller, l. c.* 33.—Calif.
salvioides, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1032.—Am. bor.
sericophylla, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* ii. 519.—Eur.
sidamoensis, *Guerke, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 126.—Afr. trop.
teucriformis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 640.—Am. bor.
vestita, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 558.—Am. bor.

STACHYTARPHETA, Vahl (Verben.).
Hassleri, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Ser. II. iv. 1164.—Parag.

STACKHOUSIA, Sm. (Stackhous.).
aphylla, *Pampan. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1147.—Austral.
Dielsi, *Pampan. l. c.* 1052.—Austral.
Georgei, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 340.—Austral.
Gunnii, *Pampan. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1055.—Austral.
linarioides, Huegel, ex Pampan. & Barg. Petr. in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. v. 1146 = muricata.
Maideni, *Pampan. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1049.—Austral.
micrantha, *Pampan. l. c.* 1150.—Austral.
tenuissima, *Pampan. l. c.* 1147.—Austral.
virgata, *Pampan. l. c.* 1148.—Austral.

STAEHELINA, Linn. (Compos.).
Sintenisii, *Bornm. in Mitth. Thüring. Bot. Ver.* n. s. xviii. 50.—Reg. Casp.

STAELIA, Cham. & Schlecht. (Rubiac.).
filifolia, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 190.—Parag.

STANFIELDIA, Small, Fl. S. E. U. S. 1187 (1903). *COMPOSITAE.*
Nealleyi, *Small, l. c.* 1188 (= *Aplopappus Nealleyi*).—Am. bor.

STANHOPEA, Frost (Orchid.).
Langlasseana, *Cogn. in Gard. Chron.* 1901, ii. 426.—Am. trop.
Wolteriana, *Kraenzl. in Gard. Chron.* 1906, ii. 102.—Hybr.

STANLEYA, Nutt. (Crucif.).
arcuata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 232.—Am. bor.
canescens, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
glauca, *Rydb. l. c.* 1904, 409.—Am. bor.
runcinata, *Rydb. l. c.* 1903, 252.—Am. bor.

STAPELIA, Linn. (Asclep.).
atrosanguinea, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1901, ii. 425.—Afr. trop.
bella, *A. Berger, in Gard. Chron.* 1902, i. 137.—Hort.
divergens, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1905, i. 49.—Afr. austr. ?
Engleriana, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 49.—Afr. trop. ?
incomparabilis, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1901, ii. 405.—Afr. austr. ?
kwebensis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 501.—Afr. trop.
melanantha, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 50.—Afr. austr.
nobilis, *N. E. Br. ex Hook. f. in Bot. Mag.* t. 7771.—Afr. austr.
Pillansii, *N. E. Br. in Gard. Chron.* 1904, i. 242.—Afr. austr.
putida, *A. Berger, in Monatsschr. Kakt.* 1905, 150.—Afr. austr. ?

STAPHYSAGRIA, Spach (Ranunc.).
[DELPHINIUM, Tourn. I. K.]
hirtella, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 39.—Gallia.
moschata, *Jord. l. c.*—Corsica.

STATHMOSTELMA, K. Schum. (Asclep.).
macropetalum, *Schlechter & K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 325.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 188.—Afr. trop.

STATICE, Tourn. (Plumbag.).
algeriensis, *Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* i. 157.—Afr. bor.
bella, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 655 (= *Armeria bella*).—Reg. Magell.
chilensis, Macl. l. c. = punicea.
cyrenaica, *Rouy, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* i. 165.—Afr. bor.
Doriae, *Sommier, in Bull. Soc. Bot. Ital.* 1902, 211.—Eur.
Kossmatii, *Wagn. & Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 89.—Socotra.
laxissima, *Rouy, Illustr. Pl. Eur. Rar.* t. 396.—Eur.
macloviana, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 655 (= *Armeria macloviana*).—Am. austr.
Neumani, *Rouy, Illustr. Pl. Eur.* t. 497 (= *Limonium Neumani*).—Eur.
Paulayana, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 89.—Socotra.
punicea, *Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 369 (= *Armeria chilensis*).—Reg. Magell.
sokotrana, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 89.—Socotra.

STAUDTIA, Warb. (Myristic.).
gabonensis, *Warb. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 384.—Afr. trop.
stipitata, *Warb. l. c.*—Afr. trop.

STAUROGYNE, Wall. (Acanth.).
[EBERMAIERA, Nees. I. K.]
siamensis, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 716.—Siam.

STAWELLIA, F. Muell. (Liliac.).
gymnocephala, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 100.—Austral.

STEINCHISMA, Rafin. (Gramin.).
hians, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 105 (= *Panicum hians*).—Am. bor.

STEIRONEMA, Rafin. (Primul.).
laevigatum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 436.—Am. bor.

STEIROSANCHEZIA, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. iv. 316 (1904). *ACANTHACEAE.*
scandens, *Lindau, l. c.* 317.—Peruv.

STELIS, Sw. (Orchid.).
Binoti, *Wildem. in Gard. Chron.* 1904, ii. 381.—Bras.
guianensis, *Rolfe, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 59.—Guiana.
guttifera, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 154.—Bras.
mucronata, *Porsch, l. c.* 155.—Bras.

STELLARIA, Linn. (Caryophyll.).
chubutensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 241.—Patag.
ciliata, Bub. Fl. Pyren. iii. 29 = Holostea.
ebracteata, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 441.—As. or.
filicaulis, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo.* xv. 113.—Japon.
intermedia, *Merino, Contrib. Fl. Galic.* (1897) 30.—Hispan.
laxa, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 12.—Ins. Philipp.
Martjanovi, *Krylov, in Act. Hort. Petrop.* xxi. 3.—As. cent.
sessiliflora, *Yabe, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 194.—Japon.
uchiyamana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 164.—Japon.
xanthospora, *Chod. & Wilcz. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 293.—Reg. Argent.

STELLARIS, Dill. = **Scilla**, Linn. (Liliac.).
autumnalis, Bub. Fl. Pyren. iv. 79 = Scilla autumnalis.
squamosa, Bub. l. c. 80 = Scilla lilio-hyacinthus.
verna, Bub. l. c. 79 = Scilla verna.

STELLULARIA, Benth. (Scrophul.).
inflata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 124.—Afr. trop.

STEMMATELLA, Wedd. (Compos.).
Lehmannii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 602.—N. Granat.
Sodiroi, *Hieron. l. c.* 601.—Am. austr.
urticifolia, *O. Hoffm. ex Hieron. l. c.* 603 (= *Galinsoga urticifolia*).—N. Granat.

STEMMODONTIA, Cass. (Compos.).
asperrima, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 800 (= *Buphthalmum asperrimum*).—Ind. occ.
biflora, *W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* ix. 377 (= *Verbesina biflora*).—Geront. trop.
canescens, *W. F. Wight, l. c.* (= *Verbesina canescens*).—Guam.
trilobata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1262 (= *Silphium trilobatum*).—Am. bor.

STEMODIA, Linn. (Scrophul.).
Bodinieri, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xv. (1905) 87.—China.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 287.—Parag.

STEMONA, Lour. (Roxburgh.).
Burkillii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 43.—Burma.
Kurzii, *Prain, l. c.* 42.—Burma.
moluccana, *Prain, l. c.* 41 (= *Roxburghia moluccana*).—Ins. Molucc.
philippinensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* vi. 16.—Ins. Philipp.

STEMONOCOLEUS, Harms, in Engl. Jahrb. xxxviii. (1905) 76. *LEGUMINOSAE.*
micranthus, *Harms, l. c.* 77.—Afr. trop.

STEMONURUS, Blume (Icacin.).
ramuensis, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 305.—N. Guin.

STENADENIUM, Pax, in Engl. Jahrb. xxx. 343 (1901). *EUPHORBIACEAE.*
spinescens, *Pax, l. c.*—Afr. trop.

STENANDRIUM, Nees (Acanth.).
floridanum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1085.—Am. bor.

STENANTHEMUM, Reiss. (Rhamnac.).
gracilipes, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 356.—Austral.
pumilum, *Diels, l. c.* (= *Spyridium pumilum*).—Austral.

STENANTHERA, Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl. vi. 67. *ANONACEAE.*
gabonensis, *Engl. & Diels, l. c.* 68 (= *Oxymitra gabonensis*).—Afr. trop.
hamata, *Engl. & Diels, l. c.* (= *Oxymitra hamata*).—Afr. trop.
myristicifolia, *Engl. & Diels, l. c.* 67 (= *Oxymitra myristicifolia*).—Afr. trop.
pluriflora, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 45.—Afr. trop.

STENHAMMARIA, Nym. Consp. 521 = STEENHAMMERA, Reichb. = **Mertensia**, Roth (Borag.).

STENOCALYX, Berg (Myrtac.).
[EUGENIA, Linn. I. K.]
nanus, *Barb. Rodr. Myrt. Parag.* 8.—Parag.
Rhampirii, *Barb. Rodr. l. c.*—Parag.

STENOLOBIUM, D. Don (Bignon.).
[TECOMA, Juss. I. K.]
alatum, *Sprague, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 448, adnot. (= *Tecoma alata*).—Peruv.
fulvum, *Sprague, l. c.* (= *Tecoma fulva*).—Peruv.

STENOPHYLLUS, Rafin. (Cyper.).
[SCIRPUS, Tourn. I. K.]
Carteri, *Britton, ex Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 420.—Am. bor.
coarctatus, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 189 (= *Scirpus coarctatus*).—Am. bor.

STENORRHYNCHUS, Rich. (Orchid.).
[SPIRANTHES, Rich. I. K.]
balanophorostachyus, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 931 (= *Spiranthes balanophorostachya*)—Parag.

STENORRHYNCHUS:—
bonariensis, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 931 (= *Spiranthes bonariensis*).—Parag.
calophyllus, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 151.—Bras.
Canterae, *Barb. Rodr. in Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, i. 48.—Urug.
Esmeraldae, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 931 (= *Spiranthes Esmeraldae*).—Parag.
Loefgrenii, *Porsch, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 151.—Bras.
macranthus, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 931 (= *Spiranthes macrantha*).—Parag.
paraguayensis, *Cogn. l. c.* (= *Spiranthes paraguayensis*).—Parag.
rupestris, *Cogn. l. c.* 932 (= *Spiranthes rupestris*).—Parag.
saltensis, *Cogn. l. c.* 931 (= *Spiranthes saltensis*).—Parag.
Sancti-Antonii, *Kraenzl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxx. 8.—Reg. Argent.
taquaremboensis, *Barb. Rodr. Contrib. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, i. 68.—Urug.
venustus, *Barb. Rodr. l. c.* 49, 67.—Bras.

STENOSPERMATUM, Schott (Arac.).
Andreanum, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 111.—N. Granat.
angosturense, *Engl. l. c.* 113.—N. Granat.
crassifolium, *Engl. l. c.* 114.—Peruv.
densiovulatum, *Engl. l. c.* 112.—Ecuador.
flavescens, *Engl. l. c.* 111.—Peruv.
latifolium, *Engl. l. c.* 112.—Ecuador.
longifolium, *Engl. l. c.* 111.—Ecuador.
longipetiolatum, *Engl. l. c.* 112.—Ecuador.
maximum, *Engl. l. c.* 113.—Ecuador.
robustum, *Engl. l. c.*—Am. cent.
sessile, *Engl. l. c.* 111.—Am. cent.
Sodiroanum, *Engl. l. c.* 112.—Ecuador.
Weberbaueri, *Engl. l. c.* 110.—Peruv.

STENOTOPSIS, Rydb. (Compos.).
Macleanii, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 261 (= *Aplopappus Macleanii*).—Am. bor.

STENOTUS, Nutt. (Compos.).
[APLOPAPPUS, Cass. I. K.]
borealis, *Rydb. in Bull. N. York Bot. Gard.* 184.—Am. bor.
Brandegei, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 300 (= *Aplopappus Brandegei*).—Am. bor.
laceratus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 7 (= *Aplopappus laceratus*).—Am. bor.
latifolius, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 266.—Am. bor.
Lyallii, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 300 (1900) (= *Aplopappus Lyallii*).—Am. bor.
Macleanii, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 7 (= *Aplopappus Macleanii*).—Am. bor.

STENOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 543; et in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 190, 219. *OCHNACEAE.*
Wrightii, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 219.—Am. cent.

STEPHANOMERIA, Nutt. (Compos.).
guadalupensis, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 164 (1903).—Calif.

STEPHANOSTEMA, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiv. 325 (1904). *APOCYNACEAE.*
stenocarpum, *K. Schum. l. c.*—Afr. trop.

STERCULIA, Linn. (Stercul.).
Balansae, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 369.—Tonkin.
brevipetiolata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 40.—Ins. Philipp.
colombiana, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 429.—N. Granat.
crassiramea, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 28.—Ins. Philipp.
Dawei, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1167.—Afr. trop.
goyazensis, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 52, nomen.—Bras.
graciliflora, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 114.—Ins. Philipp.

STERCULIA:—
Jagori, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 115.—Ins. Philipp.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 211.—Afr. trop.
Kingii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 192.—Reg. Himal.
luzonica, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 115.—Ins. Philipp.
Masseillei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 60.—Afr. trop.
montana, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 40.—Ins. Philipp.
obovata, *Merrill, l. c.* xxix. 28.—Ins. Philipp.
pallens, *Wall. ex Hochr. in Bull. Inst. Buitenz.* xix. 22.—Ind. or.
philippinensis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 29.—Ins. Philipp.
rhynchocarpa, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 323.—Afr. trop.
spatulata, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 116.—Ins. Philipp.
tonkinensis, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 368.—Tonkin.
Treubii, *Hochr. in Bull. Inst. Buitenz.* xix. 20; *Pl. Bogor. Exsicc.* 8.—Arch. Mal.!
Wigmanii, *Hochr. l. c.* 34; *l. c.* 10.—Celebes.

STEREOSPERMUM, Cham. (Bignon.).
Arnoldianum, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 128.—Afr. trop.
bracteosum, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 332.—Afr. trop.
katangense, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 130.—Afr. trop.
Verdickii, *Wildem. l. c.* 129.—Afr. trop.

STERIGMOSTEMUM, Bieb. (Crucif.).
[STERIGMA, DC. I. K.]
acanthocarpum, *Bornm. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1266 (= *Sterigma acanthocarpum*).—Persia.

STEUDNERA, C. Koch (Arac.).
virosa, *Prain, Bengal Pl.* 1113 (= *Colla virosa*).—Ind. or.

STEVIA, Cav. (Compos.).
Benthamiana, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 561.—N. Granat.; Ecuador.
collodes, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 93.—Mexic.
foliosa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1163.—Am. bor.
guaranitica, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 704.—Parag.
Hassleriana, *Chod. l. c.* ii. 305.—Parag.
Lehmannii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 563.—N. Granat.
soratensis, *Hieron. l. c.* 560.—Boliv.
tunguraguensis, *Hieron. l. c.* 563.—Ecuador.
vernicosa, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 33.—Mexic.
Wageneri, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 562.—Venez.

STIBURUS, Stapf (Gramin.).
Conrathii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 375.—Afr. austr.

STIFFTIA, Mikan (Compos.).
Connellii, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 40.—Guiana.

STIGMATODACTYLUS, Maxim. ex Makino, Ill. Fl. Jap. i. (1891) t. 43; Bot. Mag. Tokyo, xix. (1905) 68, descr. *ORCHIDACEAE.*
javanicus, *Schlechter & J. J. Sm. in J. J. Sm. Orchid. Java*, 50.—Java.
sikokianus, *Maxim. ex Makino. Ill. Fl. Jap.* i. t. 43; *Bot. Mag. Tokyo*, xix. 69.—Japon.

STILLINGIA, Linn. (Euphorb.).
linearifolia, *Small, Fl. S. E. U. S.* 704.—Am. bor.
salicifolia, *Small, l. c.*—Am. bor.
spathulata, *Small, l. c.*—Am. bor.
tenuis, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 429.—Am. bor.

STILPNOPAPPUS, Mart. (Compos.).
cearensis, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 320.—Bras.

STIPA, Linn. (Gramin.).
arcuata, R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. Ser. IV. i. no. 1, 172.—Reg. Argent.
Ameghinoi, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 168.—Reg. Argent.
arachnopus, Pilg. in Engl. Jahrb. xxxv. 70.—Austral.
arcaensis, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 131.—Reg. Argent.
Arechavaletai, Speg. l. c. 85.—Reg. Argent.
bavioensis, Speg. l. c. 122.—Reg. Argent.
bromoides, Beck, in Wiss. Mitth. Bosn. Herzegow. ix. 425 (= Agrostis bromoides).—Reg. Medit.
caespitosa, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 117 (= Nassella caespitosa).—Reg. Argent.
calchaquia, Speg. l. c. 107.—Reg. Argent.
californica, Merrill & Davy, in Univ. Calif. Publ. Bot. i. 61.—Am. bor.
capillifolia, Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires, xi. 95.—Reg. Argent.
chubutensis, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 49.—Reg. Argent.
clausa, Trab. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis, 366.—Afr. bor.
cordobensis, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 141.—Reg. Argent.
curamalalensis, Speg. l. c. 160.—Reg. Argent.
eremophila, Reader, in Vict. Naturai. xvii. 154.—Austral.
Henryi, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvi. 382.—China.
hystricina, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 115.—Reg. Argent.
leptothera, Speg. l. c. 133.—Reg. Argent.
ligularis, Speg. l. c. 91.—Reg. Argent.
nobilis, Pilg. in Engl. Jahrb. xxxv. 70.—Austral.
nubicola, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 129.—Reg. Argent.
pampagrandensis, Speg. l. c. 158.—Reg. Argent.
paramilloensis, Speg. l. c. 189.—Reg. Argent.
Porteri, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 599.—Am. bor.
psittacorum, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. 165.—Reg. Argent.
sanluisensis, Speg. l. c. 156.—Reg. Argent.
scirpea, Speg. l. c. 137.—Reg. Argent.
Sodiroana, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 10.—Ecuador.
Spegazzinii, Arech. in Anal. Mus. Montevid. iv. i. 68.—Urug.
sublaevis, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 82.—Reg. Argent.
tigrensis, Chiov. in Ann. di Bot. Roma, ii. 366.—Afr. trop.
torquata, Speg. in Anal. Mus. Montevid. iv. ii. 83.—Reg. Argent.
uspallatensis, Speg. l. c. 120 (1901).—Reg. Argent.
uspallatensis, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1904, 289.—Chili.

STIXIS, Lour. (Cappar.).
[ROYDSIA, Roxb. I. K.]
Balansae, Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 1072.—Tonkin.
longiracemosa, Aug. DC. l. c. 1071.—Tonkin.
philippinensis, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 72 (= Roydsia philippinensis).—Ins. Philipp.

STOEBE, Linn. (Compos.).
rosea, Dod, in Journ. Bot. 1901, 399.—Afr. austr.

STOMATOSTEMMA, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 252. ASCLEPIADACEAE.
Monteiroae, N. E. Br. l. c. 253.—Afr. trop.

STRANVAESIA, Lindl. (Rosac.).
Henryi, Diels, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxxii. 52.—China.

STREBLACANTHUS, Kuntze (Acanth.).
chirripensis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 404.—Am. cent.

STREPTANTHUS, Nutt. (Crucif.).
gracilis, Eastw. in Proc. Calif. Acad. Ser. III. ii. 285.—Am. bor.

STREPTOCARPUS, Lindl. (Gesner.).
Armitagei, Baker f. & S. Moore, in Journ. Bot. 1901, 262.—Afr. austr.
Bolusi, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 445.—Afr. austr.

STREPTOCARPUS :—
breviflos, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 443.—Afr. trop. et austr.
curvipes, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 267.—Am. bor.
cyaneus, S. Moore, in Journ. Bot. 1905, 172.—Afr. austr.
Daviesii, N. E. Br. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 439.—Afr. austr.
Davyi, S. Moore, in Journ. Bot. 1905, 171.—Afr. austr.
Goetzei, Engl. Jahrb. xxx. 406.—Afr. trop.
grandis, N. E. Br. in Bot. Mag. t. 8042.—Afr. austr.
Haygarthii, N. E. Br. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 440.—Afr. austr.
hirtinervis, C. B. Clarke, l. c. 446.—Afr. trop. et austr.
katangensis, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg. xl. 25; et in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 127 (descr. emend.).—Afr. trop.
micranthus, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 440.—Afr. austr.
Mahoni, Hook. f. in Bot. Mag. t. 7857.—Afr. trop.
Muddii, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 443.—Afr. austr.
Penthertanus, Fritsch, in Ann. Nat. Hofmus. Wien, xv. 71.—Afr. austr.
tubiflos, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 441.—Afr. trop. et austr.
Vandeleuri, Baker f. & S. Moore, in Journ. Bot. 1901, 262.—Afr. austr.
Woodii, C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 445.—Afr. austr.

STREPTOLIRION, Edgew. (Commelin.).
longifolium, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 334.—China.

STREPTOMANES, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 352. ASCLEPIADACEAE.
Nymanii, K. Schum. l. c.—N. Guin.

STROBILANTHES, Blume (Acanth.).
Biroi, Lindau & K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 387.—N. Guin.
dispar, Hassk. Pl. Jav. Rar. 505.—Java.
Merrillii, C. B. Clarke, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 92.—Ins. Philipp.
parvibracteatus, C. B. Clarke, in Bot. Tidsskr. xxiv. 349.—Malaya.
pluriformis, C. B. Clarke, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 93.—Ins. Philipp.
siamensis, C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 716.—Siam.

STROBUS, Opiz (Conif.).
[PINUS, Tourn. I. K.]
Strobus, Small, Fl. S. E. U. S. 29 (= Pinus Strobus).—Am. bor.

STROMANTHE, Sond. (Scitam.).
boliviana, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich Marant. 151.—Boliv.
confusa, K. Schum. l. c. 150.—Boliv.
Rothschuhii, K. Schum. l. c. 130.—Am. cent.
Sellowiana, K. Schum. l. c. 147.—Bras.

STRONGYLODON, Vog. (Legum.).
caeruleus, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 20.—Ins. Philipp.
Campenoni, Drake, Hist. Pl. Madag. i. 109.—Madag.
Catati, Drake, l. c.—Madag.
crassifolius, Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 85.—Ins. Philipp.
Elmeri, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 20.—Ins. Philipp.
Lantzianus, Drake, Hist. Pl. Madag. i. 109 (= Chadsia Lantziana).—Madag.
Warburgii, Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 85.—Ins. Philipp.

STROPHANTHUS, DC. (Apocyn.).
erythroleucus, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxii. 160.—Afr. trop.
gardeniiflorus, Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl. vii. 20.—Afr. trop.
giganteus, Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn. (1894) 297, nomen.—Cochinch.
Gilletii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 105.—Afr. trop.
grandiflorus, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxii. 161.—Afr. trop.
holosericeus, K. Schum. & Gilg, in Engl. Jahrb. xxxii. 157.—Afr. trop.

STROPHANTHUS :—
Klainei, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 106.—Afr. trop.
macrophyllus, Pierre, in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. 491.—Tonkin.
mirabilis, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxii. 159.—Afr. trop.
Pierreanus, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 102.—Afr. trop.
Radcliffei, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 180.—Afr. trop.
Schlechteri, K. Schum. & Gilg, in Engl. Jahrb. xxxii. 158.—Afr. trop.
singaporianus, Gilg, in Engl. Monog. Afr. Pfl. vii. 11 (= Cercocoma singaporiana).—Malaya.
Thierryanus, K. Schum. & Gilg, in Engl. Jahrb. xxxii. 158.—Afr. trop.
Verdickii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 103.—Afr. trop.
verrucosus, Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. 181.—Afr. trop.
Wildemanianus, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxii. 159.—Afr. trop.

STROPHOSTYLES, Ell. (Legum.).
[PHASEOLUS, Tourn. I. K.]
missouriensis, Small, Fl. S. E. U. S. 654.—Am. bor.

STRUTHANTHUS, Mart. (Loranth.).
[LORANTHUS, Linn. I. K.]
Roversii, Warb. in Tropenpfl. ix. 635, nomen.—Venez.

STRUTHIOLA, Linn. (Thymel.).
leptantha, Bolus, in Trans. S. Afr. Phil. Soc. xvi. 142.—Afr. austr.

STRYCHNOS, Linn. (Logan.).
Albersii, Gilg & Busse, in Engl. Jahrb. xxxvi. 99.—Afr. trop.
Behrensiana, Gilg & Busse, l. c. xxxii. 175.—Afr. trop.
camptoneura, Gilg & Busse, l. c. xxxvi. 93.—Afr. trop.
cardiophylla, Gilg & Busse, l. c. 110.—Afr. trop.
ciliicalyx, Gilg & Busse, l. c. 95.—Afr. trop.
cuneifolia, Gilg & Busse, l. c. 100.—Afr. trop.
Elliottii, Gilg & Busse, l. c. 99.—Afr. trop.
emarginata, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 537.—Afr. trop.
euryphylla, Gilg & Busse, in Engl. Jahrb. xxxii. 179.—Afr. trop.
Gilletii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 176.—Afr. trop.
Harmsii, Gilg & Busse, in Engl. Jahrb. xxxvi. 109.—Afr. trop.
huillensis, Gilg & Busse, l. c. 104.—Afr. trop.
leiocarpa, Gilg & Busse, l. c. 103.—Afr. trop.
leiosepala, Gilg & Busse, l. c. 111.—Afr. trop.
malacoclados, C. H. Wright, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 523.—Afr. trop.
malifolia, Baker, in Dyer, l. c. 525.—Afr. trop.
Marquesii, Baker, in Dyer, l. c. 530.—Afr. trop.
matopensis, S. Moore, in Journ. Bot. 1905, 48.—Afr. trop.
megalocarpa, Gilg & Busse, in Engl. Jahrb. xxxii. 180.—Afr. trop.
melonicarpa, Gilg & Busse, l. c. xxxvi. 101.—Afr. trop.
Mocquerysi, Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 577.—Madag.
myrtoides, Gilg & Busse, in Engl. Jahrb. xxxii. 178.—Afr. trop.
omphalocarpa, Gilg & Busse, l. c. 181.—Afr. trop.
pachyphylla, Gilg & Busse, l. c. xxxvi. 96.—Afr. trop.
paralleloneura, Gilg & Busse, l. c. 112.—Afr. trop.
penduliflora, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 531.—Afr. trop.
phaeotricha, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxvi. 105.—Afr. trop.
polyphylla, Gilg & Busse, in Engl. Jahrb. xxxvi. 104.—Afr. trop.
procera, Gilg & Busse, l. c. 97.—Afr. trop.
radiosperma, Gilg & Busse, l. c. 108.—Afr. trop.
rhombifolia, Gilg & Busse, l. c. 107.—Afr. trop.
Schumanniana, Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 330.—Afr. trop.
stenoneura, Gilg & Busse, in Engl. Jahrb. xxxvi. 103.—Afr. trop.
suberifera, Gilg & Busse, l. c. 107.—Afr. trop.
suberosa, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 177.—Afr. trop.

STRYCHNOS:—
Thomsiana, *Gilg & Busse, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 111.—Afr. trop.
togoensis, *Gilg & Busse, l. c.* 96.—Afr. trop.
variabilis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér.* V. i. 178.—Afr. trop.
Zenkeri, *Gilg, ex Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 529.—Afr. trop.

STYASASIA, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. (1905) 195. *ACANTHACEAE.*
africana, *S. Moore, l. c.* (=*Isochoriste africana*).—Afr. trop.

STYLIDIUM, Sw. (Stylid.).
cygnorum, *Fitzg. in Journ. Muell. Soc. W. Austral.* i. ix. 16.—Austral.
Dielsianum, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 596.—Austral.
Maitlandianum, *E. Pritz. l. c.* 593.—Austral.
stenosepalum, *E. Pritz. l. c.* 590.—Austral.
yilgarnense, *E. Pritz. l. c.* 591.—Austral.

STYLOCHITON, Lepr. (Arac.).
Barteri, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 194.—Afr. trop.
borumensis, *N. E. Br. in Dyer, l. c.* 191; *et in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 777.—Afr. trop.
gabonicus, *N. E. Br. in Dyer, l. c.* 190.—Afr. trop.
grandis, *N. E. Br. l. c.* 193.—Afr. trop.
hostifolius, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 238.—Afr. trop.
kerensis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 193.—Afr. trop.
lobatus, *N. E. Br. l. c.* 190.—Afr. trop.
puberulus, *N. E. Br. in Dyer, l. c.* 188; *et in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 177.—Afr. trop.
salaamicus, *N. E. Br. in Dyer, l. c.* 189.—Afr. trop.
similis, *N. E. Br. l. c.* 194.—Afr. trop.
Warneckei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 239.—Afr. trop.

STYLOCORYNA, Cav. (Rubiac.).
(KANTHIA, Houst. I. K.)
adpressa, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 200.—Penins. Mal.
angustifolia, *King, l. c.* 199.—Penins. Mal.
Maingayi, *King, l. c.* 200.—Penins. Mal.

STYLOGYNE, A. DC. (Myrsin.).
(ARDISIA, Sw. I. K.)
amazonica, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 275.—Bras.
ambigua, *Mez, l. c.* 266 (=*Ardisia ambigua*).—Bras.
ardisioides, *Mez, l. c.* 276 (=*Myrsine ardisioides*).—Am. austr.
atra, *Mez, l. c.* 273.—Bras.
balaensis, *Mez, l. c.* 271.—Ecuador.
brasiliensis, *Mez, l. c.* 269.—Bras.
Brunnii, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 417.—Ind. occ.
brunnescens, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 267.—Am. trop.
canaliculata, *Mez, l. c.* 268 (=*Ardisia canaliculata*).—Ind. occ.
cauliflora, *Mez, l. c.* 276 (=*Ardisia cauliflora*).—Reg. Amaz.
depauperata, *Mez, l. c.* 277.—Bras.
Funckeana, *Mez, l. c.* 271.—Venez.
Hayesii, *Mez, l. c.* 272.—Am. cent.
indecora, *Mez, l. c.* 277.—Bras.
Kappleri, *Mez, l. c.* 275.—Guiana.
laevigata, *Mez, l. c.* 266 (=*Icacorea laevigata*).—Bras.
laevis, *Mez, l. c.* 268 (=*Ardisia laevis*).—Mexic.
lateriflora, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 418 (=*Ardisia lateriflora*).—Ind. occ.
laxiflora, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 273 (=*Badula laxiflora*).—Bras.
leptantha, *Mez, l. c.* 267.—Bras.
Lhotzkyana, *Mez, l. c.* 269 (=*Ardisia Lhotzkyana*).—Bras.
longifolia, *Mez, l. c.* 276 (=*Ardisia longifolia*).—Am. trop.
Mathewsii, *Mez, l. c.* 276.—Peruv.
micans, *Mez, l. c.* 272.—Guiana.
micrantha, *Mez, l. c.* 276 (=*Ardisia micrantha*).—N. Granat.
nigricans, *Mez, l. c.* 267.—Bras.

STYLOGYNE:—
orinocensis, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 270 (=*Ardisia orinocensis*).—Venez.
pauciflora, *Mez, l. c.* 278.—Bras.
Poeppigii, *Mez, l. c.* 274.—Am. trop.
ramiflora, *Mez, l. c.* 272 (=*Ardisia ramiflora*).—Am. cent.
reticulata, *Mez, l. c.* 269.—N. Granat.
Schomburgkiana, *Mez, l. c.* 270 (=*Ardisia Schomburgkiana*).—Guiana.
Sellowiana, *Mez, l. c.* 278.—Bras.
Smithiorum, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 418.—Ind. occ.
sordida, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 277.—Bras.
Spruceana, *Mez, l. c.* 274.—Am. trop.
surinamensis, *Mez, l. c.* 271 (=*Ardisia surinamensis*).—Guiana.
turbacensis, *Mez, l. c.* 270 (=*Ardisia turbacensis*).—N. Granat.
venezuelana, *Mez, l. c.* 273.—Venez.
Warmingii, *Mez, l. c.* 278.—Bras.

STYLOPHORUM, Nutt. (Papav.).
sutchuense, *Fedde, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 45 (=*Hylomecon sutchuense*).—China.

STYLOPHYLLUM, Britton & Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1903) 33. *CRASSULACEAE.*
albidum, *Rose, l. c.* 34.—Calif.
attenuatum, *Britton & Rose, l. c.* 36 (=*Cotyledon attenuata*).—Calif.
densiflorum, *Rose, l. c.*—Calif.
edule, *Britton & Rose, l. c.* (=*Sedum edule*).—Calif.
Hassei, *Rose, l. c.* 35.—Calif.
insulare, *Rose, l. c.* 34.—Calif.
Orcuttii, *Rose, l. c.* 36.—Calif.
Parishii, *Britton, l. c.* 37.—Calif.
semiteres, *Rose, l. c.* 35.—Calif.
Traskae, *Rose, l. c.* 34.—Calif.
virens, *Rose, l. c.*—Calif.
viscidum, *Britton & Rose, l. c.* 33 (=*Cotyledon viscida*).—Calif.

STYLOSANTHES, Sw. (Legum.).
hispidissima, *Auct. in Proc. Biol. Soc. Washington,* xiii. 207.—Am. bor.

STYRAX, Linn. (Styrac.).
caloneurus, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxxi. 484.—China.
dasyanthus, *Perkins, l. c.* 485.—China.
davillifolius, *Perkins, l. c.* 482.—N. Granat.
formosanus, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo,* xv. 75.—Formosa.
hypochryseus, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxxi. 479.—Am. cent.
hypoglaucus, *Perkins, l. c.* 486.—China.
lasiocalyx, *Perkins, l. c.* 481.—N. Granat.
lauraceus, *Perkins, l. c.* 478.—N. Granat.
macranthus, *Perkins, l. c.* 487.—China.
macrothyrsus, *Perkins, l. c.* 485.—Tonkin.
micranthus, *Perkins, l. c.* 480.—Mexic.
myristicifolius, *Perkins, l. c.* 481.—Am. trop.
pachyphylla, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 182.—Bras.
paralleloneurus, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxxi. 484.—Sumatra.
polyanthus, *Perkins, l. c.* 479.—Am. cent.
polyneurus, *Perkins, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. (1903), 5.—Am. cent.
prunifolius, *Perkins, in Engl. Jahrb.* xxxi. 486.—China.
Roraimae, *Perkins, l. c.* 478.—Guiana.
tarapotensis, *Perkins, l. c.* 479.—Peruv.
Warscewiczii, *Perkins, l. c.* 480.—Am. trop.

SUAEDA, Forsk. (Chenopod.).
caespitosa, *Dod, in Journ. Bot.* 1901, 401.—Afr. austr.
Lipskii, *Litw. in Sched. Herb. Fl. Ross,* 1901, 35.—As. cent.
Olufsenii, *Paulsen, in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* 1903, 194.—As. cent.
Paulayana, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1903, 481.—Socotra.
vesceritensis, *L. Chevall. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 777.—Alger.

SULLIVANTIA, Torr. & Gray (Saxifr.).
halmicola, *A. Nelson, in N. Am. Fl.* xxii. 122.—Am. bor.

SUTERA, Roth (Scrophul.).
accrescens, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 305.—Afr. austr.
altoplana, *Hiern, l. c.* 302.—Afr. austr.
amplexicaulis, *Hiern, l. c.* 287 (=*Lyperia amplexicaulis*).—Afr. trop. et austr.
annua, *Hiern, l. c.* 264 (=*Chaenostoma annuum*).—Afr. austr.
antirrhinoides, *Hiern, l. c.* 274 (=*Manulea antirrhinoides*).—Afr. austr.
arcuata, *Hiern, l. c.* 266.—Afr. austr.
argentea, *Hiern, l. c.* 301 (=*Manulea argentea*).—Afr. austr.
asbestina, *Hiern, l. c.* 285.—Afr. austr.
aspalathoides, *Hiern, l. c.* 306 (=*Lyperia aspalathoides*).—Afr. austr.
atropurpurea, *Hiern, l. c.* 306 (=*Manulea atropurpurea*).—Afr. austr.
batlapina, *Hiern, l. c.* 265.—Afr. austr.
Bolusii, *Hiern, l. c.* 300.—Afr. austr.
bracteolata, *Hiern, l. c.* 276.—Afr. austr.
breviflora, *Hiern, l. c.* 288 (=*Lyperia breviflora*).—Afr. austr.
brunnea, *Hiern, l. c.* 305.—Afr. austr.
Burchellii, *Hiern, l. c.* 279.—Afr. austr.
Burkeana, *Hiern, l. c.* 299 (=*Lyperia Burkeana*).—Afr. trop. et austr.
caerulea, *Hiern, l. c.* 255 (=*Manulea caerulea*).—Afr. austr.
canescens, *Hiern, l. c.* 303 (=*Lyperia canescens*).—Afr. trop. et austr.
compta, *Hiern, l. c.* 263.—Afr. austr.
concinna, *Hiern, l. c.* 293.—Afr. austr.
Cooperi, *Hiern, l. c.* 282.—Afr. austr.
crassicaulis, *Hiern, l. c.* 294 (=*Lyperia crassicaulis*).—Afr. austr.
cymulosa, *Hiern, l. c.* 267.—Afr. austr.
densifolia, *Hiern, l. c.* 309.—Afr. austr.
Dielsiana, *Hiern, l. c.* 284 (=*Lyperia racemosa*).—Afr. austr.
divaricata, *Hiern, l. c.* 281 (=*Chaenostoma divaricatum*).—Afr. austr.
elliotensis, *Hiern, l. c.* 251.—Afr. austr.
filicaulis, *Hiern, l. c.* 298 (=*Lyperia filicaulis*).—Afr. austr.
flexuosa, *Hiern, l. c.* 252.—Afr. austr.
foliolosa, *Hiern, l. c.* 296 (=*Lyperia foliolosa*).—Afr. austr.
fraterna, *Hiern, l. c.* 274.—Afr. austr.
fruticosa, *Hiern, l. c.* 288 (=*Lyperia fruticosa*).—Afr. austr.
gracilis, *Hiern, l. c.* 283 (=*Chaenostoma gracile*).—Afr. austr.
grandiflora, *Hiern. l. c.* 304 (=*Lyperia grandiflora*).—Afr. austr.
griquensis, *Hiern, l. c.* 279.—Afr. austr.
Henrici, *Hiern, l. c.* 300.—Afr. austr.
humifusa, *Hiern, l. c.* 281.—Afr. austr.
incisa, *Hiern, l. c.* 303 (=*Erinus incisus*).—Afr. austr.
integerrima, *Hiern, l. c.* 284.—Afr. austr.
intertexta, *Hiern, l. c.* 256.—Afr. austr.
Kraussiana, *Hiern, l. c.* 301 (=*Chaenostoma Kraussianum*).—Afr. austr.
latifolia, *Hiern, l. c.* 281.—Afr. austr.
levis, *Hiern, in Journ. Bot.* 1903, 364.—Afr. austr.
litoralis, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. ii. 291 (=*Lyperia litoralis*).—Afr. austr.
luteiflora, *Hiern, l. c.* 294.—Afr. trop. et austr.
lychnidea, *Hiern, l. c.* 290 (=*Selago lychnidea*).—Afr. austr.
Macleana, *Hiern, l. c.* 276.—Afr. austr.
macrosiphon, *Hiern, l. c.* 286 (=*Chaenostoma macrosiphon*).—Afr. austr.
maritima, *Hiern, l. c.* 277.—Afr. austr.
Maxii, *Hiern, l. c.* 288.—Afr. trop. et austr.
micrantha, *Hiern, l. c.* 263.—Afr. austr.
microphylla, *Hiern, l. c.* 309 (=*Manulea microphylla*).—Afr. austr.
mollis, *Hiern, l. c.* 295 (=*Lyperia mollis*).—Afr. austr.
neglecta, *Hiern, l. c.* 260 (=*Chaenostoma neglectum*).—Afr. austr.
noodsbergensis, *Hiern, l. c.* 264.—Afr. austr.
ochracea, *Hiern, l. c.* 282.—Afr. austr.
pallescens, *Hiern, l. c.* 280.—Afr. austr.
palustris, *Hiern, l. c.* 256.—Afr. austr.
patriotica, *Hiern, l. c.* 250.—Afr. austr.
pedunculata, *Hiern, l. c.* 307 (=*Buchnera pedunculata*).—Afr. austr.

SUTERA:—
phlogiflora, Hiern, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 298 (= Lyperia phlogiflora).—Afr. austr.
platysepala, Hiern, l. c. 249.—Afr. austr.
polelensis, Hiern, l. c. 252.—Afr. austr.
polysepala, Hiern, l. c. 254.—Afr. austr.
pristisepala, Hiern, l. c. 293.—Afr. austr.
ramosissima, Hiern, l. c. 265.—Afr. austr.
roseoflava, Hiern, l. c. 251.—Afr. austr.
sessilifolia, Hiern, l. c. 291 (= Chaenostoma sessilifolium).—Afr. austr.
stenopetala, Hiern, l. c. 305 (= Chaenostoma stenopetalum).—Afr. austr.
stenophylla, Hiern, l. c. 258.—Afr. austr.
subnuda, Hiern, l. c. (= Chaenostoma subnudum).—Afr. austr.
tenella, Hiern, l. c. 278.—Afr. austr.
tenuiflora, Hiern, l. c. 291 (= Lyperia tenuiflora).—Afr. austr.
tomentosa, Hiern, l. c. 288 (= Erinus tomentosus).—Afr. trop. et austr.
tortuosa, Hiern, l. c. 309 (= Lyperia tortuosa).—Afr. austr.
tristis, Hiern, l. c. 289 (= Erinus tristis).—Afr. austr.
Tysoni, Hiern, l. c. 296.—Afr. austr.
violacea, Hiern, l. c. 286 (= Chaenostoma violaceum).—Afr. austr.
virgulosa, Hiern, l. c. 302.—Afr. austr.

SUTTONIA, A. Rich. (Myrsin.).
[MYRSINE, Linn. I. K.]
angustifolia, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. 387 (= Myrsine angustifolia).—Ins. Sandvic.
chathamica, Mez, l. c. 333 (= Myrsine chathamica).—N. Zel.
Fernseei, Mez, l. c. 336.—Ins. Sandvic.
Hillebrandii, Mez, l. c. 337.—Ins. Sandvic.
kauaiensis, Mez, l. c. 335 (= Myrsine kauaiensis).—Ins. Sandvic.
lanaiensis, Mez, l. c. 336 (= Myrsine lanaiensis).—Ins. Sandvic.
Lessertiana, Mez, l. c. (= Myrsine Lessertiana).—Ins. Sandvic.
novo-zelandensis, Mez, l. c. 334 (= Myrsine novo-zelandensis).—N. Zel.
sandwicensis, Mez, l. c. 336 (= Myrsine sandwicensis).—Ins. Sandvic.
Wawrae, Mez, l. c. 335.—Ins. Sandvic.

SVIDA, Opiz (Cornac.).
[CORNUS, Tourn. I. K.]
alternifolia, Small, Fl. S. E. U. S. 853 (= Cornus alternifolia).—Am. bor.
Amomum, Small, l. c. 854 (= Cornus Amomum).—Am. bor.
asperifolia, Small, l. c. (= Cornus asperifolia).—Am. bor.
candidissima, Small, l. c. 853 (= Cornus candidissima).—Am. bor.
interior, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 572.—Am. bor.
microcarpa, Small, Fl. S. E. U. S. 853 (= Cornus microcarpa).—Am. bor.
Priceae, Small, l. c. 854 (= Cornus Priceae).—Am. bor.
stricta, Small, l. c. 853 (= Cornus stricta).—Am. bor.

SWAINSONA, Salisb. (Legum.).
ecallosa, Sprague, in Gard. Chron. 1903, i. 274.—Austral.
paradoxa, Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc. i. 5.—Austral.
tenuis, E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. 270.—Austral.

SWEETIA, Spreng. (Legum.).
Glazioviana, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. Beibl. lxxii. 26.—Bras.

SWEETIOPSIS, Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. (1904) 833. LEGUMINOSAE.
Hassleri, Chod. l. c.—Parag.

SWERTIA, Linn. (Gentian.).
brevipedicellata, Gilg, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 577.—Afr. trop.
calycina, N. E. Br. in Dyer, l. c. 574.—Afr. trop.
congesta, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 228.—Am. bor.
Covillei, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 77.—Calif.

SWERTIA:—
curtioides, Gilg, in Engl. Jahrb. xxx. 379.—Afr. trop.
dissimilis, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 579.—Afr. trop.
erosula, N. E. Br. l. c. 572.—Afr. trop.
fwambensis, N. E. Br. l. c. 574.—Afr. trop.
Johnsoni, N. E. Br. l. c. 572.—Afr. trop.
Kuroiwai, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 53.—Japon.
minor, Cooke, Fl. Bombay, ii. 193 (= Ophelia minor).—Ind. or.
palustris, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 227.—Am. bor.
parallela, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. 92.—Am. bor.
Sharpei, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 581.—Afr. trop.
subalpina, N. E. Br. l. c. 578.—Afr. trop.
tosaensis, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 54.—Japon.
veratroides, Maxim. ex Komarov, in Act. Hort. Petrop. xxv. (1905) 276.—Manchuria.
warackensis, Freyn, in Bull Herb. Boiss. Sér. II. i. 274.—Oriens.
Wellbyi, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 577.—Afr. trop.
Whytei, N. E. Br. l. c. 579.—Afr. trop.
wojeratensis, N. E. Br. l. c. 577.—Afr. trop.
yesoensis, Matsum. Enum. Sci. Names (1895) 287 (= Ophelia yesoensis).—Japon.

SYMBEGONIA, Warb. (Begon.).
bracteosa, Warb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 323.—N. Guin.
sanguinea, Warb. l. c.—N. Guin.
strigosa, Warb. l. c. 324.—N. Guin.

SYMPETALANDRA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2721. LEGUMINOSAE.
borneensis, Stapf, l. c.—Malaya.

SYMPHORICARPOS, Dill. (Caprifol.).
acutus, Howell, Fl. N. W. Amer. 281.—Am. bor.
Austinae, Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 499.—Calif.
glabratus, Eastw. l. c.—Am. bor.
glaucus, Eastw. l. c. 497.—Am. bor.
parvifolius, Eastw. l. c. 498.—Calif.
pauciflorus, Howell, Fl. N. W. Amer. i. 281.—Am. bor.
tetonensis, A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club, 1904, 246.—Am. bor.

SYMPHYANDRA, A. DC. (Campan.).
lezgina, Alex. in Act. Hort. Tiflis, vi. i. 68.—Reg. Caucas.

SYMPHYOCHLAMYS, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxiii. (1903) 379. MALVACEAE.
Erlangeri, Guerke, l. c.—Afr. trop.

SYMPHYOSTEMON, Miers (Irid.).
Segethi, Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. viii. 819 (= Susarium Segethi).—Patag.

SYMPHYTUM, Tourn. (Borag.).
pseudobulbosum, Aznav. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 588.—As. Min.

SYMPLOCOS, Jacq. (Styrac.).
acutangula, Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc. 65.—China.
aegrota, Brand, l. c. 71.—Bras.
albifrons, Brand, l. c. 88.—Borneo.
altissima, Brand, l. c. 71.—Bras.
aluminosa, Brand, l. c. 35.—Java.
amabilis, Brand, l. c. 63.—Ind. or.
amplifolia, Brand, l. c. 75.—Venez.
aneityensis, Brand, l. c. 39.—N. Hebrid.
angulata, Brand, l. c. 73.—Bras.
apiculata, Brand, l. c. 85.—Ind. occ.
arenata, Brand, l. c. 58.—Java.
argentea, Brand, l. c. 67.—China.
ascendens, Brand, l. c. 71.—Bras.
aspera, Brand, l. c. 80.—N. Granat.
Baeuerleni, R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxvii. 594.—Austral.
Barbacenae, Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc. 81.—Bras.
barringtoniifolia, Brand, in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève, vii-viii. 283.—Ind. or.
Beccarii, Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc. 49.—Sumatra.

SYMPLOCOS:—
bogotensis, Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc. 30.—N. Granat.
boliviana, Brand, l. c. 89.—Boliv.
borneensis, Brand, l. c. 56.—Borneo.
calycodactylos, Brand, l. c. 63.—Ind. or.
campestris, Brand, l. c. 84.—Bras.
candelabrum, Brand, l. c. 39.—Austral.
candicans, Brand, l. c. 49.—Borneo.
Candolleana, Brand, l. c. 49.—Ind. or.
capitellata, Brand, l. c. 88.—Sumatra.
colorata, Brand, l. c. 74.—Boliv.
commutata, Brand, l. c. 82.—Bras.
complanata, Brand, l. c. 50.—As.
concolor, Brand, l. c. 65.—Ind. or.
confusa, Brand, l. c. 85.—Ind. or.
constricta, Brand, l. c. 41.—Malaya.
corymboclados, Brand, l. c. 72.—Bras.
cucullata, Brand, l. c. 56.—Ind. or.
Cumingiana, Brand, l. c. 58.—Ins. Philipp.
cuspidata, Brand, l. c. 69.—China.
dasyphylla, Brand, l. c. 27.—Bras.
defoliata, Brand, l. c. 41.—N. Caled.
densiflora, Brand, l. c. 71.—Bras.
depauperata, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxix. 45.—Ins. Philipp.
distans, Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc. 82.—Bras.
diversifolia, Brand, l. c. 62.—Ind. or.
edulis, Brand, l. c. 89.—Ecuador.
Elmeri, Brand, in Perkins, Frag. Fl. Philipp. 36.—Ins. Philipp.
Ernae, Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc. 58.—Borneo.
falcata, Brand, l. c. 71.—Bras.
fallax, Brand, l. c. 86.—Bras.
flavescens, Brand, l. c. 55.—N. Caled.
floridissima, Brand, l. c. 35.—Ins. Philipp.
Forbesii, Brand, l. c. 63.—Sumatra.
formosana, Brand, l. c. 67.—Formosa.
frondosa, Brand, l. c. 28.—Bras.
fulvipes, Brand, l. c. 41.—As. or.
furcata, Brand, l. c. 57.—Ind. or.
glabrescens, Brand, l. c. 64.—Ind. or.
glabrifolia, Brand, l. c. 53.—Ind. or.
glandulifera, Brand, l. c. 68.—China.
Glaziovii, Brand, l. c. 73.—Bras.
Havilandii, Brand, l. c. 41.—Borneo.
Henryi, Brand, l. c. 67.—China.
Henschelii, Brand, l. c. 89 = S. Nagelii.
hirtella, Brand, l. c. 78.—Bras.
Huegeliana, Brand, l. c. 57.—Ind. or.
insignis, Brand, l. c. 27.—Bras.
khasiana, Brand, l. c. 58.—Ind. or.
Klotzschii, Brand, l. c. 87.—Bras.
leucophylla, Brand, l. c. 60.—China.
liukiuensis, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xv. 78; l. c. xvi. 19.—Japon.
longiflora, Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc. 85.—N. Granat.
lugubris, Brand, l. c. 75.—Peruv.
lutescens, Brand, l. c. 76.—N. Granat.
macrostachya, Brand, l. c. 36.—Malaya.
maculata, Brand, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 348.—N. Guin.
major, Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc. 66.—Ind. or.
mapiriensis, Brand, l. c. 74.—Boliv.
modesta, Brand, l. c. 66.—Formosa.
Mosenii, Brand, l. c. 29.—Bras.
nana, Brand, l. c. 76.—Boliv.
neglecta, Brand, l. c. 28.—Bras.
nigrescens, Brand, l. c. 29.—Bras.
nigricans, Brand, l. c. 49.—Borneo.
nitidiflora, Brand, l. c. 71.—Bras.
nivalis, Linden, ex Brand, l. c. 81.—N. Granat.
nivea, Brand, l. c. 36.—Ind. or.
okinawensis, Matsum. in Bot. Mag. Tokyo, xv. 78.—Japon.
organensis, Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc. 72.—Bras.
orogenes, Brand, l. c. 42.—Cochinch.
padus, Klotzsch, ex Brand, l. c. 87.—Bras.
Pavonii, Brand, l. c. 75.—Ecuador.
peruviana, Brand, l. c. 89.—Peruv.
pilosiuscula, Brand, l. c. 83.—Guiana.
polyandra, Brand, l. c. 36.—Ins. Philipp.
quindiuensis, Brand, l. c. 77.—N. Granat.

SYMPLOCOS:—
quitensis, *Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc.* 76.—Ecuador.
rhynchocarpa, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 347.—N. Guin.
rigidissima, *Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc.* 75.—N. Granat.
Schlechteri, *Brand, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 348.—Ins. Bismarck.
Schumanniana, *Brand, l. c.* 347 (*sphalm. Schumaniana*).—N. Guin.
scoparia, *Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc.* 89.—Bras.
Sellowiana, *Brand, l. c.* 81.—Bras.
siamensis, *Brand, l. c.* 57.—Siam.
sogonensis, *Brand, l. c.* 49.—N. Guin.
spectabilis, *Brand, l. c.* 69.—China.
Stocksii, *Brand, l. c.* 59.—Ind. or.
suaveolens, *Klotzsch, ex Brand, l. c.* 76.—Venez.
subglabra, *Brand, l. c.*—Ind. or.
sumatrana, *Brand, l. c.* 62.—Sumatra.
superba, *Brand, l. c.* 55.—Borneo.
syringoides, *Brand, l. c.* 41.—Malaya.
Tanakae, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 79.—Japon.
Tashiroi, *Matsum. l. c.* 77.—Formosa.
tenella, *Brand, in Engl. Pflanzenreich, Symploc.* 64.—Ind. or.
tenuifolia, *Brand, l. c.* 71.—Bras.
terminalis, *Brand, l. c.* 36.—China.
tonkinensis, *Brand, l. c.* 66.—Cochinch.
trachycarpos, *Brand, l. c.* 81.—Bras.
Trianae, *Brand, l. c.* 82.—N. Granat.
tristis, *Brand, l. c.* 74.—Peruv.
umbellata, *Brand, l. c.* 75.—N. Granat.
uruguensis, *Brand, l. c.* 87.—Bras.; Urug.
verrucosa, *Brand, l. c.* 27.—Bras.
verticillata, *Brand, l. c.* 38.—N. Caled.
villosa, *Brand, l. c.* 63.—Ind. or.
violacea, *Brand, l. c.* 81.—N. Granat.
viridissima, *Brand, l. c.* 41.—Ind. or.
Walkeri, *Brand, l. c.* 63.—Ind. or.
Warburgii, *Brand, l. c.* 66.—Ind. or.
yunnanensis, *Brand, l. c.* 68.—China.

SYNADENIUM, Boiss. (Euphorb.).
Cameronii, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 133.—Afr. trop.
glaucescens, *Pax, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 289.—Afr. trop.

SYNCOLOSTEMON, E. Mey. (Labiat.).
Cooperi, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 979.—Afr. austr.

SYNGONANTHUS, Ruhl. (Eriocaul.).
aciphyllus, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 273 (= *Paepalanthus aciphyllus*).—Bras.
anomalus, *Ruhl. l. c.* 267 (= *Paepalanthus anomalus*).—Am. austr.
anthemidiflorus, *Ruhl. l. c.* 258 (= *Paepalanthus anthemidiflorus*).—Bras.
appressus, *Ruhl. l. c.* 269 (= *Paepalanthus appressus*).—Bras.
arenarius, *Ruhl. l. c.* 260 (= *Paepalanthus arenarius*).—Bras.
atrovirens, *Ruhl. l. c.* 261 (= *Paepalanthus atrovirens*).—Bras.
bisulcatus, *Ruhl. l. c.* 273 (= *Paepalanthus bisulcatus*).—Bras.
bisumbellatus, *Ruhl. l. c.* 263 (= *Paepalanthus Steudelianus*).—Bras.
bulbifer, *Ruhl. l. c.* 272 (= *Paepalanthus bulbifer*).—Guiana.
caespitosus, *Ruhl. l. c.* 278 (= *Paepalanthus caespitosus*).—Bras.
caulescens, *Ruhl. l. c.* 267 (= *Paepalanthus caulescens*).—Am. austr.
centauroides, *Ruhl. l. c.* 277 (= *Paepalanthus centauroides*).—Bras.
chrysanthus, *Ruhl. l. c.* 256 (= *Paepalanthus chrysanthus*).—Bras.
cipoensis, *Ruhl. l. c.* 278.—Bras.
circinnatus, *Ruhl. l. c.* 279 (= *Paepalanthus circinnatus*).—Bras.
costatus, *Ruhl. l. c.* 252.—Bras.
densiflorus, *Ruhl. l. c.* 263 (= *Paepalanthus densiflorus*).—Bras.
densus, *Ruhl. l. c.* 253 (= *Paepalanthus densus*).—Bras.

SYNGONANTHUS:—
eburneus, *Ruhl. in Engl. Pflanzenreich, Eriocaul.* 276 (= *Paepalanthus eburneus*).—Bras.
elegans, *Ruhl. l. c.* 275 (= *Paepalanthus elegans*).—Bras.
elegantulus, *Ruhl. l. c.* 273.—Bras.
eriophyllus, *Ruhl. l. c.* 249 (= *Paepalanthus eriophyllus*).—Guiana.
euschemus, *Ruhl. l. c.* 274.—Bras.
fertilis, *Ruhl. l. c.* 263 (= *Paepalanthus fertilis*).—Bras.
Fischerianus, *Ruhl. l. c.* 256 (= *Paepalanthus Fischerianus*).—Bras.
flavidulus, *Ruhl. l. c.* (= *Paepalanthus flavidulus*).—Am. bor.
fuscescens, *Ruhl. l. c.* 249.—Bras.
goyazensis, *Ruhl. l. c.* 255 (= *Paepalanthus goyazensis*).—Bras.
gracilis, *Ruhl. l. c.* 249 (= *Paepalanthus gracilis*).—Am. austr.
habrophyus, *Ruhl. l. c.* 274.—Bras.
helminthorrhizus, *Ruhl. l. c.* 261 (= *Paepalanthus helminthorrhizus*).—Bras.
heteropeplus, *Ruhl. l. c.* 248 (= *Paepalanthus heteropeplus*).—Guiana.
hirtellus, *Ruhl. l. c.* 252.—Bras.
Huberi, *Ruhl. l. c.* 266.—Bras.
Humboldtii, *Ruhl. l. c.* 262 (= *Paepalanthus Humboldtii*).—Venez.
hygrotrichus, *Ruhl. l. c.* 246.—Bras.
imbricatus, *Ruhl. l. c.* 279 (= *Paepalanthus imbricatus*).—Bras.
inundatus, *Ruhl. l. c.* 267 (= *Paepalanthus inundatus*).—Bras.
Kegelianus, *Ruhl. l. c.* 273 (= *Paepalanthus Kegelianus*).—Guiana.
laricifolius, *Ruhl. l. c.* 267 (= *Paepalanthus laricifolius*).—Bras.
Leprieurii, *Ruhl. l. c.* 266 (= *Paepalanthus Leprieuri*).—Guiana.
linearis, *Ruhl. l. c.* 272.—Bras.
llanorum, *Ruhl. l. c.* 265.—N. Granat.
macrocaulon, *Ruhl. l. c.* 269.—Am. austr.
nitens, *Ruhl. l. c.* 254 (= *Paepalanthus nitens*).—Bras.
nitidus, *Ruhl. l. c.* 272 (= *Paepalanthus nitidus*).—Bras.
niveus, *Ruhl. l. c.* 275 (= *Paepalanthus niveus*).—Bras.
oblongus, *Ruhl. l. c.* 260 (= *Paepalanthus oblongus*).—Bras.
paraensis, *Ruhl. l. c.* 264.—Bras.
pauper, *Ruhl. l. c.* 274.—Bras.
peruvianus, *Ruhl. l. c.* 253.—Peruv.
philodicoides, *Ruhl. l. c.* 266 (= *Paepalanthus philodicoides*).—Bras.
planus, *Ruhl. l. c.* 265.—Bras.
Poggeanus, *Ruhl. l. c.* 247.—Afr. trop.
pulcher, *Ruhl. l. c.* 255 (= *Paepalanthus pulcher*).—Bras.
pusillus, *Ruhl. l. c.* 254 (= *Paepalanthus pusillus*).—Bras.
reclinatus, *Ruhl. l. c.* 260 (= *Paepalanthus reclinatus*).—Bras.
rhizonema, *Ruhl. l. c.* 269.—Bras.
Ruprechtianus, *Ruhl. l. c.* 272 (= *Paepalanthus Ruprechtianus*).—Bras.
Schwackei, *Ruhl. l. c.* 259.—Bras.
sclerophyllus, *Ruhl. l. c.* 255.—Bras.
similis, *Ruhl. l. c.* 259.—Bras.
simplex, *Ruhl. l. c.* 248 (= *Paepalanthus simplex*).—Venez.; Guiana.
spadiceus, *Ruhl. l. c.* 255 (= *Paepalanthus spadiceus*).—Bras.
squarrosus, *Ruhl. l. c.* 276.—Bras.
tenuis, *Ruhl. l. c.* 253 (= *Paepalanthus tenuis*).—Venez.
vernonioides, *Ruhl. l. c.* 277 (= *Paepalanthus vernonioides*).—Bras.
verticillatus, *Ruhl. l. c.* 262 (= *Paepalanthus verticillatus*).—Bras.
Wahlbergii, *Ruhl. l. c.* 247 (= *Paepalanthus Wahlbergii*).—Afr. austr.
Welwitschii, *Ruhl. l. c.* 248 (= *Paepalanthus Welwitschii*).—Afr. trop.
Widgrenianus, *Ruhl. l. c.* 256 (= *Paepalanthus Widgrenianus*).—Bras.
xeranthemoides, *Ruhl. l. c.* 276 (= *Paepalanthus xeranthemoides*).—Am. austr.

SYNGONIUM, Schott (Arac.).
Donnell-Smithii, *Engl. Jahrb.* xxxvii. 141.—Am. cent.
hastifolium, *Engl. l. c.*—Bras.
reticulatum, *Engl. l. c.* 140.—Ecuador.
yurimaguense, *Engl. l. c.* 141.—Peruv.

SYNNOTIA, Sweet (Irid.).
stenophylla, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 865.—Afr. austr.

SYNSEPALUM, Baill. (Sapot.).
stipulatum, *Engl. Monogr. Afr. Pfl.* viii. 33 (= *Stironeurum stipulatum*).—Afr. trop.
ulugurense, *Engl. l. c.* 32 (= *Chrysophyllum ulugurense*).—Afr. trop.

SYNTHLIPSIS, A. Gray (Crucif.).
lepidota, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 294.—Mexic.

SYNTHYRIS, Benth. (Scrophul.).
Bullii, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 4 (= *Gymnandra Bullii*).—Am. bor.
cordata, *A. A. Heller, l. c.* (= *Wulfenia cordata*).—Am. bor.
flavescens, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxiv. 33.—Am. bor.
gymnocarpa, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 5 (= *Wulfenia gymnocarpa*).—Am. bor.
major, *A. A. Heller, l. c.* (= *Wulfenia major*).—Am. bor.
schizantha, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 223.—Am. bor.
wyomingensis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 5 (= *Wulfenia wyomingensis*).—Am. bor.

SYRINGA, Linn. (Oleac.).
Dielsiana, *Schneider, in Engl. Jahrb.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 88.—China.
Giraldiana, *Schneider, l. c.*—China.
velutina, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 428.—Corea.

SYZYGIUM, Gaertn. (Myrtac.).
[EUGENIA, Mich. I. K.]
cleyeraefolium, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 15 (= *Eugenia cleyeraefolia*).—Japon.
pallidum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 38.—Ins. Philipp.
Rowlandi, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 1170.—Afr. trop.

T

TABEBUIA, Gomez (Bignon.).
araliacea, *Morong & Britton, in Ann. N. York Acad. Sci.* vii. 190 (= *Tecoma araliacea*).—Am. austr.
rufescens, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 696.—Venez.

TABERNAEMONTANA, Plum. (Apocyn.).
erythrophthalma, K. Schum. ex Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 196 = Alafia grandis.
eusepala, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 579.—Madag.
inaequalis, Pierre, ex Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 132 = Callichilia inaequalis.
Jollyana, Pierre, ex Stapf, l. c. 144 = Conopharyngia Jollyana.
Mocquerysi, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 579.—Madag.
trialata, Pierre, ex Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 126 = Pterotaberna inconspicua.

TABERNANTHE, Baill. (Apocyn.).
Bocca, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 122.—Afr. trop.
Mannii, *Stapf, l. c.* 123.—Afr. trop.
subsessilis, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.

TACAZZEA, Decne. (Asclep.).
africana, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 261 (= *Pleurostelma africanum*).—Afr. trop.
floribunda, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 381.—Afr. trop.

TACAZZEA:—
rosmarinifolia, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 263 (= *Aechmolepis rosmarinifolia*).—Afr. trop.
salicina, *Schlechter, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 339.—Afr. trop.
volubilis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 262 (= *Raphionacme volubilis*).—Afr. trop.

TACCA, Forst. (Taccac.).
Chantieri, *André, in Rev. Hortic.* 1901, 541.—Arch. Mal.
macrantha, *Limpr. Beitr. zur Taccaceen*, 45.—Hort.

TACCARUM, Brongn. (Arac.).
Hasslerianum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1114.—Parag.

TACHIGALIA, Aubl. (Legum.).
Rusbyi, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxxiii. *Beibl.* lxxii. 20.—Venez.

TACSONIA, Juss. (Passifl.).
Andreana, *Sodiro, Contrib. Fl. Ecuat. Monogr.* iii. 3.—Ecuador.
cyanea, *Sodiro, l. c.* 21.—Ecuador.
floribunda, *Sodiro, l. c.* 2 (= *Rathea floribunda*).—Ecuador.
Mariae, *Sodiro, l. c.* 18.—Ecuador.
psilantha, *Sodiro, l. c.* 28.—Ecuador.
rosea, *Sodiro, l. c.* 11.—Hybr.
Tungurahuae, *Sodiro, l. c.* 13.—Ecuador.

TAENIOPHYLLUM, Blume (Orchid.).
calcaratum, *J. J. Smith, in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 4.—Arch. Mal.
filiforme, *J. J. Smith, l. c.*—Arch. Mal.
grandiflorum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 221.—N. Guin.
kompsopus, *Schlechter, l. c.* 220.—N. Guin.
neo-pommeranicum, *Schlechter, l. c.*—Ins. Bismarck.
palmicola, *Schlechter, l. c.* 221.—Ins. Bismarck.
platyrhizum, *Schlechter, l. c.* 222.—N. Guin.
pulvinatum, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
torricellense, *Schlechter, l. c.* 223.—N. Guin.

TAETSIA, Medic. (Liliac.).
[CORDYLINE, Royen. I. K.]
terminalis, *W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* ix. 332 (= *Asparagus terminalis*).—As. trop.; Austral.

TAGETES, Linn. (Compos.).
Hartwegii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 46.—Mexic.
jaliscensis, *Greenm. l. c.* 47.—Mexic.
Nelsonii, *Greenm. l. c.* xxxix. 117.—Mexic.

TALAUMA, Juss. (Magnol.).
grandiflora, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 13.—Ins. Philipp.
luzonensis, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 171.—Ins. Philipp.
oblongata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 8.—Ins. Philipp.

TAMARIX, Linn. (Tamaric.).
Androssowi, *Litw. in Sched. Herb. Fl. Ross.* v. 41.—Turkestan.
askabadensis, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1059.—Turkestan.
karakalensis, *Freyn, l. c.* 1060.—Turkestan.
sokotrana, *Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 62.—Socotra.

TAMBOURISSA, Sonner (Monim.).
Baroni, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 24.—Madag.
Lastelliana, *Drake, l. c.* (= *Monimia Lastelliana*).—Madag.
Perrieri, *Drake, l. c.*—Madag.

TANACETUM, Tourn. (Compos.).
Kuschakewiczi, *O. Fedtsch. Pl. Pamir*, 40.—As. cent.

TAONABO, Aubl. (Ternstroem.).
[TERNSTROEMIA, Mutis. I. K.]
lineata, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 322 (= *Ternstroemia lineata*).—Mexic.
Maltbyi, *Rose, l. c.* (= *Ternstroemia Maltbyi*).—Mexic.
oocarpa, *Rose, l. c.*—Mexic.
Pringlei, *Rose, l. c.*—Mexic.
sphaerocarpa, *Rose, l. c.*—Mexic.

TAPEINOCHEILOS, Miq. (Scitam.).
Queenslandiae, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 433.—Austral.

TAPEINOSPERMA, Hook. f. (Myrsin.).
amplexicaule, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 165.—N. Caled.
babuceuse, *Mez, l. c.* 164.—Ins. Fiji.
campanula, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 246.—N. Caled.
capitatum, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 165 (= *Ardisia capitata*).—Ins. Fiji.
clavatum, *Mez, l. c.* 164.—Ins. Fiji.
clethroides, *Mez, l. c.* 168.—N. Caled.
deflexum, *Mez, l. c.* 167.—N. Caled.
ellipticum, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 531.—N. Caled.
Flueckigeri, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 171 (= *Embelia Flueckigeri*).—Austral.
gracile, *Mez, l. c.* 166.—N. Caled.
grande, *Mez, l. c.* 164 (= *Ardisia grandis*).—Ins. Fiji.
Hornei, *Mez, l. c.*—Ins. Fiji.
laeve, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 531.—N. Caled.
laurifolium, *Mez, l. c.* 530.—N. Caled.
Lecardii, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 166.—N. Caled.
megaphyllum, *Mez, l. c.* 165 (= *Ardisia megaphylla*).—Ins. Fiji.
minutum, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 532.—N. Caled.
nectandroides, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 167.—N. Caled.
nitidum, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 533.—N. Caled.
oblongifolium, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 169.—N. Caled.
Pancheri, *Mez, l. c.* 166.—N. Caled.
pauciflorum, *Mez, l. c.* 170.—N. Caled.
psaladense, *Mez, l. c.* 167.—N. Caled.
pseudojambosa, *Mez, l. c.* 170 (= *Ardisia pseudojambosa*).—Austral.
pulchellum, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 528.—N. Caled.
robustum, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 168.—N. Caled.
rubidum, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 528.—N. Caled.
salignum, *Mez, l. c.* 530.—N. Caled.
Schlechteri, *Mez, l. c.* 527.—N. Caled.
scrobiculatum, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 169 (= *Ardisia scrobiculata*).—N. Caled.
sessilifolium, *Mez, l. c.* 165.—N. Caled.
squarrosum, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 529.—N. Caled.
tenue, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 170.—N. Caled.
vestitum, *Mez, l. c.* 165.—N. Caled.
wagapense, *Mez, l. c.* 169.—N. Caled.

TAPIRIRA, Aubl. (Anacard.).
edulis, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 78 (1900).—Calif.
pilosa, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 430.—N. Granat.

TARAKTOGENOS, Hassk. (Bixac.).
bandogama, *Hassk. ex Aresch. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxix. no. 2, 103, nomen.—Arch. Mal.

TARAXACUM, Linn. (Compos.).
alaskanum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 512.—Am. bor.
ammophilum, *A. Nelson, ex Greene, Pittonia*, iv. 233.—Am. bor.
angustifolium, *Greene, l. c.* 232.—Am. bor.
arcticum, *Dahlst. in Arkiv Bot. Stockh.* iv. no. 8, 8.—Reg. arct.
balticum, *Dahlst. in Bot. Notiser*, 1905, 162.—Scandin.
Caramanicae, *Lojac. Fl. Sic.* ii. i. 200.—Sicil.
Chamissonis, *Greene, Pittonia*, iv. 228.—Am. bor.
decipiens, *Raunk. in Bot. Tidsskr.* xxv. 139.—Dania.
dumetorum, *Greene, Pittonia*, iv. 230.—Am. bor.
Gasparini, *Tin. in Lojac. Fl. Sic.* ii. i. 201.—Sicil.
Gelertii, *Raunk. in Bot. Tidsskr.* xxv. 139.—Dania.
hyparcticum, *Dahlst. in Arkiv Bot. Stockh.* iv. no. 8, 17.—Am. arct.

TARAXACUM:—
intermedium, *Raunk. in Bot. Tidsskr.* xxv. 139.—Dania.
lacerum, *Greene, Pittonia*, iv. 230.—Am. bor.
leiospermum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 137.—Am. bor.
mutilum, *Greene, Pittonia*, iv. 232.—Am. bor.
Ostenfeldii, *Raunk. in Bot. Tidsskr.* xxv. 139.—Dania.
ovinum, *Greene, Pittonia*, iv. 229.—Am. bor.
paludosum, *Raunk. in Bot. Tidsskr.* xxv. 139.—Dania.
platylepium, *Dahlst. in Arkiv Bot. Stockh.* iv. no. 8, 34.—Nova Semlia.
pumilum, *Dahlst. l. c.* 27.—Am. arct.
rupestre, *Greene, Pittonia*, iv. 229.—Am. bor.
Schroeterianum, *Hand.-Mazz. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 462.—Eur.
sibiricum, *Dahlst. in Arkiv Bot. Stockh.* iv. no. 8, 36.—Sibir.
speciosum, *Raunk. in Bot. Tidsskr.* xxv. 139.—Dania.
spectabile, *Dahlst. in Bot. Notiser*, 1905, 159.—Reg. bor.

TARAXIA, Raimann (Onagr.).
[OENOTHERA, Linn. I. K.]
taraxacifolia, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 1.—Am. bor.

TARDAVEL, Adans. (Rubiac.).
[SPERMACOCE, Dill. I. K.]
Kaessneri, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1905, 250.—Afr. trop.
marginata, *J. Britten, Bot. Cook Voy.* 48 (= *Spermacoce marginata*).—Austral.

TARENNA, Gaertn. (Rubiac.).
affinis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 158 (= *Chomelia affinis*).—Afr. trop.
Curtisii, *F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 952 (= *Webera Curtisii*).—Siam.
fragrans, *Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands. Plantent.* lix. (1903) 77 (= *Stylocoryna fragrans*).—Java.
laxiflora, *Koord. & Valet. l. c.* 80 (= *Stylocoryna laxiflora*).—Java.

TARRIETIA, Blume (Stercul.).
amboinensis, *Hochr. in Bull. Inst. Buitenz.* xix. 22; *Pl. Bogor. Exsicc.* 11.—Amboina.
sylvatica, *Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull.* i. 39 (= *Heritiera sylvatica*).—Ins. Philipp.

TAVARESIA, Welw. in Bol. Ann. Cons. Ultramar. Lisb. no. 7 (Aug. 1854) 79. *ASCLEPIADACEAE.*
angolensis, *Welw. l. c.*—Afr. trop.
Barklyi, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 494 (= *Decabelone Barklyi*).—Afr. trop.

TAXODIUM, Rich. (Conif.).
imbricarium, *Harper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 383.—Am. bor.

TECLEA, Delile (Rutac.).
[TODDALIA, Juss. I. K.]
acuminata, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 245.—Afr. trop.
amaniensis, *Engl. l. c.* 244.—Afr. trop.
angustialata, *Engl. l. c.* 245.—Afr. trop.
Engleriana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 76.—Afr. trop.
salicifolia, *Engl. Jahrb.* xxxii. 120; *l. c.* xxxvi. 244.—Afr. trop.
utilis, *Engl. l. c.* 245.—Afr. trop.
Zenkeri, *Engl. l. c.* xxxii. 120.—Afr. trop.

TECOMA, Juss. emend. Seem. in Journ. Bot. 1863, 19 (*species foliis digitatis tantum includens*). *BIGNONIACEAE.*
acrophylla, *Urb. Symb. Antill.* iii. 374.—Ind. occ.
bahamensis, *Northr. in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 65.—Ind. occ.
Buchii, *Urb. Symb. Antill.* iii. 375.—Ind. occ.
Hassleri, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 87.—Parag.
Piutinga, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 196.—Bras.

TEESDALIA, R. Br. (Crucif.).
falciformis, *Merino, Contrib. Fl. Galic.* (1897) 29.—Galic.
verna, Bub. Fl. Pyren. iii. 215 = nudicaulis.

TEIJSMANNIODENDRON, Koord. in Ann. Jard. Buitenz. xix. (1904) 19. *ARALIACEAE.*
bogoriense, *Koord. l. c.* 20.—Hab.?

TELANTHERA, R. Br. (Amarant.).
Helleri, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxviii. (1902) 138.—Ins. Galap.
rosea, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 433 (= Mogiphanes rosea).—Parag.
rugulosa, Robinson, in Proc. Amer. Acad. xxxviii. 139.—Ins. Galap.
Snodgrassii, Robinson, l. c. 140.—Ins. Galap.

TELESONIX, Rafin. (Saxifr.).
[Saxifraga, Tourn. 1. K.]
heucheriformis, Rydb. in N. Amer. Fl. xxii. 126 (= Therofon heucheriforme).—Am. bor.

TELLIMA, R. Br. (Saxifr.).
breviflora, Rydb. in N. Amer. Fl. xxii. 90.—Am. bor.

TELOSMA, Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. (1905) 384. ASCLEPIADACEAE.
[Pergularia, Auct., non Linn.]
odoratissima, Coville, l. c. (= Cynanchum odoratissimum).—As. trop.

TENARIS, E. Mey. (Asclep.).
somalensis, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 473 (= Lasiostelma somalense).—Afr. trop.
subaphylla, N. E. Br. l. c. (= Brachystelma subaphyllum).—Afr. trop.

TEPHROSIA, Pers. (Legum.).
Butayei, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. i. 747.—Afr. trop.
cathartica, Urb. Symb. Antill. iv. 283 (= Galega cathartica).—Ind. occ.
Clementi, Shan, in Hook. Ic. Pl. t. 2729.—Austral.
curvata, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 190.—Afr. trop.
guaranitica, Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 879.—Parag.
Hassleri, Chod. l. c.—Parag.
Heckmanniana, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. 326.—Afr. trop.
hypargyrea, Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 259.—Afr. trop.
katangensis, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 191.—Afr. trop.
Kindu, Wildem. l. c.—Afr. trop.
Langlassei, Micheli, in Mem. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, xxxiv. 250.—Mexic.
Laurentii, Wildem. Énum. Pl. Laurent, 111.—Afr. trop.
longana, Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 259.—Afr. trop.
major, Micheli, in Mem. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, xxxiv. 251.—Mexic.
mossambicensis, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 948; et in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat. lxxviii. 419.—Afr. or.
nervosa, Chod. & Hassl. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. 839.—Parag.
nseleensis, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 141.—Afr. trop.
oligantha, Drake, Hist. Pl. Madag. i. 128 (= Mundulea pauciflora).—Madag.
paucijuga, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. 326.—Afr. trop.
rhodantha, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 201 (1905).—Mexic.
Stormsii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 189.—Afr. trop.
Verdickii, Wildem. l. c. 192.—Afr. trop.
Vilersii, Drake, Hist. Pl. Madag. i. 128.—Madag.

TERAMNUS, P. Br. (Legum.).
debilis, Prain, Bengal Pl. 393 (= Glycine debilis).—Ind. or.

TERMINALIA, Linn. (Combret.).
Baumii, Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 321.—Afr. trop.
burmanica, King, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. 204.—Burma.
ellipsoidea, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 33.—Ins. Philipp.
Hassleriana, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 346.—Parag.
Magarapali, Vidal, Synopsis, Atlas, 26, t. 48.—Ins. Philipp.
multiflora, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 34.—Ins. Philipp.
oocarpa, Merrill, l. c. 32 (sphalm. ovocarpa).—Ins. Philipp.

TERMINALIA:—
spinosa, Northr. in Mem. Torr. Bot. Club, xii. 54.—Ind. occ.
Teysmannii, Koord. & Valet. in Meded. 'S. Lands Plantent. lxi. 20.—Java.

TERNSTROEMIA, Mutis (Ternstroem.).
chalicophila, Loesen. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 218.—Mexic.
Seleriana, Loesen. l. c.—Am. cent.

TETRACERA, Linn. (Dillen.).
Bussei, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 197.—Afr. trop.
Dinklagei, Gilg, l. c. 201.—Afr. trop.
leiocarpa, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 81.—Afr. trop.
litoralis, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiii. 197.—Afr. trop.
Marquesii, Gilg, l. c. 199.—Afr. trop.
podotricha, Gilg, l. c. 200.—Afr. trop
rosiflora, Gilg, l. c. 199.—Afr. trop.
strigillosa, Gilg, l. c. 196.—Afr. trop.

TETRACHAETE, Chiov. in Ann. Ist. Bot. Roma, viii. 28 (1903). GRAMINEAE.
elionuroides, Chiov. l. c.—Afr. trop.

TETRADYMIA, DC. (Compos.).
axillaris, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 277.—Am. bor.
linearis, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 130.—Am. bor.

TETRAGLOCHIDION, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905), 291. EUPHORBIACEAE.
gimi, K. Schum. l. c.—N. Guin.

TETRAGLOCHIN, Poepp. (Rosac.).
acanthocarpus, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, vii. 283 (= Margyricarpus acanthocarpus).—Patag.
Ameghinoi, Speg. l. c. (= Margyricarpus Ameghinoi).—Patag.

TETRAGONANTHUS, S. G. Gmel. (Gentian.).
[Halenia, Borkh. 1. K.]
brentonianus, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 2 (= Halenia brentoniana).—Am. bor.
heterantha, A. A. Heller, l. c. (= Halenia heterantha).—Am. bor.

TETRAGONIA, Linn. (Ficoid.).
Ameghinoi, Speg. Nov. Add. Fl. Patag. i. (1901), repr. 59.—Patag.
haplostylis, K. Schum. in Just, Jahresb. xxvii. i. 475, sphalm. = macrostylis.

TETRAGONOTHECA, Dill. (Compos.).
repanda, Small, Fl. S. E. U. S. 1250 (= Halea repanda).—Am. bor.

TETRAMERIUM, Nees (Acanth.).
fruticosum, T. S. Brandegee, in Zoe, v. 171 (1903).—Calif.

TETRANEURIS, Greene (Compos.).
angustifolia, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1905, 128.—Am. bor.
Crandallii, Rydb. l. c. 127.—Am. bor.
Dodgei, Auct. in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 185.—Mexic.
epunctata, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. 275.—Am. bor.
eradiata, A. Nelson, l. c.—Am. bor.
intermedia, Greene, Pl. Baker. iii. 29.—Am. bor.
stenophylla, Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S. 1009.—Am. bor.

TETRAPERONE, Urb. Symb. Antill. ii. 462 (1901). COMPOSITAE.
bellioides, Urb. l. c. 463 (= Pinillosia bellioides).—Cuba.

TETRAPLASANDRA, A. Gray (Aral.).
Koordersii, Harms, in Ann. Jard. Buitenz. xix. 12.—Celebes.

TETRAPOGON, Desf. (Gramin.).
bidentatus, Pilg. in Engl. Jahrb. xxxiv. 129.—Afr. trop.

TETRAPTERIS, Cav. (Malpigh.).
parvifolia, Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. IIIL. 76, nomen.—Bras.
Seleriana, Niedenzu, in Engl. Jahrb. xxxvi. Beibl. lxxx. 18.—Am. cent.
tolimensis, Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. xxii. 429.—N. Granat.

TETRAPTERYGIUM, Fisch. & Mey. (Crucif.).
nummularium, Bornm. in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. v. 54 = Sameraria nummularia.

TETRARDISIA, Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin. (1902) 189. MYRSINACEAE.
denticulata, Mez, l. c. (= Ardisia denticulata).—Java.

TETRARIA, Beauv. (Cyper.).
australiensis, C. B. Clarke, in Engl. Jahrb. xxxv. 80.—Austral.

TETRARIOPSIS, C. B. Clarke, apud Diels & E. Pritz. in Engl. Jahrb. xxxv. 81, nomen. CYPERACEAE.
octandra, C. B. Clarke, in Engl. Jahrb. xxxv. 81 (= Elynanthus octandrus).—Austral.

TETRASIPHON, Urb. Symb. Antill. v. 63 (1904). CELASTRACEAE.
jamaicensis, Urb. l. c. 84.—Ind. occ.

TETRASTYLIDIUM, Engl. (Olac.).
Engleri, Schw. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. III. 90, nomen.—Bras.

TETRATHALAMUS, Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee (1905) 319. GUTTIFERAE.
montanus, Lauterb. l. c.—N. Guin.

TETRORUM, Rose, in N. Amer. Fl. xxii. 59 (1905) CRASSULACEAE.
pusillum, Rose, l. c. (= Sedum pusillum).—Am. bor.

TETROURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 374; et in Journ. de Bot. xvi. 190, 188. OCHNACEAE.
Selloi, Van Tiegh. ll. cc. (= Gomphia Sellowii).—Bras.

TEUCRIUM, Linn. (Labiat.).
boreale, E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 171.—Am. bor.
calycinum, Pau, in Bol. Soc. Arag. ii. 67.—Hispan.
eginense, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 281.—Oriens.
eremaeum, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 530.—Austral.
Goetzei, Guerke, in Engl. Jahrb. xxx. 391.—Afr. trop.
helianthemoides, Adam. in Denkschr. Akad. Wien. Math.-Nat. lxxiv. 136.—Turcia.
Hervieri, J. Briq. & O. Deb. in Bull. Acad. Géogr. Bot. xv. (1905) 118.—Eur.
bifacense, Pau, in Bol. Soc. Arag. i. 30.—Hispan.
kabylicum, Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis, 269.—Afr. bor.
littorale, E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 169.—Am. bor.
Luisieri, Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto, vii. 10.—Lusitan.
menthifolium, E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 171.—Am. bor.
myriocladum, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 530.—Austral.
roseum, E. P. Bickn. in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 169.—Am. bor.
simplex, Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xiv. (1904) 186.—China.
wanense, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 283.—Armen.

THALIA, Linn. (Scitam.).
Andersonii, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. 174.—Ecuador.
barbata, Small, Fl. S. E. U. S. 308.—Am. bor.
dipetala, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 181.—Afr. trop.
Petersiana, K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant. 173.—Bras.
Schumanniana, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 108.—Afr. trop.
trichocalyx, Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr. li. 180.—Mexic.; Am. austr.

THALICTRUM, Tourn. (Ranunc.).
amplissimum, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 51.—China.
Atriplex, Finet & Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 613.—China.

THALICTRUM:—
coreanum, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 297.—As. bor.
Fargesii, *Franch. ex Finet & Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 608.—China.
fissum, *Greene, Pittonia*, iv. 233.—Am. bor.
grandisepalum, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xi. (1902) 297.—As. bor.
jalapense, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 28.—Mexic.
obliquum, *Rose, l. c.* 27.—Mexic.
osmundifolium, *Finet & Gagn. in Bull. Soc. Bot. Fr.* l. 615.—China.
peninsulare, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 28.—Mexic.
stipitatum, *Rose, l. c.*—Mexic.
subpubescens, *Rose, l. c.*—Mexic.
texanum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 446.—Am bor.

THAPSIA, Linn. (Umbell.).
laciniata, *Rouy, Illustr. Pl. Eur.* t. 431.—Hispan.

THECOPHYLLUM, Ed. André (Bromel.)
angustum, *Mez & Werckl. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1121.—Am. cent.
balanophorum, *Mez, l. c.* iii. 131 (= *Guzmania balanophora*).—Am. cent.
capitatum, *Mez & Werckl. l. c.* iv. 873.—Am. cent.
comatum, *Mez & Werckl. l. c.* 871.—Am. cent.
crassiflorum, *Mez & Werckl. l. c.* iii. 138.—Am. cent.
Dussii, *Mez, l. c.* 131 (= *Guzmania Dussii*).—Ind. occ.
gloriosum, *Mez, l. c.* (= *Caraguata gloriosa*).—Ecuador.
hygrometricum, *Mez, l. c.* (= *Caraguata hygrometrica*).—N. Granat.
insigne, *Mez, l. c.* (= *Guzmania insignis*).—Am. cent.
irazuense, *Mez & Werckl. l. c.* 138.—Am. cent.
Johnstonei, *Mez, l. c.* iv. 872.—Venez.
Kraenzlinianum, *Mez, l.c.* iii. 131 (= *Guzmania Kraenzliniana*).—N. Granat.
latissimum, *Mez & Werckl. l. c.* iv. 1122.—Am. cent.
laxum, *Mez & Werckl. l. c.* 1123.—Am. cent.
lineatum, *Mez & Werckl. l. c.* 875.—Am. cent.
longipetalum, *Mez, l. c.* iii. 131 (= *Tillandsia longipetala*).—N. Granat.
Mosquerae, *Mez, l. c.* (= *Caraguata Mosquerae*).—N. Granat.
ororiense, *Mez, l. c.* (= *Guzmania ororiensis*).—Am. cent.
palustre, *Mez, l. c.* (= *Caraguata palustris*).—N. Granat.
panniculatum, *Mez & Werckl. l. c.* iv. 1123.—Am. cent.
pauperum, *Mez & Sodiro, l. c.* 876.—Ecuador.
pedicellatum, *Mez & Werckl. l. c.* iii. 136.—Am. cent.
pictum, *Mez & Werckl. l. c.* iv. 874.—Am. cent.
Pittieri, *Mez, l. c.* iii. 137.—Am. cent.
rubrum, *Mez & Werckl. l. c.* iv. 878.—Am. cent.
sceptrum, *Mez, l. c.* iii. 139.—N. Granat.
singuliflorum, *Mez & Werckl. l. c.* iv. 870.—Am. cent.
Sintenisii, *Mez, l. c.* iii. 131 (= *Guzmania Sintenisii*).—Ind. occ.
spectabile, *Mez & Werckl. l. c.* iv. 873.—Am. cent.
squarrosum, *Mez & Sodiro, l. c.* 877.—Ecuador.
stenophyllum, *Mez & Werckl. l. c.* 875.—Am. cent.
turbinatum, *Mez & Werckl. l. c.* 1122.—Am. cent.
Urbanianum, *Mez, l. c.* iii. 131 (= *Guzmania Urbaniana*).—Ind. occ.
violascens, *Mez & Werckl. l. c.* iv. 877.—Am. cent.
viride, *Mez & Werckl. l. c.* 872.—Am. cent.
vittatum, *Mez & Werckl. l. c.* 871.—Am. cent.
Werckleanum, *Mez, l. c.* iii. 139.—Am. cent.

THELASIS, Blume (Orchid.).
javanica, *J. J. Sm. Orchid. Java*, 498.—Java.
micrantha, J. J. Sm. l. c. 496 = contracta.

THELESPERMA, Less. (Compos.).
formosum, *Greene, Pittonia*, v. 56.—Am. bor.
intermedium, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 1004.—Am. bor.

THELYMITRA, Forst. (Orchid.).
psammophila, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* ii. 57.—Austral.

THELYPODIUM, Endl. (Crucif.).
affine, *Greene, Pittonia*, iv. 314.—Am. bor.
australe, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 180 (1904).—Mexic.

THELYPODIUM:—
flavescens, *Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 212 (= *Streptanthus flavescens*).—Calif.
Greenei, *Jepson, l. c.*—Calif.
lilacinum, *Greene, Pl. Baker.* iii. 9.—Am. bor.
macropetalum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 233.—Am. bor.
mexicanum, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 179 (1904).—Mexic.
ovalifolium, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 253.—Am. bor.
pallidum, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 294.—Mexic.
rhomboideum, *Greene, Pittonia*, iv. 314.—Am. bor.
utahense, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 233.—Am. bor.

THEOBROMA, Linn. (Stercul.).
sativa, *Lignier & Bey, in Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. V. viii. 203, nomen.—Guiana.

THEODORA, Medic. (Legum.).
[SCHOTIA, Jacq. I. K.]
capitata, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost. Afr.* C. 198 (= *Schotia capitata*).—Afr. trop.

THERMOPSIS, R. Br. (Legum.).
angustata, *Greene, Pl. Baker.* iii. 34.—Am. bor.
Hugeri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 596 (= *Baptisia Hugeri*).—Am. bor.
stricta, *Greene, Pl. Baker.* iii. 34.—Am. bor.
venosa, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 198.—Calif.

THEROFON, Rafin. (Saxifr.).
[BOYKINIA, Nutt. I. K.]
intermedium, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 53.—Am. bor; *vide etiam seq.*

THEROPHON, Rydb. in N. Amer. Fl. xxii. 123. *SAXIFRAGACEAE.*
[THEROFON, Raf.]
cincinnatum, *Rosend. & Rydb. in N. Amer. Fl.* xxii. 124.—Am. bor.
occidentale, *Rydb. l. c.* (= *Boykinia occidentalis*).—Am. bor.
turbinatum, *Rydb. l. c.*—Am. bor.
vancouverense, *Rydb. l. c.* 125.—Am. bor.

THESIUM, Linn. (Santal.).
Goetzeanum, *Engl. Jahrb.* xxx. 306.—Afr. trop.
leucanthum, *Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 230.—Afr. trop.
lycopodioides, *Gilg, l. c.* 229.—Afr. trop.
rungwense, *Engl. Jahrb.* xxx. 307.—Afr. trop.
unyikense, *Engl. l. c.* 306.—Afr. trop.
ussanguense, *Engl. l. c.* 305.—Afr. trop.

THISELTONIA, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2781 (1905). *COMPOSITAE.*
Dyeri, *Hemsl. l. c.*—Austral.

THISMIA, Griff. (Burmann.).
janeirensis, *Warm. in Overs. Danske Vid. Selsk. Forh.* 1901, 183.—Bras.
Winkleri, *Engl. Jahrb.* xxxviii. 89.—Afr. trop.

THLADIANTHA, Bunge (Cucurb.).
Oliveri, *Cogn. ex Mottet, in Rev. Hortic.* 1903, 473.—China.

THLASPI, Linn. (Crucif.).
abulense, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* i. 46.—Eur.
apterum, *Vel. in Allg. Bot. Zeitschr.* 1904, 33.—Bulgar.
coloradense, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 280.—Am. bor.
lutescens, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 28, 2.—Bulgar.
Nuttallii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, xxix. 235.—Am. bor.
purpurascens, *Rydb. l. c.* 1901, 281.—Am. bor.
vitorogense, *Stadlm. & Faltis, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 437.—Eur.

THLASPIDIUM, Bub. Fl. Pyren. iii. 213 = **Thlaspi**, Linn. (Crucif.).
alpestre, Bub. l. c. 215 = Thlaspi alpestre.
arvense, Bub. l. c. 214 = Thlaspi arvense.
cordatum, Bub. l. c. = Thlaspi perfoliatum.

THOMANDERSIA, Baill. (Acanth.).
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 180.—Afr. trop.

THOMASIA, J. Gay (Stercul.).
Dielsii, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 376.—Austral.
multiflora, *E. Pritz. l. c.* 375.—Austral.

THOMASSETIA, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 2736 (1902). *TERNSTROEMIACEAE.*
seychellana, *Hemsl. l. c.*—Ins. Seychell.

THORACOSPERMA, Klotzsch (Eric.).
[SIMOCHEILUS, Klotzsch. I. K.]
Galpini, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 330.—Afr. austr.
interruptum, *N. E. Br. l. c.* 331.—Afr. austr.
Marlothii, *N. E. Br. l. c.* 330.—Afr. austr.
nanum, *N. E. Br. l. c.* 331.—Afr. austr.
puberulum, *N. E. Br. l. c.*—Afr. austr.

THOUINIA, Poit. (Sapind.).
velutina, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 326.—Am. cent.

THRELKELDIA, R. Br. (Chenopod.).
drupacea, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 186.—Austral.

THRINAX, Linn. f. (Palmae).
bahamensis, *O. F. Cook, in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 20.—Ins. Baham.
ponceana, *O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 536.—Ind. occ.
praeceps, *O. F. Cook, l. c.*—Ind. occ.

THRINCOMA, O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 539. *PALMAE.*
alta, *O. F. Cook, l. c.* 540.—Ind. occ.

THRINGIS, O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 544. *PALMAE.*
latifrons, *O. F. Cook, l. c.* 545.—Ind. occ.
laxa, *O. F. Cook, l. c.*—Ind. occ.

THRIXSPERMUM, Lour. (Orchid.).
[SARCOCHILUS, R. Br. I. K.]
crassifolium, *Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 32.—Penins. Mal.
denticulatum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 233.—Ins. Bismarck.
neo-hibernicum, *Schlechter, l. c.* 232.—Ins. Bismarck.
Raciborskii, *J. J. Sm. in Ic. Bogor.* t. 124 A.—Java.
subteres, *J. J. Sm. in Bull. Inst. Buitenz.* vii. 5.—Arch. Mal.
xantholeucum, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 234.—Ins. Bismarck.

THRYPTOMENE, Endl. (Myrtac.).
appressa, *C. R. P. Andrews, in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 41.—Austral.
aspera, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 413.—Austral.
Dielsiana, *E. Pritz. l. c.* 412.—Austral.
hexamera, *Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, xxvi. 82.—Austral.
rosea, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 413.—Austral.
stenophylla, *E. Pritz. l. c.* 412.—Austral.
tuberculata, *E. Pritz. l. c.* 411.—Austral.

THUNBERGIA, Retz. (Acanth.).
amanensis, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 67.—Afr. trop.
amoena, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 7.—Afr. austr.
argentea, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 407.—Afr. trop.
cordibracteolata, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 7.—Afr. austr.
Elliotii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 300.—Afr. trop.
exasperata, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 408.—Afr. trop.
glaberrima, *Lindau, l. c.* xxxiii. 185.—Afr. trop.
glandulifera, *Lindau, l. c.* 184.—Afr. trop.
graminifolia, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 134.—Afr. trop.
hirtistyla, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 7.—Afr. austr.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 135.—Afr. trop.
longepedunculata, *Wildem. l. c.* 136.—Afr. trop.
Michelana, *Wildem. l. c.*—Afr. trop.

THUNBERGIA:—
nudulans, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 183.—Afr. trop.
nymphaeifolia, *Lindau, l. c.* 184.—Afr. trop.
pratensis, *Lindau, l. c.* 183.—Afr. trop.
primulina, *Hemsl. in Bot. Mag.* t. 7969.—Afr. trop.
proxima, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 137.—Afr. trop.
purpurata, *Harv. ex C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 5.—Afr. austr.
schimbensis, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 342.—Afr. trop.
squamuligera, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxx. 406.—Afr. trop.
stelligera, *Lindau, l. c.* xxxiii. 186.—Afr. trop.
stenophylla, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 6.—Afr. austr.
subnymphaeifolia, *Lindau, in Engl. Jahrb.* xxxviii. 67.—Afr. trop.
venosa, *C. B. Clarke, in Dyer, Fl. Cap.* v. 6.—Afr. austr.
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 138.—Afr. trop.
Vossiana, *Wildem. l. c.* 134.—Afr. trop.

THUNIA, Reichb. f. (Orchid.).
venosa, *Rolfe, in Orchid Rev.* 1905, 206.—Sikkim.

THYLACHIUM, Lour. (Capparid.).
Thomasii, *Gilg, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 220.—Afr. trop.

THYMOPHYLLA, Lag. (Compos.).
gnaphalodes, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1295 (= *Hymenatherum gnaphaloides*).—Am. bor.
pentachaeta, *Small, l. c.* (= *Hymenatherum pentachaetum*).—Am. bor.
polychaeta, *Small, l. c.* (= *Hymenatherum polychaetum*).—Am. bor.
tagetoides, *Small, l. c.* (= *Hymenatherum tagetoides*).—Am. bor.
tenuiloba, *Small, l. c.* (= *Hymenatherum tenuilobum*).—Am. bor.
Treculii, *Small, l. c.* (= *Hymenatherum Treculii*).—Am. bor.
Wrightii, *Small, l. c.* (= *Hymenatherum Wrightii*).—Am. bor.

THYMOPSIS, Benth. (Compos.).
Brittonii, *Greenm. in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 453.—Ind. occ.

THYMUS, Tourn. (Labiat.).
Aznavouri, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 28, 17.—Graecia.
candidissimus, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis,* 258.—Afr. bor.
carnosulus, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 28, 23.—Bulgar.
ciliatopubescens, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* ii. 559.—Eur.
danubialis, *Simk. in Magyar Bot. Lap.* iii. 84.—Eur.
euboeus, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* ii. 560.—Eur.
latifrons, *Dom. & Podp. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* lii. 669.—Eur.
leucostegius, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* vii-viii. 205.—Alger.
leucotrichus, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* ii. 561.—Eur.
loevyanus, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 28, 16.—Eur. austr. or.
moesiacus, *Velen. l. c.*—Bulgar.
Rohlenae, *Velen. ex Rohl. l. c.* no. 17, 52; *Velen. l. c.* no. 28, 22.—Montenegr.
rudis, *Kern. ex Masetti, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1903, 417.—Italia.
Skorpili, *Velen. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 53.—Eur.
thasius, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 28, 16.—Graecia.
Tosevi, *Velen. l. c.* 15.—Turcia.
tymphrestus, *Halacsy, Consp. Fl. Graec.* ii. 560.—Eur.
Velenovskyi, *Rohl. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* 1903, no. 17, 65.—Montenegr.

THYRSANTHEMA, Neck. (Compos.).
[Chaptalia, Vent. I. K.]
hybridum, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 158 (= *Tussilago hybrida*).—Eur.

THYSANOCARPUS, Hook. f. (Crucif.).
affinis, *Greene, Pittonia,* iv. 311.—Am. bor.
desertorum, *A. A. Heller, Muhlenbergia,* ii. 47.—Calif.
foliosus, *A. A. Heller, l. c.*—Calif.
trichocarpus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1903, 253.—Am. bor.

THYSANOTUS, R. Br. (Liliac.).
gageoides, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 99.—Austral.

THYSSELINUM, Adans. (Umbell.).
[Peucedanum, Tourn. I. K.]
lancifolium, *Calest. in Martelli Webbia,* 227 (= *Peucedanum lancifolium*).—Eur.

TIARELLA, Linn. (Saxifr.).
californica, *Rydb. in N. Amer. Fl.* xxii. 115.—Calif.
macrophylla, *Small, Fl. S. E. U. S.* 502.—Am. bor.

TIBOUCHINA, Aubl. (Melast.).
fraterna, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 28.—Guiana.
Hassleri, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1276.—Parag.

TIEGHEMOPANAX, Viguier, in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. (1905) 305. *ARALIACEAE.*
austrocaledonicus, *Viguier, l. c.* 313 (= *Panax austrocaledonica*).—N. Caled.
Balansae, *Viguier, l. c.* 307 (= *Panax Balansae*).—N. Caled.
bracteatus, *Viguier, l. c.*—N. Caled.
Cissodendron, *Viguier, l. c.* 311 (= *Panax Cissodendron*).—Ins. Dom. Howe.
cussonioides, *Viguier, l. c.* 314 (= *Panax cussonioides*).—Madag.
decorans, *Viguier, l. c.* 312.—N. Caled.
dioicus, *Viguier, l. c.* 313 (= *Cussonia dioica*).—N. Caled.
elegans, *Viguier, l. c.* 308 (= *Panax elegans*).—Austral.
Harmsii, *Viguier, l. c.* 309.—N. Caled.
Macgillivrayi, *Viguier, l. c.* 313 (= *Panax Macgillivrayi*).—Austral.
microbotrys, *Viguier, l. c.* 308 (= *Panax microbotrys*).—N. Caled.
microcarpus, *Viguier, l. c.* 310.—N. Caled.
mollis, *Viguier, l. c.* 312 (= *Panax mollis*).—Austral.
Murrayi, *Viguier, l. c.* 310 (= *Panax Murrayi*).—Austral.
myriophyllus, *Viguier, l. c.* 311 (= *Panax myriophylla*).—N. Caled.
nigrescens, *Viguier, l. c.* 311.—N. Caled.
Pancheri, *Viguier, l. c.* 312 (= *Panax Pancheri*).—N. Caled.
pulchellus, *Viguier, l. c.* 311 (= *Panax pulchella*).—N. Caled.
reflexus, *Viguier, l. c.* 309.—N. Caled.
sambucifolius, *Viguier, l. c.* 310 (= *Panax sambucifolia*).—Austral.
sessiliflorus, *Viguier, l. c.* 308 (= *Panax sessiliflora*).—N. Caled.
simabaefolius, *Viguier, l. c.* 312.—N. Caled.
stipulatus, *Viguier, l. c.* 313.—Austral.
subincisus, *Viguier, l. c.* 307 (= *Panax subincisa*).—N. Caled.
suborbicularis, *Viguier, l. c.* 310 (= *Panax suborbicularis*).—N. Caled.
Weinmanniae, *Viguier, l. c.* 309 (= *Panax Weinmanniae*).—N. Caled.

TILIA, Linn. (Tiliac.).
australis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 761.—Am. bor.
dasythrix, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 49.—Eur.
eburnea, *Ashe, in Contr. Bot. Gaz.* xxxiii. 231.—Am. bor.
floridana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 761.—Am. bor.
Houghi, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 318.—Mexic.
Kinashii, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* li. 422.—Japon.
leptophylla, *Small, Fl. S. E. U. S.* 762.—Am. bor.
Maximowiczii, *Baker f. in Journ. Bot.* 1898, 319 (= *T. cordata,* Maxim., non Mill.).—As. bor.
occidentalis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 317.—Mexic.
subferruginea, *Barb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 49.—Hybr.

TILLAEASTRUM, Britton, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1903) 1. *CRASSULACEAE.*
aquaticum, *Britton, l. c.* (= *Tillaea aquatica*).—Eur.; Afr. trop.
Drummondii, *Britton, l. c.* (= *Tillaea Drummondii*).—Am. bor.
Pringlei, *Rose, l. c.* 2.—Mexic.
Vaillantii, *Britton, l. c.* (= *Tillaea Vaillantii*).—Eur.; Afr. bor.
viride, *Britton, l. c.* (= *Tillaea viridis*).—Am. bor.

TILLANDSIA, Linn. (Bromel.).
ampla, *Mez & Sod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1134.—Ecuador.
Augustae-regiae, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 10; *et in Beih. Bot. Centralbl.* xiii. 79.—N. Granat.
Baileyi, *Rose, in Small, Fl. S. E. U. S.* 246.—Am. bor.
boliviana, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1130.—Boliv.
Buseri, *Mez, l. c.* 145.—N. Granat.
castaneo-bulbosa, *Mez & Werckl*é*, l. c.* 140.—Am. cent.
cauliflora, *Mez & Werckl*é*, l. c.* v. 100.—Am. cent.
contorta, *Mez & Pittier, l. c.* iii. 224.—Am. cent.
cornuta, *Mez & Sod. l. c.* v. 106.—Ecuador.
costaricana, *Mez & Werckl*é*, l. c.* iii. 148.—Am. cent.
Cowellii, *Mez & Britton, l. c.* 225.—Ind. occ.
cygnea, *Mez & Sod. l. c.* iv. 1128.—Ecuador.
emergens, *Mez & Sod. l. c.* 1132.—Ecuador.
fusco-guttata, *Mez, l. c.* v. 101.—Peruv.
goyazensis, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 11.—Bras.
Ignesiae, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 143.—Mexic.
indigofera, *Mez & Sod. l. c.* iv. 1131.—Ecuador.
intermedia, *Mez, l. c.* iii. 141.—Mexic.
lanata, *Mez. l. c.* v. 109.—Peruv.
Langlasseana, *Mez, l. c.* iii. 142.—Mexic.
laxissima, *Mez, l. c.* v. 108.—Boliv.
Michelii, *Mez, l. c.* iii. 146.—N. Granat.
micrantha, *Baker, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1902, 698.—Boliv.
minor, *Mez & Sod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1136.—Ecuador.
monticola, *Mez & Sod. l. c.* 1135.—Ecuador.
orthorhachis, *Mez & C. F. Baker, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1903, 485.—Am. cent.
palmana, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 9.—Am. cent.
pinnata, *Mez & Sod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1130.—Ecuador.
polyantha, *Mez & Sod. l. c.* 1127.—Ecuador.
quadripinnata, *Mez & Sod. l. c.* v. 105.—Ecuador.
Rothschuhiana, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 8.—Am. cent.
scaligera, *Mez & Sod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 107.—Ecuador.
sceptriformis, *Mez & Sod. l. c.* 101.—Ecuador.
scorpiura, *Mez, l. c.* 104.—Peruv.
Seleriana, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 8; *et in Bull Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 84.—Mexic.
singularis, *Mez & Werckl*é*, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 103.—Am. cent.
Sodiroi, *Mez, l. c.* iv. 1133.—Ecuador.
spathacea, *Mez & Sod. l. c.* 1129.—Ecuador.
superba, *Mez & Sod. l. c.* 1132.—Ecuador.
Tonduziana, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 9.—Am. cent.
Ulei, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 102.—Peruv.
venusta, *Mez & Werckl*é*, l. c.* 106.—Am. cent.
Weberbaueri, *Mez, l. c.* 104.—Peruv.
Werckleana, *Mez, l. c.* iii. 144.—Am. cent.

TILMIA, O. F. Cook, in Bull. Torr. Bot. Club, 1901, 565. *PALMAE.*
caryotaefolia, *O. F. Cook, l. c.* (= *Martinezia caryotaefolia*).—Am. austr.
disticha, *O. F. Cook, l. c.* (= *Martinezia disticha*).—N. Granat.

TIMONIUS, Rumph. (Rubiac.).
albus, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 475.—Ins. Carol.
celebicus, *Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 87, descr.—Celebes.
compressicaule, *Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull.* i. 54 (= *Polyphragmon compressicaule*).—Sumatra.

TIMONIUS :—
laxus, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 56.—Penins. Mal.
malaccensis, *King & Gamble, l. c.*—Penins. Mal.
Minahassae, *Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 87.—Celebes.
philippinensis, *Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull.* i. 54.—Ins. Philipp.
Schumanni, *Koord. in Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.* lxiii. 88.—Celebes.
Wrayi, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 54.—Penins. Mal.

TINA, Roem. & Schult. (Sapind.).
[RATONIA, DC. I. K.]
isaloensis, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 39.—Madag.

TINANTIA, Schiedw. (Commelin.).
caribaea, *Urb. Symb. Antill.* iii. 280.—Ind. occ.

TINIARIA, Reichb. (Polygon.).
[POLYGONUM, Tourn. I. K.]
cilinodis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 382 (= *Polygonum cilinode*).—Am. bor.
cristata, *Small, l. c.* (= *Polygonum cristatum*).—Am. bor.
scandens, *Small, l. c.* (= *Polygonum scandens*).—Am. bor.

TINNEA, Kotschy & Peyr. (Labiat.).
benguellensis, *Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 352.—Afr. trop.
coerulea, *Guerke, l. c.*—Afr. trop.
fusco-luteola, *Guerke, l. c.*—Afr. trop.
Galpini, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1094.—Afr. austr.
rhodesiana, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1906, 51.—Afr. trop.

TINOSPORA, Miers (Menisp.).
minutiflora, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 262.—N. Guin.
Rumphii, *Boerl. Cat. Hort. Bogor.* 116.—Arch. Mal.
Teysmannii, *Boerl. l. c.* 117.—Arch. Mal.

TIPULARIA, Nutt. (Orchid.).
japonica, *Matsum. in Bot. Mag. Tokyo*, xv. 87.—Japon.

ISSA, Adans. (Caryophyll.).
[SPERGULARIA, J. & C. Presl. I. K.].
bracteata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 418.—Am. bor.

TITHYMALOPSIS, Klotzsch & Garcke (Euphorb.).
[EUPHORBIA, Linn. I. K.]
apocynifolia, *Small, Fl. S. E. U. S.* 717 (= *Euphorbia apocynifolia*).—Am. bor.
corollata, *Small, l. c.* (= *Euphorbia corollata*).—Am. bor.
Curtisii, *Small, l. c.* 716 (= *Euphorbia Curtisii*).—Am. bor.
discoidalis, *Small, l. c.* 717 (= *Euphorbia discoidalis*).—Am. bor.
eriogonoides, *Small, l. c.* 716 (= *Euphorbia eriogonoides*).—Am. bor.
exserta, *Small, l. c.* 717.—Am. bor.
gracilis, *Small, l. c.* 716 (= *Euphorbia gracilis*).—Am. bor.
Ipecacuanhae, *Small, l. c.* (= *Euphorbia Ipecacuanhae*).—Am. bor.
Joorii, *Small, l. c.* 717.—Am. bor.
mercurialina, *Small, l. c.* 716 (= *Euphorbia mercurialina*).—Am. bor.
olivacea, *Small, l. c.* 717 (= *Euphorbia olivacea*).—Am. bor.
paniculata, *Small, l. c.* 718 (= *Euphorbia paniculata*).—Am. bor.
polyphylla, *Small, l. c.* 716 (= *Euphorbia polyphylla*).—Am. bor.
zinniiflora, *Small, l. c.* 717 (= *Euphorbia zinniiflora*).—Am. bor.

TITHYMALUS, Tourn. (Euphorb.).
[EUPHORBIA, Linn. I. K.]
alpigenus, *Woerl. in Ber. Bayer. Bot. Ges.* iii. (1893) 136 (= *Euphorbia alpigena*).—Eur.
austrinus, *Small, Fl. S. E. U. S.* 720.—Am. bor.
crenulatus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 55 (= *Euphorbia crenulata*).—Calif.
Darlingtonii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 719 (= *Euphorbia Darlingtonii*).—Am. bor.

TITHYMALUS :—
dictyospermus, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 56 (= *Euphorbia dictyosperma*).—Calif.
franciscanus, *A. A. Heller, l. c.*—Calif.
Helleri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 719 (= *Euphorbia Helleri*).—Am. bor.
inundatus, *Small, l. c.* (= *Euphorbia inundata*).—Am. bor.
leiococcus, *Small, l. c.* 721.—Am. bor.
longicruris, *Small, l. c.* 719 (= *Euphorbia longicruris*).—Am. bor.
missouriensis, *Small, l. c.* 721.—Am. bor.
Peplidion, *Small, l. c.* 720 (= *Euphorbia Peplidion*).—Am. bor.
Roemerianus, *Small, l. c.* (= *Euphorbia Roemeriana*).—Am. bor.
sphaerospermus, *Small, l. c.* 719 (= *Euphorbia sphaerosperma*).—Am. bor.
telephioides, *Small, l. c.* (= *Euphorbia telephioides*).—Am. bor.
tetraporus, *Small, l. c.* 720 (= *Euphorbia tetrapora*).—Am. bor.
luteola, *Greene, Pittonia*, v. 114.—Calif.

TIUM, Medic. (Legum.).
[ASTRAGALUS, Tourn. I. K.]
alpinum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 659 (= *Astragalus alpinus*).—Am. bor.
apilosum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 619 (= *Astragalus apilosus*).—Am. bor.
desperatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 660 (= *Astragalus desperatus*).—Am. bor.
Drummondii, *Rydb. l. c.* 659 (= *Astragalus Drummondii*).—Am. bor.
huministratum, *Rydb. l. c.* 660 (= *Astragalus huministratus*).—Am. bor.
intonsum, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 619 (= *Astragalus intonsus*).—Am. bor.
obcordatum, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus obcordatus*).—Am. bor.
racemosum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 659 (= *Astragalus racemosus*).—Am. bor.
scopulorum, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus scopulorum*).—Am. bor.
sparsiflorum, *Rydb. l. c.* 660 (= *Astragalus sparsiflorus*).—Am. bor.

TOCOCA, Aubl. (Melast.).
caquetana, *Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.* xxii. 432.—N. Granat.
discolor, *Pilg. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 176.—Reg. Amaz.
juruensis, *Pilg. l. c.*—Reg. Amaz.
setifera, *Pilg. l. c.* 177.—Reg. Amaz.
Ulei, *Pilg. l. c.*—Peruv.

TOCOYENA, Aubl. (Rubiac.).
neglecta, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 35.—Guiana.

TODDALIA, Juss. (Rutac.).
angolensis, *K. Schum. in Just, Jahresb.* xxvii. i. 509 (= *Crausia angolensis*).—Afr. trop.

TONELLA, Nutt. (Scrophul.).
tenella, *Jepson, Fl. W. Mid. Calif.* 400 (= *Collinsia tenella*).—Am. bor.

TONESTUS, A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz. xxxvii. (1904) 262. *COMPOSITAE.*
laceratus, *A. Nelson, l. c.* (= *Aplopappus laceratus*).—Am. bor.
Lyallii, *A. Nelson, l. c.* (= *Aplopappus Lyallii*).—Am. bor.
pygmaeus, *A. Nelson, l. c.* (= *Aplopappus pygmaeus*).—Am. bor.

TORENIA, Linn. (Scrophul.).
affinis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 122.—Afr. trop.
radicans, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xv. (1905) 88.—China.

TORILIS, Adans. (Umbellif.).
[CAUCALIS, Linn. I. K.]
caerulescens, *Calest. in Martelli, Webbia*, 255 (= *Caucalis caerulescens*).—Hispan.
homoeophylla, *Calest. l. c.* (= *Caucalis homoeophylla*).—Hispan.

TORILIS :—
litoralis, *Calest. in Martelli, Webbia*, 255 (= *Daucus bessarabicus*).—Rossia.
orientalis, *Calest. l. c.* (= *Caucalis orientalis*).—Rossia.
torgesiana, *Calest. l. c.* (= *Caucalis torgesiana*).—Graecia.

TORRALBASIA, Krug & Urb. in Seguí, Fl. Med. Tox. Cuba, 60 (1900); et in Urb. Symb. Antill. v. 49 (1904). *CELASTRACEAE.*
cuneifolia *Krug & Urb. l. c.; l. c.* 50 (= *Euonymus cuneifolius*).—Ind. occ.

TORRUBIA, Vell. (Nyctag.).
[PISONIA, Plum. I. K.]
Bracei, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1904, 614.—Ind. occ.
Cokeri, *Britton, l. c.* 613.—Ind. occ.
discolor, *Britton, l. c.* (= *Pisonia discolor*).—Ind. occ.
floridana, *Britton, l. c.* 615 (= *Pisonia floridana*).—Am. bor.
inermis, *Britton, l. c.* 614 (= *Pisonia inermis*).—Ind. occ.; Am. trop. austr.
longifolia, *Britton, l. c.*—Ind. occ.
obtusata, *Britton, l. c.* 612 (= *Pisonia obtusata*).—Ind. occ.
rufescens, *Britton, l. c.* 613 (= *Pisonia rufescens*).—Ind. occ.
suborbiculata, *Britton, l. c.* (= *Pisonia suborbiculata*).—Ind. occ.

TORULINIUM, Desv. (Cyper.).
[MARISCUS, Ehrh. I. K.]
Poeppigii, *C. B. Clarke, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxviii. 17.—Chili.

TOUCHIROA, Aubl. (Legum.).
[CRUDIA, Schreb. I. K.]
Havilandi, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 199 (= *Crudia Havilandi*).—Borneo.
Mansoni, *Prain, l. c.* (= *Crudia Mansoni*).—Burma.

TOURNEFORTIA, Linn. (Borag.).
Mocquerysi, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 581.—Madag.

TOUTEREA, Eaton & Wright, N. Amer. Bot. (1840) 454, 63. *LOASACEAE.*
Brandegei, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 276 (= *Mentzelia Brandegei*).—Am. bor. occ.
chrysantha, *Rydb. l. c.* 277 (= *Mentzelia chrysantha*).—Am. bor.
decapetala, *Rydb. l. c.* 276 (= *Bartonia decapetala*).—Am. bor.
densa, *Rydb. l. c.* 277 (= *Mentzelia densa*).—Am. bor.
humilis, *Rydb. l. c.* (= *Mentzelia multiflora*).—N. Mexic.
laciniata, *Rydb. l. c.* 1904, 565.—Am. bor.
laevicaulis, *Rydb. l. c.* 1903, 276 (= *Bartonia laevicaulis*).—Am. bor.
multicaulis, *Osterh. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 236.—Am. bor.
multiflora, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 277 (= *Bartonia multiflora*).—Am. bor.; Mexic.
parviflora, *Rydb. l. c.* 276 (= *Bartonia parviflora*).—Am. bor.
pterosperma, *Rydb. l. c.* (= *Mentzelia pterosperma*).—Am. bor.
pumila, *Rydb. l. c.* 277 (= *Mentzelia pumila*).—Am. bor.
Rusbyi, *Rydb. l. c.* 276 (= *Mentzelia Rusbyi*).—Am. bor.
sinuata, *Rydb. l. c.* 1904, 566.—Am. bor.
speciosa, *Rydb. l. c.* 1903, 276 (= *Mentzelia speciosa*).—Am. bor.
stricta, *Rydb. l. c.* (= *Hesperaster strictus*).—Am. bor.
Wrightii, *Rydb. l. c.* (= *Mentzelia Wrightii*).—Am. bor.

TOVARIA, Neck. (Liliac.).
[SMILACINA, Desf. I. K.]
tubifera, *C. H. Wright, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 111 (= *Smilacina tubifera*).—China.

TOVOMITA, Aubl. (Guttif.).
triflora, *Huber, in Bol. Mus. Para.* iii. 436.—Bras.

TOWNSENDIA, Hook. (Compos.).
dejecta, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 267.—Am. bor.
intermedia, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 944.—Am. bor.
Vreelandii, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 22.—Am. bor.

TOXICODENDRON, Linn. (Anacard.).
[RHUS, Tourn. I. K.]
aborigenum, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 125.—Am. bor.
arizonicum, *Greene, l. c.* 123.—Am. bor.
biternatum, *Greene, l. c.* 124.—Am. bor.
Blodgettii, *Greene, l. c.* 126 (= *Rhus Blodgettii*).—Florida.
comarophyllum, *Greene, l. c.* 120.—Calif.
compactum, *Greene, l. c.* 126.—Am. bor.
coriaceum, *Greene, l. c.* 120.—Am. bor.
divaricatum, *Greene, l. c.* 122.—Calif.
diversilobum, *Greene, l. c.* 119 (= *Rhus diversiloba*).—Am. bor.
dryophilum, *Greene, l. c.* 121.—Calif.
eximium, *Greene, l. c.* 123.—Mexic.
goniocarpum, *Greene, l. c.* 125.—Am. bor.
hesperium, *Greene, l. c.* 118.—Am. bor.
isophyllum, *Greene, l. c.* 121.—Calif.
laetevirens, *Greene, l. c.* 123.—Am. bor.
lobadioides, *Greene, l. c.* 119.—Am. bor.
longipes, *Greene, l. c.* 118.—Am. bor.
macrocarpum, *Greene, l. c.* 117.—Am. bor.
monticola, *Greene, l. c.* 126.—Am. bor.
Negundo, *Greene*, 117.—Am. bor.
orientale, *Greene, l. c.* 127.—Japon.
oxycarpum, *Greene, l. c.* 121.—Calif.
phaseoloides, *Greene, l. c.* 123.—Mexic.
pumilum, *Greene, l. c.* 124.—Am. bor.
punctatum, *Greene, l. c.* 125.—Am. bor.
quercifolium, *Greene, l. c.* 127 (= *Rhus quercifolia*).—Am. bor.
rhomboideum, *Greene, l. c.* 125 (= *Rhus rhomboidea*).—Am. bor.
Rydbergii, *Greene, l. c.* 117 (= *Rhus Rydbergii*).—Am. bor.
vaccarum, *Greene, l. c.* 122.—Calif.
verrucosum, *Greene, l. c.* 124 (= *Rhus verrucosa*).—Am. bor.

TOXICOSCORDION, Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club, 1903, 272. *MELANTHACEAE.*
acutum, *Rydb. l. c.* (= *Zygadenus acutus*).—Am. bor.
falcatum, *Rydb. l. c.* (= *Zygadenus falcatus*).—Am. bor.
Fremontii, *Rydb. l. c.* 273 (= *Zygadenus Fremontii*).—Calif.
gramineum, *Rydb. l. c.* 272 (= *Zygadenus gramineus*).—Am. bor.
intermedium, *Rydb. l. c.* (= *Zygadenus intermedius*).—Am. bor.
Nuttallii, *Rydb. l. c.* (= *Amianthium Nuttallii*).—Calif.
paniculatum, *Rydb. l. c.* (= *Helonias paniculata*).—Am. bor. occ.
texense, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 252.—Am. bor.
venenosum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 272 (= *Zygadenus venenosus*).—Am. bor. occ.

TOXOCARPUS, Wight & Arn. (Asclep.).
brevipes, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 287 (= *Rhynchostigma brevipes*).—Afr. trop.
Loheri, *Schlecht. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* i. 122.—Ins. Philipp.
Lujaei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 191 (= *Rhynchostigma Lujaei*).—Afr. trop.
orientalis, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 353.—Ins. Bismarck.
parviflorus, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 268 (= *Rhynchostigma parviflorum*).—Afr. trop.
racemosus, *N. E. Br. l. c.* 287 (= *Rhynchostigma racemosum*).—Afr. trop.

TOZZETTIA, Savi (Gramin.).
[ALOPECURUS, Linn. I. K.]
agrestis, *Bub. Fl. Pyren.* iv. 274 (= *Alopecurus agrestis*).—Eur.; Caucas.
geniculata, *Bub. l. c.* 275 (= *Alopecurus geniculatus*).—Reg. bor. temp.
nodosa, *Bub. l. c.* 276 (= *Alopecurus bulbosus*, Gouan).—Eur.
vulgaris, *Bub. l. c.* (= *Alopecurus pratensis*).—Reg. bor. temp.

TRACAULON, Rafin. (Polygon.).
[POLYGONUM, Tourn. I. K.]
Beyrichianum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 380 (= *Polygonum Beyrichianum*).—Am. bor.

TRACAULON:—
hastato-trilobum, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 22 (= *Polygonum hastato-trilobum*).—Japon.
hispidulum, *Greene, l. c.* (= *Polygonum hispidulum*).—As. et Austral. trop.
Maackianum, *Greene, l. c.* (= *Polygonum Maackianum*).—Japon.
Meisnerianum, *Greene, l. c.* (= *Polygonum Meisnerianum*).—Bras.
multangulare, *Greene, l. c.* (= *Polygonum multangulare*).—Am. bor.
muricatum, *Greene, l. c.* (= *Polygonum muricatum*).—Reg. Himal.
pedunculare, *Greene, l. c.* (= *Polygonum pedunculare*).—As. et Austral. trop.
perfoliatum, *Greene, l. c.* (= *Polygonum perfoliatum*).—Ind. or.; Malaya.
praetermissum, *Greene, l. c.* (= *Polygonum praetermissum*).—Ind. or.
rubricaule, *Greene, l. c.* (= *Polygonum rubricaule*).—Bras.
sagittatum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 381 (= *Polygonum sagittatum*).—Am. bor.
sibiricum, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 22.—As. bor.
Sieboldii, *Greene, l. c.*—As. bor.
stelligerum, *Greene, l. c.* (= *Polygonum stelligerum*).—Bras.
strigosum, *Greene, l. c.* (= *Polygonum strigosum*).—Austral.; N. Zel.
tetragonum, *Greene, l. c.* (= *Polygonum tetragonum*).—As. et Austral. trop.
Thunbergii, *Greene, l. c.* (= *Polygonum arifolium*).—Japon.

TRACHELANTHUS, Kunze (Borag.).
[SOLENANTHUS, Ledeb. I. K.]
hissaricus, *Lipsky, in Act. Hort. Petrop.* xxiii. 202.—As. cent.
Korolkowi, *Lipsky, l. c.* 199.—As. cent.

TRACHYCARPUS, H. Wendl. (Palmae).
Takil, *Becc. in Martelli, Webbia*, 62.—Reg. Himal.

TRACHYMENE, DC. (Umbell.).
[PLATYSACE, Bunge. I. K.]
geraniifolia, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 2015.—Austral.
xerophila, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 463.—Austral.

TRACHYPHRYNIUM, Benth. (Scitam.).
Zenkerianum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Marant.* 45.—Afr. trop.

TRACHYPLEURUM, Reichb. (Umbell.).
[BUPLEURUM, Tourn. I. K.]
subovatum, *Calest. in Martelli, Webbia*, 163 (= *Bupleurum subovatum*).—Reg. Medit.

TRACHYPOA, Bub. Fl. Pyren. iv. 359 = **Dactylis**, Linn. (Gramin.).
vulgaris, Bub. l. c. = D. glomerata.

TRACYANTHUS, Small, Fl. S. E. U. S. 250 (1903). *MELANTHACEAE.*
angustifolius, *Small, l. c.* 251 (= *Helonias angustifolia*).—Am. bor.

TRADESCANTELLA, Small, Fl. S. E. U. S. 237 (1903). *COMMELINACEAE.*
floridana, *Small, l. c.* 238 (= *Tradescantia floridana*).—Am. bor.
incarnata, *Small, l. c.* 1328 (= *Tradescantia incarnata*).—Am. bor.

TRADESCANTIA, Rupp. (Commelin.).
australis, *Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xiv. 185.—Am. bor.
difformis, *Bush, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1905, 101.—Am. bor.
diffusa, *Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xiv. 193.—Am. bor.
dracaenoides, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 70 (= *Dichorisandra longifolia*).—Mexic.
eglandulosa, *Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xiv. 191.—Am. bor.
Harbisonii, *Bush, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1905, 100.—Am. bor.
hirsutiflora, *Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xiv. 184.—Am. bor.
incarnata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 239.—Am. bor.

TRADESCANTIA:—
intermedia, *Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xiv. 191.—Am. bor.
laramiensis, *Goodd. in Coult. Bot. Gaz.* xxxiii. 68.—Am. bor.
occidentalis, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 241.—Am. bor.
peninsularis, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 173 (1903).—Calif.
radiata, *C. B. Clarke, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 245.—Parag.
Reverchoni, *Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xiv. 190.—Am. bor.
saxicola, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 70.—Mexic.
subacaulis, *Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xiv. 185.—Am. bor.
texana, *Bush, l. c.* 192.—Am. bor.
Urbinana, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 70.—Mexic.
vaginata, *Bush, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, xiv. 189.—Am. bor.
Wrightii, *Rose & Bush, l. c.* 188.—Am. bor.

TRAGANTHES, Wallr. (Compos.).
[EUPATORIUM, Tourn. I. K.]
compositifolia, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 13 (= *Eupatorium compositifolium*).—Am. bor.
Eugenei, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium Eugenei*).—Am. bor.
leptophylla, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium leptophyllum*).—Am. bor.
pectinata, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium pectinatum*).—Am. bor.
pinnatifida, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium pinnatifidum*).—Am. bor.

TRAGIA, Plum. (Euphorb.).
Descampsii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 207.—Afr. trop.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 606.—Parag.
lukafuensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 206.—Afr. trop.
saxicola, *Small, Fl. S. E. U. S.* 702.—Am. bor.

TRAGOPOGON, Linn. (Compos.).
duarius, *Chenev. in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève*, ix. 130.—Hybr.
Kindingeri, *Adamov. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 236.—Turcia.
praecox, *Focke, in Abh. Nat. Ver. Bremen*, xviii. 188.—Eur. cent.

TRAGUS, Hall. (Gramin.).
paucispina, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 193.—Afr. trop.

TRATTINICKIA, Willd. (Burser.).
Schwackeana, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 92, nomen.—Bras.

TRECHONAETES, Miers (Solan.).
leucotricha, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 45.—Patag.

TRELEASEA, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. v. (1899) 207 = **Neotreleasea**, Rose (Commelin.).
brevifolia, Rose, l. c. = N. brevifolia.
leiandra, Rose, l. c. 208 = N. leiandra.
tumida, Rose, l. c. = N. tumida.

TREMA, Lour. (Urtic.).
floridana, *Britton, in Small, Fl. S. E. U. S.* 366.—Am. bor.
Vieillardi, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 81 (= *Sponia Vieillardi*).—N. Caled.

TREMACANTHUS, S. Moore, in Journ. Bot. 1904, 33. *ACANTHACEAE.*
Robertii, *S. Moore, l. c.*—Bras.

TRIANTHA, Baker (Liliac.).
[TOFIELDIA, Huds. I. K.]
racemosa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 249 (= *Melanthium racemosum*).—Am. bor.

TRIASPIS, Burch. (Malpigh.).
canescens, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 249.—Afr. trop.
Erlangeri, *Engl. l. c.* 248.—Afr. trop.
glaucophylla, *Engl. l. c.*—Afr. austr.
Niedenzuiana, *Engl. l. c.* 247.—Afr. trop.

TRIATHERA, Desv. (Gramin.).
[BOUTELOUA, Lag. I. K.]
aristidoides, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 137 (= Dinebra aristidoides).—Am. bor.

TRICALYSIA, A. Rich. (Rubiac.).
aurantiodora, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 157.—Afr. trop.
Bussei, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. 346.—Afr. trop.
Crepiniana, Wildem. & Th. Dur. in Ann. Mus. Congo, Sér. III. 120.—Afr. trop.
djumaensis, Wildem. l. c. Sér. V. i. 202.—Afr. trop.
katangensis, Wildem. l. c. Sér. IV. 156.—Afr. trop.
longestipulata, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 756.—Afr. trop.
macronulata, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxx. 413.—Afr. trop.
odoratissima, K. Schum. l. c. xxxiii. 346.—Afr. trop.
pachystigma, K. Schum. l. c. 347.—Afr. trop.
petiolata, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 202.—Afr. trop.
roseoides, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 825.—Afr. trop.

TRICHACHNE, Nees (Gramin.).
saccharatum, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 83 (= Panicum saccharatum).—Am. bor.

TRICHERA, Schrad. = **Knautia**, Linn. (Dipsac.).
baldensis, Borb. Rev. Knaut. 43 = K. magnifica.
dinarica, Borb. l. c. = K. magnifica.
heliantha, Borb. l. c. 41 = K. heliantha.

TRICHILIA, P. Br. (Meliac.).
acutanthera, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 422.—Am. cent.
alba, C. DC. l. c. iii. 411.—Parag.
angustior, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 34.—Bras.
anisopleura, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 424.—Am. cent.
arborea, C. DC. l. c. 426.—Am. cent.
Biolleyi, C. DC. l. c. 423.—Am. cent.
brachythyrsus, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 32.—Bras.
fragrans, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 363.—Bras.
Gilletii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 50.—Afr. trop.
goyazensis, Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. III. 95, nomen.—Bras.
graciliflora, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 33.—Reg. Argent.
gracilis, Loes. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém. III. 95, nomen.—Bras.
Hassleri, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 410.—Parag.
lobulata, C. DC. l. c. i. 364.—Bras.
longeracemosa, Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr. lii. Mém III. 95, nomen.—Bras.
Mocquerysi, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 563.—Madag.
multijuga, C. DC. l. c. 308.—Bras.
obtusanthera, C. DC. l. c. v. 423.—Am. cent.
orgaosana, C. DC. l. c. i. 362.—Bras.
Pittieri, C. DC. l. c. v. 425.—Am. cent.
polyneura, C. DC. l. c. 426.—Am. cent.
Pringlei, Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. viii. 50.—Mexic.
pyramidata, Harms, in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 32.—Bras.
Schumanniana, Harms, l. c. 33.—Bras.
Schwackei, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 363.—Bras.
stellipila, C. DC. l. c. iii. 412.—Parag.
Tonduzii, C. DC. l. c. v. 423.—Am. cent.
triphyllaria, C. DC. l. c. iii. 410.—Parag.

TRICHINIUM, R. Br. (Amarant.).
Carlsoni, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 220 (= Ptilotus Carlsoni).—Austral.
chortophytum, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 192.—Austral.
Clementi, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 1088.—Austral.
depressum, Farmar, l. c. 1087 (= Ptilotus depressus).—Austral.
Elderi, Farmar, l. c. 1089.—Austral.
procerum, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 191.—Austral.

TRICHINIUM:—
Schwartzii, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 1087 (= Ptilotus Schwartzii).—Austral.
siphonandrum, Diels, in Engl. Jahrb. xxxv. 189.—Austral.

TRICHOCAULON, N. E. Br. (Asclep.).
Pillansii, N. E. Br. in Gard. Chron. 1904, i. 242.—Afr. austr.

TRICHOCLINE, Cass. (Compos.).
aurea, Reiche, Fl. Chile, iv. 362 (= Bichenia aurea).—Chili.
crenata, Reiche, l. c. 360 (= Chaetanthera crenata).—Chili.

TRICHODESMA, R. Br. (Borag.).
arenicola, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxii. 143.—Afr. trop.
atrichum, Vierh. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 439.—Socotra.
Baumii, Guerke, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 349.—Afr. trop.
Bentii, Baker & C. H. Wright, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. ii. 49.—Afr. trop.
Dekindtianum, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxii. 142.—Afr. trop.
glabrescens, Guerke, l. c. xxx. 389.—Afr. trop.
hispidum, Baker & C. H. Wright, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. ii. 45.—Afr. trop.
macrantherum, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxii. 142.—Afr. trop.
oleaefolium, Baker, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. ii. 47 (= Streblanthera oleaefolia).—Afr. trop.
Schimperi, Baker, l. c.—Afr. trop.

TRICHOGLOTTIS, Blume (Orchid.).
bataanensis, Ames, Orchid. i. 105.—Ins. Philipp.
bipenicillata, J. J. Sm. in Ic. Bogor. t. 125 A.—Borneo.
flexuosa, Rolfe, in Ames, Orchid. i. 107.—Ins. Philipp.
geminata, J. J. Sm. Orch. Ambon, 106 (= Sarcanthus geminatus).—Arch. Mal.
littoralis, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 230.—Ins. Bismarck.
pantherina, J. J. Sm. in Ic. Bogor. t. 124 B.—Borneo.

TRICHOON, Roth (Gramin.).
[PHRAGMITES, Trin. I. K.]
Roxburghii, W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. 390 (= Arundo Roxburghii).—As. austr. et or.; Polynes.

TRICHOPTERYX, Nees (Gramin.).
brevifolia, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 190.—Madag.
crinita, Stapf, in Journ. de Bot. 1905, 106.—Afr. trop.
glabra, Hack. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 770.—Afr. trop.
Kerstingii, Pilg. in Engl. Jahrb. xxxiv. 128.—Afr. trop.
parviflora, Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1902, 191.—Afr. trop.
reflexa, Pilg. in Engl. Jahrb. xxxiii. 52.—Afr. trop.
ternata, Stapf, in Journ. de Bot. 1905, 106.—Afr. trop.
togoensis, Pilg. in Engl. Jahrb. xxxiv. 128.—Afr. trop.

TRICHOSANTHES, Linn. (Cucurb.).
Rosthornii, Harms, in Engl. Jahrb. xxix. 603.—China.

TRICHOSCYPHA, Hook. f. (Anacard.).
albiflora, Engl. in Engl. Jahrb. xxxvi. 223.—Afr. trop.
atropurpurea, Engl. l. c. 222.—Afr. trop.
bipindensis, Engl. l. c. 223.—Afr. trop.
congoensis, Engl. l. c. 222.—Afr. trop.
Dinklagei, Engl. l. c. 224.—Afr. trop.
Laurentii, Wildem. Enum. Pl. Laurent, 144.—Afr. trop.
Victoriae, Engl. in Engl. Jahrb. xxxvi. 224.—Afr. trop.

TRICHOSPORUM, D. Don (Gesner.).
[AESCHYNANTHUS, Jack. I. K.]
cardinale, Copeland, ex Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xvii. 46.—Ins. Philipp.

TRICHOSTACHYS, Hook. f. (Rubiac.).
interrupta, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. 360.—Afr. trop.

TRICHOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 215; et in Journ. de Bot. xvi. 184. OCHNACEAE.
acuminata, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 232 (= Gomphia acuminata).—Bras.
Blanchetiana, Van Tiegh. l. c. 234 (= Gomphia Blanchetiana).—Bras.
brachyandra, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 188 (= Gomphia brachyandra).—Bras.
caulipila, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 234.—Bras.
cearensis, Van Tiegh. l. c. 235.—Bras.
costata, Van Tiegh. l. c.—Bras.
floribunda, Van Tiegh. l. c. 233 (= Gomphia floribunda).—Bras.
foliosa, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 157; et in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xviii. 9.—Bras.
Gardneri, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 188.—Bras.
glabrescens, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 231.—Bras.
gracilis, Van Tiegh. l. c.—Bras.
Guildingi, Van Tiegh. l. c. 235 (= Gomphia Guildingi).—Ind. occ.
laevis, Van Tiegh. l. c. 233.—Bras.
nana, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 188 (= Gomphia nana).—Bras.
nervosa, Van Tiegh. l. c. (= Gomphia nervosa).—Bras.
nitida, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 235 (= Gomphia nitida).—Ind. occ.
oleifolia, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 215; et in Journ. de Bot. xvi. 185 (= Gomphia oleaefolia).—Bras.
parvifolia, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 188 (= Gomphia parvifolia).—Bras.
pubescens, Van Tiegh. l. c. (= Gomphia pubescens).—Bras.
rufidula, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 234 (= Gomphia rufidula).—Bras.
salicifolia, Van Tiegh. l. c. 233 (= Gomphia salicifolia).—Bras.
subvelutina, Van Tiegh. in Journ. de Bot. 188 (= Gomphia subvelutina).—Bras.
vaccinioides, Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 234 (= Gomphia vaccinioides).—Bras.

TRICHOVASELIA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1902, 360; Journ. de Bot. xvi. 208; Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 411. OCHNACEAE.
canescens, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 208; et in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 411.—Venez.

TRICUSPIDARIA, Ruiz & Pav. (Tiliac.).
[CRINODENDRON, Molina. D. T. & H.]
Hookeriana, R. O. Cunningham, Nat. Hist. Strait Magell. (1871) pp. 342, 493 = lanceolata.

TRICUSPIS, Beauv. (Gramin.).
[TRIODIA, R. Br. I. K.]
elongata, Nash, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 127 (= Sieglingia elongata).—Am. bor.
pilosa, Nash, l. c. (= Sieglingia pilosa).—Am. bor.

TRICYRTIS, Wall. (Liliac.).
affinis, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 70.—Japon.

TRIDENS, Roem. & Schult. (Gramin.).
[TRIODIA, R. Br. I. K.]
Buckleyanus, Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 143 (= Triodia Buckleyana).—Am. bor.
congestus, Nash, l. c. (= Sieglingia congesta).—Am. bor.
Drummondii, Nash, l. c. (= Triodia Drummondii).—Am. bor.
elongatus, Nash, l. c. (= Uralepis elongata).—Am. bor.
muticus, Nash, l. c. (= Tricuspis mutica).—Am. bor.
seslerioides, Nash, l. c. 142 (= Poa seslerioides).—Am. bor.
strictus, Nash, l. c. 143 (= Windsoria stricta).—Am. bor.

TRIDESMOSTEMON, Engl. in Engl. Jahrb. xxxviii. (1905) 99. SAPOTACEAE.
omphalocarpoides, Engl. l. c.—Afr. trop.

TRIENTALIS, Rupp. (Primul.).
Reichelii, Oppitz, ex Knuth, in Engl. Pflanzenreich, Primul. 313 = europaea.

TRIFOLIUM, Linn. (Legum.).
Andrewsii, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 114.—Calif.
anodon, *Greene, Pittonia*, v. 107.—Calif.
arcuatum, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 39.—Am. bor.
basletanum, *Gand. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. 448.—Hispan.
brachyodon, *Greene, Pittonia*, v. 107.—Calif.
brachypus, *Blank. in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 81.—Am. bor.
bracteolatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 500.—Am. bor.
decodon, *Greene, Pittonia*, v. 108.—Calif.
lilacinum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 37.—Am. bor.
lividum, *Rydb. l. c.* 1903, 254.—Am. bor.
meduanense, *Mercier & Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xiii. (1904) 287.—Hybr.
neurophyllum, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 154.—Am. bor.
parvum, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 114.—Calif.
pedunculatum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 254.—Am. bor.
petraeum, *Greene, Pittonia*, iv. 307.—Am. bor.
Pilerii, *Adam. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxiv. 130.—Turcia.
scariosum, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 401.—Am. bor.
splendens, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 115.—Calif.
stenolobum, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 499.—Am. bor.
tenerum, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 81.—Am. bor.
trichocalyx, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 55.—Calif.
ukingense, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 324.—Afr. trop.
Wentzelianum, *Harms, l. c.*—Afr. trop.

TRIGLOCHIN, Riv. (Naiad.).
elongata, *Buchen. in Engl. Pflanzenreich, Scheuchzer.* 10.—Afr. austr.
Muelleri, *Buchen. l. c.* 12.—Austral.
narbonense, Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 443 = maritimum.

TRIGONELLA, Linn. (Legum.).
eremophila, *Freyn & Pauls. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 40.—Turkestan.

TRIGONIA. Aubl. (Vochys.).
minutiflora, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 33, nomen.—Bras.
ovalifolia, *Glaz. l. c.* 34, nomen.—Bras.

TRIGONOSPERMUM, Less. (Compos.).
floribundum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 99.—Mexic.

TRIGONOSTEMON, Blume (Euphorb.).
oliganthum, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 298.—N. Guin.

TRIGONOTIS, Stev. (Borag.).
macrophylla, *Vaniot, in Monde des Plantes*, Sér. II. vii. 42.—China.
Olgae, *B. Fedtsch. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xxi. 325.—Turkestan.

TRILLIUM, Linn. (Liliac.).
affine, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901. 334.—Am. bor.
chloropetalum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 661.—Am. bor.
decumbens, *Harbison, in Biltm. Bot. Studies*, i. 158.—Am. bor.
giganteum, *A. A. Heller, in Bull. S. Calif. Acad.* ii. 67.—Calif.
Hugeri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 277.—Am. bor.
japonicum, *Matsum. Enum. Sci. Names* (1895) 296 (= *Trillidium japonicum*).—Japon.
ludovicianum, *Harbison, in Biltm. Bot. Studies*, i. 23.—Am. bor.
luteum, *Harbison, l. c.* 21.—Am. bor.
Rugelii, *Rendle, in Journ. Bot.* 1901, 331.—Am. bor.
stamineum, *Harbison, in Biltm. Bot. Studies*, i. 23.—Am. bor.
Vaseyi, *Harbison, l. c.* 24.—Am. bor.

TRIMERIA, Harv. (Bixac.).
macrophylla, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 154.—Afr. trop.

TRINIELLA, Calest. in Martelli, Webbia, 109, 146 (1905). *UMBELLIFERAE.*
carniolica, *Calest. l. c.* 147.—Ital.
frigida, *Calest. l. c.* (= *Rumia frigida*).—Graecia.
Guicciardii, *Calest. l. c.* (= *Rumia Guicciardii*).—Graecia.

TRIODIA, R. Br. (Gramin.).
Chapmani, *Bush, in Trans. Acad. St. Louis*, xii. 74 (= *Tricuspis Chapmani*).—Am. bor.
congesta, *Bush, l. c.* 67 (= *Sieglingia congesta*).—Am. bor.
Drummondii, *Bush, l. c.* 72 (= *Tricuspis Drummondii*).—Am. bor.
Elliottii, Bush, l. c. 73 = ambigua.
elongata, Bush, l. c. 76 = trinerviglumis.
Langloisii, *Bush, l. c.* 72 (= *Tricuspis Langloisii*).—Am. bor.
paraguayensis, *Hack. ex Stuck. in Anal. Mus. Buenos Aires*, xi. 127 (= *Arundinaria paraguayensis*).—Reg. Argent.
pilosa, Bush, in Trans. Acad. St. Louis, xii. 67 = acuminata.

TRIORCHOS, Small & Nash, in Small, Fl. S. E. U. S. 329 (1903). *ORCHIDACEAE.*
ecristatus, *Small, l. c.* (= *Cyrtopodium ecristatum*).—Am. bor.

TRIOSTEUM, Linn. (Caprifol.).
aurantiacum, *E. P. Bickn. in Torreya*, i. 26; *et in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 873.—Am. bor.
intermedium, *Diels & Graebn. in Engl. Jahrb.* xxix. 590.—China.
Rosthornii, *Diels & Graebn. l. c.* 592.—China.

TRIPHALIA, Banks & Sol. ex Hook. f. in Bot. Mag. t. 7868 = **Aristotelia**, L'Herit. (Tiliac.).
rubicunda, Banks & Sol. ex Hook. f. l. c. = A. racemosa.

TRIPHORA, Nutt. (Orchid.).
[POGONIA, Juss. I. K.]
trianthophora, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 296 (= *Pogonia trianthophora*).—Am. bor.

TRIPLARIS, Loefl. (Polygon.).
baturitensis, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 300.—Bras.
guaranitica, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 393.—Parag.

TRIPLOCHITON, K. Schum. (Triplochitonaceae).
Johnsoni, *C. H. Wright, in Hook. Ic. Pl.* t. 2758.—Afr. trop.

TRIPLOSTEGIA, Wall. (Dipsac.).
grandiflora, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlvii. 333.—China.

TRIPOGON, Roth (Gramin.).
chinensis, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 503.—Corea; China.
purpurascens, *Duthie, in Ann. Hort. Bot. Calc.* ix. 74.—Ind. or.

TRIPTERIS, Less. (Compos.).
Goetzei, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 439.—Afr. trop.

TRIRAPHIS, R. Br. (Gramin.).
rigidissima, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxv. 72.—Austral.

TRISCYPHUS, Taub. ex Warm. in Overs. Dansk. Vid. Selsk. Forh. 1901, 178. *BURMANNIACEAE.*
fungiformis, *Taub. ex Warm. l. c.*—Bras.

TRISETUM, Pers. (Gramin.).
alaskanum, *Nash, in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. vi. 155.—Am. bor.
Buchtienii, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 290.—Chili.
Cheesemani, *Hack. in Trans. Proc. N. Z. Inst.* xxxv. 381.—N. Zel.
Congdoni, *Scribn. & Merrill, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1902, 470.—Am. bor.

TRISETUM:—
Henryi, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxxvi. 400.—China.
lasianthum, *Lara, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 15.—Hispan.
macrotrichum, *Hack. in Magyar Bot. Lap.* ii. 110.—Transsylv.
nutkaense, *Scribn. & Merrill, in Univ. Calif. Publ. Bot.* i. 63 (= *Avena nutkaensis*).—Am. bor.
pubiflorum, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 187.—Ind. or.
Rosei, *Scribn. & Merrill, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 289.—Mexic.
rufescens, *Adamov. in Cat. Gr. Jard. Bot. Belgr.* 1903; *et in Magyar Bot. Lap.* iii. 142.—Eur.
Shearii, *Scribn. in U. S. Dept. Agric. Circ. Agrost.* xxx. 8.—Am. bor.
Tarnowskii, *Zapal. in Bull. Acad. Cracov.* 1904, 167.—Galic.

TRISTAGMA, Poepp. (Liliac.).
eremophilum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 171.—Patag.
inflatum, *Rendle, in Journ. Bot.* 1904, 325.—Patag.
pulchellum, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 172.—Patag.

TRISTANIA, R. Br. (Myrtac.).
Brownii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 25.—Austral.
decorticata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 51.—Ins. Philipp.
Hillii, *Aresch. in Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxix. no. 2, 42, nomen.—Hab.?
subauriculata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxx. 72.—Penins. Mal.

TRISTELLATEIA, Thou. (Malpigh.).
maroana, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 562.—Madag.
Mocquerysi, *Aug. DC. l. c.* 563.—Madag.

TRISTEMMA. Juss. (Melast.).
Verdickii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 219.—Afr. trop.

TRISTICHA, Thou. (Podost.).
ramosissima, *Willis, in Ann. Bot. Gard. Perad.* i. 208 (= *Dalzellia ramosissima*).—Ind. or.

TRISTIRA, Radlk. (Sapind.).
pubescens, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* vi. 12.—Ins. Philipp.

TRISTIROPSIS, Radlk. (Sapind.).
subangula, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 310.—N. Guin.

TRITELEIA, Dougl. (Liliac.).
[BRODIAEA, Sm. I. K.]
angustiflora, *A. A. Heller, in Bull. S. Calif. Acad.* ii. 66.—Calif.

TRITHURIA, Hook. f. (Centrolep.).
filamentosa, *Rodw. Tasman. Fl.* 230.—Austral.

TRITICUM, Linn. (Gramin.).
ponticum, *Podp. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, lii. 681.—Eur.
silvestre, Aschers & Graebn. in Syn. Mitteleur. Fl. ii. 718 = campestre.
sylvestre, Bub. Fl. Pyren. iv. 395 = Aegilops ovata.

TRITONIA, Ker-Gawl. (Irid.).
acroloba, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 276.—Afr. trop.
nervosa, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 864.—Afr. austr.
parviflora, *Baker, l. c.* 865.—Afr. austr.
petrophila, *Baker, l. c.* iv. 1004.—Afr. austr.
Schlechteri, *Baker, l. c.* 1005.—Afr. austr.

TRIUMFETTA, Plum. (Tiliac.).
Amuletum, *Sprague, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. v. 702.—Afr. trop.
Deschampsii, *Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxix. 95.—Afr. trop.
dubia, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 54.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. l. c.* 55.—Afr. trop.

TRIUMFETTA :—
Hensii, Wildem. & Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxix. 93.—Afr. trop.
intermedia, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 56.—Afr. trop.
macrocoma, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxii. 133.—Afr. trop.
morrumbalana, Wildem. Pl. Nov. Hort. Then. t. 37.—Afr. trop.
rhodoneura, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxii. 134.—Afr. trop.

TRIXIS, P. Br. (Compos.).
Hassleri, Chod. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 782.—Parag.
Hieronymi, Arech. in Anal. Mus. Montevid. Ser. II., i. 16.—Urug.
Lorentzii, Arech. l. c. 15.—Urug.
megalophylla, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xli. 270.—Mexic.
Nelsonii, Greenm. l. c.—Mexic.
oligantha, Robinson & Greenm. l. c. xl. 9.—Mexic.
Pringlei, Robinson & Greenm. l. c. 10.—Mexic.
proustioides, Hieron. in Engl. Jahrb. xxviii. 653.—N. Granat.
pterocaulis, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 8.—Mexic.
rugulosa, Robinson & Greenm. l. c. 10.—Mexic.
silvatica, Robinson & Greenm. l. c. 12.—Mexic.
sonchoides, Chod. in Bull. Herb Boiss. Sér. II. iii. 783.—Parag.
Wrightii, Robinson & Greenm. in Proc. Amer. Acad. xl. 14.—Mexic.

TROCHOMERIA, Hook. f. (Cucurb.).
Baumiana, Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 394.—Afr. trop.
Busseі, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. 343.—Afr. trop.
djurensis, Schweinf. & Gilg, l. c.—Afr. trop.

TROPAEOLUM, Linn. (Geran.).
fulvum, Buchen. & Sod. in Engl. Jahrb. xxxiv. Beibl. lxxviii. 11.—Ecuador.
menispermifolium, Buchen. l. c. 12.—Ecuador.
stipulatum, Buchen. & Sod. l. c.—Ecuador.

TROPHIS, P. Br. (Urtic.).
macrostachya, Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xl. 10.—Am. cent.
racemosa, Urb. Symb. Antill. iv. 195 = americana.

TROPIDIA, Lindl. (Orchid.).
disticha, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 94.—N. Guin.
gracilis, Schlechter, l. c. 95.—N. Guin.
hongkongensis, Rolfe, in Journ. Linn Soc. xxxvi. 40.—Hongkong.

TROXIMON, Fras. (Compos.).
Poeppigii, Wildem. Rés. Voy. Belgica, Bot. 182 (= Macrorhynchus Poeppigii).—Reg. Magell.
pumilum, Wildem. l. c. (= Macrorhynchus pumilus).—Reg. Magell.

TRYBLIOCALYX, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iv. (1904) 328. ACANTHACEAE.
pyramidatus, Lindau, l. c. 401.—Guatem.

TRYMATOCOCCUS, Poepp. & Endl. (Urtic.).
Conrauanus, Engl. Jahrb. xxxiii. 117.—Afr. trop.
Gilletii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 119.—Afr. trop.
usambarensis, Engl. Jahrb. xxxiii. 117.—Afr. trop.

TRYPHOSTEMMA, Harv. (Passifl.).
Baumii, Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 310.—Afr. trop.
longifolium, Harms, in Engl. Jahrb. xxxiii. 149.—Afr. trop.

TUBERARIA, Spach (Cistac.).
[HELIANTHEMUM, Tourn. I. K.]
acuminata, Gross. in Engl. Pflanzenreich, Cistac. 59 (= Cistus acuminatus).—Reg. Medit.
guttata, Gross. l. c. 56 (= Cistus guttatus).—Reg. Medit.
melastomatifolia, Gross. l. c. 52 (= Helianthemum Tuberaria).—Reg. Medit.
praecox, Gross. l. c. 59 (= Helianthemum praecox).—Reg. Medit.
villosissima, Gross. l. c. (= Helianthemum villosissimum).—Reg. Medit.

TUBIFLORA, J. F. Gmel. (Acanth.).
[ELYTRARIA, Michx. I. K.]
acuminata, Small, Fl. S. E. U. S. 1092.—Am. bor.

TUERCKHEIMIA, Dammer, ex Donn. Sm. Enum. Pl. Guatem. vii. (1905) 53, nomen. PALMAE.
ascendens, Dammer, l. c. nomen.—Guatem.

TULBAGHIA, Linn. (Liliac.).
campanulata, N. E. Br. in Kew Bull. 1901, 135.—Afr. austr.
monantha, Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped. 192.—Afr. trop.

TULIPA, Linn. (Liliac.).
Borszczowi, Baker, in Bot. Mag. t. 6635 = Kolpakowskiana.
caucasica, Lipsky, in Act. Hort. Tiflis, vi. t. 85.—Reg. Caucas.
ingens, Hoog, in Gard. Chron. 1902, ii. 14.—As. cent.
Kolpakowskiana, Baker, in Bot. Mag. t. 6710 = Ostrowskiana.
Micheliana, Hoog, in Gard. Chron. 1902, i. 350.—Oriens.
nitida, Hoog, l. c.—Oriens.
praestans, Hort. ex Gard. Chron. 1903, i. 324, fig. 126.—Hab. ?
saracenica, Perrier, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 507.—Gallia.
Tubergeniana, Hort. ex Gard. Chron. 1904, i. 358.—As. cent. ?
Watsoniana, André, in Rev. Hortic. 1903, 206, sphalm. = Wilsoniana.
Wilsoniana, Hoog, in Gard. Chron. 1902, ii. 50.—Persia.

TULIPASTRUM, Spach (Magnol.).
[MAGNOLIA, Linn. I. K.]
acuminatum, Small, Fl. S. E. U. S. 451 (= Magnolia acuminata).—Am. bor.
cordatum, Small, l. c. (= Magnolia cordata).—Am. bor.

TUNICA, Hall. (Caryophyll.).
Nanteuilii, Guerke, in Richter, Pl. Eur. ii. 338 (= Dianthus Nanteuilii).—Gallia.

TUPISTRA, Ker-Gawl. (Liliac.).
violacea, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xli. 35.—Penins. Mal.

TURNERA, Plum. (Turner.).
dasytricha, Pilg. in Engl. Jahrb. xxx. 176.—Bras.
Hassleriana, Urb. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. 1119.—Parag.
pumilcoides, Urb. l. c. 1118.—Parag.
Selloi, Arech. in Anal. Mus. Montevid. v. 119 (= Piriqueta Selloi).—Urug.

TURPINIA, Vent. (Sapind.).
parva, Koord. & Valet. in Meded. 'S Lands Plantent. lxi. 249.—Java.

TURRAEA, Linn. (Meliac.).
Eylesii, Baker f. in Journ. Bot. 1905, 45.—Afr. trop.
humilis, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxvii. 30 = pumila.
Kaessneri, Baker f. in Journ. Bot. 1903, 13.—Afr. trop.
Kirkii, Baker f. l. c.—Afr. trop.

TURRITA, Wallr. = **Arabis**, Linn. (Crucif.).
alpestris, Bub. Fl. Pyren. iii. 153 = A. alpina.
arcuata, Bub. l. c. 157 = A. arcuata.
auriculata, Bub. l. c. 154 = A. auriculata.
brassicaeformis, Bub. l. c. 153 = A. brassicaeformis.
collina, Bub. l. c. 156 = A. muralis.
hirsuta, Bub. l. c. 155 = A. hirsuta.
ochroleuca, Bub. l. c. 153 = A. Turrita.
saxatilis, Bub. l. c. 154 = A. saxatilis.
serpyllifolia, Bub. l. c. 157 = A. serpyllifolia.
stricta, Bub. l. c. 156 = A. stricta.
vagans, Bub. l. c. 155 = A. Gerardi.
vernalis, Bub. l. c. 153 = A. verna.

TUSSILAGO, Linn. (Compos.).
umbertina, Borb. in Magyar Bot. Lap. iii. 349.—Italia.

TWEEDIA, Hook. & Arn. (Asclep.).
[OXYPETALUM, R. Br. I. K.]
brevipes, Malme, in Arkiv Bot. Stockh. ii. no. 7, 8 (= Oxypetalum brevipes).—Chili.
confertiflora, Malme, l. c. 6 (= Oxypetalum confertiflorum).—Chili

TWEEDIA :—
Echegarayi, Malme, in Arkiv Bot. Stockh. ii. no. 7, 11 (= Oxypetalum Echegarayi).—Reg. Argent.
Hookeri, Malme, l. c. 13 (= Oxypetalum Hookeri).—Chili.
obliquifolia, Malme, l. c. 9 (= Gonolobus obliquifolius).—Chili.

TYLLOMA, D. Don (Compos.).
[CHAETANTHERA, Ruiz & Pav. I. K.]
involucratum, Reiche, Fl. Chile, iv. 348 (= Chondrochilus involucratus).—Chili.

TYLOPHORA, R. Br. (Asclep.).
anfracta, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 408.—Afr. trop.
angustifolia, Schlechter, in Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 124.—Ins. Philipp.
congoensis, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxviii. 51.—Afr. trop.
dahomensis, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. 329.—Afr. trop.
exilis, Schlechter, in Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 125.—Ins. Philipp.
Gilletii, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 193.—Afr. trop.
glabriflora, Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee, 354 (= Gongronema glabriflorum).—Ins. Bismarck.
gracilis, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. V. i. 194.—Afr. trop.
hybostemma, Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 125.—Ins. Philipp.
inhambanensis, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxviii. 52.—Afr. austr.
joloensis, Schlechter, in Perkins, Frag. Fl. Philipp. i. 126.—Ins. Philipp.
liberica, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 109.—Afr. trop.
plagiopetala, Schlechter & K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiii. 330.—Afr. trop.
polyantha, Volk. in Engl. Jahrb. xxxi. 473.—Ins. Carol.
sulphurea, Volk. l. c.—Ins. Carol.
Zenkeri, Schlechter, in Engl. Jahrb. xxxviii. 52.—Afr. trop.

TYPHA, Linn. (Typhac.).
Maresii, Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis. 318.—Afr. bor.
Martini, Léveillé & Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 166.—China.
palustris, Bub. Fl. Pyren. iv. 25 = latifolia.

TYPHONIUM, Schott (Arac.).
filiforme, Ridley, in Journ. As. Soc. Straits, xli. 45.—Penins. Mal.
fultum, Ridley, l. c.—Penins. Mal.
pedatisectum, Gage, in Rec. Bot. Surv. India, iii. 110.—Burma.

U

UAPACA, Baill. (Euphorb.).
sansibarica, Pax. in Engl. Jahrb. xxxvi. 370.—Afr. trop.
togoensis, Pax, l. c. 371.—Afr. trop.

UGNI, Turcz. (Myrtac.).
[MYRTUS, Tourn. I. K.]
Myrtus, Macl. in Torreya, 1905, 198; et in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. viii. 502 (= Myrtus Ugni).—Am. austr.
Ugni, Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag. viii. 502 (= Myrtus Ugni).—Am. austr.

ULEANTHUS, Harms, in Verh. Bot. Ver. Brand. xlvii. (1905) 150. LEGUMINOSAE.
erythrinoides, Harms, l. c. 151.—Reg. Amaz.

ULEARUM, Engl. in Engl. Jahrb. xxxvii. (1905) 95. ARACEAE.
sagittatum, Engl. l. c.—Peruv.

ULMARIA, Hill (Rosac.).
[SPIRAEA, Linn. I. K.]
digitata, Matsum. Enum. Sci. Names (1895) 301 (= Spiraea palmata, Pall.).—Japon.
kamtschatica, Matsum. l. c. 302 (= Spiraea kamtschatica).—Japon.

ULMARIA:—
multijuga, *Matsum. Enum. Sci. Names* (1895) 302 (= *Filipendula multijuga*).—Japon.
purpurea, *Matsum. l. c.* (= *Filipendula purpurea*).—Japon.

UMBILICUS, DC. (Crassul.).
[Cotyledon, Tourn. I. K.]
Coutinhoi, *Mario, in Bol. Soc. Broter.* xx. (1905) 188.—Lusit.
giganteus, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 133.—Afr. bor.
praealtus, *Mario, in Bol. Soc. Broter.* xx. (1905) 185.—Lusit.
vulgaris, *Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis,* 133 (= *Cotyledon Umbilicus*).—Afr. bor.

UNAMIA, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1903) 6. *COMPOSITAE.*
fastigiata, *Greene, l. c.*—Am. bor.
georgiana, *Greene, l. c.*—Am. bor.
ptarmicoides, *Greene, l. c.* (= *Aster ptarmicoides*).—Am. bor.
subcinera, *Greene, l. c.* 7.—Am. bor.

UNCARIA, Schreb. (Rubiac.).
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 182.—Penins. Mal.
Wrayi, *King, l. c.*—Penins. Mal.

UNCASIA, Greene, Leaflets Bot. Obs. i. (1903) 13. *COMPOSITAE.*
alba, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium album*).—Am. bor.
altissima, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium altissimum*).—Am. bor.
anomala, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium anomalum*).—Am. bor.
cuneata, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium cuneatum*).—Am. bor.
cuneifolia, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium cuneifolium*).—Am. bor.
glomerata, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium glomeratum*).—Am. austr.
hyssopifolia, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium hyssopifolium*).—Am. bor.
lecheaefolia, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium lecheaefolium*).—Am. bor.
leucolepis, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium leucolepis*).—Am. bor.
linearifolia, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium linearifolium*).—Am. bor.
mikanioides, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium mikanioides*).—Am. bor.
Mohrii, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium Mohrii*).—Am. bor.
pallescens, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium pallescens*).—Am. austr.
perfoliata, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium perfoliatum*).—Am. bor.
petaloidea, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium petaloideum*).—Am. bor.
pubescens, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium pubescens*).—Am. bor.
resinosa, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium resinosum*).—Am. bor.
rotundifolia, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium rotundifolium*).—Am. bor.
Salvia, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium Salvia*).—Am. austr.
scabrida, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium scabridum*).—Am. bor.
semiserrata, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium semiserratum*).—Am. bor.
sessilifolia, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium sessilifolium*).—Am. bor.
Torreyana, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium Torreyanum*).—Am. bor.
tortifolia, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium tortifolium*).—Am. bor.
truncata, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium truncatum*).—Am. bor.
verbenaefolia, *Greene, l. c.* (= *Eupatorium verbenaefolium*).—Am. bor.

UNCINIA, Pers. (Cyper.).
fuscovaginata, *Kuek. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 50.—N. Zel.

UNEDO, Hoffmgg. & Link (Ericac.).
(Arbutus, Tourn. I. K.)
globosa, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 42.—Gallia.
oviformis, *Jord. l. c.*—Gallia.

UNIOLA, Linn. (Gramin.).
Pittieri, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 309.—Am. cent.

UNONA, Linn. f. (Anon.).
clusiflora, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 13.—Ins. Philipp.
lucens, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 14 (= *Polyalthia lucens*).—Madag.
Millenii, *Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl.* vi. 40.—Afr. trop.
Wardiana, *F. M. Bailey, Queensl. Fl.* 1996.—Austral.

UNONOPSIS, R. Fries (Anon.).
polyphleba, *Diels, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 131.—Reg. Amaz.
spectabilis, *Diels, l. c.*—Reg. Amaz.
stipitata, *Diels, l. c.* 130.—Peruv.

URAGOGA, Linn. (Rubiac.).
[Psychotria, Linn. I. K.]
Deplanchei, *Baill. ex Beauvis. Gen. Montrous.* 55 (= *Dounarrea alba*).—N. Caled.
noumeensis, Baill. ex Beauvis. l. c. 54 = Psychotria semperflorens.
Straussiae, *Baill. ex Beauvis. l. c.* 53 (= *Dounarrea speciosa*).—N. Caled.
sulphurea, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 398.—N. Guin.

URARIA, Desv. (Legum.).
neglecta, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxvi. 382 (1897).—Ind. or.

URBINELLA, Greenm. in Proc. Amer. Acad. xxxix. (1903) 117. *COMPOSITAE.*
Palmeri, *Greenm. l. c.*—Mexic.

URBINIA, Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1903) 11. *CRASSULACEAE.*
agavoides, *Rose, l. c.* 12 (= *Echeveria agavoides*).—Mexic.
Corderoyi, *Rose, l. c.* (= *Echeveria Corderoyi*).—Mexic.
obscura, *Rose, l. c.*—Hab.?

URECHITES, Muell. Arg. (Apocyn.).
Andrewsii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 936 (= *Echites Andrewsii*).—Am. bor.
neriandra, *Small, l. c.* 937 (= *Echites neriandra*).—Am. bor.

URELYTRUM, Hack. (Gramin.).
giganteum, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 125.—Afr. trop.

URERA, Gaudich. (Urtic.).
cordifolia, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 121.—Afr. trop.
Dinklagei, *Engl. l. c.*—Afr. trop.
filiformis, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 310.—Boliv.
Gravenreuthii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 120.—Afr. trop.
Henriquesii, *Engl. l. c.* 121.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent,* 72.—Afr. trop.
magna, *Britton, in Torreya,* iii. 90.—Ind. occ.
rugosa, *Rusby, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 310.—Boliv.
Rusbyi, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 310.—Boliv.

URGINEA, Steinh. (Liliac.).
amboensis, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 665.—Afr. trop.
berylloides, *Baker, l. c.* i. 785.—Afr. austr.
depressa, *Baker, l. c.* iv. 1000.—Afr. austr.
dimorphantha, *Baker, l. c.* iii. 663.—Afr. trop.
lorata, *Baker, l. c.* 664.—Afr. trop.
noctiflora, *Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 334.—Afr. bor.
pauciflora, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 786.—Afr. austr.
pilosula, *Engl. Jahrb.* xxxii. 93.—Afr. trop.

URGINEA:—
pretoriensis, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 796.—Afr. austr.
Rautanenii, *Baker, l. c.* iii. 664.—Afr. trop.
Schlechteri, *Baker, l. c.* iv. 1000.—Afr. austr.

URNULARIA, Stapf, in Hook. Ic. Pl. t. 2711 (1901). *APOCYNACEAE.*
Beccariana, *Stapf, l. c.* (= *Ancylocladus Beccarianus*).—Borneo.
flavescens, *Stapf, l. c.* (= *Willughbeia flavescens*).—Penins. Mal.
javanica, *Stapf, l. c.* (= *Willughbeia javanica*).—Java.
oblongifolia, *Stapf, l. c.*—Borneo.
ovatifolia, *Stapf, l. c.*—Borneo.

UROBOTRYA, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. (1906) 89. *OLACACEAE.*
angustifolia, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.
latifolia, *Stapf, l. c.*—Afr. trop.
minutiflora, *Stapf, l. c.* 90.—Afr. trop.

UROPHYLLUM, Wall. (Rubiac.).
andamanicum, *King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 195.—Ins. Andaman.
ferrugineum, *King & Gamble, l. c.* 193.—Penins. Mal.
potatorum, *King, l. c.* 195.—Penins. Mal.
Schmidtii, *C. B. Clarke, in Bot. Tidsskr.* xxiv. 334.—Malaya.
trifurcum, *H. H. W. Pearson, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 194.—Penins. Mal.

UROSPATHA, Schott (Arac.).
Edwallii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxvii. 122.—Bras.
Loefgreniana, *Engl. l. c.* 121.—Bras.
Tonduzii, *Engl. l. c.*—Am. cent.
Tuerckheimii, *Engl. l. c.*—Am. cent.

URSINIA, Gaertn. (Compos.).
alpina, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 125.—Afr. austr.
brevicaulis, *Wood & Evans, in Natal Colon. Herb. Rep.* 1900 (1901) 11; *et in Journ. Bot.* 1901, 172.—Afr. austr.

URTICA, Linn. (Urtic.).
Buchtienii, *Ross, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 464.—Chili.

URTICASTRUM, Fabricius, Enum. Pl. Hort. Helmstad. (1759) 204. *URTICACEAE.*

UTRICULARIA, Linn. (Lentib.).
acicularis, Soland. ex Stapf, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 430 = Ecklonii.
angolensis, *Kamienski, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 104; *et in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 373.—Afr. trop.
Baumii, *Kamienski, l. c.* 102; *et l. c.* 372.—Afr. trop.
concinna, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 55.—Guiana.
Connellii, *N. E. Br. l. c.* 53.—Guiana.
delicata, *Kamienski, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 97.—Afr. austr.
Dregei, *Kamienski, l. c.* 94.—Afr. trop.
elevata, *Kamienski, l. c.* 99.—Afr. austr.
Engleri, *Kamienski, l. c.* 95.—Afr. austr.
incerta, *Kamienski, l. c.* 111.—Afr. trop.
Kirkii, *Stapf, in Dyer, Fl. Cap.* iv. i. 428.—Afr. trop. et austr.
lobata, *Fernald, in Proc. Amer. Acad.* xl. 57.—Mexic.
Meyeri, *Pilg. in Engl. Jahrb.* xxx. 194.—Bras.
Quelchii, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 53.—Guiana.
radiata, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1090.—Am. bor.
Rehmannii, *Kamienski, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 99.—Afr. austr.
roraimensis, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 54.—Guiana.
Schinzii, *Kamienski, in Engl. Jahrb.* xxxiii. 101.—Afr. austr.
Sprengelii, *Kamienski, l. c.* 100.—Afr. austr.
strumosa, Soland. ex Stapf, in Dyer, Fl. Cap. iv. ii. 429 = capensis.
transrugosa, *Stapf, l. c.* 428.—Afr. trop. et austr.

UVARIA, Linn. (Anonac.).
alba, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xvii. 17.—Ins. Philipp.
brevistipitata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. V. i. 38.—Afr. trop.
Cabrae, *Wildem. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xl. 63.—Afr. trop.
cardiophylla, *Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl.* vi. 13.—Afr. trop.
clavata, *Pierre, ex Engl. & Diels, l. c.* 21.—Afr. trop.
Cornuana, *Engl. & Diels, l. c.* 15.—Afr. trop.
dependens, *Engl. & Diels, l. c.* 28.—Afr. trop.
Elliotiana, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
glabrata, *Engl. & Diels, l. c.*—Afr. trop.
hispido-costata, *Pierre, ex Engl. & Diels, l. c.* 25.—Afr. trop.
Klainei, *Pierre, ex Engl. & Diels, l. c.* 13.—Afr. trop.
latifolia, *Engl. & Diels, l. c.* 22 (= *Anona latifolia*).—Afr. trop.
muricata, *Pierre, ex Engl. & Diels, l. c.* 23.—Afr. trop.
nigrescens, *Engl. & Diels, l. c.* 16.—Afr. trop.
nyassensis, *Engl. & Diels, l. c.* 17.—Afr. trop.
psorosperma, *Pierre, ex Engl. & Diels, l. c.* 26.—Afr. trop.
Schweinfurthii, *Engl. & Diels, l. c.* 18.—Afr. trop.
Smithii, *Engl. l. c.* 27.—Afr. trop.
stellata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 14.—Ins. Philipp.
versicolor, *Pierre, ex Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl.* vi. 16.—Afr. trop.
Welwitschii, *Engl. & Diels, l. c.* 18.—Afr. trop.

UVARIASTRUM, Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl. vi (1901) 31. *ANONACEAE.*
Pierreanum, *Engl. & Diels, l. c.* 32.—Afr. trop.

V

VACCINIUM, Linn. (Vaccin.).
acrobracteatum, *K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 339.—N. Guin.
apoanum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 39.—Ins. Philipp.
australe, *Small, Fl. S. E. U. S.* 895.—Am. bor.
Banksii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 54.—Ins. Philipp.
caudatum, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 173.—Ins. Philipp.
Jagori, *Warb. l. c.* 174.—Ins. Philipp.
melanocarpum, *Mohr, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* vi. 658.—Am. bor.
microphyllum, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 411.—Am. bor.
Nagurai, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 56 = longeracemosum.
philippinense, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 174.—Ins. Philipp.
roraimense, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 48.—Guiana.
simulatum, *Small, Fl. S. E. U. S.* 896.—Am. bor.
Yatabei, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo,* xv. 141.—Japon.

VAGNERA, Adans. (Liliac.).
[SMILACINA, Desf. I. K.]
australis, *Small, Fl. S. E. U. S.* 270.—Am. bor.
brachypetala, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 268.—Am. bor.
leptopetala, *Rydb. l. c.*—Am. bor.

VAHADENIA, Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr. iv. i. 29 (1902). *APOCYNACEAE.*
Laurentii, *Stapf, l. c.* 30 (= *Landolphia Laurentii*).—Afr. trop.

VAHLIA, Thunb. (Saxifr.).
Menyharthii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 944.—Afr. trop.

VAILLANTIA, Tourn. (Rubiac.).
filiformis, *Lojac. Fl. Sic.* ii. i. 10.—Sicil.
intricata, *Lojac. l. c.* 11.—Sicil.

VALENTINA, Speg. Nov. Add. Fl. Patag. ii. (1902), repr. 85 = **Valentiniella**, Speg. (Borag.).
patagonica, Speg. l. c. 86 = Valentiniella patagonica.

VALENTINIELLA, Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires, ix. (1903) 9. *BORAGINACEAE.*
patagonica, *Speg. l. c.*—Patag.

VALENZUELIA, Bert. (Sapind.).
cristata, *Radlk. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 995.—Reg. Argent.

VALERIANA, Tourn. (Valerian.).
acutiloba, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 24.—Am. bor.
bracteosa, *Britton, in Bull. N. York Bot. Gard.* ii. 188.—Am. bor.
calabrica, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 400.—Ital.
calcicola, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 252.—Mexic.
californica, *A. A. Heller, Muhlenbergia,* i. 60.—Calif.
chubutensis, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires,* vii, 297.—Patag.
excelsa, *Reiche, Fl. Chile,* iii. 178.—Chili.
furfurescens, *A. Nelson, in Bull. Torr. Bot. Club,* 1901, 232.—Am. bor.
helictes, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxix. 600.—China.
heterophylla, *Reiche, Fl. Chile,* iii. 177 (= *Betckea heterophylla*).—Chili.
hiemalis, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxix. 600.—China.
macropoda, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 252.—Mexic.
macrorhiza, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 748 (= *Phyllactis macrorhiza*).—Chili; Patag.
Martjanovi, *Krylov, in Act. Hort. Petrop.* xxi. 9.—As. cent.
Nelsonii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 253.—Mexic.
ovata, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1904, 645.—Am. bor.
retrorsa, *Fern. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 502.—Mexic.
Rosthornii, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxix. 599.—China.
sedifolia, *Macl. in Rep. Princeton Univ. Exped. Patag.* viii. 749 (= *Phyllactis sedifolia*).—Reg. Magell.
septentrionalis, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 879.—Am. bor.
trachycarpa, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club,* 1904, 645.—Am. bor.
uliginosa, *Rydb. in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 878.—Am. bor.

VALERIANELLA, Tourn. (Valerian.).
Pomeli, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis,* 164.—Afr. bor.
Zoltani, *Borb. in Magyar Bot. Lap.* iii. 349.—Hybr.

VALIDALLIUM, Small, Fl. S. E. U. S. 264 (1903). *LILIACEAE.*
tricoccum, *Small, l. c.* (= *Allium tricoccum*).—Am. bor.

VANDA, Jones (Orchid.).
Watsoni, *Rolfe, in Gard. Chron.* 1905, i. 82, 123.—Anam.

VANDELLIA, Linn. (Scrophul.).
Bodinieri, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe,* 1904, repr. 9.—China.
callitrichifolia, *Léveillé, l. c.* 10.—China.
Cavaleriei, *Léveillé, l. c.* 9.—China.
punctata, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 19.—Burma.

VANDOPSIS, Pfitz. (Orchid.).
warocqueana, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee,* 225 (= *Stauropsis warocqueana*).—Ins. Bismarck.

VANGUERIA, Juss. (Rubiac.).
adenodonta, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. 414.—Afr. trop.
bicolor, *K. Schum. l. c.* xxxiv. 332.—Afr. trop.
binata, *K. Schum. l. c.* 333.—Afr. trop.
brachytricha, *K. Schum. ex Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 227.—Afr. trop.

VANGUERIA:—
glabrata, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxii. 144.—Afr. trop.
katangensis, *K. Schum. ex Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 227.—Afr. trop.
lasiocladus, *K. Schum. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 387.—Afr. trop.
linearisepala, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxxiii. 351.—Afr. trop.
oligacantha, *K. Schum. l. c.* xxxiv. 334.—Afr. trop.
Proschii, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève,* vi. 7.—Afr. trop.
Randii, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 252.—Afr. trop.
tristis, *K. Schum. ex Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 227.—Afr. trop.
Verdickii, *K. Schum. ex Wildem. l. c.* 228.—Afr. trop.

VANILLA, Plum. (Orchid.).
articulata, *Northr. in Mem. Torr. Bot. Club,* xii. 31.—Ins. Baham.
Dietschiana, *Edwall, in Revista Centr. Sci. Campinas,* ii. 192.—Bras.
Laurentiana, *Wildem. Notices Pl. Utiles Congo,* 327.—Afr. trop.
Phalaenopsis, Gard. World, 1904, 481 = Humblotii.

VANIOTIA, Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xii. (1903) 166. *SCROPHULARIACEAE.*
Martini, *Léveillé, l. c.*—China.

VASELIA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 217; Journ. de Bot. xvi. 208; Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 408. *OCHNACEAE.*
quinqueloba, *Van Tiegh. in Journ. de Bot. l. c.; et in Ann. Sci. Nat. l. c.* (= *Elvasia quinqueloba*).—Bras.

VATICA, Linn. (Dipterocarp.).
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo,* Sér. IV. 92.—Afr. trop.

VAUSAGESIA, Baill. (Violac.).
bellidifolia, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 305.—Afr. trop.

VAVAEA, Benth. (Meliac.).
Chalmersi, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. (1903) 177.—N. Guin.
pauciflora, *Volk. in Engl. Jahrb.* xxxi. 465.—Ins. Carol.

VELLEIA, Sm. (Gooden.).
hispida, *Fitzg. in Journ. W. Austral. Nat. Hist. Soc.* i. 25.—Austral.

VELLOZIA, Vand. (Amaryll.).
equisetoides, W. W[atson], in Gard. Chron. 1903, ii. 426 = trichophylla.
Kirkii, *Hemsl. in Bot. Mag.* sub t. 7962.—Afr. trop.
minuta, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 667.—Afr. trop.
rosea, *Baker, in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich.* xlix. 177.—Afr. trop.
Schlechteri, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1003.—Afr. austr.
trichophylla, *Hemsl. in Bot. Mag.* t. 7962.—Afr. trop.
violacea, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1003.—Afr. austr.

VENTILAGO, Gaertn. (Rhamnac.).
dichotoma, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxvii. 32 = luzonensis.

VEPRECELLA, Naud. (Melast.).
parvifolia, *Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 574.—Madag.

VEPRIS, Comm. (Rutac.).
[TODDALIA, Juss. I. K.]
uguenensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 243.—Afr. trop.

VERATRUM, Linn. (Liliac.).
Jonesii, *A. A. Heller, Muhlenbergia,* i. 124.—Am. bor.
tenuipetalum, *A. A. Heller, l. c.* 39.—Am. bor.

VERBASCUM, Tourn. (Scrophul.).
adrianopolitanum, *Podp. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,* lii. 665.—Eur.
atlanticum, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis,* 242.—Afr. bor.

VERBASCUM :—
belgradense, *Keller, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, lii. 98.—Eur.
corynephorum, *Borb. in Deutsch. Bot. Monatsschr.* 1902, 3.—Eur.
Dieckianum, *Borb. & Degen, in Magyar Bot. Lap.* iv. 82.—Turcia.
Kindlii, *Adamov. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 237.—Turcia.
Pancicii, *Kohlena. Beitr. Fl. Montenegr.* ii. 6 (*Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1902, Art. xxxix.).—Eur.

VERBENA, Linn. (Verben.).
ambrosifolia, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 1011.—Am. bor.
approximata, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 292.—Parag.
aretioides, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. No. 1, 109.—Reg. Argent.
Balansae, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 293.—Parag.
bonariensis, Rendle, in Journ. Bot. 1904, 370 = Prichardi.
brevibracteata, *Eggert, in Torreya*, ii. 124.—Am. bor.
callianthа, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1059.—Parag.
chubutensis, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 68.—Patag.
Hassleriana, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1056.—Parag.
inamoena, *Briq. l. c.* 1058.—Parag.
inconspicua, *Greene, Pittonia*, v. 137.—Am. bor.
intercedens, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1057.—Hybr.
laciniata, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 296 (= *Erinus laciniatus*).—Parag.
leucanthemifolia, *Greene, Pittonia*, v. 135.—Am. bor.
Lindmanii, *Briq. in Arkiv Bot. Stockh.* ii. no. 10, 12.—Bras.
maritima, *Small, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 426.—Am. bor.
mulinoides, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 70.—Patag.
neomexicana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1010.—Am. bor.
patagonica, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 68.—Patag.
plicata, *Greene, Pittonia*, v. 135.—Am. bor.
Prichardi, *Rendle, in Journ. Bot.* 1905, 33.—Patag.
pubera, *Greene, Pittonia*, v. 136.—Am. bor.
pulchella, *Greene, l. c.*—Am. bor.
pumila, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 1010.—Am. bor.
pygmaea, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. No. 1, 108.—Reg. Argent.
racemosa, *Eggert, in Torreya*, ii. 123.—Am. bor.
serpyllifolia, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 66 (= *Monopyrena serpyllifolia*).—Patag.
Silvestrii, *Speg. l. c.*—Patag.
stereoclada, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1060.—Parag.
tandilensis, *Speg. Contrib. Fl. Tandil*, 41.—Reg. Argent.
tenuisecta, *Briq. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, vii–viii. 294.—Parag.
tomophylla, *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1061.—Parag.

VERBESINA, Linn. (Compos.).
angulata, *Urb. Symb. Antill.* ii. 467.—Ind. occ.
aristata, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 8 = nudicaulis.
callacatensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 492.—Peruv.
Eggersii, *Hieron. l. c.* xxviii. 611.—Ecuador.
gracilipes, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 269.—Mexic.
guadeloupensis, *Urb. Symb. Antill.* ii. 466.—Ind. occ.
guaranitica, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 722.—Parag.
Hassleriana, *Chod. l. c.*—Parag.
hypsela, *Robinson, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxxi. 270.—Mexic.
Jelskii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 493.—Peruv.
Lehmannii, *Hieron. l. c.* xxviii. 612.—N. Granat.
madrensis, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 112.—Mexic.
myrtifolia, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 393.—Parag.
paraguariensis, *Chod. l. c.* iii. 722.—Parag.
pauciflora, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1273 (= *Actinomeris pauciflora*).—Am. bor.

VERBESINA :—
rugosa, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 393.—Parag.
Szyszylowiczii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 492.—Peruv.
Tonduzii, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 42.—Am. cent.

VERDICKIA, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 7 (1902). *LILIACEAE.*
katangensis, *Wildem. l. c.*—Afr. trop.

VERHUELLIA, Miq. (Piperac.).
lunaria, *C. DC. in Urb. Symb. Antill.* iii. 216 (= *Peperomia lunaria*).—Ind. occ.

VERNONIA, Schreb. (Compos.).
abbatobiana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 410.—Parag.
acuta, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 36.—Guiana.
ampla, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 423 (1901).—Afr. trop.
ampla, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 124.—China.
Arechavaletae, *E. André, in Rev. Hortic.* 1901, 284.—Urug.
Baumii, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 406.—Afr. trop.
Bernieri, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas*, t. 473.—Madag.
Blodgettii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1160.—Am. bor.
Bockiana, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxix. 608.—China.
borinquensis, *Urb. Symb. Antill.* iii. 390.—Ind. occ.
bracteosa, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 421.—Afr. trop.
bridelifolia, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 400.—Afr. trop.
calyculata, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 316.—Afr. trop.
candelabrum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 301.—Parag.
Caput-Medusae, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 166.—Afr. trop.
Chapelieri, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas*, t. 469.—Madag.
chiliocephala, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 148.—Afr. trop.
chimborazensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 559.—Ecuador.
cichoriiflora, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 300.—Parag.
cirrifera, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 320.—Afr. trop.
cleanthoides, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxxii. 148.—Afr. trop.
colorata, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas*, t. 466.—Madag.
conyzoides, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 303.—Parag.
cupularis, *Chod. l. c.* 299.—Parag.
cutervensis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 460.—Peruv.
dorsiventralis, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 410.—Parag.
Elliotii, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 315.—Afr. trop.
guadalupensis, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 28.—Am. bor.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 302.—Parag.
Henryi, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 500.—China.
Hindei, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 155.—Afr. trop.
homilantha, *S. Moore, l. c.* 158.—Afr. trop.
homilocephala, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 322.—Afr. trop.
Hystrix, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 298.—Parag.
Ilex, *Chod. l. c.* i. 410.—Parag.
imbricata, *Chod. l. c.* 409.—Parag.
itapensis, *Chod. l. c.* ii. 301.—Parag.
Jelskii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 459.—Peruv.
Kaessneri, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 340.—Afr. trop.
katangensis, *O. Hoffm. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. p. ix.—Afr. trop.
kentencephala, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas*, t. 477.—Madag.

VERNONIA :—
lepidifera, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 304.—Parag.
leucocalyx, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 422.—Afr. trop.
leucolepis, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas*, t. 468.—Madag.
limosa, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 400.—Afr. trop.
lingua, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 296.—Parag.
linosyrifolia, *Chod. l. c.* 300.—Parag.
lugarensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 425.—Afr. trop.
Martini, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 124.—China.
mamiensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 320.—Afr. trop.
mesogramme, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 403.—Afr. trop.
Migeodi, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 319.—Afr. trop.
milanjiana, *S. Moore, l. c.* 318.—Afr. trop.
Milleri, *J. R. Johnston, in Proc. Amer. Acad.* xl. 698.—Venez.
nandensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 323.—Afr. trop.
Nestor, *S. Moore, l. c.* 317.—Afr. trop.
oligantha, *Greene, Pittonia*, v. 56.—Am. bor.
oreophila, *Speg. Contrib. Fl. Tandil*, 22.—Reg. Argent.
perparva, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 324.—Afr. trop.
platylepis, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas*, t. 471.—Madag.
platyphylla, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 299.—Parag.
polyura, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 422.—Afr. trop.
pratensis, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas*, t. 479.—Madag.
primulina, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 402.—Afr. trop.
prolixa, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 322.—Afr. trop.
pubescens, *Auct. in Proc. Biol. Soc. Washington*, xiii. 207.—Am. bor.
pygmaea, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 401.—Afr. trop.
rigorata, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1903, 155.—Afr. trop.
Robertі, *S. Moore, l. c.* 1904, 35.—Bras.
ruwenzoriensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 321.—Afr. trop.
salviaefolia, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 410.—Parag.
scabrifolia, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 424.—Afr. trop.
Sceptrum, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 303.—Parag.
Seguini, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 241.—China.
spelaeicola, *Vaniot, l. c.* 123.—China.
sphaerocalyx, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 423.—Afr. trop.
subarborea, *Vaniot, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 126.—China.
sublanata, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas*, t. 463.—Madag.
subplumosa, *O. Hoffm. in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 404.—Afr. trop.
sylvatica, *Dunn, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 501.—China.
texana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1160.—Am. bor.
ugandensis, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 314.—Afr. trop.
usafuensis, *O. Hoffm. in Engl. Jahrb.* xxx. 426.—Afr. trop.
Valenzuelae, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 641.—Parag.
Verdickii, *O. Hoffm. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. p. ix.—Afr. trop.
viatorum, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 315.—Afr. trop.
Vidalii, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* vi. 6.—Ins. Philipp.
villosa, W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. 396 = chinensis.
volubilis, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 460.—Peruv.
voluta, *Drake, Hist. Pl. Madag. Atlas*, t. 474.—Madag.

VERONICA, Linn. (Scrophul.).
afrochamaedrys, *Engl. in Ann. Bot.* xviii. 538.—Afr. trop.
chamaedryoides, Engl. Pfl. Ost. Afr. C. 358 = afrochamaedrys.
crenatifolia, *Greene, Pittonia*, v. 114.—Am. bor.
demissa, *Sampaio, in Ann. Sci. Nat. Porto*, vii. 117.—Lusitan.
gigantea, *Cockayne, in Trans. N. Z. Inst.* xxxiv. 319.—Ins. Chatham.
Kindlii, *Adam. in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat.* lxxiv. 138.—Turcia.
macrosperma, *Schuster, in Mitth. Bayr. Bot. Ges. Muench.* 1905, 458.—Hybr.
Martini, *Léveillé, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1904, repr. 10.—China.
oxylobula, *Greene, Pittonia*, v. 113.—Am. bor.
rotundifolia, *Lura, in Mem. Soc. Esp. Hist. Nat.* ii. 52.—Hispan.
Ruprechti, *Lipsky, in Act. Hort. Tiflis*, vi. t. 73.—Caucas.
sibthorpioides, *Deb. Degen & Herv. in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xv. (1905) 116.—Hispan.
urticaeformis, *Pau, in Bol. Soc. Arag.* ii. 16, nomen.—Hispan.
Urumovi, *Vel. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1901, 31.—Bulgar.
Vollmanni, *Schuster, in Mitth. Bayr. Bot. Ges. Muench.* 1905, 457.—Hybr.
Wiesbauriana, *Schuster, l. c.* 455.—Hybr.

VERREAUXIA, Benth. (Gooden.).
Dyeri, *E. Pritz. in Hook. Ic. Pl.* t. 2782.—Austral.
villosa, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 573.—Austral.

VERTICORDIA, DC. (Myrtac.).
adenocalyx, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 405.—Austral.
Muelleriana, *E. Pritz. in Engl. Jahrb.* xxxv. 407.—Austral.
Pritzelii, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 404.—Austral.
stenopetala, *Diels, l. c.* 402.—Austral.
stylotricha, *Diels, l. c.* 403.—Austral.

VESSELOWSKYA, Pampan. in Ann. di Bot. Roma, ii (1905) 93. *SAXIFRAGACEAE.*
rubifolia, *Pampan. l. c.* (= *Geissois rubifolia*).—Austral.

VETIVERIA, Thou. (Gramin.).
[ANDROPOGON, Linn. I. K.]
zizanioides, *Nash, in Small, Fl. S. E. U. S.* 67 (= *Phalaris zizanioides*).—Am. bor.

VIBURNUM, Linn. (Caprifol.).
arcuatum, *Kom. in Act. Hort. Petrop.* xviii. 427.—As. or.
Beccarii, *Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxii. 114.—Malaya.
bitchiuense, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 156.—Japon.
Bockii, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxix. 585.—China.
bracteatum, *Rehder, in Sargent, Trees & Shrubs*, 135.—Am. bor.
buddleifolium, *C. H. Wright, in Gard. Chron.* 1903, i. 257.—China.
caudatum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 250.—Mexic.
chinshanense, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxix. 585.—China.
ciliatum, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xli. 251.—Mexic.
Dielsii, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxix. 588.—China.
fallax, *Graebn. l. c.* 586.—China.
Giraldii, *Graebn. l. c.* xxxvi. *Beibl.* lxxxii. 99.—China.
lobophyllum, *Graebn. l. c.* xxix. 589.—China.
Nashii, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1128.—Am. bor.
Prattii, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxix. 584.—China.
rectangulatum, *Graebn. l. c.* 588.—China.
Rosthornii, *Graebn. l. c.* 586.—China.
semitomentosum, Rehder, in Rhodora, vi. 59 = scabrellum.
sinuatum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 65.—Ins. Philipp.
sympodiale, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxix. 587.—China.
Veitchi, *C. H. Wright, in Gard. Chron.* 1903, i. 257.—China.
venosum, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 871.—Am. bor.
Wilsonianum, *Graebn. in Engl. Jahrb.* xxix. 589.—China.

VICIA, Tourn. (Legum.).
albescens, *Sag. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1904, 366.—Eur.
baborensis, *Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis*, 110.—Afr. bor.
Copelandi, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 197.—Calif.
Durbrowi, *Eastw. l. c.* 196.—Calif.
glabrescens, *Hayek, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* liii. 449.—Eur.
Pichleri, *Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 82.—Eur.
producta, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 500.—Am. bor.
pumila, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, ii. 88.—Calif.
Semenowi, *B. Fedtsch. in Act. Hort. Petrop.* xxiv. 245 (= *Orobus Semenovii*).—Turkestan.
texana, *Small, Fl. S. E. U. S.* 656.—Am. bor.

VIGNA, Savi (Legum.).
Antunesii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 92.—Afr. trop.
bukobensis, *Harms, l. c.*—Afr. trop.
capitata, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 67.—Afr. trop.
Dekindtiana, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 93.—Afr. trop.
fragrans, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 146.—Afr. trop.
Junodii, *Harms, l. c.* xxx. 93.—Afr. trop.
katangensis, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 67.—Afr. trop.
Laurentii, *Wildem. Énum. Pl. Laurent*, 122.—Afr. trop.
macrantha, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 93.—Afr. trop.
Neumannii, *Harms, l. c.* xxxiii. 175.—Afr. trop.
nuda, *N. E. Br. in Kew Bull.* 1901, 121.—Afr. trop.
Stuhlmannii, *Harms, in Engl. Jahrb.* xxx. 94.—Afr. trop.

VIGNEOPSIS, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 69 (1902). *LEGUMINOSAE.*
lukafuensis, *Wildem. l. c.*—Afr. trop.

VIGUIERA, H. B. & K. (Compos.).
brevifolia, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 103.—Mexic.
eriophora, *Greenm. l. c.* 104.—Mexic.
Goldmanii, *Greenm. l. c.*—Mexic.
guaranitica, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 724.—Parag.
Hassleriana, *Chod. l. c.*—Parag.
hypargyrea, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 105.—Mexic.
Lehmannii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 607.—Ecuador.
linearifolia, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 392.—Parag.
microcephala, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 105.—Mexic.
morelensis, *Greenm. l. c.* xl. 40.—Mexic.
Rosei, *Greenm. l. c.* xxxix. 106.—Mexic.
squalida, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 87.—Bras.
Szyszylowiczii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 459.—Peruv.

VILLADIA, Rose, in Bull. N. York Bot. Gard. iii. (1903) 3. *CRASSULACEAE.*
albiflora, *Rose, in N. Amer. Fl.* xxii. 30 (= *Cotyledon albiflora*).—Mexic.
cucullata, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 4.—Mexic.
imbricata, *Rose, l. c.* 3.—Mexic.
minutiflora, *Rose, l. c.* 4.—Mexic.
Nelsoni, *Rose, l. c.*—Mexic.
Painteri, *Rose, in N. Amer. Fl.* xxii. 30.—Mexic.
parviflora, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 5 (= *Cotyledon parviflora*).—Mexic.
Pringlei, *Rose, l. c.* 4.—Mexic.
ramosissima, *Rose, l. c.* 5.—Mexic.
squamulosa, *Rose, l. c.* (= *Sedum squamulosum*).—Mexic.
stricta, *Rose, in N. Amer. Fl.* xxii. 30.—Mexic.
texana, *Rose, in Bull. N. York Bot. Gard.* iii. 2 (= *Sedum texanum*).—Am. bor.

VILLARESIA, Ruiz & Pav. (Olac.).
costaricensis, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 110.—Am. cent.
Engleriana, *Loes. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 100, nomen.—Bras.

VILLOURATEA, Van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. viii. (1902) 546; et in Ann. Sci. Nat. Sér. VIII. xvi. 239. *OCHNACEAE.*
spiciformis, *Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat.* Sér. VIII. xvi. 240.—Bras.

VINCETOXICUM, Rupp. (Asclep.).
alabamense, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 178.—Am. bor.
bulligerum, *Speg. Nov. Add. Fl. Patag.* ii. (1902), repr. 29.—Patag.
cynanchoides, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 2 (= *Gonolobus cynanchoides*).—Am. bor.
flavidulum, *A. A. Heller, l. c.* (= *Gonolobus flavidulus*).—Am. bor.
hastulatum, *A. A. Heller, l. c.* (= *Gonolobus hastulatus*).—Am. bor.
parviflorum, *A. A. Heller, l. c.* (= *Gonolobus parviflorus*).—Am. bor.
parvifolium, *A. A. Heller, l. c.* (= *Gonolobus parvifolius*).—Am. bor.
pubiflorum, *A. A. Heller, l. c.* (= *Gonolobus pubiflorus*).—Am. bor.
Roberti, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1904, 104.—Bras.
sagittifolium, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 3 (= *Gonolobus sagittifolius*).—Am. bor.
Woottonii, *Vail, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1901, 485.—Mexic.
Wrightii, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 3.—Am. bor.

VIOLA, Tourn. (Violac.).
aberrans, Greene, ex Stone, in Proc. Acad. Philad. lv. 683 = fimbriatula.
achlydophylla, *Greene, Pittonia*, v. 37.—Am. bor.
achyrophora, *Greene, l. c.* 33.—Am. arct.
albertina, *Greene, l. c.* iv. 288.—Am. bor.
ampliata, *Greene, Leaflets Bot. Obs.* i. 3.—Am. bor.
Andersonii, *Greene, Pittonia*, iv. 287.—Am. bor.
Angellae, *Pollard, in Torreya*, ii. 24.—Am. bor.
anodonta, *Greene, Pittonia*, v. 32.—Calif.
arizonica, *Greene, l. c.* 33.—Am. bor.
Atholis, *W. Becker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. ii. 854.—Eur.
Austinae, *Greene, Pittonia*, v. 30.—Calif.
bellidifolia, *Greene, l. c.* iv. 292.—Am. bor.
biternata, *Greene, Pl. Baker.* iii. 12.—Am. bor.
Boissieuana, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvi. 127.—Japon.
borussica, *W. Becker, in Ber. Bayer. Bot. Ges.* viii. 269.—Hybr.
Brainerdii, *Greene, Pittonia*, v. 89.—Am. bor.
Brittoniana, *Pollard, in Britton, Man. Fl. N. U. S.* 635.—Am. bor.
bulgarica, *Becker, in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1905, 440.—Hybr.
Caflischii, *Woerl. in Ber. Bayer. Bot. Ges.* iii. (1893) 21.—Bavaria.
calcarea, *Gregory, in Journ. Bot.* 1904, 68.—Anglia.
cameleo, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 1074.—China.
cardminefolia, *Greene, Pittonia*, iv. 289.—Am. bor.
Cavillieri, *Becker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 45, t. 2.—Eur.
cazorlensis, *Gand. in Bull. Assoc. Fr. Bot.* v. (1902) 226; *Bull. Acad. Géogr. Bot.* xv. (1905) 57.—Hispan.
chaerophylloides, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 17.—Japon.
compacta, *Greene, Pittonia*, iv. 286.—Am. bor.
consors, *Greene, l. c.* v. 100.—Am. bor.
crassa, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xix. 87.—Japon.
crassula, *Greene, Pittonia*, v. 95.—Am. bor.
crenulata, *Greene, l. c.* iv. 295.—Am. bor.
cyclophylla, Greene, l. c. iv. 7 = eucycla.
cyclophylla, *Gandoger, Fl. Lyon.* 53 (1875).—Eur.
demissa, *Greene, Pl. Baker.* iii. 10.—Am. bor.
dentariaefolia, *Boissieu, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 1076.—China.
denticulosa, *Pollard, in Bull. Torr. Bot. Club*, xxviii. 475.—Am. bor.
desertorum, *Greene, Pittonia*, iv. 291.—Am. bor.
discurrens, *Greene, l. c.* v. 26.—Am. bor.
Dufforti, *Fouill. in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot.* ii. 152.—Hybr.
Dureauei, *Petitm. in Monde des Plantes*, Sér. II. vi. 47.—Hybr.
eucycla, *Greene, Pittonia*, v. 88.—Am. bor.

VIOLA:—
Fargesii, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 333.—China.
filipes, Greene, Pittonia, iv. 289.—Am. bor.
Fletcheri, Greene, l. c. 296.—Am. bor.
Francheti, Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 321.—Japon.
fruticans, Bub. Fl. Pyren. iii. 111 = arborescens.
fulcrata, Greene, Pittonia, iv. 285.—Am. bor.
galacifolia, Greene, l. c. v. 30.—Am. bor.
geminiflora, Greene, l. c. 29.—Am. bor.
genevensis, Chenev. in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève, ix. 98.—Hybr.
gomphopetala, Greene, Pl. Baker. iii. 11.—Am. bor.
granatensis, Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1904, 337.—Eur.
Henryi, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 1075.—China.
ibukiana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xix. 106.—Japon.
illinoensis, Greene, Pittonia, iv. 293.—Am. bor.
inamoena, Greene, Pl. Baker. iii. 11.—Am. bor.
incognita, Brainerd, in Rhodora, 1905, 248.—Am. bor.
indivisa, Greene, Pittonia, v. 124.—Am. bor.
Kelloggii, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 100.—Am. bor.
kiusiana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 138.—Japon.
Kronenburgii, W. Becker, in Allg. Bot. Zeitschr. 1905, 26.—Turkestan.
lacteocaerulea, Greene, in Proc. Biol. Soc. Washington, xiv. 70.—Am. bor.
latiuscula, Greene, Pittonia, v. 93.—Am. bor.
lavandulacea, E. P. Bickn. in Torreya, iv. 130.—Am. bor.
leptosepala, Greene, Pittonia, v. 98.—Am. bor.
Leveillei, Boissieu, in Bull. Acad. Géogr. Bot. xi. (1902) 91.—China.
macrotis, Greene, Pittonia, v. 97.—Am. bor.
Makinoi, Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 320.—Japon.
Matsumurae, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 134.—Japon.
Maximowicziana, Makino, l. c. 128.—Japon.
melissaefolia, Greene, Pittonia, v. 103.—Am. bor.
mesochora, Greene, ex Rosend. in Minnes. Bot. Studies, iii. 266.—Am. bor.
micrantha, Porta, ex Huter, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1904, 337.—Eur.
Miyabei, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 124.—Japon.
Mudfordae, Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington, xv. 203.—Am. bor.
multicaulis, Britton, Man. Fl. N. U. S. 640.—Am. bor.
multifida, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 125.—Japon.
muriculata, Greene, Pittonia, v. 28.—Am. bor.
neo-mexicana, Greene, l. c.—Am. bor.
nepetaefolia, Greene, l. c. 92.—Am. bor.
nesiotica, Greene, l. c. 102.—Am. bor.
nodosa, Greene, l. c. iv. 296.—Am. bor.
notabilis, E. P. Bickn. in Torreya, iv. 131.—Am. bor.
Novae-Angliae, House, in Rhodora, vi. 226.—Am. bor.
oenipontana, Murr, in Allg. Bot. Zeitschr. 1905, 147.—Austria.
Okuboi, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 85.—Japon.
ophiophila, Greene, Pittonia, v. 88.—Am. bor.
oreliensis, W. Becker, in Mitth. Thüring. Bot. Ver. n. s. xviii. 76.—Hybr.
oreocallis, Greene, Pittonia, iv. 288.—Am. bor.
oreophila, Greene, l. c. 307 (= V. monticola, Rydb.).—Am. bor.
Painteri, Rose & House, in Proc. U. S. Nat. Mus. xxix. (1905) 443.—Mexic.
pallens, Brainerd, in Rhodora, 1905, 247.—Am. bor.
parnassifolia, Greene, Pittonia, v. 32.—Calif.
pectinata, E. P. Bickn. in Torreya, iv. 129.—Am. bor.
peramoena, Greene, Pittonia, v. 91.—Am. bor.
petrophila, Greene, l. c. iv. 286.—Am. bor.
physalodes, Greene, Pl. Baker. iii. 12.—Am. bor.
Priceana, Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvi. 127.—Am. bor.
Pringlei, Rose & House, in Proc. U. S. Nat. Mus. xxix. (1905) 444.—Mexic.
prionosepala, Greene, Pittonia, v. 90.—Am. bor.
pseudosepincola, W. Becker, in Ber. Bayer. Bot. Ges. viii. 253.—Hybr.
pusilla, Tourl. in Bull. Soc. Bot. Fr. l. 306 = canina.
retroscabra, Greene, Pittonia, iv. 290.—Am. bor.
Ritschliana, W. Becker, in Ber. Bayer. Bot. Ges. viii. 270.—Hybr.

VIOLA:—
Rolandi-Bonaparte, Wolf, in Rev. Bot. Syst. Géogr. Bot. ii. 34.—Hybr.
Rouyana, Wolf, l. c.—Hybr.
rugulosa, Greene, Pittonia, v. 26.—Am. bor.
Rydbergii, Greene, l. c. 27.—Am. bor.
Sandbergii, Greene, l. c. 119.—Am. bor.
sapporensis, Franch. ex Boissieu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlvii. 321 = Francheti.
Savatieri, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 125.—Japon.
scabriuscula, Shafer, in Ann. Carneg. Mus. i. 27.—Am. bor.
scopulorum, Greene, Pittonia, v. 27.—Am. bor.
secedens, Greene, l. c. 121.—Am. bor.
securigera, Greene, l. c. 29.—Am. bor.
senecta, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xvii. 92.—Am. bor.
shikokiana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 132.—Japon.
Siebeana, W. Becker, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 751.—Eur.
splendida, W. Becker, l. c. 750.—Eur.
stenantha, Greene, Pl. Baker. iii. 10.—Am. bor.
Stoneana, House, in Bull. Torr. Bot. Club, 1906, 253.—Am. bor.
striatella, Boissieu, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 1077.—China.
subjuncta, Greene, Pittonia, v. 31.—Am. bor.
subrotunda, Greene, l. c. 118.—Am. bor.
subviscosa, Greene, l. c. iv. 293.—Am. bor.
Tanakaeana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 88.—Japon.
tenuipes, Pollard, in Proc. Biol. Soc. Washington, xv. 201.—Am. bor.
Thasia, W. Becker, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. ii. 855.—Eur.
tokubuchiana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 129.—Japon.
Umemurae, Makino, l. c. 131.—Japon.
unguiculata, Greene, Pittonia, iv. 291.—Am. bor.
variabilis, Greene, l. c. v. 90.—Am. bor.
viarum, Pollard, in Britton, Man. Fl. N. U. S. 635.—Am. bor.
villaquensis, Benz, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, 25.—Hybr.
Weinharti, W. Becker, in Allg. Bot. Zeitschr. 1899, 75.—Hybr.
Wilmattae, A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington, xv. 178.—Am. bor.
Yatabei, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvi. 122.—Japon.
Yazawana, Makino, l. c. 158.—Japon.
Zahnii, Benz, in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1903, 376.—Hybr.

VIORNA, Reichb. (Ranunc.).
[CLEMATIS, Dill. I. K.]
Addisonii, Small, Fl. S. E. U. S. 439 (= Clematis Addisonii).—Am. bor.
arizonica, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 40 (= Clematis arizonica).—Am. bor.
Baldwinii, Small, Fl. S. E. U. S. 439 (= Clematis Baldwinii).—Am. bor.
coccinea, Small, l. c. 438 (= Clematis coccinea).—Am. bor.
crispa, Small, l. c. 437 (= Clematis crispa).—Am. bor.
flaccida, Small, l. c. 438 (= Clematis flaccida).—Am. bor.
Gattingeri, Small, l. c. (= Clematis Gattingeri).—Am. bor.
glaucophylla, Small, l. c. 439 (= Clematis glaucophylla).—Am. bor.
hirsutissima, A. A. Heller, Muhlenbergia, i. 40 (= Clematis hirsutissima).—Am. bor.
obliqua, Small, Fl. S. E. U. S. 438.—Am. bor.
ochroleuca, Small, l. c. 439 (= Clematis ochroleuca).—Am. bor.
ovata, Small, l. c. (= Clematis ovata).—Am. bor.
reticulata, Small, l. c. 435 (= Clematis reticulata).—Am. bor.
Simsii, Small, l. c. (= Clematis Simsii).—Am. bor.
versicolor, Small, l. c. (= Clematis versicolor).—Am. bor.
Viorna, Small, l. c. 439 (= Clematis Viorna).—Am. bor.

VIRECTA, Afzel. (Rubiac.).
obscura, K. Schum. in Engl. Jahrb. xxxiv. 331.—Afr. trop.

VIROLA, Aubl. (Myristic.).
[MYRISTICA, Linn. I. K.]
Koschnyi, Warb. in Fedde, Repert. Nov. Sp. i. 71.—Am. cent.

VISCARIA, Riv. (Caryophyll.).
[LYCHNIS, Tourn. I. K.]
Viscaria, Degen. in Magyar Bot. Lap. iv. 122 (= Lychnis Viscaria).—Eur.; As. bor.

VISCUM, Tourn. (Loranth.).
Bagshawei, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 208.—Afr. trop.
Galpinianum, Schinz, in Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich, xlix. 179.—Afr. austr.
Goetzei, Engl. in Engl. Jahrb. xxx. 304.—Afr. trop.
Menyharthii, Engl. & Schinz, in Denkschr. Akad. Wien, Math.-Nat. lxxviii. 410.—Afr. trop.
nyanzense, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxxvii. 208.—Afr. trop.

VISMIA, Vand. (Hyperic.).
cearensis, Huber, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 313.—Bras.
floribunda, Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. xxii. 428.—N. Granat.
Glaziovii, Ruhl. in Engl. Jahrb. xxx. Beibl. lxvii. 27.—Bras.
Guaramirangae, Huber, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. i. 313.—Bras.
Sprucei, Sprague, in Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. xxii. 428.—Bras.

VITEX, Tourn. (Verben.).
Aherniana, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. vi. 18.—Ins. Philipp.
bipindensis, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxiii. 295.—Afr. trop.
collina, Beauvis. Gen. Montrous. 66 (= Rapinia collina).—N. Caled.
Dekindtiana, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxii. 143.—Afr. trop.
Dinklagei, Guerke, l. c. xxxiii. 294.—Afr. trop.
geminata, H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap. v. 213.—Afr. austr.
Gilletii, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxiii. 298.—Afr. trop.
Guerkeana, H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap. v. 217.—Afr. austr.
Harveyana, H. H. W. Pearson, l. c. 212.—Afr. austr.
helogiton, K. Schum. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee, 369.—N. Guin.
Lehmbachii, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxiii. 297.—Afr. trop.
longipetiolata, Guerke, l. c. 295.—Afr. trop.
lukafuensis, Wildem. in Ann. Mus. Congo, Sér. IV. 121.—Afr. trop.
mooiensis, H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap. v. 212; et in Hook. Ic. Pl. t. 2705.—Afr. austr.
philippinensis, Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull. i. 62.—Ins. Philipp.
quinata, F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 431 (= Cornutia quinata).—As. austr. or.
Rapini, Beauvis. Gen. Montrous. 67.—N. Caled.
reflexa, H. H. W. Pearson, in Dyer, Fl. Cap. v. 215.—Afr. austr.
rivularis, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxiii. 297.—Afr. trop.
sakondriensis, Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par. 1903, 98.—Madag.
Schlechteri, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxiii. 299.—Afr. austr.
siamica, F. N. Williams, in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. v. 431.—Penins. Mal.
Staudtii, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxiii. 299.—Afr. trop.
Turczaninowii, Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull. xxxv. 77 (= Premna philippinensis).—Ins. Philipp.
yaundensis, Guerke, in Engl. Jahrb. xxxiii. 296.—Afr. trop.
Zenkeri, Guerke, l. c. 293.—Afr. trop.

VITICELLA, Dill. (Ranunc.).
[CLEMATIS, Dill. I. K.]
Viticella, Small, Fl. S. E. U. S. 437 (= Clematis Viticella).—Eur.

VITIS, Linn. (Vitac.).
Aubertiana, *Gage, in Rec. Bot. Surv. India*, iii. 36.—Burma.
austrina, *Small, Fl. S. E. U. S.* 755.—Am. bor.
biformis, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 315.—Mexic.
Bodinieri, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 36.—China.
Bronneri, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 40.—German.
calliobotrys, *Jord. l. c.*—German.
Cavaleriei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 36.—China.
cebennensis, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 41.—Gallia.
Chaffanjoni, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 37.—China.
ferax, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 41.—Gallia.
Gentiliana, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 38.—China.
Helleri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 754.—Am. bor.
Labordei, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 40.—China.
laxa, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 41.—Gallia.
Martini, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 41.—China.
multijugata, *Léveillé & Vaniot, l. c.*—China.
oligocarpa, *Léveillé & Vaniot, l. c.*—China.
Potentilla, *Léveillé & Vaniot, l. c.* 43.—China.
rhenana, *Jord. in Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur.* iii. 40.—German.
rigida, *Léveillé & Vaniot, in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe*, 1905, 44.—China.
rubrifolia, *Léveillé & Vaniot, l. c.*—China.
rufotomentosa, *Small, Fl. S. E. U. S.* 756.—Am. bor.
Voineriana, *Baltet, in Rev. Hortic.* 1902, 56.—Cochinch.
Woodrowii, *Cooke, Fl. Bombay*, 248.—Ind. or.

VITIS-IDAEA, Tourn. (Vaccin.).
[VACCINIUM, Linn. I. K.]
Vitis-Idaea, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 708 (= *Vaccinium Vitis-Idaea*).—Am. bor.

VOACANGA, Thou. (Apocyn.).
candiflora, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 603.—Afr. trop.
Chalotiana, *Pierre, ex Stapf, l. c.* 158.—Afr. trop.
Klainii, Pierre, ex Stapf, l. c. 156 = puberula.
lutescens, *Stapf, l. c.* 157.—Afr. trop.
psilocalyx, *Pierre, ex Stapf, l. c.* 159.—Afr. trop.
spectabilis, *Stapf, l. c.* 155.—Afr. trop.
Zenkeri, *Stapf, l. c.* 159.—Afr. trop.

VOCHYSIA, Juss. (Vochys.).
alternifolia, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 33, nomen.—Bras.
brevipetiolata, *Malme, in Arkiv Bot. Stockh.* v. No. 6 (1905) 9.—Bras.
chapadensis, *Malme, l. c.* 11.—Bras.
Nettoana, *Taub. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 33, nomen.—Bras.
Warmingiana, *Taub. ex Glaz. l. c.* nomen.—Bras.

VOLKENSTEINIA, Van Tiegh. in Journ. de Bot. xvi. 192 (1902). *OCHNACEAE.*
gigantophylla, *Van Tiegh. l. c.* 193 (= *Gomphia gigantophylla*).—Bras.
Theophrasta, *Van Tiegh. l. c.* (= *Gomphia Theophrasta*).—Bras.

VOLVULUS, Medic. (Convolv.).
[CALYSTEGIA, R. Br. I. K.]
silvaticus, *Maly, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 1904, 237 (= *Convolvulus silvaticus*).—Eur.

VOUACAPOUA, Aubl. (Legum.).
[ANDIRA, Lam. I. K.]
cuyabensis, *Kunth, Handb. Blütenb.* iii. 404 (= *Andira cuyabensis*).—Bras.
inermis, *Kunth, l. c.* 405 (= *Andira inermis*).—Am. trop.

VRIESEA, Lindl. (Bromel.).
[TILLANDSIA, Linn. I. K.]
acuminata, *Mez & Werckle, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 865.—Am. cent.
Alexandrae, *Hort. ex Gard. Chron.* 1903, I. 245.—Am. trop.

VRIESEA:—
brachyphylla, *Mez & Werckle, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 869.—Am. cent.
Brunei, *Mez & Werckle, l. c.* 865.—Am. cent.
diminuta, *Mez & Werckle, l. c.* 869.—Am. cent.
graminifolia, *Mez & Werckle, l. c.* 868.—Am. cent.
hydrophora, *Ule, in Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, x. (1899) 189.—Bras.
macrantha, *Mez & Werckle, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 867.—Am. cent.
macrochlamys, *Mez & Werckle, l. c.* 865.—Am. cent.
modesta, *Mez, in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 7.—Bras.
Muelleri, *Mez, l. c.*—Bras.
pachyspatha, *Mez & Werckle, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 867.—Am. cent.
Pittieri, *Mez, l. c.* iii. 135.—Am. cent.
rugosa, *Mez & Werckle, l. c.* iv. 866.—Am. cent.
Sanderiana, *Hort. ex Gard. Chron.* 1903, I. 245.—Sumatra.
Werckleana, *Mez, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 136.—Am. cent.

VRYDAGZENIA, Blume (Orchid.).
albostriata, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 83.—N. Guin.
argyrotaenia, *Schlechter, l. c.* 84.—N. Guin.
pachyceras, *Schlechter, l. c.*—N. Guin.
papuana, *Schlechter, l. c.* 85.—N. Guin.
salomonensis, *Schlechter, l. c.* 86.—Ins. Salomon.
Schumanniana, *Kraenzl. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 86.—N. Guin.

VULPIA, C. C. Gmel. (Gramin.).
Danthonii, *Volkart, in Schinz & Keller, Fl. Schweiz*, ed. II. 57 (= *Festuca Danthonii*).—Helvet.
dertonensis, *Volkart, l. c.* (= *Festuca dertonensis*).—Helvet.
obtusa, *Trab. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis*, 385.—Afr. bor.

W

WAHLENBERGIA, Schrad. (Campan.).
brevipes, *Hemsl. in Hook. Ic. Pl.* t. 2768.—China.
cyanea, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 395.—Afr. trop.
depressa, *Dod, in Journ. Bot.* 1901, 400.—Afr. austr.
leucantha, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 396.—Afr. trop.
Tysoni, *A. Zahlbr. in Ann. Nat. Hofmus. Wien*, xviii. 403.—Afr. austr.

WALAFRIDA, E. Mey. (Selagin.).
albanensis, *Rolfe, in Dyer, Fl. Cap.* v. 120 (= *Selago albanensis*).—Afr. austr.
apiculata, *Rolfe, l. c.* 121.—Afr. austr.
articulata, *Rolfe, l. c.* 125 (= *Selago articulata*).—Afr. austr.
ciliata, *Rolfe, l. c.* 119 (= *Selago ciliata*).—Afr. austr.
cinerea, *Rolfe, l. c.* 121 (= *Selago cinerea*).—Afr. austr.
congesta, *Rolfe, l. c.* 123 (= *Selago congesta*).—Afr. austr.
crassifolia, *Rolfe, l. c.*—Afr. austr.
decipiens, *Rolfe, l. c.* 122 (= *Selago decipiens*).—Afr. austr.
densiflora, *Rolfe, l. c.* 127 (= *Selago densiflora*).—Afr. austr.
diffusa, *Rolfe, l. c.* 125 (= *Selago diffusa*).—Afr. austr.
distans, *Rolfe, l. c.* 124 (= *Selago distans*).—Afr. austr.
Fleckii, *Rolfe, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1011.—Afr. trop.
geniculata, *Rolfe, in Dyer, Fl. Cap.* v. 128 (= *Selago geniculata*).—Afr. austr.
gracilis, *Rolfe, l. c.* 126.—Afr. austr.
Macowani, *Rolfe, l. c.* 122.—Afr. austr.
micrantha, *Rolfe, l. c.* 126 (= *Selago micrantha*).—Afr. austr.
minuta, *Rolfe, l. c.* 129.—Afr. austr.
myrtifolia, *Rolfe, l. c.* 119 (= *Selago myrtifolia*).—Afr. austr.
Nachtigali, *Rolfe, l. c.* 124 (= *Selago Nachtigali*).—Afr. austr.

WALAFRIDA:—
paniculata, *Rolfe, in Dyer, Fl. Cap.* v. 127 (= *Selago paniculata*).—Afr. austr.
polycephala, *Rolfe, l. c.* 123 (= *Selago polycephala*).—Afr. austr.
polystachya, *Rolfe, l. c.* 129.—Afr. austr.
pubescens, *Rolfe, l. c.* 126.—Afr. austr.
recurva, *Rolfe, l. c.* 120 (= *Selago recurva*).—Afr. austr.
rotundifolia, *Rolfe, l. c.* 121 (= *Selago rotundifolia*).—Afr. austr.
saxatilis, *Rolfe, l. c.* 126 (= *Selago saxatilis*).—Afr. austr.
Schinzii, *Rolfe, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iv. 1011.—Afr. trop.
squarrosa, *Rolfe, in Dyer, Fl. Cap.* v. 125.—Afr. austr.
tenuifolia, *Rolfe, l. c.* 124.—Afr. austr.
witbergensis, *Rolfe, l. c.* 122 (= *Selago witbergensis*).—Afr. austr.
Zeyheri, *Rolfe, l. c.* 120 (= *Selago Zeyheri*).—Afr. austr.
zuurbergensis, *Rolfe, l. c.*—Afr. austr.

WALDSTEINIA, Willd. (Rosac.).
idahoensis, *Piper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 180.—Am. bor.

WALLENIA, Sw. (Myrsin.).
bumelioides, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 415 (= *Ardisia bumelioides*).—Cuba.
clusioides, *Mez, l. c.* 411 (= *Ardisia clusioides*).—Ind. occ.
crassifolia, *Mez, l. c.* 409.—Ind. occ.
Fawcettii, *Mez, l. c.* 408.—Ind. occ.
Grisebachii, *Mez, l. c.* 411.—Ind. occ.
jacquinioides, *Mez, l. c.* 416 (= *Ardisia jacquinioides*).—Ind. occ.
Lamarckiana, *Mez, l. c.* 414 (= *Badula Lamarckiana*).—Ind. occ.
pendula, *Mez, l. c.* 413 (= *Ardisia pendula*).—Ind. occ.
Purdieana, *Mez, l. c.* 408.—Ind. occ.
purpurascens, *Mez, l. c.* 412 (= *Ardisia purpurascens*).—Ind. occ.
Urbaniana, *Mez, l. c.* 415.—Ind. occ.
xylosteoides, *Mez, l. c.* 409 (= *Ardisia xylosteoides*).—Ind. occ.
yunquensis, *Mez, l. c.* 413 (= *Ardisia yunquensis*).—Ind. occ.

WALSURA, Roxb. (Meliac.).
Aherniana, *Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 34.—Ins. Philipp.

WALTHERIA, Linn. (Stercul.).
bahamensis, *Britton, in Torreya*, iii. 105.—Ind. occ.

WARMINGIA, Reichb. f. (Orchid.).
Loefgrenii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. 119.—Bras.

WARNECKEA, Gilg, in Engl. Jahrb. xxxiv. (1904) 100. *MELASTOMACEAE.*
amaniensis, *Gilg, l. c.* 101.—Afr. trop.

WARSZEWICZELLA, Reichb. f. (Orchid.):
[ZYGOPETALUM, Hook. I. K.]
flabelliformis, *Cogn. in Urb. Symb. Antill.* iv. 182 (= *Epidendrum flabelliforme*).—Ind. occ.

WASHINGTONIA, Rafin. (Umbell.).
[OSMORRHIZA, Rafin. I. K. S. II.]
mexicana, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 337 (= *Osmorrhiza mexicana*).—Mexic.

WATSONIA, Mill. (Irid.).
transvaalensis, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 868.—Afr. austr.

WEBERA, Schreb. (Rubiac.).
[TARENNA, Gaertn. I. K.]
congensis, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 106.—Afr. trop.
Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 67.—Penins. Mal.
gracilis, *Stapf, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 106.—Afr. trop.
Ridleyi, *H. H. W. Pearson, ex King & Gamble, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 66.—Penins. Mal.
Wrayi, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxxiii. 69.—Penins. Mal.
Yappii, *King, l. c.* 70.—Penins. Mal.

WEDELIA, Jacq. (Compos.).
coplapina, *Reiche, Fl. Chile*, iv. 89 (= *Helianthus copiapinus*).—Chili.
Eggersii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 604.—Ecuador.
instar, *S. Moore, in Journ. Linn. Soc.* xxxv. 343.—Afr. trop.
Jelskii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxxvi. 488.—Peruv.
longipes, *Urb. Symb. Antill.* iii. 411.—Ind. occ.

WEIGELTIA, A. DC. (Myrsin.).
[CYBIANTHUS, Mart. I. K.]
antillana, *Mez, in Urb. Symb. Antill.* ii. 423.—Ind. occ.
bogotensis, *Mez, in Engl. Pflanzenreich, Myrsin.* 288.—N. Granat.
densiflora, *Mez, l. c.* 286 (= *Cybianthus densiflora*).—Bras.
Glaziovii, *Mez, l. c.* 289.—Bras.
Goudotiana, *Mez, l. c.* 290.—N. Granat.
grandiflora, *Mez, l. c.* 287.—Guiana.
humilis, *Mez, l. c.* 291.—N. Granat.
microbotrys, *Mez, l. c.* 285 (= *Cybianthus microbotrys*).—Guiana.
nitida, *Mez, l. c.* 288.—Bras.
parviflora, *Mez, l. c.*—Guiana.
Potiaei, *Mez, l. c.* 285.—Guiana.
Quelchii, *Mez, l. c.* 288 (= *Ardisia Quelchii*).—Guiana.
Schlimii, *Mez, l. c.* 291 (= *Comomyrsine Schlimii*).—N. Granat.
Schomburgkiana, *Mez, l. c.* 285.—Guiana.
simplex, *Mez, l. c.* 290 (= *Comomyrsine simplex*).—Ecuador.
Sprucei, *Mez, l. c.* (= *Comomyrsine Sprucei*).—Ecuador.
surinamensis, Mez, l. c. 289 = myrianthos.

WEINMANNIA, Linn. (Saxifr.).
Baccariniana, *Pampan. in Ann. di Bot. Roma*, ii. 81.—Peruv.
goyazensis, *K. Schum. in Engl. Jahrb.* xxx. *Beibl.* lxvii. 29.—Bras.
laxiflora, *Pampan. in Ann. di Bot. Roma*, ii. 77.—Boliv.
rarotongensis, *Hemsl. ex Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 278.—Ins. Cook.
trichocarpa, *Pampan. in Ann. di Bot. Roma*, ii. 67.—Peruv.

WENDLANDIA, Bartl. (Rubiac.).
papuana, *Lauterb. in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Sudsee*, 390.—N. Guin.

WENDLANDIELLA, Damm. in Engl. Jahrb. xxxvi. (1905) *Beibl.* lxxx. 31. *PALMAE.*
gracilis, *Damm. l. c.* 32.—Bras.

WERNERIA, H. B. & K. (Compos.).
Lehmannii, *Hieron. in Engl. Jahrb.* xxviii. 647.—Ecuador.
rosea, *Hieron. l. c.* 648.—Ecuador.
Kosenii, *R. Fries, in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal.* Ser. IV. i. no. 1, 90.—Reg. Argent.

WIDDRINGTONIA, Endl. (Conif.).
[CALLITRIS, Vent. I. K.]
equisetiformis, *Masters, in Journ. Linn. Soc.* xxxvii. 271.—Afr. austr.
Mahoni, *Masters, l. c.*—Afr. trop.
Schwarzii, *Masters, l. c.* 269 (= *Callitris Schwarzii*).—Afr. austr.

WIKSTROEMIA, Endl. (Thymel.).
lanceolata, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxix. 31.—Ins. Philipp.
Meyeniana, *Warb. in Perkins, Frag. Fl. Philipp.* 171.—Ins. Philipp.

WILLARDIA, Rose, in Conzatti, Gén. Veget. Mexic. 223 (1905). *LEGUMINOSAE.*
mexicana, *Rose, l. c.*—Mexic.
parviflora, *Rose, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* viii. 313.—Mexic.

WILLKOMMIA, Hack. (Gramin.).
Newtonii, *Hack. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. I. iv. 810 (1896).—Afr. trop.
texana, *Hitchcock, in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 283.—Am. bor.

WILLUGBAEYA, Neck. (Compos.).
[MIKANIA, Willd. I. K.]
Halei, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1170.—Am. bor.
heterophylla, *Small, l. c.*—Am. bor.

WINKLERELLA, Engl. in Engl. Jahrb. xxxviii. (1906) 97. *PODOSTEMACEAE.*
dichotoma, *Engl. l. c.*—Afr. trop.

WISLIZENIA, Engelm. (Capparid.).
scabrida, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 490.—Am. bor.

WISSADULA, Medic. (Malvac.).
elongata, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 210 (1905).—Mexic.
gracilis, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 30.—Mexic.
Hassleriana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 400.—Parag.
incana, *T. S. Brandegee, in Zoe*, v. 210 (1905).—Mexic.
oligomera, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 400.—Parag.
paraguayensis, *Chod. l. c.*—Parag.
sordida, *Hochr. in Ann. Conserv. & Jard. Bot. Genève*, 1902, 29.—Boliv.

WISTARIA, Nutt. (Legum.).
involuta, Sprague, in Gard. Chron. 1904, II. 141 = Derris involuta.
pilipes, *Sprague, l. c.* 142 (= *Millettia pilipes*).—Austral.

WITTIA, K. Schum. in Monatsschr. Kakt. 1903, 117. *CACTACEAE.*
amazonica, *K. Schum. l. c.*—Bras.

WOODBURNIA, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiii. (1904) 23. *ARALIACEAE.*
penduliflora, *Prain, l. c.*—Burma.

WORMSKIOLDIA, Thonn. (Turner.).
rosulata, *Urb. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, iv. 173.—Afr. trop.

WRIGHTIA, R. Br. (Apocyn.).
cambodiensis, *Pierre, in L. Planch. Prod. Apocyn.* (1894) 333, nomen.—Cochinch.
filipendula, *Pierre, l. c.* nomen.—Cochinch.
Laniti, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxvii. 59 (= *Anasser Laniti*).—Ins. Philipp.

WULFHORSTIA, C. DC. (Meliac.).
ekebergioides, *Harms, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 271.—Afr. trop.

WURMBEA, Thunb. (Liliac.).
Goetzei, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxx. 272.—Afr. trop.

WYETHIA, Nutt. (Compos.).
lanceolata, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 341.—Am. bor.

X

XANTHISMA, DC. (Compos.).
Berlandieri, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1184.—Am. bor.

XANTHIUM, Linn. (Compos.).
commune, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 912.—Am. bor.
glabratum, *Britton, l. c.*—Am. bor.
inflexum, *Mackenzie & Bush, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1905, 106.—Am. bor.
Macounii, *Britton, Man. Fl. N. U. S.* 913.—Am. bor.
Wootoni, *Auct. in Proc. Biol. Soc. Washington*, xvi. 167.—Am. bor.

XANTHOCEPHALUM, Willd. (Compos.).
megalocephalum, *Fern. in Proc. Amer. Acad.* xxxvi. 505.—Mexic.

XANTHOPHYLLUM, Roxb. (Polygal.).
glandulosum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 34.—Ins. Philipp.
pomiferum, *Boerl. & Valet. in Ic. Bogor.* t. lxxviii.—Hort.

XANTHOSIA, Rudge (Umbell.).
silvatica, *Diels, in Engl. Jahrb.* xxxv. 455.—Austral.

XANTHOSOMA, Schott (Arac.).
brevispathaceum, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxvii. 137.—Peruv.
daguense, *Engl. l. c.*—N. Granat.
flavomaculatum, *Engl. l. c.* 139.—N. Granat.
Kerberi, *Engl. l. c.* 138.—Mexic.
tarapotense, *Engl. l. c.*—Peruv.
yucatanense, *Engl. l. c.*—Am. cent.

XANTHOSTEMON, F. Muell. (Myrtac.).
aurantiacum, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 26 (= *Fremya aurantiaca*).—N. Caled.
Beauvisagei, *Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. xii. 684.—N. Caled.
flavum, *Schlechter, l. c.* (= *Fremya flava*).—N. Caled.
glaucum, *Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* n. s. xii. 682.—N. Caled.
macrophyllum, *Pampan. l. c.* 683.—N. Caled.
Merrillii, *Pampan. l. c.* 688.—Ins. Philipp.
Montrouzieri, *Pampan. l. c.* 687.—N. Caled.
multiflorum, *Beauvis. Gen. Montrouz.* 46 (= *Drapernaudia multiflora*).—N. Caled.
Pancheri, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 24 (= *Fremya Pancheri*).—N. Caled.
speciosum, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* vi. 10.—Ins. Philipp.

XANTHOXALIS, Small, Fl. S. E. U. S. 666 (1903). *OXALIDACEAE.*
Brittoniae, *Small, l. c.* 668 (= *Oxalis Brittoniae*).—Am. bor.
Bushii, *Small, l. c.* 667 (= *Oxalis Bushii*).—Am. bor.
colorea, *Small, l. c.* 668.—Am. bor.
corniculata, *Small, l. c.* 667 (= *Oxalis corniculata*).—Am. bor.
cymosa, *Small, l. c.* 668 (= *Oxalis cymosa*).—Am. bor.
filipes, *Small, l. c.* 667 (= *Oxalis filipes*).—Am. bor.
grandis, *Small, l. c.* 668 (= *Oxalis grandis*).—Am. bor.
hirsuticaulis, *Small, l. c.* 669 (= *Oxalis hirsuticaulis*).—Am. bor.
interior, *Small, l. c.* 668.—Am. bor.
Langloisii, *Small, l. c.* 667.—Am. bor.
macrantha, *Small, l. c.*—Am. bor.
Priceae, *Small, l. c.* 669 (= *Oxalis Priceae*).—Am. bor.
recurva, *Small, l. c.* 668 (= *Oxalis recurva*).—Am. bor.
rufa, *Small, l. c.* (= *Oxalis rufa*).—Am. bor.
stricta, *Small, l. c.* 667 (= *Oxalis stricta*).—Am. bor.
texana, *Small, l. c.*—Am. bor.

XEROTES, R. Br. (Juncac.).
Andrewsii, *Fitzger. in Journ. Muell. Soc. W. Austral.* i. 36.—Austral.
Benthamiana, *Fitzger. l. c.*—Austral.
hermaphrodita, *C. Andrews, in Journ. Muell. Soc. W. Austral.* ix. 20.—Austral.

XIPHAGROSTIS, Coville, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb. ix. 400 (1905). *GRAMINEAE.*
floridula, *Coville, l. c.* 399 (= *Saccharum floridulum*).—As.; Polynes.
japonica, *Coville, l. c.* 400 (= *Saccharum japonicum*).—As. or.; Polynes.

XOLISMA, Rafin. (Eric.).
[ANDROMEDA, Linn. I. K.]
foliosiflora, *Small, Fl. S. E. U. S.* 889.—Am. bor.

XYLIA, Benth. (Legum.).
fraterna, *Drake, Hist. Pl. Madag.* i. 40 (= *Parkia fraterna*).—Madag.
Hoffmanni, *Drake, l. c.* (= *Parkia Hoffmanni*).—Madag.

XYLINABARIA, Pierre (Apocyn.).
Reynaudi, *Jumelle, in Rev. Cult. Colon.* x. 363; *Pl. Caoutch. Gutta*, 430.—Tonkin.

XYLOPHACOS, Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S. 619 (1903). *LEGUMINOSAE.*
amphioxus, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 662 (= *Astragalus amphioxus*).—Am. bor.
missouriensis, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 620 (= *Astragalus missouriensis*).—Am. bor.
Newberryi, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 662 (= *Astragalus Newberryi*).—Am. bor.
Parryi, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus Parryi*).—Am. bor.
Purshii, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus Purshii*).—Am. bor.
pygmaeus, *Rydb. l. c.* (= *Phaca pygmaea*).—Am. bor.
Shortianus, *Rydb. in Small, Fl. S. E. U. S.* 1332 (= *Astragalus Shortianus*).—Am. bor.

XYLOPHACOS:—
uintensis, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 662 (= *Astragalus uintensis*).—Am. bor.
vespertinus, *Rydb. l. c.* (= *Astragalus vespertinus*).—Am. bor.

XYLOPHRAGMA, Sprague, in Hook. Ic. Pl. t. 2770 (1903). *BIGNONIACEAE.*
myrianthum, *Sprague, l. c.* (= *Tecoma myriantha*).—Bras.
pratense, *Sprague, l. c.* (= *Tecoma pratensis*).—Peruv.

XYLOPHYLLA, Linn. = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).
ensifolia, Bojer, ex Drake, Hist. Pl. Madag. i. 191 = Phylloxylon ensifolius.

XYLOPIA, Linn. (Anonac.).
arenaria, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 159.—Afr. trop.
Batesii, *Pierre, ex Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl.* vi. 62.—Afr. trop.
Batayei, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. IV. 33.—Afr. trop.
congolensis, *Wildem. l. c.* Sér. V. 41.—Afr. trop.
dehiscens, *Merrill, in Forest. Bur. Philipp. Bull.* i. 20 (= *Unona dehiscens*).—Ins. Philipp.
Dekeyzeriana, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 46.—Afr. trop.
Elliotii, *Pierre, ex Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl.* vi. 65.—Afr. trop.
Gilletii, *Wildem. in Ann. Mus. Congo*, Sér. V. i. 42.—Afr. trop.
Holtzii, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 159.—Afr. trop.
humilis, *Engl. & Diels, in Monogr. Afr. Pfl.* vi. 60.—Afr. trop.
Klaineana, *Pierre, ex Engl. & Diels, l. c.* 59.—Afr. trop.
parviflora, *Pierre, ex Engl. & Diels, l. c.* 64 (= *Uvaria parviflora*).—Afr. trop.
Poggeana, *Pierre, ex Engl. & Diels, l. c.* 65.—Afr. trop.
Quintasii, *Pierre, ex Engl. & Diels, l. c.* 62.—Afr. trop.
striata, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxxiv. 160.—Afr. trop.
Ulei, *Diels, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xlvii. (1905) 133.—Reg. Amaz.

XYLORRHIZA, Nutt. (Compos.).
[ASTER, Tourn. I. K.]
Brandegei, *Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1905, 124.—Am. bor.
coloradensis, *Rydb. l. c.* (= *Aster coloradoensis*).—Am. bor.
scopulorum, *A. Nelson, in Coult. Bot. Gaz.* xxxvii. 270.—Am. bor.
venusta, *A. A. Heller, Muhlenbergia*, i. 8 (= *Aster venustus*).—Am. bor.

XYLOSMA, Forst. f. (Bixac.).
gracile, *Hemsl. ex Cheesem. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 272.—Ins. Cook.
ilicifolia, *Northr. in Mem. Torr. Bot. Club*, xii. 51.—Ins. Baham.
turrialbanum, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxi. 109.—Am. cent.

XYLOSTEON, Tourn. (Caprifol.).
[LONICERA, Linn. I. K.]
conjugialis, *Howell, Fl. N. W. Amer.* i. 282 (= *Lonicera conjugialis*).—Am. bor.
Ledebourii, *Howell, l. c.* (= *Lonicera Ledebourii*).—Am. bor.
utahensis, *Howell, l. c.* (= *Lonicera utahensis*).—Am. bor.

XYMALOS, Baill. (Bixac.).
usambarensis, *Engl. in Engl. Jahrb.* xxx. 310 (= *Paxiodendron usambarense*).—Afr. trop.

XYRIS, Gronov. (Xyrid.).
angularis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 22.—Afr. trop.
arenicola, *Small, Fl. S. E. U. S.* 234.—Am. bor.
aristata, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 11.—Afr. trop.
bahiana, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. XIX. 8.—Bras.
Barteri, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 22.—Afr. trop.
batokana, *N. E. Br. l. c.* 23.—Afr. trop.
Baumii, *A. Nilsson, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 161.—Afr. trop.

XYRIS:—
brunnea, *A. Nilsson, in Engl. Jahrb.* xxx. 271.—Afr. trop.
concinna, *N. E. Br. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. vi. 68.—Guiana.
dispar, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 12.—Afr. trop.
Gardneri, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. XIX. 8.—Bras.
humpatensis, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 5.—Afr. trop.
makuensis, *N. E. Br. l. c.* 17.—Afr. trop.
multicaulis, *N. E. Br. l. c.* 20.—Afr. trop.
obscura, *N. E. Br. l. c.* 6.—Afr. trop.
pallescens, *Small, Fl. S. E. U. S.* 234.—Am. bor.
scabrifolia, *Harper, in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 325.—Am. bor.
Spruceana, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvi. XIX. 12.—Venez.
zombana, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* viii. 13.—Afr. trop.

XYSMALOBIUM, R. Br. (Asclep.).
barbigerum, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 307.—Afr. trop.
Brownianum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1908, 309.—Afr. austr.
Cecilae, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 310.—Afr. trop.
dispar, *N. E. Br. l. c.* 307.—Afr. trop.
gramineum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1902, 254.—Afr. trop.
grande, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 311 (= *Glossostelma angolense*).—Afr. trop.
leucotrichum, *N. E. Br. l. c.* 615 (= *Asclepias leucotricha*).—Afr. trop.
Schumannianum, *S. Moore, in Journ. Bot.* 1901, 259.—Afr. trop.
spathulatum, *N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. I. 312 (= *Gomphocarpus spathulatus*).—Afr. trop.
trilobatum, *N. E. Br. l. c.* 306 (= *Woodia trilobata*).—Afr. trop.

Y

YEATESIA, Small (Acanth.).
[GATESIA, A. Gray I. K. S. II.]
viridiflora, *Small, Fl. S. E. U. S.* 1087 (= *Rhytiglossa viridiflora*).—Am. bor.

YUCCA, Dill. (Liliac.).
angustissima, *Engelm. ex Trelease, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1902, 68.—Am. bor.
arborescens, *Trelease, l. c.* 1892, 163.—Am. bor.
Faxoniana, *Sarg. Man. Trees N. Amer.* 121.—Am. bor.
Harrimaniae, *Trelease, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1902, 69.—Am. bor.
karlsruhensis, *Graebener, in Mitth. Deutsch. Dendrol. Ges.* 1903, 7.—Hybr.
louisianensis, *Trelease, in Rep. Missouri Bot. Gard.* 1902, 64.—Am. bor.
rigida, *Trelease, l. c.* 65.—Mexic.
rostrata, *Engelm. ex Trelease, l. c.* 68.—Mexic.
tenuistyla, *Trelease, l. c.* 53.—Am. bor.

Z

ZALUZANIA, Pers. (Compos.).
Pringlei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 101.—Mexic.

ZALUZIANSKYA, F. W. Schmidt (Scrophul.).
africana, *Hiern, in Dyer, Fl. Cap.* iv. II. 342 (= *Erinus africanus*).—Afr. austr.
Bolusii, *Hiern, l. c.* 352.—Afr. austr.
collina, *Hiern, l. c.* 346.—Afr. austr.
distans, *Hiern, l. c.* 340.—Afr. austr.
Flanagani, *Hiern, l. c.* 351.—Afr. austr.
Katharinae, *Hiern, l. c.* 341.—Afr. austr.
montana, *Hiern, l. c.* 342.—Afr. austr.
ramosa, *Schinz, ex Hiern, l. c.* 353.—Afr. austr.

ZAMIA, Linn. (Cycad.).
Tuerckheimii, *Donn. Sm. in Coult. Bot. Gaz.* xxxv. 8, t. 1.—Am. cent.

ZAMIOCULCAS, Schott (Arac.).
zamiifolia, *Engl. Pflanzenreich, Arac.-Poth.* 305 (= *Caladium zamiaefolium*).—Afr. trop.

ZANTEDESCHIA, Spreng. (Arac.).
[RICHARDIA, Kunth. I. K.]
chloroleuca, *Engl. & Gilg, in Warb. Kunene-Sambesi Exped.* 180.—Afr. trop.
Rehmannii, Sprenger, in Wien. Ill. Gart. Zeit. 1901, 415 = Richardia Rehmannii.

ZANTHOXYLUM, Linn. (Rutac.).
Eichleri, *Engl. ex Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 63, nomen.—Bras.
Glaziovianum, *Engl. ex Glaz. l. c.* nomen.—Bras.

ZAUSCHNERIA, Presl (Onagrac.).
argentea, *A. Nelson, in Proc. Biol. Soc. Washington*, xviii. 173.—Am. bor.
arizonica, *Davids. in Bull. S. Calif. Acad.* i. 4.—Am. bor.

ZELKOVA, Spach (Urtic.).
serrata, Makino, in Bot. Mag. Tokyo, xvii. 13 = acuminata.

ZENOBIA, D. Don (Ericac.).
cerasiflora, *Léveillé, in Bull. Acad. Géogr. Bot.* xii. (1903) 253.—China.

ZEPHYRANTHES, Herb. (Amaryll.).
jujuyensis, *Holmb. in Anal. Mus. Buenos Aires*, Ser. III. iv. 523.—Reg. Argent.
melanopotamica, *Speg. in Anal. Mus. Buenos Aires*, vii. 169.—Patag.
mesochloa, *Baker, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. iii. 1100 (= *Amaryllis mesochloa*).—Parag.
timida, *Holmb. in Anal. Mus. Buenos Aires*, Ser. III. ii. 77.—Reg. Argent.

ZEUGITES, P. Br. (Gramin.).
Pittieri, *Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* 1902, 373.—Am. cent.

ZEUXINE, Lindl. (Orchid.).
Erimae, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 90.—N. Guin.
montana, *Schlechter, l. c.* 91.—Ins. Bismarck.
rupestris, *Ridley, in Journ. As. Soc Straits*, xxxix. 86.—Penins. Mal.
torricellensis, *Schlechter, in K. Schum. & Lauterb. Nachtr. Fl. Deutsch. Südsee*, 92.—N. Guin.
Vieillardii, *Schlechter, in Engl. Jahrb.* xxxvi. 19 (= *Rhamphidia Vieillardii*).—N. Caled.

ZEXMENIA, La Llave (Compos.).
foliosa, *Rusby, ex Jones, in Proc. Amer. Acad.* xli. 162.—Boliv.
gracilis, *Jones, l. c.* 154.—Mexic.
Palmeri, *Greenm. ex Jones, l. c.* 149.—Mexic.
Pittieri, *Greenm. ex Jones, l. c.* 156.—Am. cent.
Rosei, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xl. 42.—Mexic.
squarrosa, *Greenm. ex Jones, in Proc. Amer. Acad.* xli. 151.—Mexic.
xylopoda, *Jones, l. c.* 150.—Mexic.

ZINGIBER, Adans. (Scitam.).
acuminatum, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 13.—Java.
alliaceum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 179 (= *Donacodes alliaceum*).—Malaya.
atrorubens, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 252.—China.
borneense, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 178.—Borneo.
Cholmondeleyi, *K. Schum. l. c.* 172.—Austral.
didymoglossa, *K. Schum. l. c.* 186.—China.
macrorrhynchus, *K. Schum. l. c.* 176.—Sumatra.
monophyllum, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. 250.—Tonkin.
neglectum, *Valet. in Bull. Inst. Buitenz.* xx. 12.—Java.
oligophyllum, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 185.—Formosa.
pleiostachyum, *K. Schum. l. c.*—Formosa.
porphyrosphaera, *K. Schum. l. c.* 175.—Borneo.

ZINGIBER :—
rufopilosum, *Gagnep. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlix. (1903) 349.—Tonkin.
stenostachys, *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich, Zingib.* 175.—Borneo.
tongtak, *K. Schum. l. c.* 177.—Malaya.
Wrayii, *Prain, ex Ridley, in Journ. As. Soc. Straits*, xli. 31.—Penins. Mal.

ZIZIA, Koch (Umbell.).
[CARUM, Rupp. I. K.]
arenicola, *Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xxix. (1905) 442.—Am. bor.

ZIZYPHUS, Tourn. (Rhamnac.).
Allemaovii, *Glaz. in Bull. Soc. Bot. Fr.* lii. Mém. III. 110, nomen.—Bras.
arborea, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* vi. 11.—Ins. Philipp.
guaranitica, *Malme, in Bih. Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xxvii. no. 11, 20.—Parag.
inermis, *Merrill, in Philipp. Gov. Lab. Bur. Bull.* xxxv. 37.—Ins. Philipp.

ZOLLIKOFERIA, DC. (Compos.).
[LAUNAEA, Cass. I. K.]
anomala, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. Algér. Tunis.* 216.—Afr. bor.
arborescens, *Batt. l. c.* 215.—Afr. bor.

ZORNIA, J. F. Gmel. (Legum.).
cearensis, *Huber, in Bull. Herb. Boiss.* Sér. II. i. 307.—Bras.

ZORNIA :—
cryptantha, *Arech. in Anal. Mus. Montevideo*, iii. 358.—Urug.

ZOZIMIA, DC. (Umbell.).
pamirica, *Lipsky, ex Paulsen, in Kjøb. Vidensk. Meddel.* 1903, 143.—As. cent.

ZYGADENUS, Michx. (Liliac.).
alpinus, *Blank, in Montana Agric. Coll. Sci. Studies, Bot.* i. 44.—Am. bor.
dilatatus, *Greene, Pl. Baker.* i. 51.—Am. bor.
gracilentus, *Greene, Pittonia*, iv. 241.—Mexic.
japonicus, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo*, xvii. 162.—Japon.
longus, *Greene, Pittonia*, iv. 240.—Am. bor.
micranthus, *Eastw. in Bull. Torr. Bot. Club*, 1903, 488.—Calif.
mohinorensis, *Greenm. in Proc. Amer. Acad.* xxxix. 71.—Mexic.

ZYGANTHERA, N. E. Br. in Dyer, Fl. Trop. Afr. viii. 160 (1901). *ARACEAE.*
Buttneri, *N. E. Br. l. c.* (= *Pseudohydrosme Buettneri*).—Afr. trop.

ZYGIA, P. Br. (Legum.).
[PITHECOLOBIUM, Mart. I. K.]
brevifolia, *Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest.* xiv. 248 (= *Pithecolobium brevifolium*).—Am. bor.
flexicaulis, *Sudw. l. c.* (= *Acacia flexicaulis*).—Am. bor.

ZYGIA :—
Unguis-cati, *Sudw. in U. S. Dept. Agric. Bull. Forest.* xiv. 248 (= *Mimosa Unguis-cati*).—Am. bor.

ZYGODIA, Benth. (Apocyn.).
melanocephala, *Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr.* iv. i. 219 (= *Oncinotis melanocephala*).—Afr. trop.

ZYGOGYNUM, Baill. (Magnol.).
Baillonii, *Van Tiegh. in Journ. de Bot.* xiv. 340.—N. Caled.
Balansae, *Van Tiegh. l. c.* 341.—N. Caled.
bicolor, *Van Tiegh. l. c.*—N. Caled.
spathulatum, *Van Tiegh. l. c.*—N. Caled.

ZYGOMENES, Salisb. (Commelin.).
[CYANOTIS, D. Don. I. K.]
cristata, *W. F. Wight, in U. S. Dept. Agric. Contrib. Nat. Herb.* ix. 404 (= *Commelina cristata*).—Ind. or.; Malaya.

ZYGOPETALUM, Hook. (Orchid.).
Binoti, *Wildem. in Gard. Chron.* 1905, ii. 258.—Bras.

ZYGOPHYLLIDIUM, Small, Fl. S. E. U. S. 714 (1903). *EUPHORBIACEAE.*
hexagonum, *Small, l. c.* (= *Euphorbia hexagona*).—Am. bor.

ZYGOPHYLLUM, Linn. (Zygophyll.).
depauperatum, *Drake, in Bull. Mus. Hist. Nat. Par.* 1903, 38.—Madag.